

# 2018年

全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书（主管护师）

# 护理学（中级）考试 押题密卷

（第3版）

主编◎尹安春

中国医药科技出版社



— 扫我 —  
让考试变得简单

2018年全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书（主管护师）

# 护理学（中级）考试押题密卷

（第3版）

- |     |     |              |
|-----|-----|--------------|
| 主 编 | 尹安春 |              |
| 编 者 | 尹安春 | 大连医科大学附属第一医院 |
|     | 郭慧芳 | 大连医科大学附属第一医院 |
|     | 贾立红 | 大连医科大学附属第一医院 |
|     | 张淑萍 | 北京市第六医院      |
|     | 纪 楠 | 北京市第六医院      |
|     | 彭丽丽 | 中日友好医院       |
|     | 陈 雪 | 北京妇产医院       |
|     | 马方方 | 中国人民解放军空军总医院 |
|     | 邵芙玲 | 中国人民解放军空军总医院 |
|     | 张 颖 | 朝阳市第二医院      |
|     | 高秀宏 | 朝阳市中心医院      |
|     | 张 楠 | 大连市万卷图书馆     |
|     | 修士会 | 朝阳市中心医院      |
|     | 王克勤 | 朝阳市第二医院      |
|     | 王淑艳 | 朝阳市第二医院      |
|     | 高晓光 | 大连医科大学附属第二医院 |

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本试卷结合 2018 年全国卫生专业技术资格考试大纲编写而成, 依据考点精选两套押题密卷, 每套模拟试卷包括基础知识、相关专业知识和专业知识和专业实践能力部分, 为了满足同一学科不同专业考生的需求, 专业知识和专业实践能力部分按各专业考试大纲要求分别编写。本试卷全面把握考试趋势, 精准预测考题, 真正做到提升解题能力夺取高分。让您真正一书在手, 考试无忧。

本书除供参加考试的考生使用外, 还可供专、本科学专业、全日制和成人教育的考生在临床教学、实习教学环节上使用。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

护理学 (中级) 考试押题密卷 / 尹安春主编. —3 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2017. 8

2018 年全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书. 主管护师

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9012 - 3

I. ①护… II. ①尹… III. ①护理学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 008519 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 787 × 1092mm<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

字数 344 千字

初版 2016 年 1 月第 1 版

版次 2017 年 8 月第 3 版

印次 2017 年 8 月第 1 次印刷

印刷 三河市腾飞印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9012 - 3

定价 38.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前 言

全国卫生专业技术资格考试实行全国统一组织、统一大纲、统一试题、统一评分标准。由人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会共同组织实施，参加卫生专业技术资格考试并成绩合格者，由人事局颁发人社部统一印制，人社部、国家卫生和计划生育委员会印发的专业技术资格证书；该证书在全国范围内有效，经国家或有关部门批准的医疗卫生机构内，从事医疗、预防、保健、医学、护理、其他卫生技术（以下简称“技术”）专业工作的人员均可报考。护理专业分为护理学（师）、护理学（中级）两个层次。

无论是各专业从事教学工作的教师，还是处于学习中的学生，在实际的教学及学习过程中，都迫切需要一套实用性强，有针对性、能够突出考试重点和难点的考题，以方便考生练习、检测知识点的掌握情况。

本书作者经过深入研究考试规律，紧扣 2018 年最新考试大纲和考点，编写出适合考生应试需要的、实用的考试用书。建议与《护理学（师）考试 10 日通关特训》《护理学（师）考试高频考点随身记》配合使用。

由于本书涉及内容广泛，虽经全体编者反复修改，但由于水平和能力有限，难免有不妥之处，恳请广大读者多提宝贵意见。

编者

2017 年 5 月

# 目 录

押题密卷一 .....	1	专业知识 (护理学) .....	154
基础知识 .....	1	专业知识 (内科护理学) .....	163
相关专业知识 .....	10	专业知识 (外科护理学) .....	172
专业知识 (护理学) .....	19	专业知识 (妇产科护理学) .....	182
专业知识 (内科护理学) .....	28	专业知识 (儿科护理学) .....	191
专业知识 (外科护理学) .....	37	专业知识 (社区护理学) .....	200
专业知识 (妇产科护理学) .....	46	专业实践能力 (护理学) .....	208
专业知识 (儿科护理学) .....	56	专业实践能力 (内科护理学) .....	219
专业知识 (社区护理学) .....	65	专业实践能力 (外科护理学) .....	230
专业实践能力 (护理学) .....	74	专业实践能力 (妇产科护理学) .....	240
专业实践能力 (内科护理学) .....	85	专业实践能力 (儿科护理学) .....	250
专业实践能力 (外科护理学) .....	95	专业实践能力 (社区护理学) .....	260
专业实践能力 (妇产科护理学) .....	105	押题密卷一参考答案 .....	270
专业实践能力 (儿科护理学) .....	115	押题密卷二参考答案 .....	275
专业实践能力 (社区护理学) .....	125		
押题密卷二 .....	136		
基础知识 .....	136		
相关专业知识 .....	145		

# 押题密卷一

## 基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 呼吸中枢所在的位置是 ( )。  
A. 大脑                      B. 小脑  
C. 脑干                      D. 脑桥  
E. 延髓
- 对病毒性心肌炎最有诊断价值的检查是 ( )。  
A. 超声心动图  
B. 血清病毒中和抗体滴度  
C. 心音图  
D. 心电图  
E. 胸片
- 肺癌组织学分类中，女性多见的是 ( )。  
A. 鳞状上皮细胞癌  
B. 小细胞未分化癌  
C. 大细胞未分化癌  
D. 腺癌  
E. 细支气管肺泡癌
- 根据病情，慢性支气管炎可分为 ( )。  
A. 急性发作期、慢性迁延期、临床缓解期  
B. 急性发作期、慢性迁延期  
C. 急性发作期、临床缓解期  
D. 潜伏期、急性发作期、临床缓解期  
E. 潜伏期、急性发作期、慢性迁延期
- 服毒后最好在几小时内洗胃 ( )。  
A. 12 小时                      B. 10 小时  
C. 6 小时                      D. 8 小时  
E. 8~10 小时
- 应给予低流量持续吸氧的疾病是 ( )。  
A. 风心病二尖瓣狭窄合并急性肺水肿  
B. 自发性气胸  
C. 休克型肺炎  
D. 急性上呼吸道感染  
E. 慢性支气管炎肺气肿并发呼吸衰竭
- 长期卧床的心力衰竭患者，形成下肢静脉血栓，活动后最易栓塞的脏器是 ( )。  
A. 心脏                      B. 脑组织  
C. 肺组织                      D. 肾脏  
E. 脾脏
- 为了准确观察患者的血压，测量时应尽量做到四定，即 ( )。  
A. 定时间、定部位、定体位、定血压计  
B. 定时间、定部位、定血压计、定人员  
C. 定时间、定部位、定体位、定记录格式  
D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器  
E. 定时间、定体位、定部位、定袖带
- 肾脏结构和功能的基本单位是指 ( )。  
A. 肾小球和肾小管  
B. 肾小体和肾小球  
C. 肾小管和肾小囊  
D. 肾小球和肾小囊

- E. 肾小管和肾小体
10. 导致心力衰竭发病和死亡的重要原因是 ( )。
- A. 心室重塑  
B. 心内膜炎  
C. 心室内附壁血栓  
D. 活动风湿  
E. 心内膜下心肌梗死
11. 指导患者正确服用硝酸甘油以缓解心绞痛的方法是 ( )。
- A. 药物置于口中, 立即用温开水送服  
B. 观察头晕、血压升高的表现  
C. 舌下含药时应平卧或坐稳, 以防发生低血压  
D. 因药物在舌下被唾液溶解而减少吸收  
E. 如果30分钟后不缓解, 再服一片
12. 下列哪项不是慢性胃炎的预防原则 ( )。
- A. 注意饮食卫生  
B. 保持大便通畅  
C. 彻底治疗幽门螺杆菌  
D. 避免服用刺激性药物和食物  
E. 戒烟戒酒
13. 我国导致二尖瓣狭窄最常见的病因是 ( )。
- A. 风湿热  
B. 结缔组织病  
C. 先天畸形  
D. 急性心肌梗死  
E. 左心衰竭
14. 确诊消化性溃疡的首选检查方法是 ( )。
- A. 幽门螺杆菌检查  
B. 胃液分析  
C. 血清学检查  
D. 胃镜及活组织检查  
E. 大便隐血试验
15. 下列哪一项检查可直接观察溃疡的部位、病变大小 ( )。
- A. X线钡餐检查  
B. 超声检查  
C. 胃镜检查  
D. 幽门螺杆菌感染的检测  
E. 胃液检查
16. 成人门静脉高压症继发食管胃底静脉曲张破裂大出血, 最常见的并发症是 ( )。
- A. 失血性休克  
B. 急性肝坏死  
C. 急性弥漫性腹膜炎  
D. 血氨增高, 肝昏迷  
E. 应激性溃疡
17. 特发性血小板减少性紫癜的发病机制主要是 ( )。
- A. 骨髓造血功能破坏  
B. 血小板抗体的存在  
C. 小血管炎性反应  
D. 凝血因子的缺乏  
E. 血小板生成抑制
18. 肠内营养的供给途径不包括 ( )。
- A. 经鼻胃管  
B. 经鼻肠管  
C. 经口摄入  
D. 经空肠造瘘  
E. 经中心静脉
19. 甲状腺次全切除术后1~4日出现手脚抽搐, 因为 ( )。
- A. 颈交感神经损伤  
B. 喉上神经损伤  
C. 喉返神经损伤  
D. 甲状旁腺损伤或误切  
E. 出血
20. 全麻术后出现急性肺不张的常见原因是 ( )。
- A. 饱餐后急诊手术  
B. 患者术前有急性呼吸道感染  
C. 术前未进行肺功能锻炼  
D. 术前应用抗生素

- E. 患者紧张
21. 引起再生障碍性贫血最多见的药物是 ( )。
- A. 阿司匹林      B. 柔红霉素  
C. 氯霉素      D. 宝泰松  
E. 环磷酰胺
22. 硬膜外麻醉中出现全脊髓麻醉的原因是 ( )。
- A. 麻醉药过量  
B. 对麻醉药物过敏  
C. 穿刺针损伤脊髓  
D. 麻醉药注入过快  
E. 麻醉药进入蛛网膜下腔
23. 受者与供者在血型配型后进行器官移植, 术后仍出现排斥反应, 可能的原因是 ( )。
- A. 移植体没有充分血液供应  
B. 受者产生封闭性抗体  
C. 供者患有先天性无丙种球蛋白血症  
D. HLA 不匹配  
E. 血小板抗原不匹配
24. 关于腹部闭合性损伤的处理不正确的是 ( )。
- A. 应首先处理对生命威胁最大的损伤  
B. 应先处理污染重的穿破性损伤, 后处理污染轻的  
C. 应先处理穿破性损伤, 后处理出血性损伤  
D. 腹腔脏器破裂者必须用大量抗生素  
E. 发生休克的内出血患者应尽量在血压升至 90mmHg 以上后手术
25. 细胞外液的主要阴离子是 ( )。
- A.  $\text{Pr}^-$ 、 $\text{HPO}_4^{2-}$ 、 $\text{HCO}_3^-$   
B.  $\text{Pr}^-$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{HCO}_3^-$   
C.  $\text{HPO}_4^{2-}$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{HCO}_3^-$   
D.  $\text{Pr}^-$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$   
E.  $\text{Pr}^-$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{HCO}_3^-$
26. 下列关于胆囊结石的叙述正确的是 ( )。
- A. 胆固醇结石多因胆汁中胆固醇、胆盐和卵磷脂增高所致  
B. 胆色素结石多因结合性胆红素增高所致  
C. 混合性结石多为胆固醇、胆盐和卵磷脂混合而成  
D. 胆固醇结石主要因胆管感染, 胆道梗阻引起  
E. 胆囊结石主要因胆汁淤积、胆道内细菌感染和胆汁成分的改变引起
27. 关于腹股沟疝的描述, 错误的是 ( )。
- A. 易复性斜疝除腹股沟区有肿块和偶有胀痛外, 并无其他症状  
B. 难复性斜疝的主要特点是疝块不能完全回纳  
C. 腹股沟直疝平卧时在腹股沟内侧端、耻骨结节外上方出现一半球形肿块  
D. 腹股沟直疝常见于年老体弱者  
E. 斜疝嵌顿机会较多
28. 丹毒是指 ( )。
- A. 急性管状淋巴管炎  
B. 急性网状淋巴管炎  
C. 急性蜂窝织炎  
D. 急性淋巴结炎  
E. 多发性毛囊炎
29. 乳癌局部皮肤呈“橘皮样”改变的原因是 ( )。
- A. 肿物压迫  
B. 癌肿侵及库柏韧带  
C. 癌细胞堵塞浅表淋巴管  
D. 并发炎症  
E. 粘连
30. 损伤性血胸, 胸腔内积血不凝固的主要原因是 ( )。
- A. 凝血因子减少  
B. 胸腔内出血量多, 血液稀释



- C. 凝血酶原减少  
D. 肺、心脏及膈肌活动的去纤维蛋白作用  
E. 损伤后弥散性血管内凝血
31. 正常新生儿生理性体重下降的时间及程度为( )。  
A. 生后1周内暂时性体重下降10%~15%  
B. 生后1周内暂时性体重下降9%以下  
C. 生后1~2周内暂时性体重下降10%~15%  
D. 生后1~2周内暂时性体重下降9%以下  
E. 生后7~10天内暂时性体重下降9%以下
32. 肛瘘叙述不正确的是( )。  
A. 肛门周围的肉芽肿性管道  
B. 感染性瘘管  
C. 由内口、瘘管、外口三部分组成  
D. 是常见的直肠肛管疾病之一  
E. 不治可自愈
33. 正常妊娠孕妇在整个妊娠期体重平均增加( )。  
A. 5.5kg                      B. 8.5kg  
C. 10.5kg                     D. 12.5kg  
E. 15.5kg
34. 哪项不是颅脑损伤患者的病情观察( )。  
A. 按GCS表评估意识  
B. 监测瞳孔变化  
C. 测生命体征  
D. 有无夏柯氏征出现  
E. 锥体束征
35. 下列对肺癌病理的描述,正确的是( )。  
A. 肺癌中以肺泡细胞癌最常见  
B. 起源于肺叶支气管以下的肺癌称为周围型癌  
C. 大细胞癌最常见,一般属周围型癌  
D. 小细胞癌对放射和化学疗法较敏感  
E. 腺癌发生率比鳞癌低,但在各型肺癌中预后最差
36. 对胸部外伤的表述,正确的是( )。  
A. 间接暴力所致肋骨骨折易产生气胸或血胸并发症  
B. 肋骨骨折好发于第4~7肋  
C. 张力性气胸常伴有反常呼吸运动  
D. 多根肋骨骨折可造成浮动胸壁  
E. 反常呼吸指软化区的胸壁在吸气时向外鼓出,呼气时内陷
37. 肺炎链球菌肺炎炎症消散后的病理变化是( )。  
A. 常导致肺气肿  
B. 肺组织无损害  
C. 常遗留纤维瘢痕  
D. 常有肺组织坏死和溃疡  
E. 肺组织不完全恢复正常
38. 颅脑损伤昏迷的患者,在观察过程中突然出现躁动。其引起的原因不包括( )。  
A. 昏迷变化即将清醒  
B. 昏迷加深  
C. 呼吸道不畅  
D. 尿潴留  
E. 卧姿不适
39. 上、下呼吸道的分界点是( )。  
A. 咽                              B. 环状软骨  
C. 喉                                D. 气管  
E. 支气管
40. 有关骨盆出口平面,错误的说法是( )。  
A. 由两个在不同平面的三角形构成  
B. 前界为耻骨联合下缘  
C. 后界为骶骨关节  
D. 两侧界为耻骨降支,骶棘韧带和坐骨棘

- E. 前后两个三角形具有共同的底边
41. 判断甲状腺功能亢进症病情程度的主要指标是 ( )。
- A. 食欲亢进程度  
B. 脉率增快和脉压增大的程度  
C. 突眼的程度  
D. 甲状腺肿大程度  
E. 体重减轻程度
42. 为判断呼吸衰竭患者代谢紊乱情况, 应首选的辅助检查是 ( )。
- A. 血常规  
B. 血细胞涂片  
C. 尿常规  
D. 血气分析  
E. 肺功能测定
43. 急性心肌梗死最常见的心律失常是 ( )。
- A. 室性心律失常  
B. 窦性心动过速  
C. 心房颤动  
D. 房室传导阻滞  
E. 房性期前收缩
44. 细胞外液包括 ( )。
- A. 漏出液和渗出液  
B. 血浆、功能性细胞外液  
C. 组织间液、淋巴液  
D. 第二间隙液、第三间隙液  
E. 血浆、细胞间液和第三间隙液
45. 甲型肝炎的主要传播途径是 ( )。
- A. 体液传播  
B. 母婴传播  
C. 血液传播  
D. 饮食传播  
E. 医源性传播
46. 小脑幕切迹疝的典型临床表现正确的是 ( )。
- A. 患侧肢体瘫痪, 肌张力增加, 病理征阳性  
B. 患侧瞳孔最初有短暂的散大  
C. 患者瞳孔以后会逐渐缩小  
D. 健侧上眼睑下垂及眼球外斜
- E. 在颅内压增高的基础上, 出现进行性意识障碍
47. 腹股沟管的内环位于 ( )。
- A. 陷窝韧带外侧  
B. 股静脉内侧  
C. 腹壁下动脉内侧  
D. 腹壁下动脉外侧  
E. 股部卵圆窝处
48. 有关癌症肿块特征的描述, 不正确的是 ( )。
- A. 表面高低不平  
B. 边界不清  
C. 早期出现疼痛  
D. 质地坚硬  
E. 固定、不活动
49. 关于脑的解剖说法正确的是 ( )。
- A. 颅腔被大脑幕分成幕上腔和幕下腔  
B. 幕上腔被小脑镰分割成左右两分腔, 分别容纳左右大脑半球  
C. 中脑在大脑幕切迹裂孔中通过  
D. 中脑外侧与小脑颞叶的沟回、海马回相邻  
E. 动眼神经从中脑腹侧的大脑脚内侧发出, 通过小脑幕切迹走行在海绵窦的外侧壁直至眶上裂
50. 最可能导致甲状腺危象的是 ( )
- A. 术前应用阿托品  
B. 手术时间长  
C. 术中损伤神经  
D. 术后未服碘剂  
E. 术前准备不充分
51. 颅底骨折的主要临床表现是 ( )。
- A. 颅脑超声波检查多有中线波移位  
B. 常出现脑脊液漏、颅神经损伤  
C. 颅底片均可见骨折线  
D. 伤后有进行性意识障碍  
E. 早期出现休克
52. 肱骨髁上骨折造成爪形手的原因是 ( )。

- A. 损伤正中神经  
B. 骨折伤及肱动脉  
C. 损伤正中静脉  
D. 损伤尺神经  
E. 损伤桡神经
53. 对于葡萄胎的诊断价值最大的是( )。  
A. 子宫大于停经月份  
B. 停经后阴道流血  
C. B型超声  
D. 妊娠试验  
E. 出现妊娠期高血压疾病
54. 对于颅内压增高病理改变的描述,正确的是( )。  
A. 脑脊液的一部分被挤入椎管内,脑脊液分泌减少、吸收也减少  
B. 脑血流量减少,脑处于严重缺氧状态  
C. 脑血管代偿性的收缩  
D. 全身周围血管扩张,血压降低,心率减慢  
E. 呼吸加深加快,以提高血氧饱和度
55. 关于骨盆的组成,下列说法正确的是( )。  
A. 两块耻骨,一块尾骨,一块骶骨  
B. 两块坐骨,一块尾骨,一块骶骨  
C. 两块髌骨,一块尾骨,一块骶骨  
D. 两块髌骨,一块尾骨,一块骶骨  
E. 两块耻骨,两块坐骨,一块尾骨
56. 我国产妇死亡第一位的原因是( )。  
A. 妊娠合并心脏病  
B. 产褥感染  
C. 羊水栓塞  
D. 产后出血  
E. 妊娠期高血压疾病
57. 小儿结核病最严重的类型是( )。  
A. 结核性腹膜炎  
B. 结核性脑膜炎  
C. 粟粒型肺结核  
D. 支气管淋巴结核  
E. 盆腔结核
58. 以下选项中不会发展为肝硬化的是( )。  
A. 乙型病毒性肝炎  
B. 丙型病毒性肝炎  
C. 丁型病毒性肝炎  
D. 戊型病毒性肝炎  
E. 乙型病毒性肝炎+丁型病毒性肝炎
59. 有关孕期检查的四步触诊法,下列错误的是( )。  
A. 可以了解子宫的大小、胎先露、胎方位  
B. 第一步是双手置于宫底部了解宫底高度,并判断是胎头还是胎臀  
C. 第二步是双手分别置于腹部两侧,辨别胎背及胎肢的方向  
D. 第三步是双手置于耻骨联合上方,判断先露部为头还是臀  
E. 第四步是双手向骨盆入口方向插入,进一步检查先露部,并确定入盆程度
60. 属于稳定性骨折的是( )。  
A. 斜形骨折  
B. 线形骨折  
C. 螺旋形骨折  
D. 粉碎性骨折  
E. 一骨多处骨折
61. 纯母乳喂养的概念是( )。  
A. 喂自己母亲的奶,不喂任何饮食  
B. 喂自己母亲的奶,每2次喂奶之间加喂糖水1次  
C. 喂自己母亲的奶,每2次喂奶之间喂开水1次  
D. 喂自己母亲的奶,不足时可静脉输液  
E. 喂自己母亲的奶,不足时补喂牛奶
62. 可判断为开放性气胸的体征是( )。  
A. 发绀  
B. 脉快

- C. 伤口有气体出入的“嘶嘶”声  
D. 血压下降  
E. 气管向健侧移位
63. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是 ( )。  
A. 脑动静脉畸形  
B. 高血压性动脉硬化  
C. 脑动脉炎  
D. 先天性动脉瘤破裂  
E. 血液病
64. 心脏病孕妇妊娠期间, 最危险的时期是 ( )。  
A. 妊娠 24 ~ 27 周  
B. 妊娠 28 ~ 31 周  
C. 妊娠 32 ~ 34 周  
D. 妊娠 34 ~ 38 周  
E. 产褥期 7 天之后
65. 便秘易诱发肝性脑病的主要原因是 ( )。  
A. 肠道内产氨增多  
B. 用力排便时引起脑出血  
C. 含氮物质在肠道内存留时间长, 被充分吸收  
D. 抑制大脑和呼吸中枢, 造成缺氧  
E. 代谢性碱中毒, 促使  $\text{NH}_3$  通过血脑屏障
66. 护理程序的概念是 ( )。  
A. 进行整体护理  
B. 找出护理诊断  
C. 设立预期目标  
D. 提供护士的工作程序或方法  
E. 实施护理措施后作评价
67. 成年人的理想血压为 ( )。  
A. 收缩压  $< 120\text{mmHg}$ , 舒张压  $< 80\text{mmHg}$   
B. 收缩压  $< 120\text{mmHg}$ , 舒张压  $< 90\text{mmHg}$   
C. 收缩压  $< 130\text{mmHg}$ , 舒张压  $< 80\text{mmHg}$   
D. 收缩压  $< 130\text{mmHg}$ , 舒张压  $< 90\text{mmHg}$   
E. 收缩压  $< 140\text{mmHg}$ , 舒张压  $< 90\text{mmHg}$
68. 中央型肺癌的定义是 ( )。  
A. 肿瘤起源于主支气管以上, 位置靠近肺门  
B. 肿瘤起源于叶支气管以上, 位置靠近肺门  
C. 肿瘤起源于段支气管以上, 位置靠近肺门  
D. 肿瘤起源于主支气管以下, 位置靠近肺门  
E. 肿瘤起源于叶支气管以下, 位置靠近肺门
69. 血栓闭塞性脉管炎发生的坏疽为 ( )。  
A. 感染性坏疽 B. 湿性坏疽  
C. 混合性坏疽 D. 干性坏疽  
E. 糜烂性坏疽
70. 产后出血是指 ( )。  
A. 胎盘娩出后 24 小时内出血达 500ml  
B. 胎儿娩出后 24 小时内出血达 500ml  
C. 产后 10 天内出血达 500ml  
D. 产后 2 周内出血达 500ml  
E. 产褥期出血 500ml
71. 子宫内膜异位症痛经的特点是 ( )。  
A. 痛经与月经无关  
B. 痛经发生在月经前  
C. 痛经发生在月经前, 经期加重, 经后缓解  
D. 痛经为经期轻, 经后重  
E. 痛经多为原发性的
72. 常用于普查发现早期子宫颈癌的方法是 ( )。  
A. 宫颈碘试验  
B. 阴道镜检查  
C. 宫颈活体组织检查  
D. 宫颈刮片细胞学检查  
E. 宫腔镜检查
73. 目前我国采用的围产期定义是 ( )。  
A. 孕满 28 周至产后 7 天之内  
B. 孕满 30 周至产后 7 天

- C. 孕满12周至产后7天  
D. 孕满28周至产后30天  
E. 孕满28周至产后3天
74. 患者男性, 71岁。诊断为慢性阻塞性肺气肿。其最可能出现的酸碱失衡是( )。  
A. 代谢性酸中毒  
B. 代谢性碱中毒  
C. 呼吸性酸中毒  
D. 呼吸性碱中毒  
E. 代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒
75. 患者, 女性, 29岁。于3年前经阴道自然分娩一健康男婴, 现进行妇科查体, 其宫颈正常, 则形状应该是( )。  
A. 圆形  
B. 纵椭圆形  
C. 横裂状  
D. 梯形  
E. 横椭圆形
76. 患者, 男性, 40岁, 肝移植术后, 术前肾功能、尿常规未见异常, 术中一过性BP 80/50mmHg, BUN 17.8mmol/L, Cr 350 $\mu$ mol/L, 血 Na<sup>+</sup> 132mmol/L, K<sup>+</sup> 7.4mmol/L, CO<sub>2</sub>-CP 12mmol/L。发生急性肾衰竭最可能的原因是( )。  
A. 有效循环血量不足  
B. 尿路梗阻  
C. 肝肾综合征  
D. 急性肾小管坏死  
E. 双侧肾皮质坏死
77. 患者男, 45岁。某医院血库化验人员。不规则发热半年余, 反复抗菌无效, 明显消瘦, 临床考虑是否同艾滋病有关。为明确诊断, 应进行具有特异性的检查是( )。  
A. 痰培养  
B. 胸部CT  
C. 血清抗-HIV  
D. HIV分离  
E. CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup>比值, CD4<sup>+</sup>T淋巴细胞计数
78. 患者, 女性, 53岁。有慢性肝病史8年。1小时前突然呕血, 量约1000ml。查体: 血压90/60mmHg, 心率110次/分。患者出血的原因最可能是( )。  
A. 急性糜烂出血性胃炎  
B. 食管胃底静脉曲张破裂出血  
C. 消化性溃疡出血  
D. 反流性食管炎出血  
E. 应激性溃疡
79. 患者, 女性, 45岁。上腹部疼痛3年, 多于饥饿时发作, 疼痛呈烧灼样, 进餐后缓解。根据患者的症状, 首选的检查方法是( )。  
A. 胃镜检查  
B. 幽门螺杆菌检查  
C. 胃液分析  
D. X线钡餐检查  
E. B超检查
80. 患者, 女性, 61岁。昨日早晨起床时发现右侧上下肢麻木, 但能起床活动。回到卧室后右下肢无力摔倒。体检: 神志清楚, 右侧轻偏瘫, 偏身感觉减退。为明确诊断, 最有鉴别价值的辅助检查是( )。  
A. 腰穿  
B. 头颅CT  
C. 脑血管造影  
D. TCD检查  
E. 脑电图
81. 患者男, 50岁。因饱餐后突发上腹痛, 伴恶心, 呕吐4小时住院, 经检查后被诊断为急性水肿性胰腺炎。下列处理措施错误的是( )。  
A. 禁食、胃肠减压  
B. 手术引流胰周渗液  
C. 补充液体  
D. 解痉、止痛  
E. 应用抗菌药
82. 患者女, 32岁。顺产1年自诉外阴“肿物”脱出, 行动不便, 腰骶酸痛。首先应考虑的诊断是( )。  
A. 外阴癌  
B. 外阴创伤  
C. 前庭大腺囊肿  
D. 子宫脱垂

- E. 尿瘘
83. 患者, 男性, 39 岁, 反复中上腹痛 4 年, 常为空腹痛, 进餐后可缓解, 有时夜间发作, 自服法莫替丁可止痛。下列哪项护理诊断与该患者不符 ( )。
- A. 疼痛: 腹痛与消化性溃疡有关  
B. 知识缺乏: 疾病的防治知识  
C. 焦虑与疾病反复发作、病情迁延有关  
D. 潜在并发症: 癌变  
E. 潜在并发症: 上消化道出血
84. 患者, 男性, 张某, 糖尿病病史 10 余年, 近 2 个月感双足麻木, 呈手套袜子样分布, 下肢皮肤针刺样疼痛, 判断患者最有可能发生了 ( )。
- A. 糖尿病并发脑血管意外  
B. 糖尿病周围神经病变  
C. 糖尿病微血管病变  
D. 糖尿病自主神经病变  
E. 糖尿病肢体动脉病变
85. 某妇女顺产娩出一新生儿, 护士用 Apgar 评分, 给新生儿评分为: 1 分钟 8 分; 5 分钟 9 分, 请问, 她根据哪几个方面评分 ( )。
- A. 呼吸、心率、脉搏、哭声、肌张力  
B. 呼吸、心率、脉搏、哭声、肌张力、皮肤颜色  
C. 呼吸、心率、喉反射、肌张力、皮肤颜色  
D. 呼吸、心率、脉搏、喉反射、肌张力  
E. 呼吸、体温、心率、哭声、肌张力
- 二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~88 题共用备选答案)

- A. 右心室前负荷加重  
B. 右心室后负荷加重  
C. 左心室前负荷加重  
D. 左心室后负荷加重  
E. 两心室前负荷加重
86. 原发性高血压 ( )。
87. 肺心病 ( )。
88. 主动脉瓣关闭不全 ( )。
- (89~90 题共用备选答案)
- A. B 超  
B. CT  
C. MRI  
D. 肝血管造影  
E. 肝组织活检
89. 目前肝癌筛查的首选方法是 ( )。
90. 确诊肝癌最可靠的方法是 ( )。

(91~93 题共用备选答案)

- A. 血行转移  
B. 直接蔓延  
C. 淋巴转移  
D. 种植转移  
E. 胃肠道管腔内转移
91. 直肠癌转移到肝脏是 ( )。
92. 胃癌转移到盆壁是 ( )。
93. 直肠癌转移到膀胱是 ( )。
- (94~95 题共用备选答案)
- A. 发病后即见脑室扩大  
B. 发病后即可见低密度影  
C. 发病后即可见高密度影  
D. 发病 24~48 小时后见低密度影  
E. 发病 24~48 小时后见高密度影
94. 脑出血后, 最早显示的典型 CT 图像和时间是 ( )。
95. 脑梗死后, 最早显示的典型 CT 图像和时间是 ( )。

(96~97 题共用备选答案)

- A. 肺  
B. 骨  
C. 脑  
D. 肝  
E. 胃
96. 前列腺癌血行转移的部位最常见于 ( )。

97. 大肠癌血行转移的部位最常见于( )。

(98~100题共用备选答案)

- A. 直接蔓延
- B. 胃肠道管腔内转移
- C. 淋巴转移

D. 种植转移

E. 血行转移

98. 直肠癌转移到肝脏是( )。

99. 胃癌转移到盆壁是( )。

100. 直肠癌转移到膀胱是( )。

## 相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 护理人员每年参加继续护理学教育的最低学分是( )。

- A. 25 学分
- B. 30 学分
- C. 35 学分
- D. 40 学分
- E. 45 学分

2. 医院感染不包括下列哪一种( )。

- A. 患者在医院内获得的感染
- B. 入院时已处于潜伏期的感染
- C. 出院时已处于潜伏期且出院后不久发生的感染
- D. 新生儿经产道分娩时发生的感染
- E. 手术后输血造成的病毒感染

3. 关于“人类行为的发展顺序”，正确的是( )。

- A. 被动发展、主动发展、巩固发展、自主发展
- B. 被动发展、主动发展、自主发展、巩固发展
- C. 自主发展、被动发展、巩固发展、主动发展
- D. 自主发展、被动发展、主动发展、巩固发展
- E. 自主发展、巩固发展、被动发展、主动发展

4. 关于医院感染概念理解错误的是( )。

- A. 医院感染是指在医院内获得的感染
- B. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染
- E. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

5. 以下描述不属于“社会行为”特征的是( )。

- A. 由社会环境造就
- B. 由人的生物性所决定
- C. 目的在于适应外界环境
- D. 贯穿人类整个社会化过程
- E. 需要在不断学习、模仿、与人交往中习得

6. 某护士在职业生涯规划中列出三年内完成护理本科自学考试，获得本科学历。此计划属于的形式是( )。

- A. 宗旨
- B. 任务
- C. 目标
- D. 策略
- E. 规划

7. 关于移位菌群失调的描述错误的是( )。

- A. 正常菌群由原籍生境转移到外籍生境
- B. 正常菌群大部分被抑制，只有少数菌种成为优势菌
- C. 本来无菌的部位定植或定居

- D. 可表现为横向转移、纵向转移、肠腔向腹腔转移
- E. 经血循环或淋巴循环向远处转移
8. 主要经粪-口途径传播的肝炎病毒有( )。
- A. 甲型肝炎病毒、丙型肝炎病毒
- B. 甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒
- C. 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒
- D. 乙型肝炎病毒、戊型肝炎病毒
- E. 甲型肝炎病毒、乙型肝炎病毒
9. 关于探索式提问的特点,叙述正确的是( )。
- A. 提问笼统
- B. 提问包含问者的观点
- C. 人际传播中应避免使用
- D. 适用于对某一问题的深入了解
- E. 提问包含两种或两种以上类型问题
10. 当健康教育者想进一步深入了解教育对象拒绝戒烟的原因时,应采用的提问方式是( )。
- A. 封闭式提问 B. 开放式提问
- C. 探索式提问 D. 偏向式提问
- E. 复合式提问
11. 以下不属于高可变性行为特点的是( )。
- A. 是正处于发展期或刚刚形成的行为
- B. 是社会不赞成的行为
- C. 行为形成的时间不长
- D. 已有成功改变的实证
- E. 扎根在文化传统或传统的生活方式之中
12. 关于消毒作用水平的描述错误的是( )。
- A. 用于评价灭菌或消毒方法对微生物的杀灭作用程度
- B. 杀灭一切病原微生物的方法为灭菌方法
- C. 只能杀灭细菌繁殖体(分枝杆菌除  
外)和亲脂病毒的化学消毒剂为低效消毒方法
- D. 杀灭和去除细菌芽孢以外的各种病原微生物的消毒方法为中效消毒方法
- E. 完全杀灭细菌繁殖体并对细菌芽孢有显著杀灭作用的方法为高效消毒方法
13. 在某项营养调查中,被调查者意识到自己正在被调查,从而自觉改变饮食习惯,以至于对调查结果产生了影响,这属于( )。
- A. 暗示效应 B. 霍桑效应
- C. 选择因素 D. 测量者因素
- E. 回归因素
14. 消毒灭菌时个人防护措施不妥的是( )。
- A. 可重复使用的尖锐物品应放在黄色垃圾袋中
- B. 发生利器刺伤时应急处理应捏住损伤处近心端,流动水下冲洗、消毒、包扎
- C. 气体化学消毒时应防止有毒、有害气体泄漏
- D. 超声波清洗时可加戴耳塞防护
- E. 紫外线消毒时避免直接照射人体
15. 健康促进规划的过程评价主要关注( )。
- A. 计划是否完善、合理、可行
- B. 项目活动的数量、质量、效率
- C. 目标人群知识、态度、信念的变化
- D. 目标人群健康状况和生活质量的变化
- E. 评价整个计划的成败
16. 传染病患者使用过的物品处理方法错误的是( )。
- A. 可重复使用的物品置于黄色塑料袋内,经灭菌后方可使用



- B. 体温计专人使用,用后须经中效消毒后用于其他患者
- C. 血压计、听诊器同病原菌感染者可共用
- D. 不可重复使用的物品按照感染性废物处理
- E. 检验标本经灭菌处理后再丢弃
17. 以下属于糖尿病患者“自我效能”的是( )。
- A. 对正确使用胰岛素的认识
- B. 对自觉进行饮食控制能力的自信
- C. 对药物治疗糖尿病有效性的肯定
- D. 对进行运动疗法困难的认识
- E. 对引发糖尿病并发症危害及后果的判断
18. 下列做法符合抗感染药物合理应用原则的是( )。
- A. 首选广谱抗生素
- B. 氨基糖苷类抗生素与 $\beta$ -内酰胺类药物同瓶滴注
- C. 尽可能选用多种抗生素,联合用药
- D. 将红霉素用注射用水溶解后放入500ml盐水中静脉滴注
- E. 急性胆囊炎,使用抗生素治疗后,体温恢复正常,继续用药2周,以巩固疗效
19. 传播的分类不包括( )。
- A. 自我传播      B. 组织传播
- C. 大众传播      D. 群体传播
- E. 社团传播
20. 外科手术患者在入院前后、术前、术后和康复期的心理卫生知识、保健技能的需求不同。因此,医护人员在评估时应注意( )。
- A. 要不断评估患者的信息需求,调整健康教育的内容和方法
- B. 只需要在入院时评估即可
- C. 以入院时评估为准,根据医生的要求稍作修改即可
- D. 没什么特别注意的,按照常规健康教育即可
- E. 将术前术后的健康教育作为重点内容,着重强调
21. 对细菌芽孢污染的物品灭菌可选用( )。
- A. 1%的戊二醛浸泡30分钟
- B. 1%的过氧化氢浸泡30分钟
- C. 1%的二溴海因浸泡30分钟
- D. 1%的过氧乙酸浸泡30分钟
- E. 1%的含氯消毒剂浸泡30分钟
22. 为预防下呼吸道感染在呼吸机使用中做法错误的是( )。
- A. 使用中的呼吸机管路应定期更换
- B. 管路上湿化及雾化用水必须使用无菌液体
- C. 正确放置冷凝水收集瓶以防冷凝水流入气道
- D. 同一患者每次雾化后,须对雾化器消毒并用无菌水冲洗
- E. 使用中的氧气湿化瓶须每周消毒
23. 首次提出科学管理概念,被称为“科学管理之父”的是( )。
- A. 韦伯              B. 法约尔
- C. 泰勒              D. 梅奥
- E. 麦格雷戈
24. 医院感染的预防和控制措施贯穿于( )。
- A. 入院和出院的护理过程中
- B. 保护性和传染性隔离的护理过程中
- C. 基本诊疗技术实施过程中
- D. 清洁、消毒、灭菌和无菌技术实施过程中
- E. 护理活动的全过程
25. 通过政策、法规对健康产生影响属于健康促进活动领域中的( )。
- A. 制定促进健康的公共政策