

全国高级卫生专业技术资格考试




妇产科护理学

# 副主任护师 主任护师

职称考试习题集

李研薇 编著



 北京科学技术出版社

全国高级卫生专业技术资格考



妇产科护理学  
**副主任护师**  
**主任护师**

职称考试习题集

李研薇 编著

 北京科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

妇产科护理学副主任护师 主任护师职称考试习题集/李研薇编著. —北京:北京科学技术出版社,2016.9

ISBN 978 - 7 - 5304 - 8569 - 9

I. ①妇… II. ①李… III. ①妇产科学 - 护理学 - 资格考试 - 习题集  
IV. ①R473.71 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 207427 号

### 妇产科护理学副主任护师 主任护师职称考试习题集

---

作 者: 李研薇

责任编辑: 张青山

封面设计: 刘 波

出 版 人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66135495(总编室)

0086 - 10 - 66113227(发行部) 0086 - 10 - 66161952(发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkpress.com

网 址: www.bkydw.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京君升印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 700 千字

印 张: 35.5

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 8569 - 9/R · 2162

---

定 价: 108.00 元



京科版图书,版权所有,侵权必究。  
京科版图书,印装差错,负责退换。

## 出版说明

目前,高级卫生专业技术资格考试采取的是由各地独立组织、独立命题、自主确定晋升标准的考聘相结合的考试制度。为了更好地帮助广大考生复习备考,我们结合各地考试的实际情况,组织临床实践和考务经验丰富的专家学者,编写了《妇产科护理学副主任护师 主任护师职称考试习题集》。

本书紧扣考试大纲,有的放矢,针对性强,能较客观地验证考生在考点温习和重点、难点掌握上的实际水平。考生用之既可考前自测和考前强化,又可考察和反馈复习备考的成果,有助于熟悉考试实战情景,提高应试的针对性,以便顺利地通过考试。

本习题集具有以下鲜明的特色。

- ◆ **趋势性:**紧扣考试大纲,严格遵循职称晋升考试的客观规律和最新变化趋势。
- ◆ **全面性:**题量充实,内容丰富,以习题形式涵盖考试的所有知识点。
- ◆ **精准性:**突出考点和重点,有的放矢,针对性强。
- ◆ **实战性:**总结并吸收了过关护师的成功经验,助力考生事半功倍,顺利通过考试。

本书涵盖了妇产科护理学高级职称考试的所有相关内容及题型,包括6种题型:A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题和案例分析题,参考答案附在每个单元的最后。题型说明如下。

**A型题:**由A1型题、A2型题、A3/A4型题组成。每题均有A、B、C、D、E 5个备选答案,其标准答案只有1个。

**B型题:**几个试题共用A、B、C、D、E 5个备选答案,每个试题的标准答案只有1个。

**X型题:**每题均有A、B、C、D、E 5个备选答案,其标准答案为2~5个。

**案例分析题:**根据对病例的分析,选出每个问题的正确答案,正确答案及错误答案的个数不定( $\geq 1$ )。

由于编写较仓促,书中难免有疏漏和不足之处,恳请广大考生和学者批评指正!

## 妇产科护理学

一、女性生殖系统解剖生理 .....	1
二、妊娠期妇女的护理 .....	16
√ 三、分娩期妇女的护理 .....	35
√ 四、产褥期妇女的护理 .....	51
五、新生儿保健 .....	65
六、高危妊娠妇女的护理 .....	73
七、妊娠期并发症妇女的护理 .....	85
√ 八、妊娠期合并症妇女的护理 .....	115
九、异常分娩的护理 .....	136
十、分娩期并发症妇女的护理 .....	155
十一、产后并发症妇女的护理 .....	172
十二、遗传咨询与产前诊断 .....	180
十三、妇科护理病历 .....	183
√ 十四、女性生殖系统炎症患者的护理 .....	189
十五、月经失调患者的护理 .....	210
十六、妊娠滋养细胞疾病患者的护理 .....	225
十七、妇科恶性肿瘤化疗患者的护理 .....	238
十八、妇科腹部手术患者的护理 .....	243

十九、外阴、阴道手术患者的护理 .....	263
二十、不孕症妇女的护理 .....	277
二十一、计划生育妇女的护理 .....	286
二十二、妇女保健 .....	298
二十三、妇产科常用护理技术 .....	302
二十四、妇产科诊疗及手术患者的护理 .....	308

## 医学伦理学

医学伦理道德 .....	322
--------------	-----

## 社区护理学

一、社区护理概论 .....	349
二、社区护理基本工作方法 .....	352
三、社区家庭护理 .....	361
四、社区重点人群保健 .....	368
五、社区常见慢性疾病的护理与管理 .....	375
六、社区常见精神疾病患者的护理与管理 .....	382
七、社区常见传染病患者的护理与管理 .....	391
八、社区急重症患者的急救和转诊 .....	400
九、社区病残者的康复护理 .....	408
十、社区临终患者关怀与护理 .....	412

## 护理健康教育学

一、健康教育与健康促进 .....	418
二、人类行为与健康相关行为 .....	421
三、健康传播的方法与技巧 .....	430
四、健康教育的步骤 .....	439
五、医院健康教育 .....	446

## 医院感染护理学

一、医院感染护理学绪论 .....	450
二、医院感染的微生物学原理 .....	455
三、医院感染监测 .....	460
四、消毒与灭菌 .....	466
五、手、皮肤的清洁和消毒 .....	481
六、医院环境的消毒 .....	486
七、隔离与防护 .....	490
八、合理使用抗感染药物 .....	497
九、医院感染与护理管理 .....	502
十、特殊病原菌的感染途径及消毒 .....	507

## 护理管理学

一、绪论 .....	512
二、管理理论在护理管理中的应用 .....	514
三、计划 .....	518
四、组织 .....	525
五、护理人力资源管理 .....	530
六、领导 .....	535
七、组织沟通 .....	542
八、冲突与协调 .....	546
九、控制工作 .....	549
十、护理质量管理 .....	553



# 妇产科护理学

## 一、女性生殖系统解剖生理

### 【A1 型题】

- 关于女性外生殖器的解剖结构,描述正确的是
  - 外阴包括大阴唇、小阴唇、阴蒂和阴道前庭
  - 阴毛分布呈尖端向上的三角形
  - 双侧小阴唇前端为腹股沟韧带终止点
  - 前庭大腺称为巴氏腺
  - 阴道前庭为双侧大阴唇之间的菱形区
- 关于阴道的解剖结构,描述错误的是
  - 阴道壁由黏膜层、肌层及纤维层构成
  - 后穹隆顶端与子宫直肠陷凹贴接,后者是腹腔的最低部分
  - 后壁短于前壁
  - 阴道黏膜有周期性变化
  - 阴道上端比下端宽
- 成人非孕时子宫大小及宫腔容量约为
  - 7cm × 5cm × 3cm, 5ml
  - 8cm × 5cm × 3cm, 10ml
  - 7cm × 5cm × 3cm, 9ml
  - 6cm × 4cm × 3cm, 4ml
  - 9cm × 6cm × 4cm, 5ml
- 骨盆腔最狭窄的平面是
  - 骨盆入口平面
  - 中骨盆平面
  - 骨盆出口平面
  - 真假骨盆分界面
  - 骨盆出口平面后三角
- 女性生殖器官的邻近器官除外
  - 膀胱
  - 直肠
  - 横结肠
  - 输尿管
  - 阑尾
- 关于骨盆组成的描述正确的是
  - 由 2 块髌骨、1 块坐骨和 1 块尾骨组成
  - 由 2 块髌骨、1 块骶骨和 1 块尾骨组成
  - 由 2 块髌骨、1 块骶骨和 1 块尾骨组成
  - 由 2 块髌骨、1 块坐骨和 1 块尾骨组成
  - 由 1 块坐骨、耻骨联合和 1 块尾骨组成
- 腺垂体分泌的激素其作用不包括
  - 促卵泡发育
  - 促排卵
  - 促黄体生成
  - 促泌乳
  - 促孕卵输送
- 月经过多是指月经量大于
  - 40ml
  - 50ml
  - 60ml
  - 70ml
  - 80ml
- 有关子宫的描述错误的是
  - 子宫位于盆腔中央,呈倒置梨形,是空腔肌性器官

- B. 子宫壁由外向内分黏膜层、肌层、浆膜层  
 C. 子宫有 4 对韧带维持子宫的正常位置  
 D. 子宫肌层是内环外纵中交错  
 E. 子宫大多呈前倾前屈位

10. 性兴奋时润滑阴道口的分泌物来自

- A. 那氏腺  
 B. 前庭大腺  
 C. 尿道旁腺  
 D. 宫颈分泌物  
 E. 阴道黏膜腺体

11. 外阴血肿最常见的部位是

- A. 阴阜  
 B. 大阴唇  
 C. 阴蒂  
 D. 小阴唇  
 E. 阴道口

12. 有关卵巢的叙述正确的是

- A. 位于阔韧带前方  
 B. 分为两部分,内为皮质,外为髓质  
 C. 表面有腹膜覆盖  
 D. 是产生卵子、分泌激素的器官  
 E. 正常卵巢重约 50g

13. 关于会阴的描述错误的是

- A. 会阴是指阴道口与肛门之间的楔形软组织  
 B. 会阴也是骨盆底的一部分  
 C. 中心腱是会阴的组成部分  
 D. 会阴包括皮肤、筋膜、部分肛提肌  
 E. 分娩时会阴伸展性很小

14. 关于女性生殖器的描述正确的是

- A. 子宫重约 80g  
 B. 阴道后壁长 10~12cm  
 C. 输卵管长约 20cm  
 D. 卵巢重约 10g  
 E. 成人子宫体与宫颈比例为 1:2

15. 关于子宫峡部的描述正确的是

- A. 指子宫体与宫颈之间最狭窄的部分  
 B. 峡部下端为解剖学内口

C. 峡部上端为组织学内口

D. 非孕时长约 3cm

E. 子宫峡部下端组织为宫腔内膜

16. 下列哪项是真骨盆的主要标记

- A. 髌骨  
 B. 耻骨  
 C. 坐骨  
 D. 骶岬  
 E. 尾骨

17. 输卵管由内向外可分为

- A. 间质部、峡部、壶腹部、伞端  
 B. 伞端、间质部、峡部、壶腹部  
 C. 伞端、峡部、壶腹部、间质部  
 D. 间质部、壶腹部、峡部、伞端  
 E. 伞端、壶腹部、峡部、间质部

18. 关于女性性腺轴的描述错误的是

- A. 下丘脑以脉冲形式分泌促性腺激素释放激素  
 B. 神经垂体在促性腺激素释放激素作用下分泌 FSH 和 LH  
 C. 卵巢在 FSH 和 LH 作用下发生周期性排卵,并周期性分泌性激素  
 D. 性腺轴受中枢神经系统的控制  
 E. 雌激素对下丘脑和垂体能产生正负反馈作用

19. 关于宫颈黏液于月经周期中的变化,叙述正确的是

- A. 排卵前雌激素使宫颈黏液呈典型羊齿植物叶状结晶  
 B. 孕激素使宫颈黏液分泌增多  
 C. 孕激素使宫颈黏液拉丝度达 10cm  
 D. 雌激素使宫颈黏液分泌减少  
 E. 雌激素使宫颈黏液结晶逐渐模糊

20. 关于前列腺素,说法不恰当的是

- A. 可使子宫肌肉收缩  
 B. 月经血中可有前列腺素  
 C. 是引起痛经的原因  
 D. 对下丘脑及垂体功能无影响  
 E. 存在于子宫内膜、卵巢中

21. 宫颈癌的好发部位是

- A. 宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处
- B. 子宫峡部解剖学内口
- C. 子宫峡部组织学内口
- D. 阴道穹隆
- E. 宫颈管

22. 与女性内生殖器的血液供应无关的是

- A. 子宫动脉
- B. 卵巢动脉
- C. 阴道动脉
- D. 阴部内动脉
- E. 髂外动脉

23. 两坐骨结节内侧缘间的距离是

- A. 坐骨棘间径
- B. 坐骨结节间径
- C. 髂耻间径
- D. 骶耻间径
- E. 真结合径

24. 位于假骨盆后方的是

- A. 第5腰椎
- B. 第4腰椎
- C. 第1腰椎
- D. 髂后上嵴
- E. 尾椎

25. 子宫内膜的增生期是

- A. 月经周期的第1~4天
- B. 月经周期的第15~28天
- C. 月经周期的第5~14天
- D. 体内雌、孕激素水平最低的时期
- E. 子宫腺体增大、上皮细胞分泌糖原的时期

26. 临床上寻找卵巢血管的标志是

- A. 卵巢悬韧带至卵巢门
- B. 卵巢子宫索
- C. 子宫阔韧带
- D. 卵巢系膜
- E. 卵巢固有韧带

27. 妇女一生中可发育成熟的卵泡有

- A. 40~50个
- B. 400~500个

- C. 4000~5000个
- D. 4万~5万个
- E. 40万~50万个

28. 加强盆底托力的肌肉是

- A. 球海绵体肌
- B. 会阴浅海绵体肌
- C. 会阴深横肌
- D. 坐骨海绵体肌
- E. 肛提肌

29. 组成肛提肌的肌肉为

- A. 耻尾肌、髂尾肌、会阴深横肌
- B. 髂尾肌、会阴浅横肌、坐尾肌
- C. 会阴浅横肌、会阴深横肌
- D. 球海绵体肌、耻尾肌、髂尾肌
- E. 耻尾肌、髂尾肌、坐尾肌

30. 关于输卵管,描述正确的是

- A. 间质部外侧是壶腹部
- B. 漏斗部为输卵管宽大部分
- C. 输卵管全长约15cm
- D. 峡部是管腔最狭窄的部分
- E. 间质部与伞部相连接

31. 关于卵巢的解剖结构,描述正确的是

- A. 是一对扁椭圆形的性腺
- B. 卵巢表面有腹膜覆盖
- C. 成年妇女卵巢约6cm×5cm×2cm大小
- D. 皮质含有原始卵泡及疏松的结缔组织
- E. 髓质含有致密的结缔组织

32. 关于骨盆的解剖结构,描述正确的是

- A. 入口平面的前后径大于横径
- B. 骨盆最小平面即中骨盆平面
- C. 骨盆最大平面的横径是坐骨棘间径
- D. 骨盆出口前后径小于出口横径
- E. 中骨盆平面横径大于前后径

33. 关于卵巢周期性变化,描述正确的是

- A. 新生儿卵巢内约有100万个始基卵泡
- B. 妇女一生仅有300个卵泡发育成熟
- C. 两侧卵巢同时排卵
- D. 排卵一般在下次月经来潮前14天

左右

- E. 青春期后原始卵泡开始发育
34. 正常排卵周期黄体寿命为
- 8~10天,平均9天
  - 10~12天,平均11天
  - 12~16天,平均14天
  - 14~18天,平均16天
  - 16~20天,平均18天
35. 下列各项中是雌激素和孕激素协同作用的是
- 子宫肌肉松弛
  - 乳房的发育
  - 基础体温的升高
  - 促进阴道上皮细胞脱落
  - 骨中钙的沉着
36. 有关女性内生殖器的描述错误的是
- 阴道黏膜表面由复层鳞状上皮覆盖
  - 阴道黏膜表面有较多腺体
  - 子宫内膜受卵巢激素影响发生周期性变化
  - 宫腔容量约5ml
  - 卵巢为性腺器官
37. 前庭大腺位于
- 阴蒂上端两侧
  - 小阴唇两侧
  - 阴阜下方,阴唇两侧
  - 会阴上方,两侧缘
  - 大阴唇后部,阴道口两侧
38. 外生殖器中极为敏感的是
- 大阴唇
  - 小阴唇
  - 阴蒂
  - 阴道前庭
  - 会阴
39. 女性进入青春期的重要标志是
- 声调增高
  - 乳房发育
  - 腋毛生长
  - 月经来潮
  - 子宫增大
40. 下列哪项不属于雌激素的功能
- 促进子宫肌肉发育
  - 使子宫内膜增生
  - 对下丘脑有正负反馈作用
  - 促进乳腺泡发育
  - 促进水钠潴留
41. 关于骨产道的描述正确的是
- 骨盆由骶骨、耻骨、尾骨组成
  - 真骨盆两侧为髂骨翼,后面为第5腰椎
  - 骨盆出口平面是指由骶尾关节、两侧坐骨棘、耻骨联合下缘围绕的骨盆腔最低平面
  - 骨盆入口平面为骶岬上缘、髂耻线与耻骨联合上缘
  - 中骨盆平面横径为坐骨结节间径
42. 子宫的功能不包括
- 形成月经
  - 产生女性激素
  - 可孕育胎儿
  - 将胎儿娩出
  - 精子进入输卵管的通道
43. 贯穿骨盆腔各平面中心点的假想曲线称为
- 耻骨弓
  - 坐骨结节连线
  - 骨盆轴
  - 骨盆中线
  - 髂耻线
44. 一般情况下,经产妇的宫颈口形状为
- 圆形
  - 横椭圆形
  - 横裂状
  - 纵椭圆形
  - 梯形
45. 正常月经周期的妇女,宫颈黏液出现羊齿植物叶状结晶,相当于在其周期的
- 第6~7天
  - 第9~10天
  - 第13~14天

D. 第 15~16 天

E. 第 17~20 天

46. 女性的性腺器官是

A. 阴道

B. 子宫

C. 卵巢

D. 输卵管

E. 巴氏腺

47. 成熟卵泡分泌大量雌激素是

A. 在 LH 协同下 FSH 的作用下

B. 在 HCG 的作用下

C. 在 LH 的作用下

D. 在孕激素的作用下

E. 在黄体的作用下

48. 正常的月经量约为

A. 10~30ml

B. 30~50ml

C. 50~80ml

D. 80~100ml

E. 100~120ml

49. 月经后子宫内膜再生于

A. 致密层

B. 基底层

C. 功能层

D. 子宫肌层

E. 海绵层

50. 影响子宫内膜由增生期转化为分泌期的激素是

A. 雌激素

B. 孕激素

C. 促黄体生成素

D. 促性腺激素

E. 促性腺激素释放激素

51. 子宫内膜分泌晚期出现在月经周期

A. 第 4~10 天

B. 第 15~25 天

C. 第 20~28 天

D. 第 24~28 天

E. 第 15~28 天

52. 关于下丘脑-垂体-卵巢轴的调节存在

反馈作用,描述不正确的是

A. 下丘脑分泌促性腺激素释放激素,作用于垂体

B. 卵泡期的雌激素高峰对下丘脑产生正反馈

C. FSH 有刺激卵泡生长发育的功能

D. 下丘脑通过门脉循环与腺垂体密切联系

E. LH 在月经中期有一个分泌高峰,卵泡在高峰时排卵

53. 关于月经的临床表现,描述不正确的是

A. 月经是女性生殖系统周期性变化的重要标志

B. 月经期一般为 3~7 天

C. 月经周期是指这次月经第 1 天至下次月经第 1 天

D. 月经血呈暗红色不凝固

E. 月经周期的长短决定于黄体期的长短

54. 关于骨盆底组织的说法错误的是

A. 骨盆底由多层肌肉和筋膜组成

B. 骨盆底封闭了骨盆的出口

C. 骨盆底有承载和支持盆腔脏器的作用

D. 会阴不属于骨盆底的一部分

E. 骨盆底间有尿道、阴道和直肠通过

55. 关于妇女一生各阶段的生理变化,说法正确的是

A. 卵巢功能逐渐衰退,生殖器官开始萎缩向衰退过渡的时期,称围绝经期

B. 第二性征的出现,标志青春期开始

C. 月经初潮标志卵巢功能成熟,为性成熟的开始

D. 围绝经期一般历时 3 年

E. 幼年期儿童体格及内外生殖器同时发育

56. 关于经期保健,说法不正确的是

A. 劳逸结合,避免精神紧张

B. 经期应盆浴,以防止感染

- C. 可照常参加工作学习✓
- D. 要用干净的月经带或卫生巾
- E. 保持外阴清洁,勤换消毒卫生垫及内裤

57. 关于阴道壁的描述错误的是
- A. 阴道黏膜为复层鳞状上皮✓
  - B. 阴道壁富有静脉丛,局部损伤易形成血肿
  - C. 阴道上皮富有腺体,故妇女常有白带多的症状
  - D. 阴道黏膜受卵巢激素的影响,有周期性变化
  - E. 阴道壁有很多横纹皱襞,外覆有弹性纤维,故有很大的伸展力

58. 关于女性外生殖器的描述正确的是
- A. 阴阜青春期开始生长阴毛,为女性第一性征之一
  - B. 小阴唇损伤后易形成血肿
  - C. 大阴唇富含神经末梢,较为敏感
  - D. 阴蒂富含神经末梢,最敏感
  - E. 前庭大腺位于小阴唇后部,球海绵体肌下方

59. 关于女性生殖系统解剖,说法错误的是
- A. 宫颈的淋巴主要汇入闭孔及髂内外淋巴结
  - B. 卵巢动脉自髂内动脉分出
  - C. 输尿管在距离宫颈内口水平 2cm 处与子宫动脉交叉
  - D. 成人子宫体与宫颈的比例为 2:1
  - E. 外生殖器主要由阴部神经支配,内生殖器则由自主神经支配

60. 卵巢位于
- A. 子宫一侧,输卵管下方,附着于阔韧带后叶
  - B. 子宫两侧,输卵管下方,附着于阔韧带前叶
  - C. 子宫两侧,输卵管后方,附着于阔韧带后叶
  - D. 子宫两侧,输卵管下方,附着于阔韧带后叶

- E. 子宫两侧,输卵管后方,附着于阔韧带前叶

61. 关于孕激素的生理功能,说法正确的是
- A. 促进阴道上皮增生、角化
  - B. 使子宫内膜由增生期转化为分泌期
  - C. 促进乳腺管增生
  - D. 促进子宫发育
  - E. 促进体内水钠潴留

62. 妇女一生各阶段历时最长的是
- A. 新生儿期
  - B. 青春期
  - C. 性成熟期
  - D. 更年期
  - E. 老年期

63. 反映卵巢有排卵功能的检查为
- A. 基础体温呈单相型
  - B. 阴道脱落细胞反映为轻度雌激素影响
  - C. 宫颈黏液有羊齿植物叶状结晶
  - D. 子宫内膜有增生期变化
  - E. 子宫内膜有分泌期变化

64. 下列属于外生殖器的器官是
- A. 阴道
  - B. 宫颈
  - C. 子宫
  - D. 输卵管
  - E. 阴道前庭

### 【A2 型题】

1. 某年轻女性,阴道上皮增生、角化、糖原增多,阴道酸度增强。此变化受哪种激素影响

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 孕激素
- D. HCG
- E. 胎盘生乳素

2. 患者女性,27 岁。月经周期为 28 天,现在是月经干净后第 8 天。宫颈黏液涂片检查结果是典型羊齿植物叶状结晶,

表明其所处的阶段为

- A. 月经期
- B. 月经前
- C. 排卵后
- D. 已妊娠
- E. 接近排卵

3. 患者女性,18岁。于高处取物时不慎摔下,呈骑跨式,伤及外阴部位,疼痛难忍,出现外阴血肿,其最易发生的部位在

- A. 阴阜
- B. 小阴唇
- C. 大阴唇
- D. 阴蒂
- E. 阴道前庭

4. 患者女性,25岁。已婚,月经规律,月经周期第28天取子宫内膜检查见腺体缩小,内膜水肿消失,螺旋小动脉痉挛性收缩,有坏死、破裂,内膜下血肿。该内膜为

- A. 月经期
- B. 增生期
- C. 分泌早期
- D. 分泌期
- E. 月经前期

5. 患者女性,30岁。月经周期为28天,有排卵型,于月经周期第22天刮宫,镜检见子宫内膜腺体增大,血管增生、卷曲,间质高度水肿、疏松。该内膜为

- A. 月经前期
- B. 月经期
- C. 月经后期
- D. 增生期
- E. 分泌期

6. 患者女性,27岁。宫颈黏液分泌减少,而且变得稠厚。此变化受哪种激素影响

- A. HCG
- B. 泌乳素
- C. 雌激素

- D. 孕激素
- E. 雄激素

7. 患者女性,28岁。急性下腹坠痛3小时,停经45天。妇科检查右侧附件区可触及一包块,初步诊断为宫外孕。为确诊需进行阴道穹隆穿刺,穿刺部位应该是

- A. 阴道前穹隆
- B. 阴道后穹隆
- C. 阴道左穹隆
- D. 阴道右穹隆
- E. 膀胱子宫陷凹

【A3/A4 型题】

(1~2 题共用题干)

患儿女,12岁。阴道流血3天,面色苍白, BP 90/60mmHg, 子宫不大,附件正常,无外伤及性生活史。患儿自觉头晕、心悸、四肢冰冷。

1. 该患儿阴道流血的原因最可能是

- A. 因卵巢功能不全,经血量多
- B. 早孕
- C. 遗传性疾病
- D. 感染
- E. 凝血功能障碍

2. 下列护理措施不当的是

- A. 做好心理护理 ✓
- B. 坐浴以清洗外阴
- C. 保暖 ✓
- D. 休息 ✓
- E. 加强营养

(3~4 题共用题干)

患者女性,47岁。14岁月经初潮,既往月经规律,周期28~30天,连续5天,近1年月经周期不规则,20~35天行经1次,持续7~12天干净,经量多,每次需用卫生巾2包。

3. 目前该患者处于

- A. 性成熟期
- B. 绝经前期
- C. 绝经过渡期

- D. 绝经期
- E. 绝经后期

4. 目前该患者的卵巢状况为

- A. 卵巢功能属于成熟阶段
- B. 常为有排卵型月经
- C. 卵巢内卵泡已耗竭
- D. 卵巢内剩余卵泡完全丧失对垂体促性腺激素的反应
- E. 卵巢内卵泡数明显减少且易发生卵泡发育不良

(5~6 题共用题干)

某健康妇女,进行查体,其骨盆形态各径线均正常。

5. 该妇女骨盆入口平面前后径可能为

- A. 11cm
- B. 10cm
- C. 9.5cm
- D. 9cm
- E. 8.5cm

6. 该妇女中骨盆平面前后径可能为

- A. 11.5cm
- B. 10.5cm
- C. 9.5cm
- D. 8.5cm
- E. 8cm

(7~8 题共用题干)

患者女性,48 岁。月经周期不规则近 2 年。近期月经周期 30~40 天,经期长短不一,量多;基础体温呈单相型;宫颈黏液羊齿植物叶状结晶呈持续高度影响。

7. 此时子宫内膜最有可能的改变是

- A. 增生期
- B. 分泌期
- C. 增生期 + 分泌期
- D. 子宫内膜增生症
- E. 分泌期分泌功能不足

8. 最能明确诊断的检查是

- A. B 超
- B. 诊断性刮宫

- C. 宫腔镜检查
- D. 性激素水平测定
- E. 宫颈细胞检查

(9~10 题共用题干)

某妇女的月经周期可以被描述成 13 3~5/29 天,末次月经 10 月 21 日。

9. 该妇女的月经周期是

- A. 3~5 天
- B. 13 天
- C. 24~26 天
- D. 28 天
- E. 29 天

10. 该妇女的初潮年龄是

- A. 3~5 岁
- B. 13 岁
- C. 24 岁
- D. 29 岁
- E. 30 岁

(11~13 题共用题干)

患者女性,32 岁。15 岁月经初潮,月经周期规律,5/32 天。结婚 4 年夫妻同居,有正常性生活,至今未怀孕。末次月经 7 月 24 日。

11. 从理论推算,该患者排卵日应在

- A. 8 月 1 日左右
- B. 8 月 7 日左右
- C. 8 月 12 日左右
- D. 8 月 14 日左右
- E. 8 月 21 日左右

12. 判断该患者有无排卵,最简便的检查方法是

- A. 尿孕二醇测定
- B. 放射免疫法测定血浆中 LH
- C. 孕激素试验
- D. 基础体温测定
- E. 子宫内膜活检

13. 若该患者有排卵,检查结果能反映体内已受孕激素影响的是

- A. 阴道上皮表层细胞角化



- B. 宫颈黏液出现羊齿植物叶状结晶
- C. 基础体温呈单相型
- D. 子宫内膜腺上皮细胞出现核下空泡
- E. 子宫内膜呈增生期图像

【B型题】

(1~5题共用备选答案)

- A. 子宫
- B. 卵巢
- C. 输卵管
- D. 阴道
- E. 阴蒂

- 1. 位于两侧小阴唇顶端,有勃起性的器官是
- 2. 可以发生周期性变化,产生月经的器官是
- 3. 既是性交器官,又是胎儿娩出的通道的是
- 4. 精子与卵子相遇发生受精的部位是
- 5. 产生性激素的器官是

(6~10题共用备选答案)

- A. 起于两侧子宫角前面,向前方伸展,向下终止于大阴唇前端,维持子宫前倾位
- B. 由子宫两侧至骨盆壁,将骨盆分为前后两部分,维持子宫在盆腔的正中位置
- C. 横行于宫颈两侧和骨盆侧壁间,固定宫颈于正常位置
- D. 起自宫颈后上侧方,向两侧绕过直肠达骶椎前,向后上牵引宫颈,保持子宫前倾位
- E. 位于骶尾骨与坐骨棘之间,妊娠期受激素影响变得松弛,有利于胎儿娩出

- 6. 圆韧带
- 7. 宫骶韧带
- 8. 阔韧带
- 9. 主韧带
- 10. 骶棘韧带

(11~13题共用备选答案)

- A. 促卵泡素
- B. 促黄体生成素
- C. 雌激素
- D. 孕激素
- E. 催乳激素

- 11. 卵泡早期分泌少,其后逐渐增高,排卵前达高峰,以后降低,黄体期再度增高的是
- 12. 卵泡前半期分泌少,以后逐渐上升,排卵前24小时出现高峰的是
- 13. 卵泡早期血含量甚微,排卵后分泌量显著增加,7~8天后逐渐下降的是

(14~16题共用备选答案)

- A. 月经期
- B. 增生期
- C. 分泌期
- D. 月经前期
- E. 月经周期

- 14. 两次月经第1天相隔的时间,称为
- 15. 月经的第1~4天,称为
- 16. 月经的第5~14天,称为

(17~19题共用备选答案)

- A. 腰淋巴结
- B. 腹股沟淋巴结
- C. 腹股沟浅淋巴结
- D. 腹股沟深淋巴结
- E. 闭孔淋巴结与髂淋巴结
- 17. 子宫体及底部与输卵管、卵巢淋巴汇入
- 18. 阴道下段的淋巴汇入
- 19. 阴道上段、宫颈的淋巴汇入

(20~24题共用备选答案)

- A. 子宫静脉
- B. 右卵巢静脉
- C. 左卵巢静脉
- D. 子宫动脉
- E. 卵巢动脉

- 20. 来自髂内动脉前干的是