

全国卫生专业技术资格
考试丛书·双核系列

护理学专业 (护师)资格考试 核心2000题

● 北京大学医学部专家组 编写

经典畅销10年
助百万考生通关

HULIXUE ZHUANYE
(HUSHI) ZIGE KAOSHI
HEXIN 2000 TI

赠

2015年考试试题选编
2016年考试全真模拟卷2套
200元网上学习费用



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书【双核系列】

护理学专业（护师）资格考试 核心 2000 题

北京大学医学部专家组 编写

北京大学医学出版社

HULIXUE ZHUANYE (HUSHI) ZIGE KAOSHI HEXIN 2000 TI

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (护师) 资格考试核心 2000 题/北京大学医学部专家组编写. —2 版. —北京: 北京大学医学出版社, 2013. 9 (2015. 8 重印)

ISBN 978-7-5659-0639-8

I. ①护… II. ①北… III. ①护理学—护士—资格考试—习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 211160 号

护理学专业 (护师) 资格考试核心 2000 题

编 写: 北京大学医学部专家组

出版发行: 北京大学医学出版社

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

电 话: 发行部 010-82802230; 图书邮购 010-82802495; 考试出版培训 010-82802564

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 药蓉 刘燕 李娜 董采萱 责任校对: 金彤文 责任印制: 李 啸

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 24.75 字数: 595 千字

版 次: 2013 年 9 月第 2 版 2015 年 8 月修订 2015 年 8 月第 3 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5659-0639-8

定 价: 59.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版说明

《全国卫生专业技术资格考试丛书》——护理学专业（护师）系列是北京大学医学出版社组织北京大学护理学院专家编写的全国首套针对护理学专业（护师）资格考试的考前辅导用书。本丛书从 2004 年启动，根据考生的个性需求，品种逐年增多；根据大纲变化和考生反馈，内容持续更新。

2013 年考试大纲新增医疗机构从业人员行为规范，医学伦理道德的要求由“了解”改为“熟悉”。

《护理学专业（护师）资格考试核心 2000 题》一书由北京大学护理学院的专家们，根据新大纲要求的考点精心选择两千多道试题，并按照考试试卷的形式按“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”分类。试题后直接附答案和解析，点明出题思路和涵盖考点，便于考生有针对性地复习。

本书是全国卫生专业技术资格考试——护理学专业（护师）考生的考前必备用书。

编 者

全国卫生专业技术资格考试丛书—— 护理学专业（护师）系列

【经典系列】

- ◎ **护理学专业（护师）资格考试应试指导**
紧扣最新大纲，精炼展现大纲内容。
- ◎ **护理学专业（护师）资格考试习题集**
习题质量高，题量丰富，涵盖大纲全部考点。
- ◎ **护理学专业（护师）资格考试全真模拟及精解**
全真模拟考试情景，答案后附有解析，帮助考生了解考题的难易度和考点分布。
- ◎ **护理学专业（护师）资格考试历年考题汇编及精解**
汇总历年考试真题，专家解析。根据真题会重复出现的规律反复练习，可帮助考生透析命题规律，提高应试技巧。

【双核系列】

- ◎ **护理学专业（护师）资格考试核心考点**
本书精选近千个核心考点，并附有“考点串联”和“名师点拨”板块，总结了作者多年的教学和考前培训经验。开本适宜，便于携带。
- ◎ **护理学专业（护师）资格考试核心 2000 题**
本书按照考试形式分卷编写，精选两千多道试题，试题后直接附答案及解析，便于考生有针对性地复习。

2015 护理学专业（护师）资格考试试题选编

基础知识

1. 与消化性溃疡发病相关的损害性因素中，占主导的是（幽门螺杆菌感染）
2. 人体在术后早期应激状态下出现的代谢改变是（肌肉蛋白质分解增强）
3. 慢性胃炎常见的病原菌是（幽门螺杆菌）
4. 在我国，肝硬化的主要病因是（病毒性肝炎）
5. 小儿呼吸心搏骤停的主要直接原因是（窒息）
6. 可杀灭结核分枝杆菌的条件是（烈日暴晒 2h）
7. 儿童 5 岁时的体重按公式粗略估计为（18kg）
8. 小儿尿路感染最主要的感染途径是（上行感染）
9. 原位癌变的范围仅限于（局限于上皮层内）
10. 子宫颈癌的好发部位是（宫颈鳞-柱状上皮交界处）
11. 慢性肾衰竭患者贫血的最主要原因是（促红细胞生成素缺乏）
12. 心脏冲动的起源部分是（窦房结）
13. 颅内压增高患者死亡的主要原因是（脑疝）
14. 1 型糖尿病发病的机制是（胰岛素分泌绝对不足）
15. 急性上呼吸道感染最常见的病因为（病毒）
16. 癫痫大发作时护理措施错误的是（扶持患者卧倒）
17. 胆汁的主要成分不包括（淀粉酶）
18. Grave 病最主要的病因是（自身免疫）
19. 大多数婴儿会叫“爸爸”“妈妈”的时期是（10~12 个月）
20. 引起腹外疝的两个主要原因是（腹壁强度低和腹内压增高）
21. 左心功能不全所致呼吸困难是由于（肺循环淤血）
22. 再生障碍性贫血属于（造血干细胞疾病）
23. 人体细胞外主要的阳离子是（ Na^+ ）
24. 发生心绞痛的最主要原因是（冠状动脉粥样硬化）
25. 急性腹膜炎后最常见的残余脓肿为（盆腔脓肿）
26. 水痘的传播途径是（呼吸道传播）
27. 肾的结核感染主要来自于（肺结核）
28. 慢性肺心病发病的关键环节是（肺动脉高压）
29. 护理人员能够在医疗机构执业的基本条件是（通过护士执业资格考试）
30. 急性脓胸多为继发性感染，最主要的原发病灶来自（肺部）
31. 新生儿硬肿症最先出现硬肿的部位是（小腿）
32. 正常脐带中应含有（一条静脉，两条动脉）
33. 继发性闭经是指月经初潮后，因某种病理性原因停经在（六个月以上）
34. 痰是黄色的提示肺部感染的病原菌是（葡萄球菌）
35. 最能反映小儿体格生长，尤其是营养状况的指标是（体重）
36. 孕妇血容量增加的最高峰在（孕 32~34 周）
37. 不符合慢性肾炎患者肾功能状况的描述是（肾功能损害是不可逆的）

38. 慢性心功能不全的诱因不包括 (气候急剧变化)
39. 脑出血最常见的部位是 (内囊)
40. 肛裂的好发部位是 (后正中线)
41. 肾盂肾炎最常见的致病菌是 (大肠埃希菌)
42. 属于构成骨髓为环境的细胞是 (造血干细胞)
43. 引起原发性肝癌的原因不包括 (饮食中含有多量纤维)
44. 门静脉与腔静脉之间的交通支不包括 (胃脾静脉)
45. 育龄健康妇女服用短效口服避孕药物的不良反应不包括 (腰酸、腹胀)
46. 左向右分流性先天性心脏病最易并发 (肺炎)
47. 系统性红斑狼疮属于 (自身免疫性疾病)
48. 直腿抬高试验阳性时, 患者下肢抬高的度数是在 (70° 以内)
49. 休克时反映器官血流灌注最重要的指标是 (尿量)
50. 临床死亡期限一般认为是 (4~6min)
51. 胃癌最主要的转移途径是 (淋巴转移)
52. 空肠回肠的静脉血最终汇入 (肠系膜上静脉)
53. “医乃至精至微之事”, 医疗卫生职业的内在要求是 (严谨求实, 精益求精)
54. 与乳腺癌发生有直接关系的激素是 (雌酮)
55. 提示哮喘患者病情严重的情况是 (哮鸣音减弱或消失)
56. 某护士在执行医嘱时, 发现主治医师的处方有问题, 该护士正确的做法是 (立刻告诉主治医师)
57. 患儿男, 8岁, 诊断为原发型肺结核, 经治疗后其病理转归最有可能是 (吸收好转)
58. 患者男, 23岁。全身高度水肿4周。实验室检查: 血浆清蛋白降低, 血脂增高, 尿蛋白(+++), 尿红细胞(+)。患者水肿最主要的原因是 (血浆胶体渗透压降低)
59. 患者男, 56岁。急性化脓性阑尾炎, 行阑尾切除术3天, 腹胀, 伴溢出性呕吐。检查: 全腹均匀膨隆, 肠鸣音减弱, 考虑肠梗阻。其肠梗阻类型是 (麻痹性肠梗阻)
60. 患儿男, 2岁, 因“发热、犬吠样咳嗽, 声嘶1日, 夜间症状较重”就诊。查体可见三凹征, 吸气性喉鸣, 咽部充血。最可能的诊断是 (急性感染性喉炎)
61. 患者女, 34岁。1周来自觉外阴瘙痒, 有豆渣样白带。查体: 阴道黏膜红肿, 附有白色膜状物, 易剥离。引起该病的病原体为 (白色念珠菌)
62. 女婴6天, 其母换尿片时发现起阴道流出少量血性分泌物向护士咨询。护士正确的解释是 (出生后母体雌激素影响中断所致)
63. 新生儿, 胎龄35周, 出生体重2000g。该新生儿分类应属于 (出生体重儿)
64. 患儿1.5岁, 发热、流涕3日。今日外耳道流出少量脓性分泌物。考虑为中耳炎。其易患中耳炎的原因是 (咽鼓管宽、短、直)
65. 患者男, 30岁。胸部以下大面积烧伤6h入院。入院时CVP 4cmH₂O, BP 80/60mmHg, 尿量20ml/h, 四肢厥冷, 呼吸急促, 提示 (血容量不足)
66. 患儿, 8个月。单纯母乳喂养。诊断为营养性巨幼红细胞性贫血, 主要病因是 (维生素B₁₂和叶酸供给不足)
67. 初孕妇, 妊娠28周。近日自感头晕、头痛, 产检时发现血压158/110mmHg, 尿蛋白(++), 水肿(+++)。诊断为子痫前期重度。其基本病理变化是 (全身小动脉痉挛)
68. 患者女, 40岁。因关节肿痛伴僵硬多年, 诊断为类风湿关节炎。其发病相关因素是 (自身免疫因素)
69. 患者男, 32岁。昨晚与朋友饮酒后突发上腹部持续而剧烈疼痛, 并向腰背部放射, 伴恶心呕吐, 呕吐物为胃内容物, 吐后腹痛不缓解, 来医院就诊。实验室检查: 血清淀粉酶650U/L, 初步诊断为急性胰腺炎。最可能的病因是 (酗酒和暴饮暴食)
70. 患者男, 67岁。以慢性支气管炎并发性慢性阻塞性肺气肿入院。于一阵干咳后突感左上胸剧烈刺痛, 出现明显呼吸困难, 不能平卧, 听诊左肺呼吸音明显减弱。应考虑为 (自发性气胸)

71. 患儿男，7岁。3日前右中指被竹签刺伤，今诉手指疼痛。检查见右中指红肿明显，原刺伤部位中间发白，手指无法弯曲。患儿体温38℃。最可能的诊断是（蜂窝织炎）
72. 某孕妇，28岁，孕33周。触诊抬头在腹部右侧，胎臀在腹部左侧，胎心在脐周听到。胎先露为（肩先露）
73. 患者男，52岁。因“胸痛，痰中带血1个月”入院。X线检查示右肺上叶有一不规则肿块。未明确诊断最可靠的检查是（CT检查）

相关专业知识

1. 治疗急性肺水肿不恰当的是（口服地高辛）
2. 颅内压增高的病因不包括（颅中窝骨折）
3. 腹膜炎手术后胃管拔除、开始进食的指征是（肠鸣音恢复，肛门排气）
4. 大便呈柏油样常见于（上消化道出血）
5. 病毒性脑炎患儿急性颅内压升高有脑疝先兆时，首先使用的药物是（20%甘露醇静脉滴注）
6. 脓肿形成后，首要的处理是（切开引流）
7. 前尿道结石的治疗，最常用的方法是（经尿道勾取或钳出结石）
8. 初筛大肠癌的检查方法是（大便潜血检查）
9. 我国对食管癌采取的一种简化的普查筛选诊断方法是（脱落细胞学检查）
10. 诊断早期胃癌的最有效的方法是（纤维胃镜）
11. 属于ICU基础监护的是（持续心电图，心率，呼吸）
12. 治疗休克的基本措施是（补充血容量）
13. 闭合性多根多处肋骨骨折患者首要的急救措施是（局部加压包扎固定）
14. 大隐静脉曲张术后患者首要的急救措施是（血栓形成）
15. 应用 β_2 受体激动剂控制哮喘发作时，首选的给药方法是（吸入法）
16. 确诊甲状腺功能亢进的化验是（三碘甲状腺原氨酸增高）
17. 治疗系统性红斑狼疮的首选药物是（强的松）
18. 新生儿破伤风发作时，最先受累的肌肉是（咀嚼肌）
19. 结核菌素试验阳性（++）的表现是（除硬结外，还有水疱、坏死或淋巴管炎）
20. 关于结核药物的治疗原则，不正确的叙述是（酌情停药）
21. 原发性肝癌非手术治疗的的首选是（肝动脉化疗栓塞治疗）
22. 新生儿窒息复苏步骤不包括（预防感染）
23. 肾结核的临床表现不包括（排尿困难、排尿中断）
24. 触觉语颤增强见于（大叶性肺炎）
25. 胰腺癌最常用的辅助诊断和随访项目是（糖类抗原19-9）
26. 关于采集血液标本的注意事项，不妥的叙述是（采血后针头贴试管壁缓缓注入试管内）
27. 白血病诊断的重要检查依据是（骨髓检查）
28. 肝破裂的腹腔穿刺液性质为（不凝固血清）
29. 冲洗气性坏疽创口的溶液应该是（3%过氧化氢溶液）
30. 甲状腺大部分切除术后发生抽搐是因为损伤（甲状旁腺）
31. 确诊中毒性细菌性痢疾最有价值的检查是（粪便细菌培养）
32. 新生儿寒冷损伤综合征复温的原则是（逐步复温）
33. 系统性红斑狼疮特异性的检查是（抗Sm抗体）
34. 中心静脉压正常值的范围是（6~12cmH₂O）
35. 低血钾症最早出现的临床表现是（肌无力）
36. 对心室颤动患者进行心肺复苏的首选药物是（利多卡因）
37. 软组织急性化脓性感染，在出现波动前需早起切开引流的是（脓性指头炎）

38. 诊断急性心肌梗死特异性最高的心肌酶是 (PM-MB 和 LD. H1)
39. 2 型糖尿病患者最主要的死因是 (心脑血管病变)
40. 诊断小儿心搏骤停的依据不包括 (持续昏迷)
41. 急性盆腔炎的主要治疗手段是 (抗生素治疗)
42. 长期高血压易导致脏器出现相关并发症, 常累及的脏器是 (心、脑、肾)
43. 维持正常循环功能的三个因素是 (血容量、脉压差、周围血管张力)
44. 原发性肾病综合征复发的主要原因是 (感染)
45. 鉴别肱骨髁上骨折与肘关节脱位, 主要检查 (肘后三点关系是否正常)
46. 对有机磷农药中毒有诊断价值的检查是 (胆碱酯酶活力测定)
47. 米泔水样便常见于 (霍乱)
48. 法洛四联症患儿缺氧发作应立即采取的体位是 (膝胸位)
49. Apgar 评分内容为 (呼吸、心率、肌张力、喉反射、皮肤颜色)
50. 过敏性紫癜主要累及的部位不包括 (心脏)
51. 做尿常规检查, 应留取 (清晨新鲜尿液)
52. 确诊缺铁性贫血的化验项目是 (血红蛋白)
53. 冠状动脉粥样硬化性心脏病确诊的依据是 (冠状动脉造影)
54. 关于慢性肾盂肾炎的治疗, 正确的是 (寻找易感因素, 提高机体免疫力)
55. 脑脊液检查出现蛋白细胞分离的疾病是 (格林-巴利综合征)
56. 断离肢体的现场保护方法是 (无菌或清洁敷料包裹后干燥冷藏)
57. 适宜滴虫生长的阴道 pH 大约为 (5.2~6.6)
58. 下肢深静脉回流是否通畅的检查实验是 (波氏试验)
59. 符合阻塞性肺气肿的肺功能检查结果是 (第一秒用力呼气量增加)
60. 患者女, 60 岁, 外阴菜花样肿物, 经病理检查为外阴鳞状细胞癌 1 期, 未见转移迹象, 该患者的治疗首选是 (手术治疗)
61. 患者男, 72 岁, 既往有排尿困难多年, 今日受凉感冒后下腹胀痛, 直肠指诊前列腺肥大, 首要的处理措施是 (导尿)
62. 患者女, 35 岁, 右上腹阵发性绞痛伴恶心呕吐 5h, Murphy 征阳性, 进一步检查应首选 (腹部 B 超)
63. 患者女, 35 岁。因觉心悸到医院行心电图检查, 心电图结果为窦性心律, 心率 125 次/分, 诊断为心律失常, 此患者的心律失常是 (窦性心动过速)
64. 患者男, 65 岁, 肝硬化病史 2 年, 出现持续性肝区疼痛, 急诊入院行超声检查示腹腔大量腹水, 肝增大伴弥漫性改变, 肝右叶可见多个大小不等的强回声团, 最可能的诊断是 (肝硬化癌变)
65. 患者男, 57 岁, 排尿困难 3 个月, B 超检查可见前列腺增大, 血清总 PSA 为 20ng/ml, 为明确诊断, 最可靠的检查方法是 (前列腺穿刺活检)
66. 患儿男, 4 个月, 人工喂养, 睡眠时常烦躁哭闹, 难以入眠。查体: 体重 6kg, 体温 37.9℃, 有枕秃及颅骨软化, 诊断为“佝偻病”。给予维生素 D₂ 30 万 U, 肌肉注射后突然全身抽搐 3 次, 每次约 20~60s, 发作停止后精神如常, 查血清离子钙为 1.0mmol/L, 血清总钙为 1.8mmol/L。该患儿发生抽搐的原因是 (血清钙减少)
67. 患儿男, 5 岁, 发热伴腮腺肿大, 诊断为“流行性腮腺炎”。该患儿恰当护理措施是 (易消化的半流质饮食)
68. 某孕妇, 25 岁, 孕 1 产 0, 早孕出现较重的呕吐, 现孕 8 周, 皮肤黏膜苍白, 毛发干燥无光泽, 活动无力, 易头晕。实验室检查: 血红蛋白 70g/L, 血细胞比容 0.15, 血清铁 6.0μmol/L。下列孕期健康宣教内容, 错误的是 (如果服用铁剂时胃肠道反应较轻, 则不需同服维生素 C 及稀盐酸)
69. 患者女, 65 岁。阴道分泌物增多伴出血 3 个月, 经宫颈病理等检查临床诊断为宫颈鳞状细胞癌 1a 期, 应行 (宫颈局部用药)
70. 患者女, 54 岁, 手术前行腰麻, 当麻醉穿刺注药后, 血压立即下降, 主要原因是 (交感神经抑制)

71. 患儿，3个月。腹泻2日，呈黄绿色稀便，有奶瓣和泡沫，为纠正轻度脱水，应选择（少量多次喂服ORS液）
72. 患者男，21岁，淋雨后突然寒战、高热、咳嗽，查血白细胞总数 $18 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞90%。其原因是（细菌感染）
73. 初产妇，33岁，妊娠39周，不规则宫缩3h。B超检查：胎头双顶径10cm，该孕妇空腹血糖为8.2mmol/L，该孕妇最合适的分娩方式是（剖宫产）
74. 患者女，52岁，单位查体发现子宫肌瘤。妇科检查：子宫小于2个月大小，患者无不适主诉，最适合的护理方法是（定期随访）
75. 患者男，31岁，头痛、乏力5个月，视物模糊5日。查体：血压180/100mmHg，尿蛋白（++），尿红细胞20/HP。眼底视网膜动脉痉挛，黄斑部有渗出与出血，视盘无水肿，B超示双肾体积缩小，最可能的诊断是（恶性高血压肾损害）
76. 患者男，30岁。因急性肠梗阻入院，现患者出现明显腹膜刺激征。X线检查显示孤立、胀大的肠袢，且不受体位和时间的影响。应首先考虑诊断是（绞窄性肠梗阻）
77. 患儿，20个月，其母主诉夜间多哭多汗易惊，近日频发手足肌肉痉挛呈弓状，昨夜间突然意识不清，四肢抽搐，两眼上翻，持续10s左右，其护理措施错误的是（静脉注射钙剂时需快速推注）
78. 患者男，57岁，肝硬化病史10年，近三日来大便不畅，逐渐出现嗜睡、幻觉、脑电图表现异常，节律变慢，出现 β 波，医生给予弱碱性溶液灌肠，其目的是（减少肠道氨的形成）
79. 患者男，65岁，慢性支气管肺炎十余年，近一个月来出现进行性呼吸困难，晨起咳嗽严重，痰量较多，呈脓性。查体：肺部可闻及啰音，呼吸音减弱，为进一步明确诊断，辅助检查不包括（胃肠钡餐）
80. 初产妇，28岁，24h前行会阴侧切术分娩一男婴，会阴水肿明显，护理措施错误的是（会阴切口患侧卧位）
81. 患者男，33岁，汽车撞伤左上腹4h，P120次/分，BP70/40mmHg，全腹压痛，反跳痛，肌紧张，肝浊音界存在，肠鸣音减弱，进一步的检查是（诊断性腹腔穿刺）
82. 患者男，18岁，自儿童时期起哮喘即反复发作。昨日上午因受凉感冒而致哮喘再次发作，目前控制哮喘发作最有效的抗炎药是（糖皮质激素）
83. 急性肾盂肾炎常见的尿液特点是（脓尿）
84. 慢性肾小球肾炎常见的尿液特点是（蛋白尿）
85. 慢性肾衰竭常见的尿液特点是（蛋白尿）
86. 轻度甲亢基础代谢率是（+20%~30%）
87. 重度甲亢基础代谢率是（>+60%）
88. 门静脉高压症所致上消化道大出血，较好的手术方法是（贲门周围血管离断术）
89. 门静脉高压症所致顽固性腹水的有效手术治疗方法是（肝移植术）
90. 头部受到撞击后，发生一过性神经功能障碍，无肉眼可见的神经病理改变，显微镜下，神经组织结构紊乱，判断为（脑震荡）
91. 暴力作用头部后，脑组织受到破坏较轻，软脑膜尚完整，判断为（脑挫伤）
92. 脑实质血管破裂，会导致（硬膜下血肿）
93. 特发性血小板减少性紫癜首选（糖皮质激素治疗）
94. 重型再生障碍性贫血首选（免疫抑制剂治疗）

专业实践能力

1. 气管内吸痰时，每次插管吸痰时间不宜超过（15s）
2. 在压力理论中，“不祥的预感”属于（心理性压力源）
3. 患者疼痛时的行为反应是（皱眉、咬嘴唇）
4. 尸体护理时将尸体仰卧，头下垫枕的主要目的是（防止面部淤血变色）
5. 用紫外线灯消毒物品时的有效距离和消毒时间分别是（25~60mm，20~30min）
6. 瞳孔散大的标准是瞳孔直径（>5mm）

7. 关于煮沸消毒法的叙述, 不正确的是 (从物品放入开始计时消毒时间)
8. 极度衰弱、膀胱高度膨胀的患者, 导尿时排空膀胱会引起 (血尿、虚脱)
9. 属于清洁区的是 (消毒间)
10. 控制医院感染最简单有效的方法是 (洗手)
11. 可出现尿频、尿急、尿痛症状的是 (膀胱炎症)
12. 属于冷疗禁忌证的是 (全身微循环障碍)
13. 患者自己无能力变换体位, 卧于他人安置的体位是 (被动卧位)
14. 使用无菌溶液时应先核对 (瓶签各项内容)
15. 容易潮解的口服药物是 (酵母片)
16. 为传染病患者吸痰时, 错误的做法是 (痰液滴落地面应立即清洁处理)
17. 伤寒患者灌肠的液量及液面距肛门的距离应是 (不超过 500ml, 不超过 30cm)
18. 根据人类基本需要层次论, 对各层次之间关系的理解, 不正确的是 (不同层次需要不会重叠出现)
19. 在传染病区内护士穿隔离衣的方法, 正确的是 (两手在背后捏住隔离衣内外边缘对齐折叠系带)
20. 护士的思想道德素质不包括 (心理健康, 情绪稳定)
21. 危重患者眼睑不能闭合时应 (覆盖凡士林纱布)
22. 易风化潮解的药物应 (放在阴凉干燥处)
23. 对于丧亲者的护理, 不妥的是 (尽力提供经济支持)
24. 留 24h 尿标本用浓盐酸进行防腐, 其作用是 (防止尿中激素被氧化)
25. 用于改善微循环的胶体溶液是 (低分子右旋糖酐)
26. 为避免患者出现不可逆转的脑损害, 心肺复苏抢救开始的时间不应超过 (4min)
27. 在鼻饲患者灌注食物时, 鼻饲液适宜的温度是 (38~40℃)
28. 护理技术操作前解释的内容不包括 (感谢患者的合作)
29. 误服硫酸后, 需保护胃黏膜时可选用的溶液是 (镁乳)
30. 患者男, 23 岁。脾外伤破裂引起出血 1000ml, 输大量库血后心率缓慢, 手足抽搐, 血压下降, 伤口渗血。其原因是 (血钙降低)
31. 患者可以根据需要和利益得到所有可能的服务属于佩皮劳人际关系模式的 (开拓期)
32. 现有 95% 乙醇溶液 500ml, 要配制 70% 乙醇, 需加入灭菌蒸馏水 (179ml)
33. 关于护理诊断排列顺序的叙述, 正确的是 (护师可参照马斯洛的需要层次论对护理诊断进行排序)
34. 关于小量不保留灌肠的叙述, 正确的是 (小儿插管深度 4~7cm)
35. 关于舒适和不舒适的叙述, 不正确的是 (影响舒适的因素包括身体、心理和社会三方面)
36. 为防止脑水肿, 用冰槽降温时患者的肛温维持在 (33℃)
37. 医疗卫生法的基本原则不包括 (保护弱者原则)
38. 对要素饮食的叙述, 不正确的是 (营养价值高)
39. 20 世纪 80 年代以来, 影响健康的最主要因素是 (生活方式)
40. 属于沟通基本层次中的最高层次是 (共鸣性沟通)
41. 属于护理程序中计划阶段的内容是 (实施护理措施)
42. 患者出于安全的需要, 最需要的是 (由有知识、负责任的护士照顾)
43. 对整体护理的正确理解是 (贯穿于人生命的全过程)
44. 瞳孔呈椭圆形并伴散大, 常见于 (青光眼)
45. 关于环境与护理的叙述, 不正确的是 (人的内环境相对稳定, 一般不会随外界环境的变化而变化)
46. 中枢神经系统活动能量的来源是 (碳水化合物)
47. 患者男, 42 岁, 因肺炎住院。治疗后病情有所好转, 但这时他的妻子意外骨折。他立即出院去照顾妻子和孩子。他的这种行为是 (角色行为消退)
48. 患者男, 25 岁。因发热、咳嗽、呼吸困难而住院。患者神志清楚。在收集资料过程中属于主要来源的

是（患者本人）

49. 患者女，35岁。因糖尿病住院治疗，医嘱皮下注射普通胰岛素8个单位 ac，执行时间是（饭前）
50. 患者男，32岁。脚底被铁锈钉刺伤。遵医嘱注射破伤风抗毒素。皮试结果：红肿大于1.5cm，周围红晕达6cm。采用脱敏注射。正确的注射方法是（分4次注射，剂量渐增）
51. 患者女，55岁。因外伤入院。患者不能控制排便，多次将大便排在床上。对该患者的护理重点是（保护肛周皮肤，防止压疮）
52. 患者女，23岁。急性肠胃炎、腹痛、怕冷，可以在患者腹部（湿热敷）
53. 患者女，30岁。因上呼吸道感染就医。在下列采集的资料中，属于客观资料的是（咽部充血，体温38.1℃）
54. 患者男，因甲型肝炎住院20天后治愈出院。护士为其进行终末消毒处理，不妥的做法是（被服及时送洗衣房清洗）
55. 患者女，32岁。过马路时不慎被汽车撞成右下肢开放性骨折，因失血过多发生休克，入院后应采取的体位是（中凹卧位）
56. 患者男，66岁。慢性心功能不全。医嘱地高辛2.05mg qd，护士发药前应首先〔测脉率（心率）和脉律（心律）〕。
57. 患者男，15岁。诊断为急性肾炎。为配合治疗，适宜的饮食为（低蛋白、低盐饮食）
58. 患者男，64岁。脑血栓昏迷，需插胃管进行鼻饲饮食。插管至15cm时，应注意（使患者下颌靠近胸骨柄）
59. 患者男，72岁。因胃癌晚期，不能进食，需经静脉供给高营养以维持生命。采用颈外静脉穿刺法输液，其穿刺部位为下颌角与锁骨上缘中点连线之（上1/3处）
60. 患者男，65岁。肝癌晚期，极度衰弱。此时医护人员应采取的主要措施是（以对症照料为主）
61. 患者女，65岁，老年性白内障术后第三天。为预防感染，需要滴眼药。护士在操作时，眼药的滴入部位应该是（下眼睑）
62. 患者男，66岁。糖尿病，不会讲普通话。护士在与其交流时应特别注意使用的沟通技巧是（核对）
63. 患儿男，7岁。近2个月来出现异食癖，喜食煤渣，患儿缺乏的营养素是（锌）
64. 患者男，26岁。腿部外伤后发展为气性坏疽，为其换药用的剪刀最佳消毒方法是（高压蒸汽灭菌）
65. 患者女，50岁。因急性支气管炎遵医嘱用青霉素治疗。用药第9日出现发热、关节肿痛、全身淋巴结肿大、腹痛，应考虑为（血清病型反应）
66. 护士给患者使用热水袋时发生烫伤。根据我国法律，这属于（失职）
67. 患者男，65岁。肺心病入院，护士为其进行静脉穿刺，进针时有回血，推药时患者疼痛明显。此时可能出现的问题是（针头未完全刺入血管内）
68. 患者男，55岁，急性肾小球肾炎，轻度水肿。患者每天的饮食中食盐的摄入量应低于（2.5g）。患者每天的饮食中蛋白质的摄入量应低于（40g）
69. 患者男，64岁。突然出现胸骨后压迫性疼痛并放射到左肩和左侧小指，不能忍受。面色苍白、出冷汗、心率快，心电图可见ST段压低、T波倒置，使用消心痛（异山梨酯）5min后疼痛缓解。对患者进行健康指导，错误的是（食物中宜高糖，适量纤维素）。引起患者疼痛的原因是（病理改变）。患者的疼痛属于世界卫生组织规定疼痛分级的（3度）。
70. 患者男，18岁。因“急性肺炎”入院。患者神志清楚，咳嗽，咳痰，体温39.5℃。医嘱：乙醇拭浴，冰袋不宜放置在患者的（足底）。因患者咳嗽加剧，痰液黏稠，遵医嘱超声雾化吸入，首选药物是（ α -糜蛋白酶）
71. 患者女，26岁，因停经6周，阴道少量出血就诊，诊断为先兆流产，需肌内注射黄体酮。吸取药液操作不妥的是（将安瓿用两手对搓），注射时，患者的正确姿势是（上腿伸直，下腿弯曲）
72. 患者女，51岁。乳腺癌晚期，身体极度衰竭，卧床不起，情绪暴躁，常无端发脾气。此时该患者的心理反应是（愤怒期）。护理该患者时，不恰当的护理措施是（劝慰患者不要輕易表达不良情绪）。
73. 护士洗手时揉搓的时间不少于（15s）

74. 护士涂擦消毒手时的时间不少于 (2min)
75. 根据自理模式理论, 对糖尿病患者进行护理时应采用 (支持指导系统)
76. 根据自身模式理论, 对昏迷患者进行护理时应采用 (全补偿系统)
77. 大量不保留灌肠肛管插入深度为 (7~10cm)
78. 保留灌肠肛管插入深度为 (15~20cm)
79. 胆道完全阻塞时, 粪便是 (陶土色)
80. 下消化道出血时, 粪便是 (暗红色)
81. 在输血前、后, 为防止不良反应发生, 应静脉输入的溶液是 (0.9%氯化钠溶液)
82. 在预防枸橼酸钠中毒反应发生, 每输入 1000ml 库血, 应按医嘱静脉注射的液体是 (10%葡萄糖酸钙溶液)
83. 参与合成血红蛋白、肌红蛋白与细胞色素 A 的物质是 (铁)
84. 调节心脏和神经传导及肌肉收缩的物质是 (钙)
85. 角色行为强化指 (安于患者角色, 对自我能力表示怀疑, 产生退缩和依赖心理)
86. 角色行为缺如指 (没有进入患者角色, 不承认自己是患者, 不能很好配合医疗和护理)
87. 角色行为冲突指 (患者与其患病前的各种角色发生心理冲突而引起行为的不协调)

专业知识

1. 癫痫患者可进行的日常活动项目是 (太极拳)
2. 脑脊液漏患者禁忌耳鼻冲洗的目的是避免 (颅内继发感染)
3. 决定能否经阴道分娩的重要观察项目是 (宫口扩张程度)
4. 癫痫大发作的临床表现特征是 (意识丧失, 全身抽搐)
5. 颅前窝骨折临床表现 (脑脊液鼻漏)
6. I 期内痔患者排便时 (出现无痛性出血)
7. 产后出血导致失血性休克时的补血原则是 (补充 1/2 失血量)
8. 关于糖皮质激素治疗肾病综合征, 正确的叙述是 (维持时间长, 在 1~2 年)
9. 肾性水肿患者进食蛋白质应选用 (优质蛋白)
10. 弥散性血管内凝血患者早期及时应用的药物是 (肝素)
11. 急性左心力衰竭患者端坐位的目的是 (减轻肺淤血)
12. 有机磷农药中毒瞳孔缩小是因为 (毒蕈碱样作用)
13. 正常情况下, 7 个月小儿未接种的疫苗是 (麻疹疫苗)
14. 慢性白血病护理体检最突出的体征 (胸骨压痛)
15. 猩红热的特征性体征是 (帕氏线)
16. 十二指肠溃疡典型临床表现是 (饥饿痛)
17. 佝偻病患儿早期主要表现是 (睡眠不安, 多汗, 枕秃)
18. 长期卧床的心力衰竭患者, 其水肿最容易出现的部位是 (腰骶部)
19. 骨软骨瘤的临床表现是 (多数无症状, 无意中发现骨性肿块)
20. 急性肾盂肾炎最重要的护理措施是 (卧床休息, 多饮水)
21. 化疗不良反应最常见、最严重的是 (造血功能障碍)
22. 与营养不良无关的指标是 (肌酐清除率)
23. 支气管扩张患者的痰液是 (分层痰)
24. 白血病患者化疗静脉给药不妥的是 (血管要轮换使用)
25. 上消化道出血伴休克时首选的护理措施是 (迅速建立静脉通路)
26. 乳腺癌根治术后的患者, 患侧手部及腕部早期功能锻炼时间是术后 (24h)
27. 关于胸腔闭式引流患者的护理措施是, 错误的是 (患者呼气未屏气拔管)
28. 重度一氧化碳中毒时, 患者全血的碳氧血红蛋白浓度的是 (>50%)

29. 为促进非手术治疗尿路结石的患者排出结石，最适宜的运动方式是（跳跃）
30. 关于肝性脑病患者的护理措施，不妥的是（烦躁者给镇静剂）
31. 杜加实验阳性的关节脱位是（肩关节）
32. 下列疾病中，可导致里急后重的是（直肠癌）
33. 术前需要使用甲紫的妇科手术是（全子宫切除术）
34. 抢救新生儿窒息的首要护理措施是（保持呼吸道通畅）
35. 感染性休克常见的并发症不包括（肺水肿）
36. 某新生儿黄疸出生后 2~3 天出现，4~5 天最明显，10~14 天消退，应考虑是（新生儿生理性黄疸）
37. 二尖瓣狭窄患者最重要的体征是（心尖部舒张期杂音）
38. 护理肿瘤放疗患者，应每周检查一次白细胞和血小板，当白细胞降至多少时应停止治疗（ $3 \times 10^9/L$ ）
39. 急性一氧化碳中毒患者苏醒后，应继续观察时间是（2 周）
40. 溃疡性结肠炎的并发症不包括（肠梗阻）
41. 患者术前肌内注射哌替啶、阿托品的目的不是（减少忧虑）
42. 金属声调最常见于（肺癌）
43. 不属于肺癌的肺外表现的是（女性闭经）
44. 易合并脓胸的肺炎是（金黄色葡萄球菌肺炎）
45. 小儿肾病综合征的常见并发症是（感染、血栓、电解质紊乱）
46. 患儿，1 岁，外伤导致颅内出血，前囟隆起，喷射性呕吐，浅昏迷。患儿可能发生脑疝的表现是（瞳孔不等大）
47. 患者男，35 岁，服用吲哚美辛后胃痛，今晨呕吐咖啡样胃内容物 250ml 来就诊，既往无病史，首选检查是（急诊胃镜）
48. 患者男，32 岁，咳嗽，咳脓痰 1 年，间断咯血，量少。查体：背部可闻及湿性啰音，有杵状指，首先应考虑的是（支气管扩张）
49. 患者女，26 岁，下楼梯时右脚踝关节不慎扭伤，24h 之内的正确处理措施（冷敷）
50. 患儿，6 个月。诊断化脓性脑膜炎。经正规治疗后，脑脊液正常，但头围进行性增大。该患儿可能合并了（脑积水）
51. 患者女，35 岁。四肢皮肤反复出现紫癜 1 年余。实验室检查血小板明显减少，红细胞、白细胞基本正常，应考虑的诊断是（特发性血小板减少性紫癜）
52. 患者男，怕热多汗 3 年余，心率 110 次/分，食欲好且逐渐消瘦，经检查发现 FT_3 、 FT_4 增高。昨日突然出现昏睡，体温达到 $40^\circ C$ ，心率 160 次/分。呕吐少量胃内容物、腹泻、大汗。此患者可能发生了（甲状腺危象）
53. 患者男，27 岁。近两年来经常出现低热，近来感气促，间断咳脓痰，胸部 X 线片示纵隔移向右侧，行脓腔造影，行脓腔造影，咳出蓝色痰液，为改善呼吸功能建议采取（半坐卧位）
54. 患者女，31 岁，被诊断患有滴虫性阴道炎，护士应告知月经干净后复查滴虫性阴道炎连续几次阴性为治愈标准（3 次）
55. 28 岁已婚女性，性生活正常，婚后 3 年未受孕。护士指导提高受孕率技巧应除外（性交前、中、后使用阴道润滑剂）
56. 某 1 型糖尿病患者早餐后 2h 血糖 $15mmol/L$ 。给胰岛素静脉滴注，过程中患者自觉多汗，手抖，饥饿，应考虑的原因是（低血糖）
57. 冠状动脉旁路手术患者术前停用抗凝剂的目的是（防止术中出血不止）
58. 患者男，65 岁，胃溃疡病史 30 余年，近 2 周上腹部疼痛，服用治疗溃疡药物无效，伴有黑便多次，患者可能发生的并发症是（出血）
59. 患儿，4 岁，突然发热、腹痛。腹痛位于脐周，呈持续性，伴有呕吐、腹胀、腹泻，大便为果酱样，有腥臭味。腹部 X 线片可见液平面，最可能诊断（肠套叠）

60. 初孕妇，26岁，停经60天，少量阴道流血3天。检查：宫口未开，子宫如60天大小，HCG(+)。最可能的诊断是（先兆流产）
61. 产妇，26岁。早期宫腔检查无异样。第二产程突然出现呛咳，呼吸困难，随即出现昏迷，血压50/30mmHg，该产妇可能发生了（羊水栓塞）
62. 患者女，35岁，头晕1个月来院就诊，查血常规RBC $3 \times 10^{12}/L$ ，Hb 80g/L，WBC $2.0 \times 10^9/L$ ，PLT $40 \times 10^9/L$ 。考虑的是（再生障碍性贫血）
63. 患者女，38岁，子宫内膜异位症病史1年，该患者最主要的临床表现是（痛经）
64. 患者男，38岁。慢性肾衰竭伴严重水肿，不妥的护理措施（控制水的摄入）
65. 患儿，5个月。查体发现口腔上有白色乳凝样物体，不易褪去。擦拭时患儿无明显不适感，最可能的诊断是（鹅口疮）
66. 某妊娠26周孕妇，因妊娠高血压静脉滴注硫酸镁，下列用药的监测结果中，应停用药物的指征是（膝反射亢进）
67. 患者男，49岁，农民，中午在烈日下劳动，3h后恶心，头晕，头痛，面色苍白，大汗，脉速，呼吸浅快，意识不清，血压79/49mmHg。应考虑是（热衰竭）
68. 腹股沟斜疝患者在常规修补术后取平卧位，患侧膝下垫软枕，使髋关节微屈的目的（减轻刀口张力）
69. 患儿男，3岁。出生后3个月开始哭闹时青紫，后逐渐加重，有昏厥史，最可能的诊断是（法洛四联症）
70. 初产妇，27岁。36周妊娠合并心脏病，心功能Ⅱ级，终止妊娠后，不正确的护理措施是（回乳）
71. 患者男，65岁。前列腺增生切除术后，短期内禁止肛管排气和灌肠，是为防止（出血）
72. 初产妇，26岁，40周妊娠，宫口开全，胎先露达坐骨棘平面以下3cm，胎心突然降到85次/分，正确的做法是（立即剖宫产）
73. 患者女，26岁，患系统性红斑狼疮3年，未婚，面部有较严重的蝶形红斑，怕见人，且有不规则发热，患者首要的护理诊断是（皮肤完整性受损）
74. 患儿，3岁。诊断脓胸。住院第2天发生呼吸困难、喘憋、烦躁、心率快，右下肺叩诊浊音，右上肺叩诊鼓音。最可能发生（脓气胸）。最适当的治疗是（患侧胸腔闭式引流）。若胸腔积液为黏性黄色液体，最可能的致病菌是（金黄色葡萄球菌）
75. 女性，25岁。工作压力大，婚后意外怀孕，该孕妇整个孕期精神紧张烦躁，于妊娠35周因胎儿宫内窘迫手术产一女婴。产后第二天丈夫因公出差开始精神不振，常常失眠，向心理医生求助，心理医生诊断为产后抑郁。产后抑郁一般发生在（产后3~4天）。该产妇产后抑郁的心理因素不包括（手术分娩）。
76. 患儿男，8岁。被开水烫伤后4h送到急诊，患儿躯干前侧包括会阴均为薄壁大水疱，疼痛剧烈，双下肢红斑性改变。该患儿烧伤面积是（36%）。躯干前侧烫伤深度达到（表皮）。双下肢损伤深度是（真皮浅层）
77. 患者女，30岁。因房屋倒塌导致严重多发伤，心跳呼吸骤停，经紧急复苏后，送住ICU进一步抢救治疗。两天后患者出现口鼻腔、伤口、消化道及注射部位出血，诊断为DIC。对患者进行早期心肺复苏，错误的是（人工呼吸的频率10~12次）。实验室检查结果不包括（3P试验阴性）
78. 患者男，46岁。因高位小肠瘘入院，为保护局部皮肤，遵医嘱在瘘口处放置持续负压吸引管和滴液管。每日等渗盐水冲洗量（2000~4000ml），负压的压力为（10~20kPa）
79. 患者男，56岁。心脏瓣膜伴二尖瓣狭窄6年，头晕，心悸，心前区不适3h。查体：脉搏90次/分，心率110次/分。第一心音强弱不等，心律极不规则，心电图P波消失，代之以大小形态不等及脉率不一样f波，QRS波群形态正常。该患者的脉搏是（短绌脉），可能发生了（心房颤动）。
80. 类风湿关节炎患者的表现为（有关节畸形）
81. SLE患者除关节外的表现为（有多系统脏器损害）
82. 卡介苗的接种方法是（左上臂三角肌上缘皮内注射）
83. 结核菌素的接种方法是（左前臂掌侧中下1/3交界处皮内）
84. 乙肝疫苗的接种方法是（上臂三角肌肌肉注射）

- 85. 甲状腺腺体内有单个的高功能结节，患者无眼球突出属于（高功能腺瘤）
- 86. 甲状腺呈弥漫性肿大，两侧对称伴有眼球突出属于（原发性甲亢）
- 87. 甲状腺腺体呈结节性两侧不对称，不伴有突眼，属于（继发性甲亢）
- 88. 急性梗阻性化脓性胆管炎可见的症状是（腹痛，寒战高热，黄疸+休克+精神症状）
- 89. 胰头癌可见的症状是（腹痛，寒战高热，黄疸）
- 90. 慢性肾上腺皮质功能减退症的患者常可出现（色素沉着）
- 91. 呆小症患者可出现（身材矮小）
- 92. 甲状腺功能减退患者可出现（肥胖）

2014 年护理学专业（护师）执业资格考试试题选编

基础知识

1. 类风湿关节炎的病理改变为（滑膜炎）
2. 最常见的上消化道出血原因为（消化性溃疡）
3. 系统性红斑狼疮是（免疫系统疾病）
4. 膈下新月形阴影可能是（胃穿孔）
5. 易发生绞窄性肠梗阻的是（嵌顿性肠梗阻）
6. 肋骨骨折常见的部位为（第4~7肋）
7. 会阴损伤最常见的部位为（大阴唇）
8. 骑跨伤易引起损伤的部位为（尿道球部）
9. 骨盆骨折易引起损伤的部位为（尿道膜部）
10. 小儿收缩压 125mmHg, 超出正常值的数值为（25mmHg）
11. 青春月经不规则的主要病因为（无排卵性功能失调性子宫出血）
12. 某产妇, 未临产, 脐带脱出 2cm, 造成胎儿胎心不正常的主要原因为（脐带脱垂）
13. 小儿, 4 个月, 应添加的辅食为（蛋黄）
14. 根据豆腐渣样白带这一症状, 最有可能的诊断是（真菌感染）
15. 在我国, 肝硬化最常见的病因为（肝炎病毒感染）
16. 引起慢性胃炎的主要因素为（幽门螺杆菌感染）
17. 高血压引起心脏负荷加重的原因主要是（后负荷过重）
18. 频发室性期前收缩指（每分钟超过 5 次）
19. 治疗肺癌最主要的手段是（手术切除）
20. 胎儿成人形发生于（第 8 周）
21. 引起前囟闭合延迟最常见的原因是（缺钙）

相关专业知识

1. 诊断关节腔积液, 最灵敏的方法是（X 线检查）
2. 治疗开放性骨折最重要的措施是（早期彻底清创, 使用抗生素）
3. 乳腺癌淋巴转移的最常见部位是（腋窝）
4. 急性特发性血小板减少性紫癜的血小板计数为（一般 $< 20 \times 10^9 / L$ ）
5. 肿瘤化疗期间严重呕吐时所采取的最合理的营养方式是（肠外营养）
6. 关于对 ARDS 患者的治疗表述中, 不正确的是（加大补液量）
7. 产程划分中, 宫颈扩张指（从规律宫缩开始至宫口开全）
8. 诊断感染性心内膜炎的金标准是（血培养）
9. 属于血液系统监护检查的是（血常规）
10. 血清白蛋白显著降低时应考虑的因素是（肝硬化）
11. 颅内压增高明显时, 应避免（腰椎穿刺）
12. 洋地黄中毒的主要表现是（胃肠道反应）
13. 确定人体是否感染过结核的有效方法是（PPD 试验）
14. 重症肺炎患儿静脉用药时间应持续至（体温正常后 5~7 天）