

2016 新大纲版

**国家临床
执业助理医师资格考试
全真模拟题集**

文都医学考试研究中心◎策划

顾艳南◎编著

中国医药科技出版社

2016 新大纲版

**国家临床
执业医师资格考试
全真模拟题集**

文都医学考试研究中心◎策划
顾艳南◎编著

中国医药科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家临床执业助理医师资格考试全真模拟题集/顾艳南编著. —北京:中国医药科技出版社,2016.6

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8531 - 0

I. ①国… II. ①顾… III. ①临床医学 - 医师 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 133811 号

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010 - 62227427 邮购:010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm $1/16$

印张 $6\frac{3}{4}$

字数 195 千字

版次 2016 年 6 月第 1 版

印次 2016 年 6 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8531 - 0

定价 22.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话:010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

资格考试时代的“考证”正在深刻地改变着我们的生活:一些人没有学历而走上了以考证来追求幸福生活的道路;另一些人即使大学毕业了,也辛辛苦苦地参加证书考试;甚至有一些人在读完博士后还苦于考证带来的压力。不管什么形式的学习,只要能通过考试就好。随着社会发展的深入,加强职业准入是社会发展的必然,每一种证书都是一块职业市场的敲门砖。成功人看趋势,失败人看潮流。在资格证考试和学历考试具有同样法律地位且越来越被社会认可的趋势下,你“认证”了吗?

医师资格考试正成为医学界一项非常热门的资格考试,而且每家医院都要求执业人员持证上岗。中国知名教育品牌“文都教育”在考研西医综合图书市场火爆销售近八年并得到广大学子的认可后,紧跟步伐,适时推出医师资格考试辅导用书:《国家临床执业医师资格考试全真模拟题集》、《国家临床执业助理医师资格考试全真模拟题集》,为您考试的成功增添了一项可靠的选择,胜算的砝码。

《国家临床执业医师资格考试全真模拟题集》、《国家临床执业助理医师资格考试全真模拟题集》各含4套模拟试题,每套试题的编写都严格以国家临床执业医师资格考试大纲和国家临床助理医师资格考试大纲为依据。在编写过程中,作者花费大量时间与精力深入分析了考纲精神及要求,并细心对比了历年考纲与历年考题之间的联系,使本书所编撰的4套模拟试题从不同层面与角度体现考纲的目标,暗含考纲的考查方向。本书无疑将成为您参加考试最贴近真题的训练场。

由于时间仓促,错误在所难免,考生们在使用本系列参考书的过程中如发现不足和错误之处,请随时指正,我们将不胜感激!

如有问题,可以随时与顾艳南老师联系,顾老师博客:<http://gu-yannan.blog.sohu.com>。

祝每一位考生顺利通过考试,拿到医师资格证书!

编 者

2016年5月

目 录

国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(一)	1
第一单元	1
第二单元	13
参考答案	26
国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(二)	27
第一单元	27
第二单元	39
参考答案	51
国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(三)	52
第一单元	52
第二单元	64
参考答案	76
国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(四)	77
第一单元	77
第二单元	88
参考答案	100

国家临床执业助理医师资格考试 全真模拟试题(一)

第一单元

A1 型题(1~95 题)

以下每一考题都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

- 1.《医疗事故处理条例》规定,造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的,属于
A. 四级医疗事故
B. 三级医疗事故
C. 二级医疗事故
D. 一级甲等医疗事故
E. 一级甲等医疗事故
2. 处方一般不得超过几日用量
A. 3 日
B. 5 日
C. 7 天
D. 10 天
E. 1 月
3. 根据《药品管理法》的规定,以下不属于药品的是
A. 中药饮片
B. 中成药
C. 疫苗
D. 血清
E. 保健品
4. 属于《母婴保健法》规定可以申请医学技术鉴定的是
A. 对孕妇、产妇保健服务有异议的
B. 对婚前医学检查结果有异议的
C. 对婚前卫生咨询有异议的
D. 对孕产期保健服务有异议的
E. 对医学指导意见有异议的
5. 治疗要获得患者的知情同意,其实质是
A. 尊重患者人格尊严
B. 尊重患者社会地位
C. 尊重患者自主性
D. 患者不会做出错误决定
E. 患者提出的要求总是合理的
6. 目前我国最常用的智力量表是
A. 斯坦福-比奈智力量表
B. 洛奇-桑代克智力量表
C. 韦克斯勒智力量表
D. 瑟斯顿智力量表
E. 勒特国际操作量表
7. 医患双方当事人对患者死因有异议的,应当尸检。当地不具备尸体冻存条件的,尸检的期限是
A. 在患者死亡后 12 小时内进行
B. 在患者死亡后 24 小时内进行
C. 在患者死亡后 36 小时内进行
D. 在患者死亡后 48 小时内进行
E. 在患者死亡后 60 小时内进行
8. 医务人员对诊疗活动中需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的患者,应当
A. 及时向患者说明医疗风险,取得其口头或书面同意
B. 及时向患者说明医疗风险,取得其书面同意
C. 及时向患者说明医疗风险,取得其家属口头或书面同意
D. 及时向患者说明医疗风险,取得其家属书面同意
E. 向患者做必要的解释

9. 急性阑尾炎的主要症状是
A. 恶心呕吐 B. 低热 C. 转移性右下腹痛 D. 便秘 E. 食欲减退
10. 小脑幕切迹疝最有意义的临床定侧体征是
A. 患侧肢体活动减少或消失 B. 对侧腹壁反射消失
C. 患侧瞳孔散大 D. 对侧肢体腱反射亢进
E. 患侧下肢病理反射
11. 下列哪一项不是急性出血坏死型胰腺炎的特征性表现
A. 急性肾损伤 B. 乳糜样腹水及胸水
C. 弥散性血管内凝血 D. 成人呼吸窘迫综合征
E. 血清正铁血清蛋白阳性
12. ALT 增高的病人,在鉴别诊断时,下列哪种情况可以不必考虑
A. 病毒性肝炎 B. 化脓性胆管炎 C. 急性胆囊炎 D. 肝血管瘤 E. 心肌梗死
13. 周围性舌下神经麻痹的症状不包括
A. 电检查有变性的反应 B. 一侧麻痹,伸舌时舌尖偏向麻痹侧
C. 两侧麻痹,伸舌时受限或不能 D. 舌肌萎缩及伴有肌束震颤
E. 一侧麻痹伸舌时舌尖偏向麻痹对侧
14. 治疗暴发型溃疡性结肠炎的首要方法为
A. 手术治疗 B. 免疫抑制剂
C. 大剂量抗胆碱能药物 D. 柳氮磺吡啶
E. 大剂量肾上腺皮质激素
15. 关于特异性感染,下列哪项不正确
A. 混合感染 B. 结核 C. 破伤风 D. 气性坏疽 E. 炭疽
16. 住院期间影响病人的心理变量不包括
A. 对医疗环境的适应和角色变换
B. 诊断快慢和信息是否明确,病名的社会赞许度
C. 治疗效果和药物副反应,医疗开支
D. 医患沟通和病友互相影响
E. 以上都是
17. 关于前置胎盘腹部检查所见正确的是
A. 子宫小于妊娠月份 B. 胎位不易摸清
C. 宫体硬如板状 D. 不易发生胎位异常
E. 枕先露者胎头高浮
18. 关于脾破裂的治疗,下列哪项是错误的
A. 可自体输血 B. 病理脾破裂一定将脾切除
C. 儿童脾破裂均行脾切除 D. 自发破裂的脾一定手术切除
E. 轻度的脾破裂可缝合修补
19. 下列哪一项不是巨大儿阴道分娩易发生的并发症
A. 产程延长 B. 肩难产 C. 羊水栓塞 D. 产后出血 E. 相对头盆不称
20. 各种流产的临床特点,哪项是正确的
A. 先兆流产:宫口闭,出血量少 B. 完全流产:腹痛,宫口松
C. 难免流产:出血少,未破水 D. 不全流产:宫口闭,出血减少
E. 过期流产:胚胎死亡达 1 个月以上尚未排出者
21. 子宫内膜异位症最多见于
A. 直肠子宫陷凹 B. 宫颈 C. 腹膜 D. 输卵管 E. 卵巢

22. 法洛四联症患者青紫的程度主要取决于
- A. 肺动脉狭窄的程度 B. 室间隔缺损的大小
C. 室间隔缺损的部位 D. 主动脉骑跨的程度
E. 右心室肥厚的程度
23. 肛管直肠疾病下述哪一种可发生恶性变
- A. 肛裂 B. 嵌顿性内痔 C. 肛窦炎 D. 直肠息肉 E. 高位肛瘘
24. 肺炎链球菌的主要致病因素是
- A. C 反应蛋白 B. 自溶酶 C. 荚膜 D. 外毒素 E. 内毒素
25. 外周血中 T 细胞绝对数达成人水平的年龄期是
- A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 学龄前期 E. 学龄期
26. 最能反映关节脱位的特有体征是
- A. 关节空虚、弹性固定、畸形 B. 肿胀、畸形、压痛
C. 畸形、活动受限、压痛 D. 骨擦音、活动受限、压痛
E. 肿胀、反常活动、骨擦感
27. 霍乱弧菌的致病因素不包括
- A. 鞭毛 B. 菌毛 C. 荚膜 D. 肠毒素 E. 内毒素
28. 平静呼吸时,关于胸膜腔内压的叙述,正确的是
- A. 只有吸气时低于大气压 B. 呼气时高于大气压
C. 吸气时和呼气时均等于大气压 D. 呼气初胸内压绝对值高于吸气末
E. 吸气与呼气过程中均低于大气压
29. 机体处于应激如创伤、手术、感染等情况下,能量代谢的变化中,错误的是
- A. 机体出现高代谢和分解代谢 B. 脂肪动员加速
C. 蛋白质分解加速 D. 处理葡萄糖能力增强
E. 机体处于负氮平衡
30. 目前,对肠易激综合征的诊断推荐采用国际认同的罗马 II 标准,其中有关腹部不适或腹痛时间的规定是在过去 12 个月内至少累计达
- A. 6 周 B. 8 周 C. 10 周 D. 12 周 E. 16 周
31. 预测 Graves 病停用抗甲状腺药物是否易复发的指标是下列哪一项
- A. 甲状腺摄 ^{131}I 率 B. 肿瘤标记物
C. TSH、 nT_3 、 T_4 及 BT_3 D. FT_3
E. 甲状腺刺激免疫球蛋白
32. 影响分娩的四大因素,下列哪一项是错误的
- A. 产力 B. 产道
C. 胎儿 D. 孕妇的精神心理状态
E. 妊娠孕周
33. 早期胃癌的定义是
- A. 癌浸润不超过肌层,无局部淋巴结转移 B. 癌肿 $<2\text{cm}$,无淋巴结转移
C. 癌肿 $<1\text{cm}$,无淋巴结转移 D. 癌浸润不超过黏膜下层,不论有无局部淋巴结转移
E. 癌浸润黏膜层、黏膜下层及肌层
34. 为探讨儿童白血病的病因,选择 200 例确诊白血病的儿童,同时选择 200 例同期同医院无白血病的儿童,然后调查其母亲孕期 X 线照射情况,此研究方法为
- A. 现况研究 B. 病例对照研究 C. 队列研究
D. 回顾性前瞻研究 E. 临床实验研究
35. 胃溃疡的好发部位是
- A. 胃底部 B. 胃大弯 C. 贲门部 D. 胃后壁 E. 胃小弯

36. 当今环境污染最受关注的是
A. 自然污染物 B. 生物性污染物 C. 化学性污染物 D. 持久性污染物 E. 物理性污染物
37. 胆固醇结石好发于
A. 胆囊内 B. 肝内胆管 C. 肝外胆管 D. 胆总管 E. 右肝管
38. 导致粘连性肠梗阻最常见的原因是
A. 腹腔内炎症 B. 腹腔内出血 C. 腹腔内异物 D. 腹腔内创伤 E. 腹腔内手术
39. 诊断早期糖尿病肾病较有意义的检查是
A. 尿常规检查 B. 尿微量清蛋白测定
C. 尿渗透压测定 D. 双肾 B 超
E. 肌酐清除率
40. 1 型和 2 型糖尿病鉴别时下列临床特征以哪种为主
A. 年轻与年老 B. 消瘦与肥胖
C. 有无自发性酮症倾向 D. 有无明显“三多一少”症状
E. 并发症的多少与严重程度
41. 科学心理学诞生的标志事件是
A. 希波克拉底提出气质类型说 B. 巴普洛夫的高级神经类型学说
C. 弗洛伊德提出潜意识学说 D. 华生建立了行为研究客观方法
E. 冯特在德国建立的心理实验室
42. 可促进醛固酮分泌增多的因素是
A. 血糖浓度增高 B. 血 Ca^{2+} 浓度降低
C. 血 K^{+} 浓度增高 D. 循环血量增多
E. 血 Na^{+} 浓度增高
43. 选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡时加作幽门成形术的目的是
A. 进一步降低胃酸 B. 防止手术后腹泻
C. 减低溃疡复发率 D. 解除胃滞留
E. 有利于提高消化吸收功能
44. 生理情况下, 肾小球滤过率为
A. 25ml/min B. 125ml/min C. 225ml/min D. 325ml/min E. 425ml/min
45. 合并下列哪种疾病时, 应禁忌使用垂体后叶加压素治疗食管静脉曲张破裂出血
A. 消化性溃疡 B. 溃疡性结肠炎 C. 肺结核 D. 冠心病 E. 支气管扩张
46. 与前置胎盘的发生无关的是
A. 妊娠高血压综合征 B. 双胎妊娠
C. 多次刮宫 D. 胎盘面积过大
E. 受精卵滋养层发育迟缓
47. 关于脊柱结核正确的描述是
A. 主要累及棘突 B. 可有拾物试验阳性
C. 可有托马斯征阳性 D. 手术治疗无需抗结核药物配合
E. 早期易形成寒性脓肿
48. 关于锁骨骨折, 下列哪项是错误的
A. 好发于中 1/3 处
B. 多由间接暴力引起
C. 骨折后近折端因受胸锁乳突肌牵引, 向上、向前移位
D. 远折端因受上肢重量的影响, 向下移位
E. 因胸大肌、斜方肌、背阔肌等牵拉, 远折端向前、向下移位

49. 小儿符合中度等渗性脱水的是
 A. 失水量占体重的 6%, 血清钠 155mmol/L
 B. 失水量占体重的 3%, 血清钠 135mmol/L
 C. 失水量占体重的 7%, 血清钠 120mmol/L
 D. 失水量占体重的 8%, 血清钠 140mmol/L
 E. 失水量占体重的 11%, 血清钠 140mmol/L
50. 鉴别肾盂肾炎和下尿路感染, 下列哪一项最有价值
 A. 全身症状轻重
 B. 尿培养的阳性率高低
 C. 膀胱刺激症状的轻重
 D. 尿常规中白细胞的数量
 E. 尿常规中是否有白细胞管型
51. 在下列文献中, 关于人体实验的国际性著名文件是
 A. 《夏威夷宣言》
 B. 《赫尔辛基宣言》
 C. 《希波克拉底宣言》
 D. 《东京宣言》
 E. 《悉尼宣言》
52. 女性生殖器结核的病理变化, 正确的是
 A. 输卵管结核多为双侧性, 由子宫内膜结核蔓延而来
 B. 卵巢结核通常是卵巢深部形成结节和干酪样坏死
 C. 子宫内膜结核可使子宫腔粘连、变形、缩小
 D. 宫颈结核在生殖道结核中最常见
 E. 盆腔腹膜结核分粘连型和渗出型, 粘连型不易形成瘘管
53. 将猪的肝脏移植给人, 日前需要解决的主要问题是
 A. 超急性排斥反应
 B. 急性排斥反应
 C. 慢性排斥反应
 D. 病人不愿接受
 E. 手术技术尚不成熟
54. 吸入性肺脓肿最常见的部位是
 A. 左上叶后段和舌叶
 B. 左下叶基底段
 C. 坐位时, 好发于下叶后基底段
 D. 右下叶基底段
 E. 右中叶
55. 成人肺结核最可靠的诊断依据是
 A. 血沉增快
 B. 低热、咳嗽、盗汗、乏力
 C. 胸片有渗出阴影
 D. 痰涂片检查结核菌阳性
 E. 结核菌素试验阳性
56. 关于结核性腹膜炎患者的腹水, 下述哪一项不正确
 A. 腹水可为草黄色、淡血性或乳糜性
 B. 腹水比重 > 1.016
 C. 腹水蛋白质含量 $> 30\text{g/L}$
 D. 腹水白细胞计数 $> 0.5 \times 10^9/\text{L}$
 E. 腹水结核杆菌培养大多阳性
57. 心理量表标准化的概念是
 A. 问题固定
 B. 评分标准固定
 C. 施测方法和指导语固定
 D. 测量指标和解释固定
 E. 以上都对
58. 维持躯体姿势的最基本的反射是
 A. 屈肌反射
 B. 肌紧张反射
 C. 对侧伸肌反射
 D. 翻正反射
 E. 腱反射
59. 对强迫症有特殊效果的药物是
 A. 氯氮平
 B. 多塞平
 C. 氯丙嗪
 D. 阿普唑仑
 E. 氯米帕明
60. 最容易发生泌尿系感染的疾病是
 A. 缺铁性贫血
 B. 高尿酸血症
 C. 高脂血症
 D. 高血压
 E. 糖尿病

61. 结核性腹膜炎的抗结核治疗,下列哪项不正确
- A. 其疗效一般比溃疡型肠结核略好
 - B. 粘连型合并渗出者,病变不易控制
 - C. 一般用3至4种药物联合强化治疗
 - D. 继发于体内其他结核病的病人,临床多选用以往未用或少用的药物
 - E. 有血行播散或严重结核毒性症状者,可短期加用肾上腺糖皮质激素
62. 下列关于炎症的叙述正确的是
- A. 炎症反应均对机体有利
 - B. 损伤必然导致炎症
 - C. 炎症是一种防御反应
 - D. 任何机体均可发生炎症
 - E. 以上都不对
63. 关于甲状腺激素的叙述,下列哪一项是错误的
- A. 碘是甲状腺激素合成的重要原料
 - B. 用药物抑制合成后,血中甲状腺激素水平在1~2天内即下降
 - C. 对婴幼儿脑的发育有促进作用
 - D. 可增加组织耗氧量,增加产热
 - E. 交感神经兴奋可使其合成分泌增加
64. 下列哪项不是腹部闭合性损伤的手术适应证
- A. 有失血性休克
 - B. 有急性腹膜炎体征
 - C. 腹腔穿刺有凝固血液
 - D. 腹部有明显移动性浊音
 - E. X线片有膈下游离气体
65. 心理障碍患者躯体症状的产生是由于心理必须通过生理的中介才能产生,持这种观点的学者是
- A. 罗杰斯
 - B. 坎农
 - C. 巴浦洛夫
 - D. 华生
 - E. 弗洛伊德
66. 《医疗机构管理条例》规定,医疗机构不得使用非卫生技术人员从事的工作为
- A. 医疗后勤服务
 - B. 医疗卫生技术
 - C. 医院安全保卫
 - D. 医院财务审计
 - E. 医疗器械采购
67. 与子宫内膜癌的癌前病变关系最密切的是
- A. 子宫内膜囊腺型增生过长
 - B. 子宫内膜腺瘤型增生过长
 - C. 分泌期子宫内膜
 - D. 萎缩型子宫内膜
 - E. 增生期子宫内膜
68. 酶促反应中决定酶专一性的部分是
- A. 底物
 - B. 辅基或辅酶
 - C. 金属离子
 - D. 酶蛋白
 - E. 催化基团
69. 下列关于抑制性突触后电位的叙述,正确的是
- A. 是局部去极化电位
 - B. 具有“全或无”性质
 - C. 后膜对 Cl^- 通透性上升
 - D. 由突触前膜递质释放量减少所致
 - E. 由突触后膜对钠通透性增加所致
70. 双侧肺门增大,同时合并结节性红斑,最可能的是
- A. 气管、支气管淋巴结核
 - B. 嗜酸性粒细胞增多症
 - C. 恶性淋巴瘤
 - D. 结节病
 - E. 矽肺
71. 下列哪一项不是胆囊切除的适应证
- A. 胆囊积液
 - B. 胆囊积脓
 - C. 急性胆囊炎
 - D. 胆道蛔虫病
 - E. 胆囊结石
72. 肠结核的预防重点是
- A. 有关结核病的卫生宣传
 - B. 加强卫生监督
 - C. 提倡用公筷进餐、牛奶须灭菌消毒
 - D. 肠外结核特别是肺结核的早期诊治
 - E. 保持排便通畅

73. 婴儿期白细胞总数维持在
A. $>20 \times 10^9/L$ B. $15 \times 10^9/L$ C. $10 \times 10^9/L$ D. $5 \times 10^9/L$ E. $<5 \times 10^9/L$
74. 下列关于糖皮质激素抗炎作用的正确叙述是
A. 对抗各种原因如物理、生物等引起的炎症
B. 能提高机体的防御功能
C. 促进创口愈合
D. 抑制病原体生长
E. 直接杀灭病原体
75. 根据临床表现难以区分肠结核与克罗恩病时,最可靠的鉴别方法是
A. 多次粪便结核杆菌培养 B. X线全程钡餐检查
C. 全结肠镜检查 D. 诊断性抗结核治疗
E. 剖腹探查
76. 医学心理学不包括
A. 心理学技术在医学的应用 B. 心理治疗
C. 教育心理学 D. 生理-心理-社会的健康概念
E. 医患沟通
77. 肠结核的好发部位是
A. 空肠 B. 回肠 C. 回盲部 D. 横结肠 E. 十二指肠
78. 十二指肠溃疡伴有幽门不全梗阻者应选择的治疗方法是
A. 胃管减压,输液疗法 B. 胃大部切除术
C. 高选择性迷走神经切断术 D. 选择性迷走神经切断术加幽门成形术
E. 胃空肠吻合术
79. 引发医疗纠纷的原因有
A. 各种角色障碍 B. 患者及家属期望与现实的落差,或医生过多承诺
C. 医疗质量问题或医疗事故 D. 医生无中生有地夸大病情
E. 以上都是
80. 下列选项中,不属于抗 ENA 抗体的是
A. 抗 Sm 抗体 B. 抗 RNP 抗体 C. 抗 SSA 抗体 D. 抗 rRNP 抗体 E. 抗 dsDNA 抗体
81. 原发性免疫缺陷病致死的主要原因是
A. 血小板减少 B. 大出血 C. 恶性肿瘤 D. 反复感染 E. 自身免疫性疾病
82. 下列何项不是内分泌功能试验的兴奋试验
A. ACTH 试验 B. TRH 试验 C. 地塞米松试验
D. 胰岛素低血糖试验 E. 精氨酸试验
83. 左三叉神经病损表现为
A. 左面部痛温觉障碍,张口下颌偏向左侧 B. 左面部痛温觉障碍,张口下颌偏向右侧
C. 左面部痛温觉障碍,左闭目不能 D. 左面部痛温觉障碍,右闭目不能
E. 右面部痛温觉障碍,张口下颌偏向左侧
84. 下列哪项最不可能引起溃疡性结肠炎
A. 结肠感染 B. 变态反应 C. 细胞免疫异常 D. 遗传 E. 过敏反应
85. 血浆渗透压主要来自于
A. 无机盐 B. 葡萄糖 C. 白蛋白 D. 纤维蛋白原 E. 血浆蛋白
86. 抗甲状腺药物治疗一般疗程应为
A. 症状缓解后即可停药 B. 症状缓解后三个月
C. 症状缓解后半年 D. 疗程 $>$ 一年
E. 疗程 $>$ 一年半

87. 下列足月新生儿特点,哪项不正确
- 生后第1小时内呼吸频率可达60~80次/分
 - 血压平均为9.3/6.7kPa
 - 生后24小时后排出胎便
 - 具备拥抱反射
 - 巴氏征阳性
88. 胆总管的血液供应主要来自
- 肝固有动脉
 - 胆囊动脉
 - 胃十二指肠动脉
 - 肝右动脉
 - 肝左动脉
89. 形成血浆胶体渗透压的主要物质是
- NaCl
 - 白蛋白
 - 球蛋白
 - 纤维蛋白
 - 血红蛋白
90. 对于涂改伪造病历材料的医务人员应做出的处理是
- 责令改正
 - 行政处分
 - 依法追究刑事责任
 - 治安管理处罚
 - 给予警告
91. 急性阑尾炎需要优先采用手术治疗者是哪一类型的阑尾炎
- 急性单纯性阑尾炎
 - 轻型化脓性阑尾炎
 - 阑尾周围脓肿
 - 阑尾穿孔并发弥漫性腹膜炎
 - 阑尾穿孔伴有限局性腹膜炎
92. 原发性肝癌早期转移途径为
- 肺内转移
 - 淋巴转移
 - 直接浸润转移
 - 肝内血行转移
 - 骨转移
93. 下列激素中哪一种不是促激素
- ACTH
 - TSH
 - FSH
 - LH
 - PRL
94. Horner 征表现不正确的是
- 瞳孔对光反应消失
 - 眼球内陷
 - 眼裂狭小
 - 眼睑膜充血及面部无汗
 - 瞳孔缩小
95. 为明确诊断应首先选择的检查是
- 上消化道钡剂造影
 - 腹部超声
 - 立位腹部X线平片
 - 卧位腹部X线平片
 - 胃镜
- A2 型题 (96 ~ 115 题)**
- 每一道考题下面都有A、B、C、D、E 5个备选答案,答题时,只需从中选择一个最合适的作为正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。
96. 妊娠8周行吸宫术后半月,阴道持续流血,量时多时少。妇科检查:宫口松,子宫如40天妊娠大小,较软,尿妊娠试验阳性,应考虑的诊断是
- 绒毛膜癌
 - 侵蚀性葡萄胎
 - 子宫内膜炎
 - 吸宫不全
 - 子宫复旧不良
97. 患者男性,40岁,发现HBsAg(+)10年,ALT时有升高。近1个月来食欲减退,恶心,明显乏力,齿龈出血,尿黄,近2周尿量减少。查体:神清,扑翼样震颤(+),化验:ALT177U/L, TBil433 μ mol/L, PT36秒(对照13秒),该患者应诊断为
- 病毒性肝炎乙型亚急性重型
 - 病毒性肝炎乙型慢性轻度
 - 乙肝后肝硬化
 - 病毒性肝炎乙型慢性重型
 - 病毒性肝炎乙型慢性中度
98. 患者,女,25岁,腰痛,阵发性下腹部疼痛,尿频、尿急、尿痛,伴畏冷、发热1天就诊,查尿蛋白(+),白细胞10个/HP,红细胞12个/HP。最可能的诊断是
- 急性膀胱炎
 - 尿道综合征
 - 泌尿系结石
 - 急性肾盂肾炎
 - 急性肾炎

99. 女性,31岁,寒战、高热、腰痛、尿频、尿痛4天,体温39.5℃,两侧肋腰点压痛,普通尿培养阴性,用口服诺氟沙星(氟哌酸)治疗效果不佳,应首选以下哪项检查
- A. 腹部平片 B. 静脉路肾盂造影
C. 尿抗体包裹细菌检查 D. 尿高渗性培养
E. 腹部B超
100. 女性,31岁,妊娠4个月。发现尿糖(+),口服葡萄糖耐量试验结果:空腹血糖6.6mmol/L,2小时血糖10.6mmol/L。既往无糖尿病病史。最可能的诊断是
- A. 肾性糖尿 B. 糖尿病合并妊娠 C. 妊娠期糖尿病 D. 继发性糖尿病 E. 2型糖尿病
101. 男性,45岁,突然呕血400ml伴黑便。血压100/70mmHg,心肺(-),可见腹壁静脉曲张,肝未触及,脾于肋下2cm,可触及。应首选的治疗是
- A. 静脉注射止血药 B. 静脉推注奥美拉唑(洛赛克)
C. 静脉滴注垂体后叶素 D. 静脉滴注代血浆
E. 冰盐水洗胃
102. 男性,28岁,下腹部挤压伤后5小时,下腹胀痛、排尿困难、尿道滴血。检查:下腹部膨隆、压痛明显、叩诊浊音,X线片显示:骨盆坐骨骨折。最可能的损伤是
- A. 肠破裂 B. 膀胱破裂 C. 直肠损伤 D. 后尿道损伤 E. 输尿管损伤
103. 女,18岁,怕热,多汗,甲状腺Ⅱ°肿大。无其他不适,血FT₃、FT₄测定值均高,治疗宜选择
- A. 抗甲状腺药物长程治疗 B. ¹³¹I治疗
C. 甲状腺次全切除 D. 药物控制症状后行甲状腺次全切除
E. 药物控制症状后行¹³¹I治疗
104. 女,45岁,既往有胆石症及冠心病病史。昨日饮酒及进油腻饮食后出现剧烈腹痛并向腰背放射,伴发热和恶心、呕吐。查体:BP70/40mmHg,P120次/分,巩膜轻度黄染,皮肤湿冷。腹壁稍紧张,上腹有明显压痛,移动性浊音阳性,血清淀粉酶64单位(苏氏法),血钙1.5mmol/L,血清正铁血清蛋白阳性。诊断应首先考虑
- A. 消化性溃疡合并急性穿孔 B. 急性阑尾炎穿孔
C. 急性出血坏死型胰腺炎 D. 慢性胆囊炎急性发作
E. 急性心肌梗死
105. 男,42岁,持续性上腹痛12小时,腹胀、呕吐,既往有消化性溃疡病史,查体:上腹压痛轻微,血淀粉酶750U(Somogyi),最可能的诊断是
- A. 消化性溃疡急性穿孔 B. 急性胰腺炎
C. 急性肠梗阻 D. 急性心肌梗死
E. 急性胃肠炎
106. 女,35岁,毒性弥漫性甲状腺肿患者,结束抗甲状腺药物疗程已4年,判断是否会复发的最佳指标为
- A. 血清总T₃、T₄测定 B. 血清游离甲状腺激素(FT₄)测定
C. 血rT(反T)测定 D. 甲状腺吸¹³¹I率测定
E. TSAb测定
107. 女,32岁,甲亢6年,疏于治疗,长期不愈,临床疑诊甲亢心脏病,心功能二级。甲状腺Ⅰ°肿大,甲状腺吸碘率3小时68%。24小时91%,应首先考虑下列哪项治疗
- A. 他巴唑治疗 B. 丙硫氧嘧啶治疗
C. 手术治疗 D. 他巴唑+普萘洛尔治疗
E. ¹³¹I治疗
108. 27岁妊娠38周初产妇,规律宫缩16小时,已破膜,宫缩弱,宫口开大4cm,S=-2,胎心170次/分,宫缩时觉肛门坠胀。本例正确处理应是
- A. 肌注哌替啶 B. 静脉滴注缩宫素
C. 嘱产妇朝向胎背的对侧方向侧卧 D. 观察半小时再决定分娩方式

- E. 立即行剖宫产术
109. 患者,女,25岁,因低热、乏力、轻咳少痰,右上肺斑片状阴影和痰结核分枝杆菌阳性而确诊为肺结核,经异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇治疗2个月,上述症状消失,痰菌阴转,各项化验指标正常。但出现极少量右胸腔积液,应考虑
- A. 肺结核病恶化进展 B. 出现类赫反应
C. 伴发新感染 D. 患结核性胸膜炎
E. 低蛋白血症
110. 一急性肺脓肿患者,经内科积极治疗4个月,症状有改善,但仍有3cm大小脓腔未闭合,进一步治疗应考虑
- A. 气管内给药 B. 继续用抗生素 C. 体位引流 D. 纤支镜吸引 E. 外科手术
111. 女性,31岁,有风湿性心脏病史4年,近10天来发热,疑诊为亚急性感染性心内膜炎,以下哪项处理最恰当
- A. 做血培养后立即肌注青霉素 B. 先用3天抗生素,再血培养
C. 做血培养后立即考虑瓣膜置换术 D. 做血培养,待结果回报后选择用药
E. 做血培养后立即静脉滴注大剂量青霉素
112. 女,54岁,发作性右上腹痛伴间断巩膜皮肤黄染半年。B超提示胆囊内多发米粒大小结石。手术方式最恰当的是
- A. 胆囊造瘘 B. 腹腔镜胆囊切除
C. 胆囊切除,胆总管探查 D. 胆囊切除
E. 胆肠吻合
113. 女,45岁,因关节疼痛长期服用吲哚美辛,黑粪2次,呕血1次来院急诊,疑诊急性胃炎,除嘱停用该药物外,应首先采取什么措施
- A. 阿托品缓解腹痛 B. 止酸剂降低胃pH
C. 硫酸铝保护胃黏膜 D. 止血补充血容量
E. 急诊胃镜检查
114. 来院就诊的26岁重度先兆子痫孕妇,对估计病情及决定处理方案最有价值的辅助检查方法是
- A. 全血黏度比值及血浆黏度比值 B. 眼底检查
C. 测定血细胞比容 D. 测定血丙氨酸转氨酶值
E. 测定尿雌激素/肌酐比值
115. 女性30岁,双下肢无力2个月,查体双上肢肌力正常,双下肢肌力3级,肌张力高,跟腱反射亢进,病理反射(+),其病变部位可能是
- A. 胸髓 B. 腰膨大 C. 颈膨大 D. 高颈髓 E. 脊髓前角细胞

A3/A4 型题(116~137题)

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E 5个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

(116~117题共用题干)

一青年女性,被人发现昏迷且休克,屋内有火炉,且发现有敌敌畏空瓶。查体:T36℃,BP 90/60mmHg,四肢厥冷,腱反射消失,心电图一度房室传导阻滞,尿糖(+),尿蛋白(+),血液的COHb为60%。

116. 最可能的诊断是
- A. 急性巴比妥类中毒 B. 急性有机磷农药中毒
C. 急性CO中毒 D. 糖尿病酮症酸中毒
E. 急性亚硝酸盐中毒
117. 首要的治疗方法是
- A. 20%甘露醇250ml快速静点 B. 冬眠疗法
C. 血液透析 D. 能量合剂

E. 氧气疗法

(118~122 题共用题干)

女性,35岁,近半年向心性肥胖,乏力。皮肤可见色素沉着,紫纹(+),血压170/100mmHg。血皮质醇增高,pH7.4,血钾3.7mmol/L,B超提示双侧肾上腺增大。

118. 最可能的诊断是

- A. 不依赖 ACTH 的双侧肾上腺小结节性增生
- B. 不依赖 ACTH 的双侧肾上腺大结节性增生
- C. 肾上腺皮质腺瘤
- D. 异位 ACTH 综合征
- E. 依赖 ACTH 的 Cushing 病

119. 如需鉴别库欣综合征与单纯性肥胖,下列各项中最有意义的检验或试验是

- A. 血皮质醇测定
- B. 24 小时尿 17-羟、17-酮
- C. 24 小时尿游离皮质醇
- D. 小剂量地塞米松抑制试验
- E. 大剂量地塞米松抑制试验

120. 为确定库欣综合征的病变部位,下列各项中最有意义的检验或试验是

- A. 血皮质醇测定
- B. 24 小时尿 17-羟、17-酮
- C. 24 小时尿游离皮质醇
- D. 小剂量地塞米松抑制试验
- E. 大剂量地塞米松抑制试验

121. 为确定库欣综合征的病变部位,下列各项中最有意义的检查是

- A. 垂体 CT 扫描
- B. 颅脑 CT 扫描
- C. 腹膜后充气造影
- D. 肾上腺血管造影
- E. 肾上腺 CT 扫描

122. 如该患者最后确诊是垂体瘤所致,其库欣综合征的治疗方法是

- A. 经蝶鞍手术切除
- B. 一侧肾上腺全切,另一侧大部分切除
- C. 放射治疗
- D. 溴隐亭
- E. 双氯苯二氯乙烷

(123~124 题共用题干)

一中年女性,既往风湿性关节炎病史10年,劳累后心悸、气促4年,近来加重,夜间不能平卧,查体:心尖部舒张期隆隆样杂音,两肺底可听到细小水泡音,腹胀,双下肢水肿。

123. 可能诊断为

- A. 支气管哮喘
- B. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- C. 肺部感染
- D. 急性心包炎
- E. 风湿性心脏病三尖瓣狭窄

124. 患者心功能不全的类型为

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 右心衰竭伴肺部感染
- E. 左心衰竭伴肾功能不全

(125~128 题共用题干)

男4岁,因怀疑先天性心脏病就诊。

125. 首先应做的检查是

- A. 血常规
- B. 脑电图
- C. 血钙、磷测定
- D. 胸部 X 线摄片
- E. 腹部 B 超

126. 该患儿口唇黏膜青紫,轻度杵状指,胸骨左缘2~4肋间听到2~3/6级收缩期杂音,肺动脉第二音减弱;为确诊应做的检查是

- A. 脑电图
- B. 头部 CT
- C. 心肌酶谱
- D. 右心导管造影
- E. 腹部 B 超

127. 2个月后患儿出现发热伴咽痛,2周后出现头痛。右侧巴氏征(+),WBC $18 \times 10^9/L$,中性0.86,淋巴0.14,考虑合并

- A. 肺炎
- B. 脑出血
- C. 脑脓肿
- D. 心肌炎
- E. 结核性脑膜炎

128. 合并症治愈后,进一步治疗的方法为

- A. 预防外伤
- B. 长期抗生素预防感染
- C. 应用激素
- D. 口服维生素
- E. 施行心脏手术

(129~130 题共用题干)

初产妇,孕39周,临产15小时,腹围99cm,宫高36cm,胎位LOA,胎心138次/分,宫口开大8cm,先露S+2,胎膜已破,羊水清,宫缩40秒/2分,观察2小时,宫口扩大及先露下降无进展,阴道检查:矢状缝在左斜径上,大囟门在1点处,坐骨棘间径9.5cm,坐骨切迹宽度3横指,骶尾关节活动。

129. 目前的诊断下列哪一项是正确的

- A. 不协调性宫缩乏力
- B. 持续性枕后位
- C. 中骨盆狭窄
- D. 漏斗骨盆
- E. 持续性枕横位

130. 正确的处理措施是

- A. 静滴缩宫素
- B. 手转胎位至枕前位,严密观察产程
- C. 立即剖宫产
- D. 肌注镇静剂
- E. 立即产钳助产

(131~133 题共用题干)

50岁女性,孕5产5,绝经3年,阴道不规则流血1个月。妇科检查:外阴阴道正常,宫颈肥大、糜烂、触之易出血,子宫后屈、稍小,双侧附件未见异常。

131. 该病人绝经后最可能的出血原因是

- A. 子宫颈炎
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫颈尖锐湿疣
- E. 子宫内膜炎

132. 进一步确诊时需做

- A. B型超声检查
- B. 宫颈涂片细胞学检查
- C. 宫颈活组织检查
- D. 子宫颈碘试验
- E. 阴道镜检查

133. 若以上检查未发现可疑病灶,下一步最恰当的处理是

- A. 分段诊刮
- B. 子宫镜+子宫内膜活检
- C. 宫颈激光
- D. 宫颈锥切术
- E. 3~6个月后复查

(134~137 题共用题干)

10岁男孩,跌倒时右肘关节半屈位、手掌着地,右肘部肿痛、畸形、伴活动障碍3小时就诊,查体:右肘部肿胀及压痛、半屈位畸形,右前臂及手部血运良好,X线片示右肱骨髁上伸直型骨折,移位明显。

134. 最恰当的处理方法是

- A. 三角巾悬吊
- B. 切开复位内固定
- C. 手法复位外固定
- D. 持续皮牵引
- E. 持续骨牵引

135. 采用上述方法处理后,患肘关节以下严重肿胀、青紫,右手发凉、麻木,被动活动手指感剧痛,右桡动脉搏动消失,最可能是发生了下列哪项并发症

- A. 缺血性骨坏死
- B. 肱静脉损伤
- C. 挤压综合征
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 肱动脉损伤

136. 肱骨髁上骨折容易并发正中神经损伤,正中神经损伤后,表现为正中神经支配区域的感觉及运动障碍,下列哪项与正中神经损伤无关

- A. 右手猿手畸形
- B. 右拇指不能对掌
- C. 右手第2~5指掌指关节不能伸直
- D. 右前臂旋前障碍