

高级卫生专业技术资格考试用书

内科护理学习题集

(副主任护师/主任护师)

丁淑贞 陈正女 ◎ 主编

系统梳理学科理论

条分缕析知识要点

活化临床思维模式

全面提升专业技能



中国协和医科大学出版社

高级卫生专业技术资格考试用书

内科护理学习题集

(副主任护师/主任护师)

主 编 丁淑贞 陈正女

副主编 宫 颖 张 丽 金 嵩 潘 洁

编 者 (按姓氏笔画排序):

丁淑贞	王 霞	王月虹	王月珠	王丽丽
王丽莹	王建荣	冯 红	孙晗潇	李世博
李艳艳	李桂侠	李雪岩	李淑元	吴雅楠
张 丽	张 彤	陈正女	金 嵩	郑 英
宫 颖	徐曼珊	高筱琪	桑 甜	梁 艳
潘 洁				



中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

内科护理学习题集 / 丁淑贞, 陈正女主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. 1

高级卫生专业技术资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0800 - 0

I. ①内… II. ①丁… ②陈… III. ①内科学 - 护理学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R473.5 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 239317 号

高级卫生专业技术资格考试用书

内科护理学习题集

主 编: 丁淑贞 陈正女

责任编辑: 吴桂梅

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260431)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 开

印 张: 20.75

字 数: 330 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 4 月第 2 次印刷

定 价: 55.00 元

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0800 - 0

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

为进一步深化卫生专业技术职称改革工作，不断完善卫生专业技术职务聘任制，根据中共中央组织部、人事部、卫生部《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》（人发〔2000〕31号）文件精神和国家有关职称改革的规定，人事部下发《加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发〔2000〕114号），高级专业技术资格采取考试和评审结合的办法取得。为了更好地帮助广大考生复习备考，编者根据多年的临床实践，结合考试的实际情况，编写了这本《内科护理学习题集》。

本书包含高级卫生专业技术资格考试的所有相关内容及考试题型。全书共十七章，包括A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题、案例分析题，每章习题的参考答案附在最后。

本书实用性强，可用于考前复习和自测，以便考生顺利通过考试。

因水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2017年10月

第一章	呼吸系统疾病患者的护理	1
第二章	循环系统疾病患者的护理	50
第三章	消化系统疾病患者的护理	87
第四章	泌尿系统疾病患者的护理	125
第五章	血液系统疾病患者的护理	152
第六章	内分泌与代谢性疾病患者的护理	190
第七章	风湿性疾病患者的护理	226
第八章	传染性疾病患者的护理	245
第九章	神经系统疾病患者的护理	287
第十章	理化因素所致疾病患者的护理	313

第一章 呼吸系统疾病患者的护理

一、A1型题

1. 下列胸痛的护理措施中错误的是 ()。
 - A. 使用吗啡镇痛
 - B. 给予小剂量镇静剂
 - C. 用宽胶布于呼气末紧贴在患侧胸部
 - D. 患者取患侧卧位
 - E. 根据不同病因采取相应护理措施
2. 正常情况下, 肺泡通气量与肺毛细血管血流量的比例是 ()。
 - A. 0.5
 - B. 0.6
 - C. 0.7
 - D. 0.8
 - E. 1.0
3. 呼吸道和消化道的共同通道是 ()。
 - A. 咽
 - B. 鼻
 - C. 喉
 - D. 气管
 - E. 肺泡
4. 肺内气体交换的主要场所是 ()。
 - A. 肺泡
 - B. 胸膜
 - C. 细支气管
 - D. 右主支气管
 - E. 左主支气管
5. 呼吸系统疾病最常见的原因是 ()。
 - A. 感染
 - B. 变态反应
 - C. 粉尘和有害气体吸入
 - D. 肿瘤
 - E. 其他全身疾病
6. 长期氧疗是指 ()。
 - A. 每天吸氧时间坚持 10 小时
 - B. 每天吸氧时间坚持 12 小时
 - C. 氧流量维持在 2~4L
 - D. 睡眠时不吸氧
 - E. 每天吸氧时间坚持 15 小时以上
7. 4 小时内咯血量超过多少称为大量咯血 ()。
 - A. 100ml
 - B. 300ml

- C. 400ml
D. 500ml
E. 600ml
8. 咯血窒息患者宜采取的体位是 ()。
- A. 端坐位
B. 患侧卧位
C. 去枕平卧位
D. 平卧位, 头偏向一侧
E. 头低足高位, 头偏向一侧
9. 呼吸系统最常见的症状是 ()。
- A. 咳嗽
B. 咳痰
C. 咯血
D. 呼吸困难
E. 胸痛
10. 以下护理胸痛患者的措施中哪项不妥 ()。
- A. 适当安慰, 消除其紧张情绪
B. 指导患者取患侧卧位
C. 用宽胶布于患者吸气末紧贴在患侧胸部
D. 按医嘱给小剂量的镇静剂和镇痛剂
E. 根据不同病因采取相应护理措施
11. 下列哪项不是引起咯血的常见疾病 ()。
- A. 肺结核
B. 支气管扩张
C. 支气管哮喘
D. 支气管内膜结核
E. 支气管肺癌
12. 在下列肺结核化疗方案中应警惕肾功能损害的是 ()。
- A. 异烟肼, 链霉素, 吡嗪酰胺
B. 异烟肼, 吡嗪酰胺, 利福平
C. 异烟肼, 吡嗪酰胺, 利福平, 乙胺丁醇
D. 异烟肼, 利福平, 乙胺丁醇
E. 异烟肼, 利福平
13. 上呼吸道感染患者错误的护理方法是 ()。
- A. 发热、全身酸痛者可用解热镇痛药
B. 注意保暖
C. 多饮水
D. 一般不需要任何特殊处理
E. 常规使用抗生素
14. 急性上呼吸道感染患者一般的病程是 ()。
- A. 3 天
B. 5 天
C. 1 周
D. 半个月
E. 1 个月
15. 慢性支气管炎主要症状不包括 ()。
- A. 喘息或气促
B. 慢性咳嗽、咳痰
C. 呼吸困难
D. 每年持续 3 个月, 连续 2 年以上
E. 多见于冬春季



16. 慢性支气管炎常出现 ()。
- A. 金属音的咳嗽
 - B. 带喉音的咳嗽
 - C. 急性刺激性干咳
 - D. 变换体位时咳嗽
 - E. 白色泡沫状痰或黏液性痰
17. 关于慢性支气管炎的描述, 错误的是 ()。
- A. 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
 - B. 指气管、支气管黏膜的慢性感染性炎症
 - C. 常并发阻塞性肺气肿
 - D. 吸烟是其主要病因
 - E. 临床可分为单纯型、喘息型
18. 第 1 秒用力呼气量占用力肺活量的比值 ($FEV_1/FVC\%$) 小于 60%, 最大通气量 (MBC) 低于预计值的 80%, 可诊断为 ()。
- A. 肺炎
 - B. 普通感冒
 - C. 慢性支气管炎
 - D. 急性气管-支气管炎
 - E. 阻塞性肺气肿
19. 慢性支气管炎的定义是 ()。
- A. 具有气流受限特征的一组疾病
 - B. 终末支气管远端的气道弹性减退, 气腔异常扩大
 - C. 气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症
 - D. 由多种病原菌引起的肺实质或间质内的急性渗出性炎症
 - E. 以嗜酸性粒细胞和肥大细胞反应为主的气道变应性炎症和气道高反应性为特征性疾病
20. 慢性喘息型支气管炎的特点是 ()。
- A. 呼气性呼吸困难, 双肺布满哮鸣音
 - B. 端坐呼吸, 双肺底水泡音
 - C. 呼气性呼吸困难, 两肺散在干湿性啰音
 - D. 吸气性呼吸困难, 呼吸音低
 - E. 进行性呼吸困难, 咳嗽, 痰中带血
21. 慢性支气管炎的临床分型是 ()。
- A. 单纯型、喘息型
 - B. 单纯型、喘息型、混合型
 - C. 急性型、慢性迁延型
 - D. 急性型、慢性型、迁延型
 - E. 急性型、慢性型、反复发作型
22. 慢性支气管炎的主要诊断依据是 ()。
- A. 病史和临床表现
 - B. 肺功能测定
 - C. 痰液细菌学检查
 - D. X 线检查
 - E. 长期吸烟史
23. 慢性支气管炎最常见的并发症是 ()。
- A. 肺气肿
 - B. 肺部感染

- C. 支气管扩张
E. 肺源性心脏病
24. 慢性支气管炎最突出的症状是 ()。
- A. 长期反复咳嗽
B. 经常咳痰
C. 时有喘息
D. 反复发热
E. 少量咯血
25. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿患者，主要是在原有症状的基础上又出现 ()。
- A. 反复发作
B. 剧烈咳嗽
C. 咳多量脓痰
D. 经常感染发热
E. 逐渐加重的呼吸困难
26. 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 患者的临床表现，错误的是 ()。
- A. 进行性呼吸困难
B. 肺气肿时肺泡呼吸音减弱
C. 咳嗽、咳痰
D. 急性发作时肺部可闻及干、湿啰
E. 肺部可听到管状呼吸音
27. 残气量 (RV) 增加，残气量/肺总量 (RV/TLC) 超过 40%，可诊断 ()。
- A. 肺炎
B. 普通感冒
C. 阻塞性肺气肿
D. 慢性支气管炎
E. 急性气管-支气管炎
28. 慢性阻塞性肺病合并心衰时，在用利尿剂治疗过程中易发生哪种电解质紊乱 ()。
- A. 低钠血症
B. 高钾低氯血症
C. 低钙血症
D. 低钾、低氯血症
E. 高钙血症
29. COPD (慢性阻塞性肺疾病) 包括哪些病 ()。
- A. 慢性气管炎 + 慢性阻塞性肺气肿
B. 上感 + 急性气管炎
C. 上感 + 急性支气管哮喘
D. 慢性支气管炎 + 支气管扩张
E. 慢性支气管炎 + II 型呼吸衰竭
30. 慢性肺源性心脏病的护理措施不包括 ()。
- A. 保持呼吸道通畅
B. 持续低流量吸氧
C. 观察患者的神志和精神状态
D. 必要时可给予镇静剂
E. 合理应用抗生素
31. 肺源性心脏病的首要死亡原因是 ()。
- A. 休克
B. 肺性脑病
C. 上消化道出血
D. 水、电解质平衡失调
E. 心律失常



32. 慢性肺源性心脏病急性加重期的常见诱因是 ()。
- A. 过劳
B. 大量利尿
C. 使用镇静剂
D. 呼吸道感染
E. 使用支气管扩张剂
33. 肺心病急性加重期的关键治疗措施是 ()。
- A. 改善呼吸功能
B. 控制呼吸道感染
C. 利尿减轻心负荷
D. 给予洋地黄制剂
E. 控制心律失常
34. 肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素是 ()。
- A. 继发性红细胞增多
B. 血液黏稠度增加
C. 血容量增加
D. 肺部毛细血管微小栓子形成
E. 缺氧及二氧化碳潴留引起肺小血管收缩痉挛
35. 诊断早期肺源性心脏病的主要依据是 ()。
- A. 发绀
B. 呼吸困难
C. 两肺干湿啰音及肺气肿体征
D. 肺动脉高压及右心室增大征象
E. 高碳酸血症
36. 肺心病心功能失代偿期表现为 ()。
- A. 以右心衰为主
B. 低氧血症
C. 二氧化碳潴留
D. 多为全心衰
E. 多为肺水肿
37. 慢性肺心病可致 ()。
- A. 右心衰竭
B. 左心室衰竭
C. 左心房衰竭
D. 心包炎
E. 心肌炎
38. 关于动脉血气分析, 错误的采血方法是 ()。
- A. 可选股动脉、肱动脉或桡动脉为穿刺点
B. 垂直或与皮肤呈 30° 角进针
C. 采血量 1ml 左右
D. 选择动脉搏动最强处为进针点
E. 采血后立即送检
39. 对支气管哮喘有激发作用的是 ()。
- A. 感染
B. 吸烟
C. 大气污染
D. 电离辐射
E. 自主神经功能紊乱
40. 支气管哮喘发病多属于 ()。
- A. I 型变态反应
B. II 型变态反应

- C. Ⅲ型变态反应
D. Ⅳ型变态反应
E. V型变态反应
41. 典型支气管哮喘发作时, 最主要的临床表现是 ()。
- A. 带哮鸣音的吸气性呼吸困难及双肺哮鸣音
B. 带哮鸣音的呼气性呼吸困难及双肺哮鸣音
C. 带哮鸣音的混合性呼吸困难及双肺哮鸣音
D. 带哮鸣音的混合性呼吸困难、粉红色泡沫痰
E. 带哮鸣音的混合性呼吸困难、咯血
42. 支气管哮喘患者突然出现胸痛、气急、呼吸困难、大汗、不安, 应考虑 ()。
- A. 自发性气胸
B. 支气管哮喘急性发作
C. 左心衰竭
D. 肺炎
E. 胸膜炎
43. 某支气管哮喘患者发生哮喘时查血可发现 ()。
- A. 血小板计数增多
B. 大单核细胞计数增多
C. 嗜碱性粒细胞增多
D. 中性粒细胞增多
E. 嗜酸性粒细胞增多
44. 支气管哮喘患者当哮喘发作时呼吸困难特点是 ()。
- A. 呼气性
B. 吸气性
C. 混合性
D. 潮式呼吸
E. 间停式呼吸
45. 支气管哮喘急性发作的首选药物是 ()。
- A. 拟肾上腺素类药物
B. 黄嘌呤类药物
C. 色甘酸钠
D. β 肾上腺素能受体激动剂
E. 酮替芬
46. 支气管哮喘诊断的主要依据是 ()。
- A. PaO_2 和 SaO_2 降低, PaCO_2 升高
B. 血液中嗜酸性粒细胞增多
C. 胸透有横膈下降和透亮度增加
D. 有反复发作史, 呼气性呼吸困难和两肺广泛哮鸣音
E. 肺功能检测有阻塞性通气障碍
47. 与支气管扩张发病关系较小的疾病有 ()。
- A. 麻疹
B. 百日咳
C. 支气管肺炎
D. 猩红热
E. 肺结核



48. 胸部听到局限而固定的湿啰音常见于 ()。
- A. 肺结核
 - B. 支气管肺癌
 - C. 支气管哮喘
 - D. 阻塞性肺气肿
 - E. 支气管扩张症
49. 支气管扩张的临床特点是 ()。
- A. 黄痰
 - B. 大量脓痰久置分3层
 - C. 铁锈色痰
 - D. 粉红泡沫痰
 - E. 绿痰
50. 支气管扩张肺部可听到 ()。
- A. 鼾音
 - B. 管型呼吸音
 - C. 捻发音
 - D. 哮鸣音
 - E. 患处固定湿啰音
51. 关于支气管扩张的叙述, 下列哪项有误 ()。
- A. 多在中、老年期起病
 - B. 主要表现为慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血及继发肺部感染
 - C. 病变部位可听到局限性持久存在的啰音
 - D. X线胸片可见蜂窝状或卷发样阴影
 - E. 支气管碘油造影确诊
52. 支气管扩张患者作体位引流的时间宜选择于 ()。
- A. 早上
 - B. 中午
 - C. 晚间
 - D. 饭前
 - E. 饭后
53. 支气管扩张患者的病变部位在下叶后基底段, 作体位引流应取哪种体位 ()。
- A. 平卧位
 - B. 俯卧位, 腰臀部抬高
 - C. 仰卧位, 腰部抬高
 - D. 左侧卧位, 腰部抬高
 - E. 右侧卧位, 腰部抬高
54. 支气管扩张患者的咳嗽特点为 ()。
- A. 晨起及晚间躺下时较重
 - B. 常出现刺激性干咳
 - C. 有时呈阵发性呛咳
 - D. 后期咳嗽加重并伴喘鸣声
 - E. 严重者出现呼气性呼吸困难
55. 支气管扩张患者如有厌氧菌感染, 则痰的特征为 ()。
- A. 铁锈色
 - B. 胶冻样
 - C. 泡沫痰
 - D. 白色痰
 - E. 有恶臭

56. 护理支气管扩张患者最重要的措施为 ()。
- A. 促进排痰
B. 增进营养
C. 增强体质
D. 预防窒息
E. 保持口腔卫生
57. 超声雾化吸入常用的药物, 不包括 ()。
- A. 地塞米松
B. 氨茶碱
C. 35% 酒精
D. α -糜蛋白酶
E. 抗生素
58. 治疗肺炎链球菌肺炎, 停用抗生素的指标一般是 ()。
- A. 体温降至正常后 1 天
B. 体温降至正常后 3 天
C. 体温降至正常后 7 天
D. 症状、体征完全消失
E. X 线示炎症阴影完全消失
59. 休克性肺炎除给予抗菌药物治疗外, 首要的护理措施为 ()。
- A. 预防并发症的发生
B. 遵医嘱给予止咳祛痰药
C. 鼻饲高热量、富含维生素的流质饮食
D. 按休克原则处理体位、保暖、吸氧、静脉输液等问题
E. 注意观察生命征、神志、瞳孔、尿量等变化
60. 治疗肺炎球菌肺炎的首选抗生素是 ()。
- A. 红霉素
B. 青霉素
C. 丁胺卡那霉素 (阿米卡星)
D. 氟嗉酸 (氧氟沙星)
E. 羧苄青霉素 (羧苄西林)
61. 肺炎链球菌肺炎患者的护理措施不妥的是 ()。
- A. 应用解热镇痛药
B. 必要时给予氧气吸入
C. 饮食要清淡
D. 应用祛痰镇咳药
E. 卧床休息为主, 适当下床活动
62. 符合肺炎链球菌肺炎患者的给氧方式是 ()。
- A. 持续低流量吸氧
B. 高流量面罩给氧
C. 高流量酒精湿化吸氧
D. 1~2L/min 持续鼻导管给氧
E. 2~4L/min 鼻导管给氧
63. 对肺炎球菌肺炎患者的护理措施中, 下列哪项不妥 ()。
- A. 气急, 发绀可给予鼻导管吸氧
B. 腹胀、鼓励做局部热敷或肛管排气
C. 高热者首选使用退热药
D. 进行保健指导, 以防今后再次发病
E. 胸痛剧烈者取患侧卧位



64. 厌氧菌感染所致肺炎患者咳 ()。
- A. 脓臭痰
B. 草绿色痰
C. 铁锈色痰
D. 少量白黏痰
E. 红棕色胶冻状痰
65. 军团菌肺炎 X 线检查, 可见 ()。
- A. 肺蜂窝状肺脓肿
B. 肺下叶斑片状浸润
C. 双肺弥漫性结节性浸润
D. 大片炎症浸润影或实变影
E. 肺部多种形态浸润影, 见于肺下叶
66. 军团菌肺炎治疗应首选 ()。
- A. 红霉素
B. 青霉素
C. 氯霉素
D. 两性霉素
E. 糖皮质激素
67. 肺炎球菌性肺炎的抗菌药物治疗疗程一般应用至 ()。
- A. 发热消退
B. 退热后 3 天
C. 退热后 1 周
D. 肺部炎症完全吸收
E. 血中白细胞计数正常
68. 肺炎球菌肺炎时产生的铁锈色痰最主要的原因是 ()。
- A. 痰内有大量红细胞
B. 痰内含大量脓细胞
C. 白细胞破坏时所产生的溶蛋白酶
D. 红细胞破坏释放出含铁血黄素
E. 红细胞碎屑被巨噬细胞吞噬
69. 肺炎球菌肺炎最重要的胸部体征是 ()。
- A. 桶状胸
B. 扁平胸
C. 胸部疱疹
D. 胸部肺实变体征
E. 胸膜摩擦音
70. 肺炎杆菌 (肺炎克雷伯杆菌肺炎) 肺炎的临床表现中具有特征性的是 ()。
- A. 胸痛
B. 寒战、发热
C. 可闻干、湿性啰音
D. 红色胶冻状黏稠脓性痰
E. 胸片见模糊淡薄阴影
71. 肺炎有下列哪项改变, 应诊断休克型肺炎 ()。
- A. 低血压
B. 全身发绀
C. 意识障碍
D. 循环障碍
E. DIC
72. 军团菌肺炎首选抗菌药物是 ()。
- A. 红霉素
B. 青霉素

- C. 丁胺卡那霉素（阿米卡星）
D. 四环素
E. 头孢菌素
73. 有关肺炎支原体肺炎的实验室结果，下列哪项最有诊断价值（ ）。
A. 周围血白细胞总数正常或稍增多，以中性粒细胞为主
B. 抗支原体抗体测定（免疫荧光法）
C. 链球菌 MG 凝集试验阳性
D. 抗支原体抗体测定（酶联免疫吸附试验）
E. 冷凝集试验阳性
74. 下列疾病中，常有空洞形成，除了（ ）。
A. 肺结核
B. 坏死性肉芽肿
C. 肺炎球菌性肺炎
D. 肺脓肿
E. 金葡萄球菌性肺炎
75. 结核性胸膜炎的常见症状不包括（ ）。
A. 午后低热
B. 乏力、消瘦
C. 胸痛
D. 咳痰
E. 盗汗
76. 判断肺结核有无传染性最重要的依据是（ ）。
A. 血沉增快
B. 结核菌素试验阳性
C. 反复痰中带血
D. 胸部 X 线检查有空洞
E. 痰结核菌检查阳性
77. 肺结核化疗的原则不包括（ ）。
A. 间断
B. 早期
C. 联合
D. 全程
E. 适量
78. 做结核菌素试验的主要目的是（ ）。
A. 测定人体是否受过结核菌感染
B. 诊断是否患有肺结核
C. 判断结核有无活动性
D. 增强机体对结核菌的免疫力
E. 明确结核患者是否需要隔离治疗
79. 关于肺结核错误的护理措施是（ ）。
A. 注意消毒与隔离
B. 患者绝对卧床休息
C. 观察药物不良反应
D. 高蛋白、高热量、高维生素饮食
E. 做好卫生宣传工作
80. 结核菌素试验判断结果的时间是注射后（ ）。
A. 8~10 小时
B. 14~18 小时



- C. 20~26 小时
D. 28~36 小时
E. 48~72 小时
81. 肺结核在治疗过程中, 判断结核化疗效果, 最重要的指标是 ()。
- A. OT 转阴
B. ESR 恢复正常
C. 痰结核菌转阴
D. 病灶吸收好转
E. 体温恢复正常
82. 肺结核患者的全身毒性症状中有特异性的是 ()。
- A. 疲乏
B. 食欲减退
C. 体重减轻
D. 月经失调
E. 低热, 盗汗
83. 肺结核大咯血的患者宜采取的体位是 ()。
- A. 端坐位
B. 患侧卧位
C. 去枕平卧位
D. 平卧位, 头偏向一侧
E. 头低足高位, 头偏向一侧
84. 锁骨上、下部位在咳嗽后听到湿啰音常见于 ()。
- A. 肺结核
B. 支气管肺癌
C. 支气管哮喘
D. 支气管扩张症
E. 阻塞性肺气肿
85. 结核感染的主要途径是 ()。
- A. 母婴
B. 血液
C. 消化道
D. 呼吸道
E. 性接触
86. 病程最长的肺结核类型是 ()。
- A. 原发型肺结核
B. 浸润型肺结核
C. 结核性胸膜炎
D. 血行播散型肺结核
E. 慢性纤维空洞型肺结核
87. 在肺结核治疗和预防中, 最常使用的药物是 ()。
- A. 链霉素
B. 异烟肼
C. 利福平
D. 乙胺丁醇
E. 对氨基水杨酸
88. 对肺结核大咯血的护理, 最主要的是避免发生 ()。
- A. 窒息
B. 贫血
C. 发热
D. 循环衰竭
E. 呼吸道感染

89. 浸润型肺结核的病灶多位于 ()。
- A. 肺尖或肺上野 B. 肺门附近
C. 肺中部 D. 肺下野
E. 全肺各处
90. 肺结核化学治疗原则是 ()。
- A. 早期、联合、适量、规律、全程 B. 仅早期使用抗结核药
C. 间断使用抗结核药 D. 仅用一种杀菌剂
E. 药物剂量应偏大
91. 哪项肺结核类型不相符 ()。
- A. I 型——原发性肺结核 B. II 型——血行播散型肺结核
C. III 型——浸润型肺结核 D. IV 型——慢性纤维空洞型肺结核
E. V 型——干酪性肺炎
92. 继发性肺结核中最常见的类型为 ()。
- A. 原发型肺结核 B. 血行播散型肺结核
C. 浸润型肺结核 D. 慢性纤维空洞型肺结核
E. 结核性胸膜炎
93. 结核病化疗联用的主要目的 ()。
- A. 减少并发症 B. 避免发生耐药性，增加疗效
C. 避免副作用 D. 可完全杀灭结核菌
E. 缩短疗程
94. 咳脓臭痰常提示患者呼吸道有 ()。
- A. 病毒感染 B. 真菌感染
C. 化脓菌感染 D. 铜绿假单胞菌感染
E. 厌氧菌感染
95. 肺结核咯血伴高热常提示 ()。
- A. 病灶扩散 B. 空洞形成
C. 支气管内血液吸收 D. 炎症波及壁层胸膜
E. 并发血气胸
96. 肺结核患者的消毒隔离措施，错误的一项是 ()。
- A. 做好呼吸道隔离 B. 剩余的饭菜煮沸后弃去
C. 痰液加等量的 1% 过氧乙酸浸泡 D. 餐具洗涤后应煮沸 5 分钟
E. 病室每日用紫外线灯照射
97. 肺结核患者痰液最简单有效的灭菌方法是 ()。
- A. 掩埋 B. 煮沸