



国家医师资格考试推荐用书

2017

口腔执业助理医师资格考试 冲刺预测试卷

主编 / 杨帆 博士 王登峰 博士

编写 / 北大协和医考博士团队

北大协和博士团队 助力医考轻松过关

紧扣大纲

名师精讲

紧抓重点

高效记忆

赠送

300元网校课程



人民卫生出版社



国家医师资格考试推荐用书



20985940

2017

口腔执业助理医师资格考试 冲刺预测试卷

主 编 杨 帆 博士

王登峰 博士

编 者 (以姓氏笔画为序)

王 丰 王 静 王卫平 王文静 王登峰

刘 宁 刘中宁 杨 帆 李 玉 李 波

李 慧 李 璐 李广学 何 璐 初 明

周 香 宝莎娜 宫玮玉 贺青云 郭玉兴



目 录

冲刺预测试卷一	1
第一单元	1
第二单元	15
冲刺预测试卷二	30
第一单元	30
第二单元	45
冲刺预测试卷三	60
第一单元	60
第二单元	75
冲刺预测试卷四	91
第一单元	91
第二单元	105

冲刺预测试卷一

|| 第一单元 ||

A1 型题(1~92 题)

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 检查邻面龋的可靠方法为
 - A. 视诊
 - B. 探诊
 - C. 叩诊
 - D. 温度测试
 - E. X 线片检查
2. 需要劈冠以解除阻力的阻生齿类型为
 - A. 垂直阻生
 - B. 近中阻生
 - C. 颊向阻生
 - D. 远中阻生
 - E. 舌向阻生
3. 不是下颌神经分支的是
 - A. 棘孔神经
 - B. 耳颞神经
 - C. 舌神经
 - D. 蝶腭神经
 - E. 颊神经
4. 颌面部危险三角区的化脓性感染处理不当最易引起的并发症是
 - A. 颌面部多间隙感染
 - B. 海绵窦血栓性静脉炎
 - C. 上颌骨髓炎
 - D. 肝脓肿
 - E. 唇坏死缺损
5. 有关牙本质小管的结构,以下不恰当的是
 - A. 在牙尖部小管较直
 - B. 小管越近牙髓一端越细
 - C. 牙本质小管可有许多分支
 - D. 小管贯穿牙本质全层
 - E. 在牙颈部弯曲呈“~”形
6. 塑料基托的平均厚度为
 - A. 1.0mm
 - B. 0.5mm
 - C. 1.5mm
 - D. 2.0mm
 - E. 3.0mm
7. 重型口疮的症状特点不包括
 - A. 7~15 天可愈
 - B. 疼痛明显
 - C. 溃疡时有“凹、红、黄、痛”的特征
 - D. 愈后可有瘢痕
 - E. 溃疡大而深,“似弹坑”
8. 皮瓣的组成
 - A. 表皮 + 真皮乳头
 - B. 表皮 + 真皮全层
 - C. 表皮 + 真皮 + 皮下组织



- D. 表皮 + 真皮 + 皮下组织 + 肌
E. 表皮 + 真皮 + 皮下组织 + 肌 + 骨
9. 牙周炎在 X 线片上表现为
A. 牙槽骨密度降低
B. 骨硬板呈白线
C. 前牙牙槽嵴顶尖锐
D. 牙周膜呈黑线
E. 根尖周骨密度减低
10. WHO 龋病流行程度评价的指标是
A. 患龋率
B. 龋齿发病率
C. 龋均
D. 龋面均
E. 无龋率
11. 牙颈部硬组织结构, 正确的是
A. 60% 为牙釉质覆盖在牙骨质上
B. 60% 为牙骨质覆盖在牙釉质上
C. 大部分釉质和牙骨质并不相连
D. 全部为釉质和牙骨质端端相连
E. 30% 为牙骨质覆盖在牙釉质上
12. 引起药物性牙龈增生的是
A. 地西洋
B. 维生素
C. 硝苯地平
D. 感冒颗粒
E. 维生素 B
13. 有关乳牙和恒牙的区别, 不恰当的是
A. 恒牙牙冠呈乳白偏黄, 乳牙牙冠呈白垩色
B. 乳牙与同名恒牙体积相似
C. 乳牙牙冠颈嵴突出, 冠根分明; 恒牙牙冠根分界不太明显
D. 恒牙颈嵴突起较乳牙不明显
E. 恒磨牙根干较长、分叉小; 乳磨牙根干短、分叉大
14. 关于高压蒸汽灭菌法, 不正确的描述是
A. 灭菌效果最可靠
B. 适用于对耐高温和耐湿物品的灭菌
C. 可杀灭包括细菌芽胞在内的所有微生物
D. 通常灭菌压力为 $205\text{kg}/\text{cm}^2$
E. 通常灭菌温度为 120°C
15. 下颌处于休息状态时, 上、下牙弓自然分开成一楔形间隙, 称
A. 颌间隙
B. 息止殆间隙
C. 颌间距离
D. 牙高度
E. 垂直距离
16. 位于上颌骨体的是
A. 切牙孔
B. 腭大孔
C. 破裂孔
D. 眶下孔
E. 眶上孔
17. 正常覆盖时, 上颌切牙切缘到下颌切牙唇面的距离是
A. 3mm 以内
B. 4mm 左右
C. 5mm 左右
D. 6mm 左右
E. 7mm 以上
18. 在根尖孔形成后所形成的牙本质称为
A. 前期牙本质
B. 球间牙本质
C. 透明牙本质
D. 原发性牙本质
E. 继发性牙本质
19. 维生素 C 缺乏时可患
A. 维生素 C 缺乏症
B. 败血症
C. 白血病
D. 痛风
E. 贫血症
20. 造成牙齿邻面磨耗的主要原因是



- A. 牙生理性远中移动
 - B. 牙生理性近中移动
 - C. 牙垂向移动
 - D. 牙颊向移动
 - E. 牙舌向移动
21. 上牙槽神经丛的内环神经组成是
- A. 上牙槽前神经、中神经、后神经
 - B. 上牙槽前神经、中神经
 - C. 上牙槽前神经、中神经、鼻腭神经
 - D. 腭前神经、鼻腭神经
 - E. 上牙槽前神经、中神经、后神经、鼻腭神经
22. 口腔颌面外科手术止血方法中,最基本、最常用的方法是
- A. 压迫止血
 - B. 阻断止血
 - C. 降压止血
 - D. 热凝止血
 - E. 钳夹、结扎止血
23. 腭裂术后穿孔最主要的原因是
- A. 感染
 - B. 张力过大
 - C. 出血
 - D. 患儿哭闹
 - E. 饮食
24. 3条或3条以上的发育沟相交所形成的凹陷称为
- A. 窝
 - B. 点隙
 - C. 外展隙
 - D. 楔状隙
 - E. 邻间隙
25. 下列对上前牙邻面接触点的描述恰当的是
- A. 靠近邻面中1/3
 - B. 殆龈径小于唇舌径
 - C. 靠近邻面切1/3
 - D. 靠近邻面龈1/3
 - E. 以上都不是
26. 下列细菌中与产生毒素和噬菌体有关的是
- A. 破伤风梭菌
 - B. 白喉棒状杆菌
 - C. 霍乱弧菌
 - D. 产气荚膜梭菌
 - E. 大肠埃希菌
27. 全口义齿初戴时发现下牙弓明显后退,其原因可能是
- A. 人工牙排列不当
 - B. 病人下颌骨过于后退
 - C. 殆架前后移动
 - D. 确定水平颌位关系时,下颌前伸
 - E. 垂直距离过低
28. 牙体预备应达到的要求是
- A. 去除病变组织,阻止病变发展
 - B. 消除轴壁倒凹,获得良好就位道
 - C. 开辟修复体所占空间,保证修复体一定的强度、厚度和美观
 - D. 预备良好的固位形和抗力形,磨改过长牙、错位牙、异常对颌牙及邻牙,并做适当预防性扩展
 - E. 以上均是应达到的要求
29. 全口义齿制作中使用殆托的最主要目的是
- A. 便于排牙
 - B. 恢复垂直距离
 - C. 殆位记录
 - D. 恢复面部外形
 - E. 确定殆平面
30. 牙槽骨吸收超过基牙根长多少时,须考虑增加基牙
- A. 3/4
 - B. 1/3
 - C. 1/2
 - D. 4mm 以上
 - E. 2/3
31. 临床上常用的印模材料是藻酸盐印模材料,此种材料的印模从口内取出后,应及时灌注模型,因为



- A. 印模材失水收缩,吸水膨胀,体积不太稳定
B. 印模材吸水收缩,失水膨胀,体积不太稳定
C. 石膏失水收缩,吸水膨胀,体积不太稳定
D. 石膏吸水收缩,失水膨胀,体积不太稳定
E. 石膏凝固时间长
32. 牙发育畸形中最易出现的形态是
A. 牙齿结构异常
B. 牙齿形态异常
C. 牙齿数目异常
D. 牙齿萌出异常
E. 牙齿结构形态均异常
33. 在牙本质中钙化程度最高的为
A. 管周牙本质
B. 管间牙本质
C. 小球间牙本质
D. 前期牙本质
E. 托姆斯颗粒层
34. 牙本质小管中不会含有的是
A. 成牙本质细胞突起
B. 神经纤维
C. 压力感受器
D. 神经末梢
E. 组织液
35. 不能通过输血传播的病毒是
A. 单纯疱疹病毒
B. EB 病毒
C. 巨细胞病毒
D. 肝炎病毒
E. HIV
36. 牙本质钙化过程中,钙化团之间遗留的钙化区是
A. 原发性牙本质
B. 罩牙本质
C. 前期牙本质
D. 硬化牙本质
E. 球间牙本质
37. 磨片中可见到新生线的牙是
A. 上中切牙
B. 下中切牙
C. 上第一磨牙
D. 下第二磨牙
E. 第三磨牙
38. 胶原纤维排列与牙本质小管平行的牙本质是
A. 小管周牙本质
B. 小管间牙本质
C. 前期牙本质
D. 小球间牙本质
E. 罩牙本质
39. 牙周膜的主要成分是
A. 胶原纤维
B. 上皮剩余
C. 成骨细胞
D. 破骨细胞
E. 成牙骨质细胞
40. 下列不属于口腔二级预防的是
A. 口腔 X 线片辅助诊断
B. 龋病的早期充填
C. 龋病的早期诊断
D. 定期口腔检查
E. 窝沟封闭
41. 对含氟牙膏的防龋效果进行研究。将若干名学生随机分成两组,一组用含氟牙膏,另一组用普通牙膏,3 年后观察其防龋效果。这种研究方法为
A. 历史常规资料分析
B. 病例对照研究
C. 横断面研究
D. 实验研究
E. 群组研究
42. 如果确定腭根已进入上颌窦,经去除牙槽间隔后扩大牙槽窝将其冲出。此时上颌窦



- 底黏膜破裂口约7mm,此时应
- 立即行上颌窦瘘修补术
 - 牙槽窝填塞碘仿纱条
 - 可不予处理
 - 给予抗生素,延期行上颌窦瘘修补术
 - 术后牙槽窝内放置碘仿海绵
43. 下列疾病不是由沙门菌引起的是
- 伤寒
 - 败血症
 - 食物中毒
 - 副伤寒
 - 假膜性肠炎
44. 牙槽突骨折的特征性表现是
- 伴牙缺失
 - 伴有唇和牙龈的肿胀及撕裂,撕裂口与牙相对应
 - 咬合错乱
 - 摇动损伤区某一牙时,邻近牙及骨折片随之移动
 - 伴牙折或牙脱位
45. 唇、舌、耳、鼻及眼睑断裂伤,离体组织尚完好,应尽量将离体组织缝回原处,但一般不宜超过
- 1 小时
 - 2 小时
 - 4 小时
 - 6 小时
 - 8 小时
46. 颌间牵引常用于复位
- 上颌骨水平骨折
 - 上颌骨锥形骨折
 - 上颌骨横行骨折
 - 下颌骨骨折
 - 牙槽突骨折
47. 急性假膜型念珠菌口炎(雪口病)的典型临床表现是
- 白色或乳白色的丝绒状斑片,稍用力可擦掉
 - 灰白色或灰黄色假膜,易被拭去
 - 固着紧密的白色角质斑块
 - 亮红色水肿或黄白色的条索状或斑点状假膜
 - 灰白色或黄褐色假膜,致密而光滑
48. 前牙区牙龈肿物镜下见由纤维结缔组织构成,其中见大量成纤维细胞、纤维细胞和多核巨细胞。有出血灶并见巨噬细胞和炎症细胞。最可能的病理诊断是
- 增生性牙龈炎
 - 先天性牙龈瘤
 - 纤维性牙龈瘤
 - 巨细胞性牙龈瘤
 - 肉芽肿性牙龈瘤
49. 腮腺肿瘤镜下见肿瘤性上皮组织与黏液样、软骨样组织混杂在一起,上皮成分形成腺管样结构和肌上皮细胞以及鳞状细胞团块。最可能的病理诊断是
- 黏液表皮样癌
 - 腺样囊腺瘤
 - 多形性腺瘤
 - 单形性腺瘤
 - 肌上皮瘤
50. 牙内吸收时,牙髓组织变为炎症性肉芽组织,吸收牙齿的部分是
- 牙本质壁
 - 牙骨质
 - 釉界牙骨质
 - 根尖狭窄部
 - 根分叉部
51. 下列有关盖髓术原理的叙述中不正确的是
- 用一种可使牙髓变性的制剂
 - 盖髓剂盖在近髓牙本质或暴露牙髓的创面上
 - 其最终目的是保护活髓
 - 为了消除感染
 - 恢复牙髓功能
52. 目前公认效果较好的盖髓剂是



- A. 磷酸锌
B. 氧化锌丁香油制剂
C. 氢氧化钙制剂
D. 激素类
E. 抗生素类
53. 根管充填的时机为
A. 无自觉症状
B. 根管内无渗出
C. 取出棉捻无臭物
D. 检查无叩痛
E. 包括以上各项
54. 用直接电镜法可作出早期快速诊断的病毒是
A. 疱疹病毒
B. 轮状病毒
C. 流感病毒
D. 巨细胞病毒
E. 腺病毒
55. 离下颌管最近的是
A. 上颌尖牙
B. 下颌前磨牙
C. 上颌前磨牙
D. 上颌磨牙
E. 下颌磨牙
56. 双侧颞下颌关节强直最好一次手术,如需分两次手术,相隔时间不宜超过
A. 3天
B. 1周
C. 2周
D. 1个月
E. 3个月
57. 能促进根尖周组织修复的充填材料是
A. 氢氧化钙
B. 氯仿牙胶
C. 氧化锌丁香油黏固剂
D. 松油牙胶
E. 碘仿糊剂
58. 试测主牙胶尖合适的重要指标是
A. 与牙根管的长度一致
B. 达到患牙根管的工作长度
C. 在取出时根尖部有回拉阻力
D. 刚能进入根管的根尖狭窄部
E. 与根管预备后的根管锥度一致
59. 湿性坏疽常发生在
A. 脑、脾、肝
B. 脑、肠、子宫
C. 肺、肠、肝
D. 肺、肠、子宫
E. 肺、肾、脑
60. 根管预备常用的器械是
A. 裂钻、根管扩大器、拔髓针
B. 根管锉、球钻、根管扩大器
C. 扩孔钻、根管扩大器、根管侧压器
D. 机用扩孔钻、根管锉、根管侧压器
E. 机用扩孔钻、根管锉、根管扩大器
61. 严重急性呼吸综合征(SARS)的病原体是
A. 流感病毒
B. 衣原体
C. 冠状病毒
D. 禽流感病毒
E. 嗜肺军团菌
62. 根疗中可能引起最严重后果的意外是
A. 器械折断
B. 根管壁侧穿
C. 急性根尖周炎
D. 器械误吞、误吸
E. 皮下气肿
63. 上颌骨的四个突起分别称为
A. 蝶突、颧突、鼻突和腭突
B. 颧突、鼻突、上颌突和腭突
C. 额突、颧突、牙槽突和腭突
D. 额突、颧突、上颌窦和腭突
E. 蝶突、颧突、牙槽突和腭突
64. 面总静脉是由



- A. 颌内静脉与颞浅静脉汇合而成
B. 面后静脉前支与面前静脉汇合而成
C. 面后静脉后支与耳后静脉汇合而成
D. 耳后静脉与颞浅静脉汇合而成
E. 面前静脉与颌内静脉汇合而成
65. 釉牙本质界弧形的凹面
A. 与釉质生长线平行
B. 朝向牙本质
C. 朝向釉质
D. 与施雷格板平行
E. 与釉板长轴平行
66. 关于牙髓的神经,以下错误的是
A. 牙髓内神经很丰富
B. 大多数是无髓神经
C. 靠近多细胞层的神经纤维形成网状,称为神经壁层
D. 神经轴突止于成牙本质细胞突起之间或牙本质小管内
E. 在受到外界刺激后,牙髓神经常反映为痛觉
67. 颌面部发育异常出现于
A. 胚胎第3周至第4周
B. 胚胎第6周至第7周
C. 胚胎第9周
D. 胚胎第10周
E. 胚胎第6个月
68. 唾液中的主要成分下列说法错误的是
A. 水占95%,固体物质占5%
B. 含有黏蛋白、球蛋白
C. 唾液淀粉酶、麦芽糖酶
D. 氧化酶,溶菌酶
E. 钾、钠、钙、镁
69. 口底囊肿囊腔内充满白色豆腐渣样物质,镜下见角化复层鳞状上皮衬里,囊壁内含有皮肤附属器。最可能的病理诊断是
A. 表皮样囊肿
B. 皮样囊肿
C. 畸胎样囊肿
D. 口底囊肿
E. 蛤蟆肿
70. 不能通过垂直传播的病原体为
A. 艾滋病病毒(HIV)
B. 乙型肝炎病毒(HBV)
C. 梅毒螺旋体
D. 流行性乙型脑炎病毒
E. 风疹病毒
71. 颌骨骨髓炎X线检查有诊断价值一般是在发病后
A. 1~3天
B. 4~9天
C. 2周
D. 1个月
E. 2个月
72. 组织学表现为恶性者所占比例很高的疾病是
A. 白斑
B. 红斑
C. 扁平苔藓
D. 慢性盘状红斑狼疮
E. 口腔黏膜下纤维化
73. 白斑的发病特点如下,除外
A. 与吸烟有关
B. 女性多于男性
C. 与刺激食物有关
D. 发病以中老年较多
E. 与某些全身因素有关
74. 创伤性溃疡的临床特征为
A. 溃疡形态与刺激物相吻合
B. 溃疡呈菜花状,基底有浸润
C. 病人多有低热、乏力、盗汗
D. 溃疡可自愈
E. 溃疡表浅,周围红晕,疼痛明显
75. 复发性口腔溃疡治疗措施中,近期疗效最佳的是
A. 口腔局部消炎,镇痛、促愈合
B. 手术切除



- C. 注射转移因子或口服左旋咪唑
D. 针对与发病有关的全身和局部因素治疗
E. 补充营养
76. 不应该拔除的乳牙是
A. 牙冠破坏严重,已无法修复的乳牙
B. 根尖周炎症已涉及继承恒牙牙胚
C. 乳牙有牙髓炎症可治疗,但离替换时间很近
D. 受继承恒牙萌出力的推压,使根尖露出龈外常致局部黏膜创伤性溃疡
E. 有病灶感染迹象但能彻底治愈
77. 乳牙牙根开始吸收是在换牙前
A. 6~8个月
B. 9~10个月
C. 1~2年
D. 2~3年
E. 4~5年
78. 下述牙周疗效维持及预防的叙述中,正确的是
A. 1~2年进行一次复查,复诊
B. 防治牙周炎1~2年做一次洁治
C. 局部龈无炎症可以不拍摄X线片
D. 牙周维护在治疗后的头3年最重要
E. 病人复查时重点要检查全身情况
79. 与蛋白质载体结合后才具有免疫原性的物质是
A. 完全抗原
B. 胸腺依赖性抗原
C. 不完全抗原
D. 非胸腺依赖性抗原
E. 同种异型抗原
80. 青少年牙周炎牙槽骨吸收的特点如下,除外
A. 初期牙槽骨仅表现为疏松
B. 可见到牙槽硬骨板模糊不清,但牙槽骨无明显吸收
C. 病变中晚期,骨吸收多呈杯状或角形吸收
D. 多发生牙槽骨的水平吸收
E. 牙槽骨吸收的范围和牙周袋深度常不一致
81. 根分叉病变治疗难度大,从牙体解剖的特点分析有以下原因,除外
A. 根分叉入口过小
B. 釉突
C. 根面有凹槽
D. 深刮器械工作刃过短
E. 多数磨牙根分叉距釉牙骨质界较近
82. 以下情况会加大基牙的负担,除了
A. 缺牙数目多、缺牙间隙长
B. 基托下黏膜松软、移动度大
C. 卡环与基牙牙冠表面接触面大,卡环刚性大
D. 牙槽嵴丰满
E. 义齿欠稳定,咬合不平衡
83. 关于上颌牙牙周面积的大小排序,正确的是
A. 6754321
B. 7645312
C. 6745321
D. 6734512
E. 7634512
84. 根尖片投照的分角技术是指
A. X线与被检查牙齿的长轴垂直
B. X线与胶片垂直
C. X线与被检查牙齿的长轴及胶片之间的分角线垂直
D. X线与被检查牙齿的长轴和胶片之间的分角线平行
E. X线与咬合平面平行
85. 牙周脓肿区别于根尖脓肿的表现是
A. 牙有龋病
B. 有深的牙周袋
C. 脓肿位于根尖区
D. 无牙髓活力



- E. 根尖周骨质破坏,牙槽嵴正常
86. 样本含量足够大,总体阳性率与阴性率均不接近于 0 和 1,总体率 95% 可信区间的估计公式为
- $p \pm 2.58S_p$
 - $p \pm 1.96S_p$
 - $p \pm 1.96S$
 - $p \pm 2.58S$
 - $p \pm 1.96S$
87. 导致牙周炎临床症状的主要病理变化是
- 牙龈出血与牙齿移位
 - 牙周袋形成与牙周溢脓
 - 牙周袋形成与牙槽骨吸收
 - 牙周膜间隙增宽与牙槽骨吸收
 - 牙周膜间隙变窄与牙槽骨吸收
88. 早期牙周炎的表现不包括
- 牙周袋形成
 - 牙槽骨吸收
 - 牙龈红肿
 - 牙齿移位
 - 探诊后牙龈出血
89. 临床怀疑口腔念珠菌感染时,首先选用的辅助诊断技术为
- 唾液培养
 - 唾液及血清念珠菌抗体测定
 - 血清铁及维生素 B_{12} 测定
 - 直接在病损区涂片镜检
 - 活体组织检查
90. 疱疹性龈口炎的病因是
- 细菌
 - 病毒
 - 真菌
 - 衣原体
 - 立克次体
91. 特纳(Turner)牙是由于
- 服用四环素所致
 - 饮水氟含量过多所致

- 患儿严重的发热性疾病所致
- 先天发育缺陷
- 乳牙根尖周严重感染所致

92. 三期梅毒的标志性表现是

- 梅毒性舌炎
- 梅毒性舌白斑
- 结节性梅毒疹
- 树胶样肿
- 梅毒性口炎

A2 型题(93 ~ 121 题)

每一道考题是以一个小案例的形式出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

93. 男,18 岁。发现右下颌下无痛性质软肿物 3 个月,表面皮肤正常,口腔内检查亦未见异常。行下颌下手术中见肿物呈囊性,术中囊壁破裂,流出黏稠而略带黄色蛋清样液体,遂将囊壁及下颌下腺一并摘除,但术后不久囊肿复发,该病最可能的诊断是
- 下颌下腺囊肿
 - 潜突型舌下腺囊肿
 - 下颌下区软组织囊肿
 - 囊性水瘤
 - 鳃裂囊肿
94. 女,40 岁。拔除右上第一磨牙残根时,根不慎进入上颌窦,最佳处理方法是
- 经牙槽窝探查
 - 填塞明胶海绵
 - 行上颌窦开窗术
 - 扩大牙槽窝底
 - 不处理
95. 男,7 岁。需拔除Ⅱ度松动的左下第一乳切牙,临床常用的麻醉方法是
- 阻滞麻醉
 - 浸润麻醉
 - 表面麻醉



- D. 冷冻麻醉
E. 针刺穴位麻醉
96. 女,35岁。颊面外伤伴昏迷,经现场紧急处理后准备后送,处理中不正确的是
A. 俯卧位
B. 额部垫高
C. 仰卧位
D. 随时观察,防止窒息和休克发生
E. 若怀疑有颈椎损伤,在搬运时应由2~4人同时进行
97. 男,28岁。无意中发现甲状腺肿块15天,近3天来似有增大,^{99m}Tc扫描表示“冷结节”,碘甲状腺扫描示冷结节处有放射性浓聚,甲状腺B超检查结果为实质性肿块,最可能的诊断是
A. 单纯性甲状腺肿
B. 青春期甲状腺肿
C. 甲状腺囊腺瘤并发囊内出血
D. 结节性甲状腺肿
E. 甲状腺癌
98. 男,有不洁性交史,2个月前出现生殖器皮肤的无痛性溃疡,1个月后自然愈合,近日出现全身皮肤红疹,伴有淋巴结肿大,该病人可能患有
A. 猩红热
B. 麻疹
C. 性病淋巴肉芽肿
D. 风疹
E. 梅毒
99. 男,18岁。与他人相撞致上前牙外伤。检查发现1位置低于咬合面,牙冠缩短,松动,牙龈有少许撕裂,牙外伤的诊断是
A. 牙挫伤
B. 牙脱位
C. 冠折
D. 根折
E. 冠根折
100. 患儿,4岁。腭裂修复术后,腭咽闭合良好,多长时间可以开始语音训练
A. 1周
B. 半个月
C. 1个月
D. 3个月
E. 半年
101. 病人,49岁。因左下牙疼痛2个月,下唇麻木3周就诊。曲面断层片示左下颌骨体区2cm×3cm的低密度溶骨破坏区,边界不清呈虫蚀状,无死骨形成及新骨增生,最可能的诊断是
A. 下颌骨骨髓炎
B. 成釉细胞瘤
C. 角化囊肿
D. 含牙囊肿
E. 原发性骨肉瘤
102. 女,32岁。牙龈肿物3个月。镜下见病变由大量新生毛细血管及成纤维细胞组成,有多数炎症细胞浸润,表皮上皮变薄。病理上最符合
A. 纤维性牙龈瘤
B. 骨化纤维性牙龈瘤
C. 妊娠性牙龈瘤
D. 肉芽肿性牙龈瘤
E. 巨细胞性牙龈瘤
103. 女,52岁。因龋病而拔除 $\overline{456}$,余留牙情况良好。不适合固定义齿修复的主要理由是
A. 基牙数目不够
B. 基牙固位力不够
C. 牙周储备力不够
D. 桥体的强度不够
E. 连接体的强度不够
104. 男,29岁。因外伤致 $\overline{3}$ 缺失,行固定义齿修复,其修复体属于
A. 双端固定桥
B. 黏接固定桥
C. 单端固定桥



- D. 复合固定桥
E. 特殊固定桥
105. 男,36岁。行双端固定桥修复后基牙出现持续性疼痛,伴夜间自发性疼痛。应做的处理是
A. 口服镇痛药
B. 口服消炎药
C. 拆除固定桥,行根管治疗
D. 局部上碘酚
E. 不做任何处理,观察
106. 如果在第一天休克复苏过程中,病人烦躁、口渴、尿量 20ml/h,脉搏增加至 150 次/分,临床进一步处理是
A. 口服饮料解渴
B. 肌内注射镇静药或冬眠疗法
C. 加快输液速率
D. 吸氧
E. 加用广谱抗生素
107. 女,2岁。不完全性腭裂伴腭咽闭合不全。其咽成形术应在腭成形术后进行的时限是
A. 半年
B. 1年
C. 5年
D. 6年
E. 7年以上
108. 男,2岁。双侧完全性腭裂,其临床表现不包括
A. 常与双侧唇裂同时发生
B. 前颌部分向两侧裂开
C. 双侧牙槽嵴裂
D. 前颌骨孤立于中央
E. 腭垂缺失
109. 女,60岁。右肩背部肿痛5天。查体:体温 39.4℃,右肩背部有多个脓肿,中央部坏死呈火山口状,最有效的处理措施是
A. 抗生素
B. 理疗
C. 中药外敷
D. 沿皮纹纵行切开
E. “+”或“++”形切口引流
110. 病人,4岁。因外伤左上乳中切牙内陷移位,牙龈无明显撕裂伤,牙槽突无折断,X线片显示:恒牙胚未受波及。正确的处理是
A. 立即复位固定
B. 立即拔除
C. 定期复诊观察
D. 牵引复位
E. 不做处理
111. 男,60岁。右上牙床肿痛2天。检查:全口牙牙石(+)~(++),16颊侧牙龈局限性隆起,波动感,有深牙周袋,患牙未见龋坏。其他牙牙周袋探诊深度普遍 4~7mm。最可能的诊断是
A. 急性龈乳头炎
B. 急性牙龈脓肿
C. 急性牙槽脓肿
D. 急性牙周脓肿
E. 根分叉病变
112. 一病人下磨牙干髓治疗已3年。近3周咬物不适,喝热水时有时有疼痛,睡前自发钝痛。最应考虑的诊断是
A. 继发龋
B. 残髓炎
C. 急性牙髓炎
D. 急性根尖周炎
E. 慢性根尖周炎
113. 男,20岁。一日前左上中切牙外伤。检查患牙冠折露髓,叩痛(+),不松动,冷测一过性敏感,X线片检查未见根折。治疗应为
A. 间接盖髓
B. 直接盖髓
C. 活髓切断
D. 根管治疗



E. 根尖诱导成形术

114. 男,20岁。右大腿刀刺伤18小时,刀口处红肿,有渗出液,目前最适当的治疗措施是

- A. 清创缝合
- B. 抗生素治疗
- C. 理疗
- D. 清理伤口后换药
- E. 局部固定

115. 女,76岁。左下后牙进食酸痛,无自发痛史,临床检查:6 𪚩面磨耗,探诊敏感。该病人可诊断为

- A. 牙周炎
- B. 磨牙症
- C. 釉质发育不全
- D. 牙本质过敏症
- E. 氟牙症

116. 女,35岁。有下后牙遇冷、热敏感。食物嵌塞,但无自发痛。检查发现47 龋洞较深、近髓。去除软化本质时,病人感到明显疼痛,对该患牙首选的治疗方法是

- A. 氢氧化钙直接盖髓
- B. 聚酸锌黏合剂垫底,永久充填
- C. 局麻下开髓做牙髓治疗
- D. 安抚治疗或间接盖髓
- E. 磷酸锌黏合剂垫底,永久填充

117. 男,45岁。刷牙时牙龈出血10年,检查见牙石(++),菌斑量多,牙龈红肿明显,探诊出血,袋深普遍4~6mm,附着丧失普遍2~4mm,X线片示牙槽骨有水平吸收。最可能的诊断是

- A. 坏死性龈炎
- B. 边缘性龈炎
- C. 增生性龈炎
- D. 成人牙周炎
- E. 快速进展性牙周炎

118. 男,6岁。右手烧伤,有水疱,剧痛,在现场急救中,为减轻疼痛,最适当的方法是

- A. 安慰和鼓励受伤者
- B. 肌注地西泮
- C. 肌注哌替啶
- D. 局部制动
- E. 将手放入冷水中

119. 男,2岁。1年前左上前牙因牙龈小泡曾行根管治疗,现该牙又出现肿痛,来诊。查:11 原充填物在,根方黏膜充血,叩痛,叩痛(+),松动Ⅰ度,X线片示根管内严密充填,根尖区骨质破坏范围较大。此时宜采取的治疗措施是

- A. 抗炎、镇痛
- B. 重新根管治疗
- C. 抗炎后行根尖手术
- D. 重新根管治疗+根尖手术
- E. 拔除患牙

120. 男,35岁。因下前牙急性根尖周炎行根管治疗,第一次的处理应进行的操作是

- A. 开髓开放
- B. 局部麻醉
- C. 开髓拔髓
- D. 开髓封失活剂
- E. 麻醉下拔除

121. 女,46岁。左下后牙2个月来遇冷、热过敏,食物嵌入牙内引起隐隐不适,近2天出现自发阵发痛,遇冷、热疼痛更加剧。检查发现左下6 𪚩面深龋,冷测引发剧烈疼痛,穿髓孔小,探痛(+++),叩痛(±),就诊时医生在局麻下开髓拔髓,未扩管,封FC药捻,当晚出现剧烈疼痛,牙松动Ⅲ度,叩痛(+++).该患牙的病变发展过程是

- A. 牙髓充血-慢性牙髓炎-慢性牙髓炎急性发作-急性根尖周炎
- B. 牙髓充血-急性根尖周炎
- C. 急性牙髓炎-急性根尖周炎
- D. 慢性牙髓炎-急性根尖周炎
- E. 牙髓充血-急性牙髓炎-急性根尖周炎

A3/A4 型题(122~125题)

以下提供若干个案例,每个案例下设若干



道考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(122 ~ 125 题共用题干)

男,30 岁。2 年前因交通追尾而碰伤下前牙,牙冠完整,未诊治。以后一直出现咀嚼不适,牙齿有“发木”感,牙逐渐变色,根尖部反复发生肿痛,服消炎药后可好转。颊部有一瘻管反复发作,长期流脓,曾于美容科切除瘻管,但再次发作。

122. 确诊最有价值的检查是

- A. 扪诊
- B. 叩诊
- C. 冷、热诊
- D. X 线片
- E. 探诊

123. 根据上述临床表现最不可能的诊断是

- A. 慢性根尖周囊肿
- B. 慢性有瘻型根尖周脓肿
- C. 慢性有瘻型根尖周炎
- D. 慢性根尖周肉芽肿
- E. 慢性根尖周致密性骨炎

124. 假设此病例经根管治疗后仍不痊愈,下列不可能是其原因的是

- A. 仅做全冠修复
- B. 根管超填
- C. 菌斑堆积
- D. 根管欠填
- E. 根尖周骨质破坏较大

125. 对于颊部瘻管,处理正确的是

- A. 拔除患牙,切除瘻管
- B. 碘酚灼烧,封闭瘻管
- C. 患牙根治后瘻管可自行封闭
- D. 患牙根治后搔刮瘻管
- E. 观察,待自行闭合

B1 型题 (126 ~ 150 题)

以下提供若干组考题,每组考题共用在考

题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(126 ~ 127 题共用备选答案)

- A. 衣原体
- B. 病毒
- C. 支原体
- D. 螺旋体
- E. 真菌

126. 只有一种类型核酸的是

127. 缺乏细胞壁的原核细胞型微生物是

(128 ~ 130 题共用备选答案)

- A. 支托移位形成支点
- B. 基托边缘过长或过锐
- C. 基托过厚过大
- D. 卡环臂进入基牙倒凹区过深
- E. 咬合过高,基牙负担过重

128. 戴用义齿后发音不清的原因是

129. 义齿撬动或摆动的原因是

130. 摘戴困难的原因是

(131 ~ 133 题共用备选答案)

- A. 根尖部无明显变化
- B. 根尖部有圆形的投射影像,边界清晰
- C. 根尖周骨质较疏松,呈云雾状,透射区边界不清
- D. 根尖周透射区边界清,有致密骨白线围绕
- E. 根尖部局限性致密阻射影像,无透射区

131. 慢性根尖周脓肿 X 线片的影像特点是

132. 根尖周囊肿 X 线片的影像特点是

133. 根尖周致密性骨炎 X 线片的影像特点是

(134 ~ 135 题共用备选答案)

- A. 边缘扩展阳性
- B. 尼氏征阳性
- C. 雷诺征阳性
- D. 针刺反应阳性



E. Wickham 纹

134. 天疱疮的皮肤损害特点为

135. 扁平苔藓的皮肤损害表面常有

(136 ~ 137 题共用备选答案)

A. 1 岁以后

B. 2 岁以后

C. 3 ~ 6 岁

D. 6 岁以后

E. 10 岁以后

136. 儿童趋向于要自己刷牙,需要父母时常督促和帮助是在

137. 培养儿童建立口腔卫生习惯,掌握刷牙方法,有效地刷牙是在

(138 ~ 142 题共用备选答案)

A. 眶下间隙感染

B. 咬肌间隙感染

C. 翼下颌间隙感染

D. 颞下间隙感染

E. 下颌下间隙感染

138. 磨牙后三角区黏膜的感染可导致

139. 可沿面静脉、内眦静脉、眼静脉向颅内扩散,并发海绵窦血栓性静脉炎的是

140. 表现为颧弓上、下及下颌支后方微肿,有深压痛,伴有不同程度的张口受限的是

141. 常表现为先有牙痛史,继之出现张口受限,咀嚼、吞咽疼痛的是

142. 下牙槽神经阻滞麻醉时消毒不严格可引起

(143 ~ 144 题共用备选答案)

A. 根尖圆形透射影,周边为阻射的白线,根尖牙周膜不连续

B. 牙周膜间隙增宽

C. 根尖圆形透射影,形状规则

D. 根尖孔喇叭状,形状规则

E. 根尖圆形透射影,边缘锐利

143. 根尖周囊肿的 X 线表现是

144. 部分性牙脱位的 X 线表现是

(145 ~ 148 题共用备选答案)

A. 腺样囊性癌

B. 黏液表皮样癌

C. 多形性低度恶性腺癌

D. 腺泡细胞癌

E. 多形性腺瘤

145. 主要发生在腮腺,颌下腺和舌下腺少见,小涎腺罕见的肿瘤是

146. 2/3 发生在腮腺,其次为腮腺、磨牙后腺和颌下腺的肿瘤是

147. 好发于小涎腺和大涎腺中较小的腺体的肿瘤是

148. 仅发生在小涎腺的肿瘤是

(149 ~ 150 题共用备选答案)

A. 牙龈切除术

B. 牙周翻瓣术

C. 引导性组织再生术

D. 截根术

E. 牙冠延长术

149. 基础治疗后增生的牙龈未消退,应采取的牙周手术为

150. 对三壁骨袋最佳的治疗选择是

第一单元参考答案

1. E	2. B	3. D	4. B	5. B	6. D
7. A	8. C	9. A	10. C	11. B	12. C
13. B	14. D	15. B	16. D	17. A	18. E
19. B	20. B	21. D	22. E	23. B	24. B
25. C	26. B	27. D	28. E	29. C	30. B
31. A	32. E	33. A	34. C	35. A	36. E
37. C	38. E	39. A	40. E	41. D	42. A
43. E	44. D	45. D	46. D	47. A	48. D
49. C	50. A	51. A	52. C	53. E	54. B
55. E	56. C	57. A	58. C	59. D	60. E
61. C	62. D	63. C	64. B	65. C	66. B
67. B	68. A	69. B	70. D	71. C	72. B
73. B	74. A	75. C	76. E	77. D	78. D
79. C	80. D	81. D	82. D	83. D	84. C
85. B	86. B	87. C	88. D	89. D	90. B
91. E	92. D	93. B	94. D	95. C	96. C
97. E	98. E	99. B	100. C	101. E	102. D