


GUOJIA YAODIAN ZHONGYAO CAISE TUJIAN

编著 ● 刘永新

以《中华人民共和国药典(2015年版)》为蓝本
600余种常用中药材
1200余幅高度清晰彩色图片



中医古籍出版社

Publishing House of Ancient Chinese Medical Books

国家药典 中药

图彩
鉴色



以《中华人民共和国药典（2015年版）》为蓝本


国家药典中药

彩色图鉴

GUO JIA YAO DIAN ZHONG YAO
CAI SE TU JIAN

编著 刘永新

中卷



中医古籍出版社

决明子 JUEMINGZI

别名

草决明，马蹄决明，千里光，假绿豆。

基源

决明子为豆科(Leguminosae)植物决明的干燥成熟种子。

植物形态

决明 *Cassia tora* L.

一年生亚灌木状草本，高 50 ~ 150cm，多分枝，被短柔毛。叶互生，偶数羽状复叶，叶柄上无腺体，在各对小叶间的叶轴上有 1 钻形暗红色腺体。小叶 3 对，倒卵形或倒卵状长圆形，长 2 ~ 6cm，宽 1.5 ~ 3.2cm，先端圆，基部楔形，全缘，幼时疏生柔毛。花成对腋生，顶部聚生，苞片线形，萼片 5，卵形或卵状披针形；外面有毛；花冠黄色，花瓣 5，基部有爪，下面 2 片稍长。雄蕊 10，3 个退化。荚果细长，四棱柱状，稍弯曲，长 8 ~ 15 ~ 24cm，宽 2 ~ 6mm，果梗长 2 ~ 4cm。种子多粒，棱柱形，褐绿色，光亮。花期 6 ~ 8 月。果期 8 ~ 10 月。

生境分布

生于村边、路旁、山坡等地。全国各地均有栽培。

采收加工

秋季采收成熟果实，晒干，打下种子，脱粒，除去杂质。

药材鉴别

四棱短圆柱形，一端钝圆，另一端倾斜并有尖头，长 4 ~ 6mm，宽 2 ~ 3mm。棕绿色或暗棕色，平滑，有光泽，背腹面各有 1 条凸起的棱线，棱线两侧各有 1 条脐点向合点斜向的浅棕线形凹纹。质坚硬。横切面种皮薄；胚肥大，灰白色，半透明；胚黄色，两片子叶重叠并呈“S”状折曲。微弱豆腥气，味微苦，稍带黏性。

炮制及饮片

1. 决明子 除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。
2. 炒决明子 取净决明子，清炒至微有香气。用时捣碎。

性味功能

味苦、甘、咸，微寒。有清肝明目，润肠通便的功能。

主治用法

用于高血压，头痛，眩晕，目赤涩痛，目暗不明，急性眼结膜炎，角膜溃疡，视物不清，青光眼，大便秘结，痈疖疮疡。用量 10 ~ 15g，水煎服。



决明果枝 *Cassia tora*



决明子 *Cassia tora*



决明花枝 *Cassia tora*

华山参 HUASHANSHEN

别名

热参。

基源

本品为茄科植物漏斗泡囊草（华山参）*Physochlaina infundibularis* Kuang 的干燥根。

植物形态

多年生草本。根粗壮，肉质，锥状圆柱形。茎直立，被毛，常数茎丛生。叶互生，卵形、宽卵形或三角状宽卵形，基部楔形下延，有时近截形或浅心形，全缘或微波状。伞房花序顶生或腋生；花萼钟形，裂片5，长椭圆形或长三角形，边缘及外面具白色毛茸；在果期膨大成球状的囊；花冠黄绿色，或边缘呈黄绿色，边缘以下呈紫褐色，裂片5，广卵形至三角形，花冠外面及边缘具毛茸；雄蕊5，着生于花冠管内下方；子房2室，花柱丝状。蒴果盖裂，包于囊状宿萼内。种子肾形。花期3~5月。果期5~6月。

生境分布

生于山坡、沟谷或草地。分布陕西、山西、河南等地。

采收加工

春季采挖，除去须根，洗净，晒干。

药材鉴别

本品呈长圆锥形或圆柱形，略弯曲，有的有分枝，长10~20cm，直径1~2.5cm。表面棕褐色，有黄白色横长皮孔、须根痕及纵皱纹，上部有环纹。顶端常有1至数



华山参 *Physochlaina infundibularis* Kuang

个根茎，其上有茎痕及疣状突起。质硬，断面类白色或黄白色，皮部狭窄，木部宽广，可见细密的放射状纹理。具烟草气，味微苦，稍麻舌。

炮制及饮片

除去杂质，洗净，晒干。用时捣碎。

性味功能

甘、微苦，热；有毒。止咳平喘，安神镇惊。

主治用法

用于寒痰喘咳，心悸失眠易惊，劳损体弱，自汗盗汗。用法用量，0.1~0.2g。

合欢皮 HEHUANPI

别名

合昏皮，夜合皮，合欢木皮。

基源

合欢皮为豆科 (Leguminosae) 植物合欢的干燥树皮。

植物形态

合欢 *Albizia julibrissin* Durazz. 别名：绒花树，芙蓉花。落叶乔木，高6~16m。树皮灰褐色，不裂或浅裂。

小枝灰褐色，有棱，皮孔明显。2回双数羽状复叶互生；托叶早落，羽片5~15对；每羽片小叶10~30对，无柄；小叶镰刀状长圆形，长6~12mm，宽1~4mm，先端尖，基部圆截形，不对称，全缘，夜晚闭合；叶缘及下面中脉有短柔毛，托叶线状披针形，早落。头状花序多数腋生或顶生，枝端呈伞房状；花淡红色；花萼小，筒状，有毛，先端5裂；花冠漏斗状，疏生短柔毛，5裂，裂片三角状卵形；雄蕊多数，基部结合成管状包围子房，上部分离，花丝细长，上部淡红色，伸出花冠管外；子房上位，花柱细长，几与花丝等长，柱头圆柱状。荚果扁平，长8~15cm，宽1~2.5cm，黄褐色，幼时有毛。种子椭圆形而扁平，褐色。花期6~8月。果期8~10月。



合欢皮饮片 *Albizia julibrissin*

生境分布

生于山谷、林缘、山坡地，多栽培于庭园中或路旁。分布于辽宁、河北、甘肃、宁夏、陕西、山东、河南及长江以南各省、自治区。

采收加工

夏、秋二季采收，剥取树皮，晒干。

药材鉴别

合欢皮呈卷曲筒状或半筒状，长40~80cm，厚0.1~0.3cm。外表面灰棕色，稍有纵皱纹，有的成浅裂纹，密生明显的椭圆形横向皮孔，棕色或棕红色，偶有突起的横棱或较大的圆形枝痕，常附有地衣斑；内表面淡黄棕色或黄白色，平滑，有细密纵纹。质硬而脆，易折断，断面纤维性片状，淡黄棕色或黄白色。气微香，味淡、微涩、稍刺舌。

炮制及饮片

除去杂质，洗净，润透，切丝或块，干燥。

性味功能

味甘，性平。有解郁安神，活血消肿，抗肿瘤的功能。



合欢皮饮片 *Albizia julibrissin*

主治用法

用于心神不安，忧郁失眠，健忘，肺脓疡，咯脓痰，痈肿，心胃气痛，风火眼疾，咽痛，瘰癧，筋骨折伤，跌扑伤痛。用量6~12g，水煎服。

合欢花 HEHUANHUA**别名**

夜合花，合欢米。

基源

合欢花为豆科 (Leguminosae) 植物合欢的干燥花序。

植物形态

合欢 *Albizia julibrissin* Durazz.

落叶乔木，高6~16m。树皮灰褐色，不裂或浅裂。小枝灰褐色，有棱，皮孔明显。2回双数羽状复叶互生；托叶早落，羽片5~15对；每羽片小叶10~30对，无柄；小叶镰刀状长圆形，长6~12mm，宽1~4mm，先端尖，基部圆截形，不对称，全缘，夜晚闭合；叶缘及下面中脉有短柔毛，托叶线状披针形，早落。头状花序多数腋生或顶生，枝端呈伞房状；花淡红色；花萼小，筒状，有毛，先端5裂；花冠漏斗状，疏生短柔毛，5裂，裂片三角状卵形；雄蕊多数，基部结合成管状包围子房，上部分离，花丝细长，上部淡红色，伸出花冠管外；子房上位，花柱细长，几与花丝等长，柱头圆柱状。荚果扁平，长8~15cm，宽1~2.5cm，黄褐色，幼时有毛。种子椭圆形而扁平，褐色。花期6~8月。果期8~10月。

生境分布


生于山谷、林缘、山坡地，多栽培于庭园中或路旁。分布于辽宁、河北、甘肃、宁夏、陕西、山东、河南及长江以南各省、自治区。

采收加工

夏季花开放时选择晴天采收，及时晒干。

药材鉴别

合欢花头状花序，皱缩成团。花细长而弯曲，长0.7~1cm，淡黄棕色至淡黄色，具短梗。花萼筒状，先端有5小齿；花冠筒长约为萼筒的2倍，先端5裂，裂片



合欢花枝 *Albizia julibrissin*

披针形；雄蕊多数，花丝细长，黄棕色，下部合生，上部分离，伸出花冠筒外。气微香，味淡。

性味功能

味甘，性平。有舒郁，理气，安神，活络，解郁安神的功能。

主治用法

用于心神不安，忧郁失眠。用量4.5~9g，水煎服。

地龙 DILONG

别名

曲蟥、坚蚕、引无、却行、寒欣、鸣砌、蚯蚓。

基源

为品为巨蚓科动物参环毛蚓 *Pheretima aspergillum* (E. Perrier)、通俗环毛蚓 *Pheretima vulgaris* Chen、威廉环毛蚓 *Pheretima guillelmi* (Michaelsen) 或栉盲环毛蚓 *Pheretima pectinifera* Michaelsen 的干燥体。前一种习称“广地龙”，后三种习称“沪地龙”。广地龙春季至秋季捕捉，沪地龙夏季捕捉，及时剖开腹部，除去内脏及泥沙，洗净，晒干或低温干燥。

动物形态

体长约60mm~120mm，体重约0.7~4g。最大的有1.5kg。生活在潮湿、疏松和肥沃的土壤中，身体呈圆筒形，褐色稍淡，约由100多个体节组成。前段稍尖，后端稍圆，在前端有一个分节不明显的环带。腹面颜色较浅，大多数体节中间有刚毛，在蚯蚓爬行时起固定支撑作用。在11节体节后，各节背部背线处有背孔，有利于呼吸，保持身体湿润。

生境分布

生于潮湿、疏松之泥土中，行运迟缓。

采收加工

分布于福建、广东、广西、江苏、浙江、湖北及上海、天津等地。

药材鉴别

1. 广地龙 呈长条状薄片，弯曲，边缘略卷，长15~20cm，宽1~2cm。全体具环节，背部棕褐色至紫灰色，腹部浅黄棕色；第14~16环节为生殖带，习称“白颈”，较光亮。体前端稍尖，尾端钝圆，刚毛圈粗糙而硬，色稍浅。雄生殖孔在第18节腹侧刚毛圈一小孔突上，外缘有数环绕的浅皮褶，内侧刚毛圈隆起，前面两边有横排（一排或二排）小乳突，每边10~20个不等。受精囊孔2对，位于7/8至8/9环节间一椭圆形突起上，约占节周5/11。体轻，略呈革质，不易折断。气腥，味微咸。

2. 沪地龙 长8~15cm，宽0.5~1.5cm。全体具环节，背部棕褐色至黄褐色，腹部浅黄棕色；受精囊孔3对，在6/7至8/9环节间。第14~16环节为生殖带，较光亮。第18环节有一对雄生殖孔。通俗环毛蚓的雄交配腔能全部翻出，呈花菜状或阴茎状；威廉环毛蚓的雄交配腔孔呈纵向裂缝状；栉盲环毛蚓的雄生殖孔内侧有1或多个小乳突。

炮制及饮片

除去杂质，洗净，切段，干燥。

性味功能

咸，寒。归肝、脾、膀胱经。热病惊狂、小儿惊风、咳喘、头痛目赤、咽喉肿痛、小便不通、风湿关节疼痛，半身不遂等症。

主治用法

外用涂丹毒、漆疮等症。用法用量，4.5~9g。



地龙

地枫皮 DIFENGPI

别名

钻地枫、风榔、矮丁香。

基源

为八角科植物地枫皮的树皮或枝皮。

植物形态

常绿灌木，高1~3m；全株具芳香气味。树皮灰棕色。叶3~5聚生枝顶或节上；叶厚革质，有光泽，倒披针形至长椭圆形，先端短渐尖，基部楔形，全缘，无毛；密布褐色油点。花红色或紫红色，腋生或近顶生；花被片15~20，宽卵形，下凹，肉质；雄蕊多数；心皮12~13枚。聚合果由9~11果组成，果顶端喙细尖，常内弯。种子扁卵形，



地枫皮 *Illicium difengpi* K.I.B.etK.I.M.

黄色,光亮。花期4~5月,果期8~9月。

生境分布

生于石灰岩山的石缝中或疏林下。分布于广西西南部及南部。

采收加工

春、秋二季剥取树皮或枝皮,晒干。

药材鉴别

本品呈卷筒状或槽状,长5~15cm,直径1~4cm,厚0.2~0.3cm。外表面灰棕色至深棕色,有的可见灰白色地衣斑,粗皮易剥离或脱落,脱落处棕红色。内表面棕色或棕红色,具明显的细纵皱纹。质松脆,易折断,断面

颗粒状。气微香,味微涩。

炮制及饮片

除去杂质,洗净,打碎,晒干。

性味功能

味涩、微辛,性温;有小毒。有祛风除湿、行气止痛的功能。

主治用法

用于风湿性关节痛、腰肌劳损等症。用量6~9g。

地肤子 DIFUZI

别名

竹帚子,帚莱子,铁帚把子,扫帚子。

别名

扫帚子,扫帚草,扫帚苗。

基源

地肤子为藜科(Chenopodiaceae)植物地肤的干燥成熟果实。

植物形态

地肤 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.

一年生草本。株高50~100cm。根略成纺锤形。茎直立,多分枝,淡绿色或带紫红色,具多数纵棱。叶披针形或线状披针形,长2~5cm,宽3~7mm,先端短渐尖,基部渐狭,常具3条明显的主脉,边缘具疏生的锈色绢状缘毛;茎上部叶较小,无柄,1脉。花两性或雌性,常1~3个簇生于叶腋,构成穗状圆锥花序;花被近球形,淡绿色,花被裂片近三角形;翅端附属物三角形至倒卵形,有时近扇形,膜质,边缘微波状或具缺刻;花丝丝状,花药淡黄色;柱头2,丝状,紫褐色。胞果扁球形。种子卵形,黑褐色,稍有光泽;胚环形,外胚乳块状。花期6~9月,果期7~10月。

生境分布

生于山野荒地、田野、路旁或庭院栽培,分布于全国各地。

采收加工

秋季果实成熟时采收植株,晒干,打下果实,除去杂质。

药材鉴别

地肤子 扁球状五角星形,直径1~3mm。外被宿存花被,灰绿色或浅棕色,周围具5枚三角状膜质小翅,先端有缺刻状浅裂,下面中心有微突起点状果梗痕及放射状脉纹5~10条;果皮膜质,半透明,质脆易剥离;种子扁卵形,褐棕色,有网状皱纹,长约1.5mm,黑色。胚绿黄,油质,胚乳白色。气微,味微苦。

性味功能

味辛、苦,性寒。有清热利湿,祛风止痒的功能。



地肤花枝 *Kochia scoparia*



地肤子 *Kochia scoparia*

主治用法

用于小便涩痛,阴痒带下,风疹,湿疹,皮肤瘙痒,荨麻疹。用量9~15g。外用适量,煎水洗患处。

地骨皮 DIGUPI

别名

枸杞根, 枸杞根皮, 狗奶子根皮。

基源

地骨皮为茄科 (Solanaceae) 植物枸杞或宁夏枸杞的干燥根皮。

植物形态

1. 枸杞 *Lycium chinense* Mill.

落叶灌木, 高达2m。主根长, 有支根。茎多分枝, 枝条细长, 幼枝有棱, 浅灰黄色, 无毛, 常具棘刺, 生于叶腋, 长0.5~2cm。叶互生或2~3片簇生, 叶柄短, 长0.5~1cm, 叶卵形, 卵状菱形或卵状披针形, 长2~5cm, 宽0.5~2.5cm, 栽培者长达10cm, 宽4cm, 先端锐尖或急尖, 基部楔形, 全缘, 两面无毛。花在长枝上生, 或双生在短枝上簇生, 花梗长1~2cm; 花萼长3~4mm, 先端3中裂或4~5齿裂, 裂片有缘毛, 基部有耳; 花冠漏斗状, 长9~12mm, 管下部急缩, 后向上扩大, 5裂, 裂片与筒部等长或稍短于筒部, 长卵形, 边缘具缘毛, 花冠筒内雄蕊着生处具绒毛一轮; 雄蕊5, 着生于花筒内, 花药丁字形着生, 花丝伸出花筒外, 长约7mm; 花盘5裂; 子房长卵形, 花柱细, 伸出花冠筒处, 柱头头状。浆果卵圆形或长圆形, 长7~15mm, 深红色。种子多数, 长扁肾形, 长约2.5~3mm, 黄色。花期6~9月。果期7~11月。

2. 宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L.

落叶灌木, 高1~3m。茎直立, 主枝多条, 粗壮, 淡灰黄色, 上部分枝细长弱, 先端弯曲下垂, 短枝刺状, 长1~4cm。叶互生或数片簇生于短枝或长枝顶上; 叶稍厚, 狭披针形或披针形, 长2.5~6cm, 宽0.5~1.5cm, 先端尖, 基部楔形, 下延成叶柄, 全缘, 上面深绿色, 下面灰绿色, 无毛。花单生或数朵簇生于长枝上部叶腋; 花细, 长1.5~2cm; 花萼杯状, 先端2~3裂, 先端边缘有纤毛; 花冠漏斗状, 筒部顶端5裂, 裂片卵形, 向后反卷, 粉红色或浅紫红色, 有暗紫色脉纹, 边缘有纤毛; 雄蕊5, 生于花冠中部, 花丝细, 不等长, 花药长圆柱形, 纵裂; 子房上位, 2室, 柱头头状。浆果倒卵形或卵形, 红色或橘红色。种子多数, 扁平肾形。花期5~6月。果期6~11月。

生境分布

枸杞生于荒山坡, 路边或丘陵地带。分布于全国大部分省区。宁夏枸杞生于干山坡、渠畔, 分布于河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等省区。宁夏有大量栽培。

采收加工

全年可采挖, 一般在立冬至次年清明前采挖根部, 洗净泥土, 剥取根皮, 晒干。

药材鉴别

干燥根皮呈筒状或槽状卷片, 大小不一, 一般长3~10cm, 宽0.5~2cm, 厚1~4mm。外表面灰黄色或黄棕色, 粗糙, 栓皮疏松, 有不规则的纵裂纹, 易呈鳞片脱落。



枸杞果枝 *Lycium chinense*



地骨皮 (枸杞 *Lycium chinense*)

内表面黄白色或灰黄色, 较平坦, 有细纵纹。质轻脆, 易折断, 断面不平坦, 外层栓皮黄棕色, 内层灰白色。气微香, 味微甜而后稍苦。

炮制及饮片

除去杂质及残余木心, 洗净, 晒干。

性味功能

味甘, 淡, 性寒。有清虚热, 清肺火, 凉血止血的功能。

主治用法

用于虚劳发热, 有盗汗骨蒸, 肺热咳嗽, 喘息, 血热吐血, 小便出血, 咯血, 衄血, 消渴等症。用量9~15g, 水煎服。

地黄 DIHUANG; 熟地黄 SHOUDIHUANG

别名

生地, 生地黄。

基源

地黄为玄参科 (Scrophulariaceae) 植物地黄的新鲜或干燥块根。熟地黄为生地黄的炮制加工品。

植物形态

地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 别名: 蜜蜜罐, 野生地。

多年生草本, 高 10 ~ 35cm, 全株密生灰白色长柔毛及腺毛。根肥厚肉质, 圆柱形或纺锤形。叶基生成丛, 倒卵状披针形, 长 3 ~ 10cm, 宽 1.5 ~ 4cm, 先端钝, 基部渐狭下延成长柄, 叶面多皱, 边缘有不整齐钝齿。花茎圆柱形, 单生或 2 ~ 3 枝丛生; 苞片叶状; 总状花序, 花萼钟状, 先端 5 裂, 花冠宽筒状, 稍弯曲, 长 3 ~ 4cm, 外面暗紫色, 内面带黄色, 有明显紫纹, 先端 5 浅裂, 稍二唇状; 雄蕊 4, 二强, 着生于花冠筒基部; 子房上位, 卵形, 2 室, 花后渐变 1 室, 柱头膨大。蒴果球形或卵圆形, 先端尖, 上有宿存花柱, 外为宿存花萼所包。种子多数。花期 4 ~ 5 月。果期 5 ~ 6 月。

生境分布

生于山坡、路旁或栽培。分布于华北及辽宁、陕西、河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、四川等省区。

采收加工

秋季采收, 除去芦头、须根及泥沙, 鲜用; 或将鲜生地缓缓烘焙至八成干。前者习称“鲜地黄”, 后者称“生地黄”。

药材鉴别

1. 鲜地黄 为纺锤形或条状, 长 8 ~ 24cm, 直径 2 ~ 9cm, 外皮薄, 浅黄色, 具弯曲的纵皱纹、横长皮孔及不规则疤痕。肉质, 易断, 断面皮部淡黄白色, 木部黄白色, 导管呈放射状排列。气微, 味微甜、微苦。

2. 生地黄 为不规则的团块状或长圆形, 中间膨大, 两端稍细, 长 6 ~ 12cm, 直径 3 ~ 6cm。有的细小, 长条状, 稍扁而扭曲。棕黑色或棕灰色, 极皱缩, 具不规则的横皱纹。体重, 质较软而韧, 不易折断, 断面棕黑色或乌黑色, 有光泽, 具黏性。无臭, 味微甜。

3. 熟地黄 为不规则的块片、碎块, 大小、厚薄不一。乌黑色, 有光泽, 黏性大。质柔软而带韧性, 不易折断, 断面乌黑色, 有光泽。无臭, 味甜。

炮制及饮片

1. 生地片 将鲜地黄缓缓烘焙至八成干时, 捏成团块, 切片后干燥。

2. 熟地黄

① 蒸熟地黄 取生地置容器内蒸至黑润为度, 取出晒至八成干, 切片, 再晒干。

② 酒熟地黄 取生地置罐内容器内, 加黄酒 (生地每 100kg 加黄酒 50kg), 盖严, 隔水蒸至酒被吸尽, 取出晒至外皮粘液稍干时, 切片晒干。



地黄 *Rehmannia glutinosa*



生地黄药材 *Rehmannia glutinosa*

性味功能

1. 鲜地黄 味甘、苦, 性大寒。有清热生津, 凉血止血的功能。

2. 生地黄 味甘、苦, 性寒。有滋阴清热, 凉血止血的功能。

3. 熟地黄 味甘, 性微温。有滋阴补血, 益精填髓的功能。

主治用法

1. 鲜地黄 用于温病热盛, 烦躁口渴, 发斑发疹, 吐血, 衄血, 尿血, 咽喉肿痛。用量 12 ~ 30g, 水煎服。

2. 生地黄 用于热病烦躁, 发斑发疹阴虚低热, 消渴, 吐血, 衄血, 尿血, 崩漏。用量 9 ~ 15g, 水煎服。

3. 熟地黄 用于肝肾阴虚, 腰膝酸软, 骨蒸潮热, 盗汗遗精, 内热消渴, 血虚萎黄, 心悸怔忡, 月经不调, 崩漏下血, 眩晕, 耳鸣, 须发早白。用量 9 ~ 15g, 水煎服。

地榆 Diyu

别名

白地榆, 鼠尾地榆, 黄瓜香, 绵地榆, 红地榆, 马猴枣。

基源

地榆为蔷薇科 (Rosaceae) 植物地榆和长叶地榆的干燥根。

植物形态

1. 地榆 *Sanguisorba officinalis* L.

多年生草本, 高 50 ~ 150cm。根茎粗壮, 生多数纺锤形或长圆柱形根。茎上部分枝。单数羽状复叶, 基生叶有长柄; 小叶 4 ~ 6 对, 小叶卵圆形或长圆状卵形, 先端尖或钝圆, 基部心形或微心形, 边缘粗锯齿, 小叶柄基部有小托叶; 茎生叶有短柄, 小叶长圆形或长圆状披针形, 长 2 ~ 7cm, 宽 0.5 ~ 3cm, 基部心形或楔形, 托叶镰刀状抱茎, 有齿。花密集成近球形或短圆柱形穗状花序, 花序长 1 ~ 4cm, 直径约 1cm, 花暗紫色、紫红色或红色; 每小花有膜质苞片 2; 萼片 4, 短小, 宿存; 无花冠; 雄蕊 4, 花丝丝状; 花药黑紫色; 子房上位。瘦果暗棕色, 有细毛。花期 6 ~ 7 月。果期 8 ~ 9 月。

2. 长叶地榆 *Sanguisorba officinalis* L. var. *longifolia* (Bert.) Yu et Li 别名: 绵地榆。

与地榆的主要区别: 根富纤维性, 折断面呈细毛状。基生小叶线状长圆形至线状披针形, 基部微心形至宽楔形, 茎生叶与基生叶相似, 但较细长。穗状花序圆柱形, 长 2 ~ 6cm, 直径通常 0.5 ~ 1cm。花果期 8 ~ 11 月。

生境分布

地榆生于山坡、林缘、草原、灌丛或田边, 分布于东北、华北及陕西、甘肃、河南、山东、江苏、浙江、江西、湖北、四川、贵州、云南等省区; 长叶地榆生于山坡草地、溪边、灌丛、湿草地, 分布于黑龙江、辽宁、河北、山西、河南、山东及长江以南各地区。

采收加工

春季返青或秋季枯萎后采挖, 除去根茎及须根, 洗净, 晒干或趁鲜切片晒干。

药材鉴别

1. 地榆 根圆柱形, 中、下部常膨大成不规则纺锤形, 稍弯曲, 长 5 ~ 20cm, 直径 0.5 ~ 2cm; 棕色或暗棕紫色, 粗糙, 有多数纵皱纹或有细根。质硬脆, 断面较平坦, 粉红色或淡黄色, 木部色淡, 放射状纹理。气微, 味微苦而涩。

2. 长叶地榆 常自短粗根茎分出数条长圆柱形根。棕色至暗紫色, 粗糙, 有多数纵皱纹。质坚硬, 断面较平坦, 粉红色, 木部色淡。无臭, 味微苦而涩。

炮制及饮片

1. 地榆 除去杂质; 未切片者, 洗净, 除去残茎, 润透, 切厚片, 干燥。

2. 地榆炭 取净地榆片, 炒至表面焦黑色、内部棕褐色。



地榆 *Sanguisorba officinalis*



地榆饮片 (地榆 *Sanguisorba officinalis*)

性味功能

味苦、酸, 性微寒。有凉血止血, 清热解毒, 生肌敛疮功能。

主治用法

用于月经过多, 关节炎, 便血, 血痢, 痔疮出血, 尿血, 崩漏, 痈肿疮毒, 烧伤, 烫伤。用量 9 ~ 15g。水煎服或入丸散。外用适量, 研末调敷患处。

地锦草 DIJINCAO

别名

血见愁，血风草，铺地锦。

基源

地锦草为大戟科 (Euphorbiaceae) 植物地锦或斑地锦的干燥全草。

植物形态

1. 地锦 *Euphorbia humifusa* Willd.

一年生草本。茎纤细，多分枝，平卧，常带红色，具疏柔毛或无毛。叶对生，长圆形，长5~10mm，宽3~7mm，先端钝圆，基部偏斜，叶缘具细齿；叶柄短；托叶细锥形，羽状细裂。杯状聚伞花序，单生于分枝的叶腋，总梗短或无梗。总苞倒圆锥形，长约1mm，顶端4裂；裂片膜质，长三角形，裂片间有腺体。腺体扁椭圆形，具花瓣状附属物。子房3室；花柱3，顶端2裂。蒴果，近球形，径约2mm，无毛。种子卵形，长约1mm，具灰白色细毛。花期6~9月，果期7~10月。

2. 斑地锦 *Euphorbia maculata* L. 别名：血筋草。

极似地锦草，但斑地锦茎密被白色细柔毛，叶上面中央有长线状紫红色斑。叶和蒴果被稀疏白色短柔毛，种子灰红色。

生境分布

地锦生于原野荒地、路旁、田间，分布几遍全国。斑地锦生于荒地、路旁、田间，分布于山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西等地区。

采收加工

夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

药材鉴别

常皱缩卷曲，根细小。茎细，呈叉状分枝，表面带紫红色，光滑无毛或疏生白色细柔毛；质脆，易折断，断面黄白色，中空。单叶对生，具短柄或几无柄；叶片多皱缩或已脱落，展平后呈长椭圆形，长5~10mm，宽4~6mm；绿色或带紫红色，通常无毛或疏生细柔毛；先端钝圆，基部偏斜，边缘具小锯齿或呈微波状。杯状聚伞花序腋生，细小。蒴果三棱状球形，表面光滑。种子细小，卵形，褐色。无臭，味微涩。

炮制及饮片

除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。



地锦 *Euphorbia humifusa*



地锦草药材 (地锦 *Euphorbia humifusa*)

性味功能

味辛，性平。有清热解毒，凉血止血的功能。

主治用法

用于痢疾，肠炎，咳血，尿血，便血，崩漏，疮疖肿痛，湿热黄疸，乳汁不下。用量9~20g，水煎服。鲜品30~60g。

安息香 ANXIXIANG

别名

白花榔。

基源

为安息香科植物白花树 *Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib ex Hart. 的干燥树脂。树干经自然损伤或于夏、秋二

季割裂树干，收集流出的树脂，阴干。

植物形态

乔木，高10~20m。树皮绿棕色，嫩枝被棕色星状毛。叶互生，长卵形，长达11cm，宽达4.5cm，叶缘具不规则齿牙，上面稍有光泽，下面密被白色短星状毛；叶

柄长约1cm。总状或圆锥花序腋生及顶生，被毡毛；苞片小，早落；花萼短钟形，5浅齿；花冠5深裂，裂片披针形，长约为萼筒的3倍；花萼及花瓣外面被银白色丝状毛，内面棕红色；雄蕊8~10，花药线形，2室；子房上位，卵形，密被白色茸毛，下部2~3室，上部单室，花柱细长，棕红色。果实扁球形，长约2cm，灰棕色。种子坚果状，红棕色，具6浅色纵纹。

生境分布

野生或栽培于稻田边。分布于印度尼西亚的苏门答腊及爪哇，江西、福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南等地。

采收加工

生长10年以上的健壮成龄树，在夏、秋两季割脂。割脂前，先进行乙烯利处理，于距离地面9~12cm的树干基部，在同一水平线上按等距离用小刀浅刮树皮3处，然后将10%乙烯利油剂薄薄地在刮面上刷1层，刷药要在晴天进行，处理后9~11d，即可开割。一个割脂周期内平均单株产量200~250g。收集的液状树脂放阴凉处，自然干燥变白后，用纸包好放木箱内贮藏。树脂受热易融化，切忌阳光曝晒。

药材鉴别

不规则的小块，稍扁平，常粘结成团块。表面橙黄色，具蜡样光泽（自然出脂）；或为不规则的圆柱状、扁平块状，表面灰白色至淡黄白色（人工割脂）。质脆，易碎，断面平坦，白色，放置后逐渐变为淡黄棕色至红棕色。加热则软化熔融。气芳香，味微辛，嚼之有砂粒感。

炮制及饮片

酒制 取安息香加酒与水煮4~5小时至成粉膏状，或煮至沉于底部凝成块时，取出晒干。

性味功能

辛、苦，平。归心、脾经。开窍清神，行气活血，止痛。

主治用法

用于中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，心腹疼痛，产后血晕，小儿惊风。用法用量，0.6~1.5g，多入丸散用。



安息香

延胡索 YANHUSUO

别名

延胡，玄胡索，元胡索，元胡。

基源

延胡索为罂粟科 (Papaveraceae) 植物延胡索的干燥块茎。

植物形态

延胡索 *Corydalis yanhusuo* W. T. Wang .

多年生草本，高10~20cm。块茎扁球状，直径0.5~2.5cm，黄色。茎纤细，稍肉质。基生叶与茎生叶同形，有柄；茎生叶互生，2回三出，第2回深裂，末回裂片披针形、长圆形或狭椭圆形，长2~3.5cm，宽6~8mm，先端钝或锐尖，全缘或有缺刻。总状花序顶生或与叶对生；苞片阔披针形，全缘或有少数牙齿或3~5裂，花红紫色，长约2cm，小花梗长约6mm；萼片2，早落；花瓣4，外轮2片稍大，上部1片边缘波状，顶端微凹，凹部中央有突尖，



延胡索花株 *Corydalis yanhusuo*

尾部延伸成长距，距长约占全长的一半，内轮2片比外轮2片小；雄蕊6，花丝连合成两束；子房扁柱形，花柱细短，柱头似蝴蝶状。蒴果线形。花期4月。果期5~6月。

生境分布

生长于溪流两岸或山脚的沙质壤土或沙土中，分布于江西、江苏、安徽、浙江、河南、湖北等省。全国多数地区有栽培，主产于浙江。

采收加工

栽培元胡5~6月间采挖，收获最适宜，折干率较高。采挖后分别装在竹箩里，洗净泥土，放入开水中略煮3~6分钟至块茎内部中心有芝麻样小白点时为度，立即捞起晒干。野生土元胡一般在植物生长末期或花期采挖，因为过迟难于寻找，但此时采挖药材质量较差，总碱含量较低。

药材鉴别

块茎扁圆形或倒圆锥形，直径0.5~2cm。灰黄或黄棕色，表皮脱落处显灰棕色。上端凹陷，有茎痕，底部中央稍凹陷脐状或底部呈圆锥状突起。质坚硬脆，断面金黄色，角质样，有蜡样光泽。气微，味极苦。

炮制及饮片

1. 延胡索 除去杂质，洗净，干燥，切厚片或用时捣碎。
2. 醋延胡索 取净延胡索，加入适量醋，炒干或煮至醋吸尽，切厚片或用时捣碎。



延胡索药材 *Corydalis yanhusuo*

性味功能

味苦、辛，性温。有活血散瘀，利气止痛功能。

主治用法

用于全身各部气滞血瘀之痛，痛经，经闭，癥瘕，产后瘀阻，跌扑损伤，疝气作痛。用量3~9g，水煎服。孕妇忌服。

当归 DANGGUI

别名

马尾归，秦归，云归，西当归。

基源

当归为伞形科(Umbelliferae)植物当归干燥根。

植物形态

当归 *Angelica sinensis* (Oliv.)Diels.

多年生草本，高30~100cm。全株有特异香气。主根粗短，肥大肉质。茎直立，带紫色，有纵沟。叶互生，叶柄长3~13cm，基部膨大呈鞘状抱茎；叶为2~3回奇数羽状复叶，最终裂片卵形或椭圆形，小叶3对，近顶端的一对无柄，1~2回分裂，裂片边缘有缺刻。复伞形花序，顶生，伞梗10~14枚，长短不等，基部有2枚线形总苞片或缺；小总苞片2~4枚，线形；每一小伞形花序有花12~36朵，小伞梗长3~15mm，密被细柔毛；萼齿5，细卵形；花瓣5，白色，长卵形，先端狭尖略向内折；雄蕊5，花丝向内弯；子房下位，花柱短，花柱基部圆锥形。双悬果椭圆形，长4~6mm，宽3~4mm，成熟后易从合生面分开；分果有果棱5条，背棱线形隆起，侧棱发展成宽而薄的翅，翅边缘淡紫色，背部扁平，每棱槽有1个油管，接合面2个油管。花期7月，果期8~9月。

生境分布

生于海拔1800~2500m的高寒阴湿地方。栽培于甘

肃、四川、云南、湖北、陕西、贵州等省区。

采收加工

秋末采挖，除去须根及泥沙，待水分稍蒸发后，捆成小把，上棚，用烟火慢慢熏干。当归不宜太阳晒。



当归花株 *Angelica sinensis*

药材鉴别

主根粗短，肥大肉质，圆柱形，下部有多数粗长支根，黄棕色，具纵皱纹及横长皮孔。根头（归头）直径1.5~4cm，具环纹，上端圆钝，有紫色或黄绿色的茎及叶鞘的残基；主根（归身）表面凹凸不平；支根（归尾）直径0.3~1cm，上粗下细，多扭曲，有少数须根痕。质柔韧，断面黄白色或淡黄棕色，皮部厚，有裂隙及多数棕色点状分泌腔，木部色较淡，形成层环黄棕色。有浓郁的香气，味甘、辛、微苦。

炮制及饮片

1. 当归 除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干或低温干燥。

2. 酒当归 取净当归片，酒炖或酒蒸至酒吸尽，炒干。本品为类圆形或不规则薄片，切面有浅棕色环纹，质柔韧，深黄色，略有焦斑。味甘、微苦，香气浓厚，有酒香气。

性味功能

味甘、辛，性温。有补血活血，调经止痛，润肠通便的功能。



当归饮片 *Angelica sinensis*

主治用法

用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。用量4.5~9g，水煎服。

当药 DANGYAO

别名

瘤毛、獐牙菜。

基源

龙胆科植物瘤毛獐牙菜 *Swertia pseudochinensis* Hara 的干、全草。

植物形态

瘤毛獐牙菜 *Swertia pseudochinensis* Hara.

一年生草本，高15~30cm。根通常黄色，粗壮，味苦。茎直立，四棱形，沿棱具窄翅，有时具微点状突起，通常多分枝。叶对生，线状披针形或线形，长1.5~4cm，宽2~6mm，先端长渐尖，全缘，基部渐狭，无毛。花梗直立，长10~25mm；花5基数；萼片长10~15mm，先端锐尖或渐尖；花冠淡蓝紫色，管部长1~1.5mm，裂片窄卵形，先端渐尖，基部具2囊状淡黄色腺窝，其边缘具白色流苏状长毛；花药狭椭圆形，长2.5~3mm。花果期9~10月。

生境分布

生于海拔500~1600m的溪边、山坡、林下、灌丛。分布于河北、内蒙古、宁夏、陕西、山东、山西。

采收加工

夏、秋二季采挖，除去杂质，晒干。

药材鉴别

本品长10~40cm。根呈圆锥形，黄色，断面类白色。茎方柱形，多分枝，黄绿色或黄棕色带紫色；质脆，易折断，断面中空。叶对生，无柄；呈条状披针形，先端渐尖，基部狭，全缘。圆锥状聚伞花序顶生或腋生。花萼5深裂，裂片线形。

花冠淡蓝色，5深裂，裂片内侧有2腺体，其周围有长毛。蒴果椭圆形。气微，味苦。

炮制及饮片

除去杂质，迅速洗净，润透，切段，干燥。

性味功能

苦、寒。归肝、胃、大肠经。有清湿热，健胃的功能。

主治用法

用于湿热黄疸，胁痛，痢疾腹痛，食欲不振。用量6~12g，水煎服。儿童酌减。



毛獐牙菜 *Swertia pseudochinensis*

朱砂 ZHUSHA

别名

朱砂。

基源


本品为三方晶系。我国大部分地区均有分布。

性味功能

甘，微寒，无毒。

主治用法

身体五脏百病，养精神，安魂魄，益气明目，杀精魅邪恶鬼。久服通神明不老。能化为汞。



朱砂 cinnabar

朱砂根 ZHUSHAGEN

基源

为紫金牛科植物朱砂根的根。

植物形态

常绿灌木；根状茎肉质柔软，微红色，断面有小血点。单中叶互生，革质或坚纸质，狭椭圆形，先端钝尖，基部楔形，边缘有圆齿，具腺点。伞形花序顶生，花小，淡紫白色有深色腺点，花5数；子房上位。核果球形，红色，有稀疏黑腺点，有宿存花萼和细长花柱。花期5~7月，果期9~12月。

生境分布

生于林下或灌丛中。分布于长江以南各等省区。

采收加工

秋季采挖，切碎，晒干。

药材鉴别

干燥根，多分枝，呈细圆柱状，略弯曲，长短不一，径4~10mm。表面暗紫色或暗棕色，有纵向皱纹及须根痕。质坚硬，断面木部与皮部易分离，皮部发达，约占断面1/2，淡紫色，木部淡黄色。

炮制及饮片

1. 净制 除去杂质，洗净。
2. 切制 洗净，切碎，晒干。

性味功能

味苦、辛，性平。有清热解毒，消肿止痛，活血散瘀，祛风除湿的功能。

主治用法

用于咽喉肿痛，白喉，扁桃腺炎，淋巴节炎，跌打损伤，风湿痹痛等症。外用于外伤肿痛，毒蛇咬伤。



朱砂根 Ardisia crenata Sims

灯心草 DENGXINCAO

别名

虎须草，赤须，灯心，灯草。

基源

灯心草为灯心草科(Juncaceae)植物灯心草的茎髓。

植物形态

灯心草 *Juncus effusus* L.

多年生草本，高40~100cm。根茎横走，具多数须根。茎丛生，直立，圆柱状，直径1.5~4mm，绿色，具纵条纹；髓部白色，下部鞘状叶数枚，长至15cm，红褐色或淡黄色，上部的绿色，有光泽；叶片退化呈刺芒状。花序聚伞状，假侧生，多花，密集或疏散；总苞圆柱状，直立，长5~20cm；花小，淡绿色，具短柄；花被片6，2轮，条

状披针形，外轮稍长，边缘膜质；雄蕊3，稀为6，较花被短；雌蕊1，子房上位，3室，柱头3裂。蒴果卵状三棱形或椭圆形，3室，顶端钝或微凹，略与花被等长或稍长。种子多数，卵状长圆形，长约0.4mm，褐色。花期5~6月，果期6~7月。

生境分布

生于湿地、沼泽边、溪边、田边等潮湿地带。分布于全国各地。

采收加工

夏、秋季采收地上部，晒干，用刀顺茎划开皮部，剥出髓心，捆把。

药材鉴别

呈细长圆柱形，长可达90cm，直径1~3mm，表面乳白色或淡黄色，有凸起的细纵纹及极细的孔隙。质轻而柔软，有弹性，易拉断，断面不平，白色。

炮制及饮片

1. 灯心草 除去杂质，剪段。
2. 灯心炭 取净灯心草，焖煨至透，放凉，取出。

性味功能

味甘、淡，性微寒。有清心火，利小便的功能。

主治用法

用于心烦失眠，尿少涩痛，口舌生疮。用量1~3g，水煎服。



灯心草果株 *Juncus effusus*



灯心草药材 *Juncus effusus*

灯盏细辛 DENGZHANXIXIN

别名

地顶草、灯盏花地朝阳、双葵花、东菊、灯盏草、牙陷药、罐儿草。

基源

菊科飞蓬属植物短茎飞蓬 *Erigeron breviscapus* (Vaniot) Hand.-Mazz., 以全草或根入药。

植物形态

多年生草本，高20~30cm。根茎粗壮，其上密生纤细的须根。叶为单叶，基生叶密集，匙形，长3~5cm，宽1.2~1.5cm，两面有毛，边缘常皱波状，基部下延成柄，柄带红色；茎生叶长圆形，长仅2cm，宽约0.6cm。头状花序顶生，常单个，边缘有2列紫色舌状花，中央为黄包管状花。瘦果扁平，有柔软的冠毛。花期夏季。



灯盏细辛

生境分布

生于山地疏林下、草丛或向阳坡地。分布于湖南、广西、四川、贵州、云南及西藏等地。

采收加工

秋季茎叶茂盛花开放时采收，洗净，鲜用或晒干。

药材鉴别

气微香，味辛、微苦。以根茎粗壮、细根多、色绿黄者为佳。

性味功能

味辛、微苦，性温。有散寒解表，祛风除湿，活络止痛的功能。

主治用法

用于感冒头痛，牙痛，胃痛，风湿疼痛，脑血管意外引起的瘫痪，骨髓炎。9 ~ 15g，水煎服，或研末蒸鸡蛋吃，或泡酒服。



灯盏细辛药材

161



百合 BAIHE

别名

白百合。

基源

百合为百合科 (Liliaceae) 植物卷丹、百合或细叶百合的干燥肉质鳞叶。

植物形态

1. 卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb. 别名：山百合。

多年生草本。鳞茎宽卵状球形，白色，鳞片叶宽卵形。茎直立，常带紫色条纹，具白色绵毛。叶互生，长圆状披针形或披针形，两面近无毛，先端具白毛，叶缘具乳头状突起，具5 ~ 7脉，上部叶腋具珠芽。花3 ~ 6朵或更多，苞片叶状，卵状披针形；花下垂，花被片披针形，反卷，橙红色，具紫黑色斑点，蜜腺两边具乳头状突起；雄蕊6，向四面开张，淡红色；子房圆柱形；柱头膨大，3裂。蒴果，狭长卵形，长3 ~ 4cm。花期7 ~ 8月，果期8 ~ 10月。

2. 百合 *Lilium brownii* F.E. Brown var. *viridulum* Baker. 别名：野百合。

鳞茎球形，直径2 ~ 4.5cm；鳞片披针形，长1.8 ~ 4cm，宽0.8 ~ 1.4cm，无节，白色。茎高0.7 ~ 2m，有的有紫色条纹，有的下部有小乳头状突起。叶散生，通常自下向上渐小，叶倒披针形至倒卵形，长7 ~ 15cm，宽(0.6 ~ 1) ~ 2cm，先端渐尖，基部渐狭，有5 ~ 7条脉，全缘，两面无毛。花单生或几朵排成近伞形；花梗长3 ~ 10cm，稍弯；苞片披针形，长3 ~ 9cm，宽0.6 ~ 1.8cm；花喇叭状，有香气，乳白色，外面稍带紫色，无斑点，向外张开或先端外弯而不卷，长13 ~ 18cm；外轮花被片宽2 ~ 4.3cm，先端尖；内轮花被片宽3.4 ~ 5cm，蜜腺两边有乳头状突起；雄蕊向上弯，花丝长10 ~ 13cm，中部以下密被柔毛，少有具稀疏的毛或无毛；花药长椭圆形，长1.1 ~ 1.6cm；子



百合花株 *Lilium brownii* var. *viridulum*

房圆柱形，长3.2 ~ 3.6cm，宽4mm；花柱长8.5 ~ 11cm，柱头3裂。蒴果矩圆形，长4.5 ~ 6cm，宽约3.5cm，有棱，具多数种子。花期5 ~ 6月，果期9 ~ 10月。

3. 细叶百合 *Lilium pumilum* DC. 别名：山丹。

草本，高30 ~ 60cm。鳞茎圆锥形，高2.5 ~ 4cm，直径1.8 ~ 3.5cm。茎细，圆柱形，绿色。叶密集，互生，无柄，窄条形，长3 ~ 14cm，宽1 ~ 3mm，先端锐尖。花1 ~ 3朵，下垂，鲜红色，花被片长3 ~ 4.5cm，宽