

高级卫生专业技术资格考试用书

妇产科护理学习题集

(副主任护师/主任护师)

丁淑贞 戴 红◎主编

系统梳理学科理论

条分缕析知识要点

活化临床思维模式

全面提升专业技能



中国协和医科大学出版社

高级卫生专业技术资格考试用书

妇产科护理学习题集

(副主任护师/主任护师)

主 编 丁淑贞 戴 红

副主编 郝春艳 魏 冰 黄芳艳 王 涛

编 者 (按姓氏笔画排序):

丁淑贞	马丽梅	王 涛	王月珠	王庆华	王丽莹
王建荣	王淑云	冯 红	刘春鸣	孙晗潇	李世博
李雪雁	邹 辉	张 平	张 杰	张 彤	范喜瑛
赵英杰	赵春慧	赵瑾瑶	郝春艳	徐曼姗	高筱琪
黄芳艳	梁 艳	韩 莉	谭 燕	翟 艳	潘 杰
戴 红	魏 冰				



中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

妇产科护理学习题集 / 丁淑贞, 戴红主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. 1

高级卫生专业技术资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0801 - 7

I. ①妇… II. ①丁… ②戴… III. ①妇产科学 - 护理学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①

R473.71 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 235894 号

高级卫生专业技术资格考试用书

妇产科护理学习题集

主 编: 丁淑贞 戴 红

责任编辑: 吴桂梅

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260431)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 开

印 张: 22.25

字 数: 360 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5679 - 0801 - 7

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

为进一步深化卫生专业技术职称改革工作，不断完善卫生专业技术职务聘任制，根据中共中央组织部、人事部、卫生部《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》（人发〔2000〕31号）文件精神和国家有关职称改革的规定，人事部下发《加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发〔2000〕114号），高级专业技术资格采取考试和评审结合的办法取得。为了更好地帮助广大考生复习备考，编者根据多年的临床实践，结合考试的实际情况，编写了这本《妇产科护理学习题集》。

本书包含高级卫生专业技术资格考试的所有相关内容及考试题型。全书共十七章，包括A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题、案例分析题，每章习题的参考答案附在最后。

本书实用性强，可用于考前复习和自测，以便考生顺利通过考试。

因水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2017年10月

第一章	产前诊断	1
第二章	正常分娩妇女的护理	17
第三章	正常产褥期妇女的护理	40
第四章	异常妊娠妇女的护理	56
第五章	妊娠特有疾病妇女的护理	104
第六章	妊娠合并症妇女的护理	119
第七章	异常分娩妇女的护理	147
第八章	分娩期并发症妇女的护理	169
第九章	产褥期疾病妇女的护理	180
第十章	女性生殖系统炎症妇女的护理	196
第十一章	性传播疾病妇女的护理	231
第十二章	月经失调妇女的护理	241
第十三章	妊娠滋养细胞疾病妇女的护理	255
第十四章	女性生殖系统肿瘤患者的护理	271
第十五章	会阴部手术患者的护理	298
第十六章	不孕症与辅助生殖技术	307
第十七章	计划生育	325

第一章 产前诊断

一、A1 型题

1. 诊断宫内早孕最可靠的辅助检查方法是 ()。
A. 尿妊娠试验
B. B 型超声检查
C. 宫颈黏液涂片干燥后镜检
D. 基础体温测定
E. 阴道脱落细胞学检查
2. 妊娠晚期每周体重增加不应超过 ()。
A. 0.5kg
B. 1kg
C. 1.5kg
D. 2kg
E. 2.5kg
3. 目前最常用的推算预产期的依据是 ()。
A. 胎儿大小和宫底高度
B. 初觉胎动时间
C. 早孕反应开始的时间
D. 末次月经开始之日
E. 末次月经干净之日
4. 维持子宫在盆腔正中位置的韧带是 ()。
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 宫骶韧带
D. 骶结节韧带
E. 主韧带
5. 产前检查的目的错误的是 ()。
A. 指导孕期卫生
B. 了解孕妇健康状况
C. 预知胎儿性别
D. 早期发现异常
E. 胎儿发育情况
6. 临产时子宫下段长 ()。
A. 1~2cm
B. 3~4cm
C. 5~6cm
D. 7~10cm
E. 10~15cm
7. 关于胎动下列错误的是 ()。
A. 孕妇一般于 18~20 周首次感到胎动
B. 胎动每小时 3~5 次

- C. 胎儿死亡前 1~2 天停止胎动
D. 胎动可经腹壁听到
E. 妊娠晚期胎动增加
8. 妊娠末期白细胞增多,但一般为 ()。
A. $(10\sim15) \times 10^9/L$
B. $(12\sim17) \times 10^9/L$
C. $(14\sim19) \times 10^9/L$
D. $(16\sim18) \times 10^9/L$
E. $(18\sim20) \times 10^9/L$
9. 头先露中最常见的是 ()。
A. 前囟先露
B. 额先露
C. 面先露
D. 枕先露
E. 复合先露
10. 黄体发育达高峰,在排卵后 ()。
A. 7~8 天
B. 9~10 天
C. 11~12 天
D. 13~14 天
E. 15~16 天
11. 判断胎儿成熟度,应测孕妇的 ()。
A. 血中甲胎蛋白值
B. 尿中孕二醇值
C. 羊水中肌酐值
D. 尿中雌三醇值
E. 羊水中人胎盘生乳素值
12. 临产的主要标志为 ()。
A. 不规则子宫收缩
B. 规则子宫收缩
C. 羊水早破
D. 阴道流血
E. 腹痛
13. 20 周末胎儿发育特征为 ()。
A. 身长 25cm,皮下脂肪发育良好
B. 临床上用普通听诊器可听到胎心
C. 指甲已超过指端
D. 吸吮反射良好
E. 四肢活动活泼
14. 在耻骨联合上能触到宫底时,妊娠为 ()。
A. 6 周后
B. 8 周后
C. 10 周后
D. 12 周后
E. 14 周后
15. 停经 35 天的已婚妇女,确定是否宫内妊娠,最合适的方法是 ()。
A. 黄体酮试验
B. 尿妊娠试验
C. 多普勒超声诊断
D. B 超检查
E. 盆腔检查



16. 哪项属正常胎心音次数 ()。
- A. 80 次/分
B. 100 次/分
C. 105 次/分
D. 132 次/分
E. 170 次/分
17. 引产出一胎儿, 身长 30cm, 皮肤呈皱缩状, 根据以上情况判断此产妇妊娠月份是 ()。
- A. 3 个月
B. 4 个月
C. 5 个月
D. 6 个月
E. 7 个月
18. 初孕妇自觉胎动多数开始于 ()。
- A. 妊娠 8~10 周
B. 妊娠 10~12 周
C. 妊娠 12~14 周
D. 妊娠 14~18 周
E. 妊娠 18~20 周
19. 评估胎儿宫内有无缺氧的方法是 ()。
- A. Apgar 评分法
B. 真蜕膜
C. 底蜕膜
D. 包蜕膜
E. Manning 评分法
20. 产前检查时, 脐上 3 横指触及孕妇子宫底, 此时判断妊娠 ()。
- A. 6 个月末
B. 9 个月末
C. 7 个月末
D. 5 个月末
E. 8 个月末
21. 向女士, 妊娠 38 周, 为判断其胎盘功能, 应 ()。
- A. 测定羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值
B. 测定血或尿中雌三醇值
C. 测定血中绒毛膜促性腺激素 hCG 值
D. 测定羊水中肌酐值
E. 测定羊水中脂肪细胞值
22. 在脐耻之间手测可以触及宫底时应该是 ()。
- A. 妊娠 14 周末
B. 妊娠 15 周末
C. 妊娠 16 周末
D. 妊娠 17 周末
E. 妊娠 18 周末
23. 在孕妇腹壁最早听到胎心音的时间约是 ()。
- A. 孕 8 周末
B. 孕 20 周末
C. 孕 12 周末
D. 孕 24 周末
E. 孕 16 周末
24. 晚期囊胚侵入到子宫内膜的过程称 ()。
- A. 孕卵形成
B. 着床

- C. 受精
E. 拾卵
25. 胎儿生物物理监测的内容不包括 ()。
- A. 羊水指数
B. 肌张力
C. NST
D. 胎盘成熟度
E. 胎动
26. 妇科检查前护理错误的是 ()。
- A. 准备好消毒的检查器械
B. 做好解释工作
C. 嘱患者排尿
D. 铺好干净的布垫
E. 协助患者取仰卧位
27. 可辨别部分胎儿性别最早的时间是 ()。
- A. 妊娠 24 周末
B. 妊娠 20 周末
C. 妊娠 12 周末
D. 妊娠 16 周末
E. 妊娠 8 周末
28. 妊娠 32 周末胎儿体重 ()。
- A. 1400g
B. 1000g
C. 1200g
D. 1500~1700g
E. 1900~2100g
29. 初产妇, 停经 8 周时, 下列哪项不会出现 ()。
- A. 尿频
B. 乳晕着色
C. 晨起恶心、呕吐
D. 出现妊娠纹
E. 阴道壁和宫颈呈紫蓝色
30. 四步触诊法检查内容不包括 ()。
- A. 胎产式
B. 子宫大小
C. 胎方位
D. 胎先露
E. 胎心率
31. 有关卵巢周期变化, 下述哪项不对 ()。
- A. 排卵发生在月经来潮前 14 天左右
B. 如卵子未受精, 黄体于排卵后 9~10 天萎缩
C. 黄体衰退, 月经即来潮
D. 黄体细胞分泌雌、孕激素
E. 排卵后 7~8 天黄体发育达到高峰
32. 了解胎儿宫内发育情况的人工监护方法为 ()。
- A. 测量子宫底高度
B. 听诊胎心

- C. B 超
E. 测量孕妇的骨盆各径线
33. 目前对于月经周期正常规律的妇女, 最简单易行而且最常用的推算预产期的依据是 ()。
- A. 胎儿大小和宫底高度
B. 早孕反应开始的时间
C. 末次月经干净之日
D. 末次月经开始之日
E. 初觉胎动时间
34. 某健康女性, 28 岁, 已婚, 未孕, 其子宫峡部长度正常情况下约为 ()。
- A. 0.5cm
B. 1.0cm
C. 2.5cm
D. 1.5cm
E. 2.0cm
35. 确诊妊娠最可靠的方法是 ()。
- A. B 超检查
B. 妊娠试验
C. X 线检查
D. 内诊
E. 问诊
36. 孕妇腹壁上胎心音听诊最佳位置是 ()。
- A. 胎儿腹侧
B. 胎儿臀侧
C. 胎儿背侧
D. 胎儿足侧
E. 胎儿头侧
37. 当停经 3 个月, 子宫远大于孕月时, 鉴别正常妊娠及多胎妊娠的主要方法是 ()。
- A. 羊水甲胎蛋白测定
B. 查血绒毛膜促性腺激素 (hCG)
C. 超声多普勒检查
D. 胎儿心电图检查
E. B 超显像法
38. 中期妊娠是指孕 ()。
- A. 13~28 周
B. 18~28 周
C. 20~28 周
D. 11~25 周
E. 12~28 周
39. 某次产前检查测得孕妇宫底高度为 12cm, 腹围 50cm, 则估算出的胎儿体重是 ()。
- A. 1200g
B. 800g
C. 1000g
D. 1400g
E. 600g
40. 早孕反应不包括 ()。
- A. 喜食酸物
B. 食欲减退
C. 恶心
D. 呕吐
E. 失眠

41. 孕妇妊娠早期产生尿频症状的原因是 ()。
- A. 增大的子宫压迫膀胱
B. 体内肾素-血管紧张素系统分泌紊乱
C. 头先露进入盆腔
D. 液体摄入量增多
E. 盆底肌肉松弛
42. 一般一个孕龄单位为 ()。
- A. 8 周
B. 4 周
C. 10 周
D. 6 周
E. 2 周
43. 初产妇总产程为 ()。
- A. 16~20 小时
B. 13~18 小时
C. 20~22 小时
D. 8~10 小时
E. 22~26 小时
44. 初产妇与经产妇第三产程需 ()。
- A. 6~8 小时
B. 5~15 分钟
C. 11~12 小时
D. 1 小时
E. 1~2 小时
45. 关于孕期保健, 下列叙述错误的是 ()。
- A. 散步是孕妇最好的运动方法
B. 认真做好产前检查
C. 妊娠期间应禁止性交
D. 妊娠中、晚期提倡坐位淋浴
E. 妊娠期衣服应以宽松为宜
46. 最常用的协助诊断早孕的辅助检查方法是 ()。
- A. 黄体酮试验
B. 超声多普勒
C. 胎儿心电图
D. B 超
E. 尿妊娠试验
47. 张女士, 孕 20 周后行自我胎动计数, 正常的是 ()。
- A. 1~2 次/小时
B. 6~8 次/小时
C. 9~12 次/小时
D. 13~15 次/小时
E. 3~5 次/小时
48. 正常情况下胎动每小时应为 ()。
- A. 1~2 次
B. 3~5 次
C. 12~14 次
D. 6~8 次
E. 9~11 次
49. 妊娠早期叶酸缺乏会导致 ()。
- A. 胎儿神经管畸形
B. 婴儿患先天性心脏病



- C. 胎儿骨骼发育不良
D. 婴儿患呆小症
E. 新生儿黄疸
50. 以下属于过渡足月儿的是 ()。
- A. 妊娠 43 周出生, 瘦小, 伴羊水、胎粪污染
B. 妊娠 37 周出生, 出生体重为 2400g
C. 妊娠 33 周出生, 出生体重为 2300g
D. 妊娠 27 周出生, 出生体重为 1800g
E. 妊娠 39 周出生, 出生体重为 3500g
51. 关于非孕期成人正常子宫, 下列说法错误的是 ()。
- A. 宫颈宫体相连处称为峡部
B. 子宫容积约为 5ml
C. 子宫长 7~8cm
D. 子宫体位于骨盆腔中央, 坐骨棘水平以下
E. 峡部长约 1cm
52. 妇科检查前护理工作错误的是 ()。
- A. 准备好消毒的检查器械
B. 嘱患者排尿
C. 协助患者取仰卧位
D. 向患者作好解释工作
E. 更换好一次性垫单
53. 妇科检查床的台垫更换应 ()。
- A. 必要时
B. 按人
C. 每周
D. 每天
E. 隔天
54. 成人子宫体与子宫颈的长度比例为 ()。
- A. 1:1
B. 1:2
C. 2:1
D. 1:3
E. 3:1

二、A2 型题

1. 田女士, 25 岁, 初孕妇, 孕 1 产 0, 末次月经不清, 产科检查量宫高 32cm, 腹围 94cm, 宫底在剑突下 2 横指, 胎头未入盆, 胎心位于脐下左下方, 其孕周可能为 ()。
- A. 孕 33 周
B. 孕 34 周
C. 孕 35 周
D. 孕 36 周
E. 孕 37 周
2. 刘女士, 24 岁, 停经 8 周确诊为早孕, 本人要求终止妊娠。行人工终止妊娠负压吸引术时, 患者诉恶心, 继而出汗、面色苍白, 血压 80/60mmHg, 心率 48 次/分, 子宫无异常情况发生机制是 ()。
- A. 受术者精神太紧张
B. 手术引起迷走神经反射
C. 受术者未吃早饭
D. 术中出血过多
E. 治疗对心脏的刺激

3. 汪女士，妊娠 28 周，产前检查均正常，咨询监护胎儿情况最简单的方法。应指导其采用（ ）。
- A. 胎心听诊
B. 电子胎心监护
C. 测宫高、腹围
D. 自我胎动计数
E. B 超检查
4. 毛女士，25 岁，月经过期 1 周，结婚 6 个月，从未用过避孕药，既往月经正常、规律，宫颈软、着色，子宫正常大小，双附件（-）。下列选项中诊断妊娠的最早方法是（ ）。
- A. 听胎心
B. 基础体温
C. B 型超声
D. 尿 hCG 测定
E. 放射免疫测定 β -hCG
5. 周女士，27 岁，确诊妊娠，末次月经 2005 年 3 月 14 日开始，预产期是（ ）。
- A. 2005 年 10 月 21 日
B. 2005 年 12 月 21 日
C. 2005 年 11 月 21 日
D. 2005 年 10 月 28 日
E. 2005 年 11 月 28 日
6. 王女士，40 岁，已婚已育。最近 1 年月经周期不规律。现停经 60 天，于停经 40 天时曾肌注黄体酮 20mg/d，连续 5 天。停药后月经仍未转。该妇女首先要明确的诊断是（ ）。
- A. 卵巢早衰
B. 继发闭经
C. 宫颈粘连
D. 更年期综合征
E. 早期妊娠
7. 患者女性，27 岁，停经 2 个月余，阴道出血 2 天，下腹痛 1 天，来院就诊。检查：子宫增大，如鹅蛋大小，宫口闭，下列检查最有诊断意义的是（ ）。
- A. B 超检查
B. 血常规检查
C. 凝血时间试验
D. 阴道脱落细胞学检查
E. 尿妊娠试验
8. 蔡女士，27 岁，初孕妇，末次月经日期记不清。自觉 5 周前出现胎动，检查子宫长度为 23cm，比较符合实际的妊娠周数应该是（ ）。
- A. 18~20 周
B. 20~22 周
C. 22~24 周
D. 24~26 周
E. 26~28 周
9. 戚女士，23 岁，引产一女性胎儿，身长 35cm，体重 1025g，各脏器已发育完全，该妇女为妊娠（ ）。
- A. 22 周末
B. 20 周末
C. 24 周末
D. 26 周末
E. 28 周末



10. 26岁,已婚女性,既往月经不规律,停经72天,应首先进行下列哪项辅助检查()。
- A. 黄体酮试验
B. 测量基础体温
C. 腹部X线摄片
D. B型超声波检查
E. 妊娠试验
11. 张女士,25岁,结婚1年,月经初潮13岁,周期28天,经期3~5天,突然停经,应首先考虑()。
- A. 自主神经功能紊乱
B. 卵巢功能障碍
C. 闭经
D. 内分泌紊乱
E. 妊娠
12. 初产妇,王某,妊娠39周住院待产。检查:规律宫缩,枕左前位,胎心146次/分,宫口开大3cm。在产程护理措施中,错误的是()。
- A. 宫缩时嘱正确用腹压
B. 指导合理进食
C. 休息时取左侧卧位
D. 每隔1~2小时听1次胎心
E. 鼓励2~4小时排尿1次
13. 温女士,28岁,婚后2年未孕,月经规律,现停经40天,近1周觉乳房胀痛,尿妊娠试验阳性,基础体温曲线示高温相已达27天,最可能的诊断为()。
- A. 月经前期
B. 子宫性闭经
C. 垂体性闭经
D. 早期妊娠
E. 卵巢早衰
14. 患者,女性,24岁。停经8周确诊为早孕,本人要求终止妊娠。行人工终止妊娠负压吸引术时,患者诉恶心,继而出汗、面色苍白,血压80/60mmHg,心率48次/分,子宫无异常情况最适宜的处理是()。
- A. 给予阿托品
B. 给予输血
C. 给予镇静剂
D. 给予止吐剂
E. 给予心理安慰
15. 25岁,已婚女性,既往月经规律,停经16周,耻骨联合上方扪及一包块,首选的辅助检查是()。
- A. 腹部CT
B. 腹部X线摄片
C. 腹部B超
D. 尿妊娠试验
E. 血hCG
16. 孕妇王某,34岁,初次怀孕,孕16周出现心慌、气短,经检查发现心功能属于Ⅱ级。经过增加产前检查次数,严密监测孕期经过等,目前孕37周,自然临产。该产妇的体位最好是()。
- A. 平卧位
B. 左侧卧位

- C. 随意卧位
D. 半卧位
E. 右侧卧位
17. 张女士，怀孕 50 天，在“妇儿卫生保健咨询日”向护士咨询孕期哪段时间应禁止性交。正确回答是在妊娠（ ）。
A. 2 个月内及最后 2 个月
B. 2 个月内及最后 1 个月
C. 3 个月内及最后半个月
D. 3 个月内及最后 1 个月
E. 3 个月内及最后 2 个月
18. 女，26 岁，既往月经规律，停经 46 天，近 4 天厌油食、伴轻度尿频、晨起呕吐，仍坚持上班，最有可能的诊断是（ ）。
A. 病毒性肝炎
B. 早期妊娠
C. 膀胱炎
D. 继发性闭经
E. 妊娠剧吐
19. 刘女士，月经周期规则，末次月经第一日是 2009 年 10 月 26 日，计算预产期应是（ ）。
A. 2010 年 7 月 2 日
B. 2010 年 7 月 4 日
C. 2010 年 8 月 2 日
D. 2010 年 8 月 4 日
E. 2010 年 8 月 5 日
20. 赵女士，妊娠 37 周。腹部检查：子宫呈椭圆形，胎先露部较软且不规则，胎心在脐上偏左，本例的胎先露应是（ ）。
A. 枕先露
B. 颏先露
C. 面先露
D. 肩先露
E. 臀先露
21. 刘女士，26 岁，初孕妇。以往月经周期规则。现停经 6 月，自觉胎动消失。检查：子宫体 4 月妊娠大小，推测胎儿宫内死亡。下列哪项不必检查（ ）。
A. 尿 hCG 测定
B. 腹部 X 线检查
C. B 超检查
D. 胎儿心电图
E. 多普勒超声胎心检查

三、A3/A4 型题

(1~2 题共用题干)

24 岁，初孕妇，妊娠 43 周，自觉胎动减少已 2 日。血压 110/70mmHg，枕左前位，无头盆不称征象。

1. 为能恰当处理，最重要的检查项目是（ ）。
A. 测羊水肌酐值
B. 测羊水胆红素类物质值
C. 测羊水卵磷脂/鞘磷脂比值
D. 测羊水脂肪细胞百分率
E. 测孕妇尿液雌激素/肌酐比值

2. 经上述检查证实胎盘功能减退, 此时最恰当的处理应是 ()。
- A. 刺激乳头诱发宫缩
B. 静滴维生素 C, 吸氧, 等待自然分娩
C. 静滴缩宫素使其经阴道分娩
D. 行剖宫产术结束分娩
E. 左侧卧位, 吸氧, 等待自然分娩

(3~4 题共用题干)

某女性, 27 岁, 结婚 2 年未孕, 月经周期规律, 现停经 40 天, 稍有恶心呕吐, 近 1 周觉乳房胀痛, 尿妊娠试验 (±), 基础体温曲线示高温相已达 26 天。

3. 最可能的诊断是 ()。
- A. 月经前期
B. 卵巢早衰
C. 早期妊娠
D. 子宫性闭经
E. 垂体性闭经
4. 经检查确诊上述诊断, 为该患者提供的护理措施中, 不恰当的是 ()。
- A. 清淡饮食
B. 精神支持
C. 放松心情
D. 住院治疗
E. 避免油炸食物

(5~6 题共用题干)

秦女士, 29 岁, 月经 1~3 个月来 1 次, 周期不规则, 现已停经 18 周。且 2 个月内未有性生活。妇科检查: 子宫略增大。

5. 首选的辅助检查是 ()。
- A. 腹部听胎心
B. 腹部 X 线检查
C. 黄体酮试验
D. 尿妊娠试验
E. B 超检查
6. 如果经检查发现秦女士并未妊娠, 接下来应如何处理 ()。
- A. 继续观察
B. 宫腔镜检查
C. 行人工月经周期
D. 应用黄体酮
E. 测血生殖内分泌检查

(7~9 题共用题干)

张女士, 27 岁, 已婚, 平日月经周期均为 28 日。末次月经为 2013 年 8 月 9 日, 于 2013 年 9 月 16 日来医院就诊, 主诉为“无腹痛, 近 3 日阴道有少量血性分泌物”。

7. 张女士首先应检查的是 ()。
- A. 诊断性刮宫
B. 宫颈黏液涂片

- C. 尿常规检查
D. 尿 hCG 检查
E. 基础体温检查
8. 如果张女士已妊娠, 宫内妊娠的确诊应选择 ()。
- A. 最早在停经 4 周时行阴道 B 型超声检查是否妊娠囊内有胚芽和原始心管搏动
B. 最早在停经 4 周时行阴道 B 型超声查看宫内妊娠囊
C. 最早在停经 5 周时行阴道 B 型超声检查是否妊娠囊内有胚芽和原始心管搏动
D. 行宫颈黏液检查
E. 行妇科检查看子宫是否增大变软
9. 如果张女士于停经 6 周做 B 超检查, 宫内未见妊娠囊, 见左附件区低回声包块, 应高度怀疑是 ()。
- A. 左卵巢囊肿
B. 左卵巢黄体
C. 左输卵管积水
D. 左附件异位妊娠
E. 葡萄胎

四、B 型题

(1~3 题共用备选答案)

- A. 末次月经第 1 天
B. 初觉胎动
C. 早孕反应
D. 腹围
E. 体重
1. 平日月经规律的妇女推算预产期的主要根据是 ()。
2. 判断孕妇体内有无隐性水肿 ()。
3. 妊娠 18~20 周 ()。

(4~6 题共用备选答案)

- A. 希克斯收缩
B. 早孕反应
C. 黑格征
D. 蒙哥马利结节
E. 仰卧位低血压综合征
4. 妊娠 12~14 周起, 子宫出现不规则无痛性收缩 ()。
5. 乳晕颜色变深, 乳晕上皮脂腺肥大形成小隆起 ()。
6. 停经 6 周左右出现晨吐、恶心等症状 ()。

(7~9 题共用备选答案)

- A. 宫底高度在脐上 1 横指
B. 宫底高度在脐上 3 横指
C. 宫底高度在脐耻之间
D. 宫底高度在脐与剑突之间
E. 宫底高度在剑突下 2 横指