



国家执业资格考试应试宝典系列丛书 · 执业资格考试规划教材

2017

国家护士执业资格考试 应试宝典

模拟试题

总主编：喻友军 屈刚
主 编：张春强 尹龙武

专业团队 + 高频考点 + 高仿真卷 + 同源题库



独家护考辅导视频
即将上线，敬请关注
新增机考内容

+ 考点精粹 高频考点逐级归纳整理
重点突出显示。书末赠易混淆知识点汇总。

精练（上册） 对接《考点精粹》，
+ 精练（中册） 以试题形式考察学生对考点的掌握。
精练（下册） 典型试题全部列明解题思路。

+ 模拟试题 内含六轮护考试卷
高度拟合护考考察形式及难度，直击考点。



科学出版社

国家执业资格考试应试宝典系列丛书

执业资格考试规划教材

2017 国家护士执业资格考试 应试宝典·模拟试题

总主编 喻友军 屈 刚

主 编 张春强 尹龙武

编 者 (按姓氏汉语拼音排序)

邓湘穗 邓意志 赖 青

李小英 刘静馨 柳 卫

伍梅芳 徐洁欢 尹龙武

张 菡 张春强 张钱友

科 学 出 版 社

北 京

· 版权所有 侵权必究 ·

举报电话: 010-64030229; 010-64034315; 13501151303(打假办)

内 容 简 介

本书是“2017 国家护士执业资格考试应试宝典”丛书之一,由具有多年护士执业资格考试辅导经验的教师团队编写。该团队对近些年来的考试真题进行了认真的分析研究,其辅导的中专学生连续八年参加全国护士执业资格考试通过率超过 95%,大专学生达 100%。本书严格按照国家护士执业资格考试大纲要求,既考虑知识的全面性,又结合考试实际,突出重点,力求覆盖所有考点。本着方便教师辅导教学和利于学生复习的宗旨,本书内容与本丛书《2017 国家护士执业资格考试应试宝典·考点精粹》的内容紧密对接,共有六套模拟试题,每套试题分为专业实务与实践能力两部分,具有高度的模拟仿真性。各种题型的题量都按照考试大纲的要求进行配置,对于一些学生不容易理解的难题用※进行了标记,并在参考答案中给予解析。

本书主要供参加国家护士执业资格考试的考生使用,也可作为自学考试、专升本考试、成人高考及在校学生学习期间的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

2017 国家护士执业资格考试应试宝典·模拟试题/张春强,尹龙武主编. —北京:科学出版社,2016.12

国家执业资格考试应试宝典系列丛书·执业资格考试规划教材

ISBN 978-7-03-050899-7

I. 2… II. ①张… ②尹… III. 护士-资格考试-习题集 IV. R192.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 284910 号

责任编辑:张茵/责任校对:李影

责任印制:徐晓晨/封面设计:张佩战

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京厚诚则铭印刷科技有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 12 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2017 年 1 月第二次印刷 印张:7 1/4

字数:185 600

POD 定价:42.50 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

总 前 言

“2017 国家护士执业资格考试应试宝典”丛书为国家护士执业资格考试的复习参考书。本丛书以最新护考大纲为依据,以近年来护士执业资格考试考点为参照,认真分析研究了历年考试真题所覆盖的知识点,并采纳了众多考生的反馈意见,汲取了国内目前已出版的各种护士执业考试辅导用书的优点,总结了自 2009 年来编者所在院校教学与护考的成功经验精编而成,力求为广大考生提供最全面、最精要的备考知识,让考生用最少的复习时间,掌握最多的知识点,取得最理想的考试成绩。2009~2016 年国家护士执业资格考试中,由编者所辅导的 10 000 余名护理、助产专业考生,中专学生考试平均通过率达 95%以上,大专学生达 100%。

“2017 国家护士执业资格考试应试宝典”丛书包括考点精粹,精练(上册、中册、下册)和模拟试题五本,以国家最新考试大纲为蓝本,既考虑知识点的全面性,又结合考试实际,瞄准考点、突出重点、突破难点,在编写形式上力求便于考生理解和记忆,试题均备有参考答案,难题备有解析。考点精粹分册对大纲考点科学重组,系统排序,要点提炼,重点标注并详实阐述;精练分册以系统疾病为单元,以经典试题再现知识点,与护考无缝对接,便于考生边复习边检测;模拟试题分册依照国家统一考试单元编写,共 6 套试卷 1440 题,每套含专业实务与实践能力两部分,考点覆盖面广,模拟性、针对性、预测性强,方便考生顺利由各科目的系统复习向综合性实战模拟过渡,达到事半功倍的效果。

本丛书主要供参加国家护士执业资格考试的各类考生和参与辅导工作的教师使用,亦可作为自学考试、成人高考和在校学生学习期间的参考资料。

本丛书编写参考了国内护考相关的教材教辅用书,在此一并致谢。鉴于各种原因,书中难免有不足之处,敬请各位同仁和广大读者批评指正!

喻友军 屈 刚

2016 年 9 月

目 录

模拟试题一.....	1	专业实务.....	53
专业实务.....	1	实践能力.....	61
实践能力.....	9	模拟试题五.....	70
模拟试题二.....	18	专业实务.....	70
专业实务.....	18	实践能力.....	78
实践能力.....	26	模拟试题六.....	87
模拟试题三.....	35	专业实务.....	87
专业实务.....	35	实践能力.....	95
实践能力.....	43	2017 国家护士执业资格考试应试宝典·模拟试	
模拟试题四.....	53	题答案.....	104

专 业 实 务

一、I 型题 (A1/A2 型题): 请从各题 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号对应答案所属的方框涂黑。

1. 泌尿系肿瘤患者排尿的特点是

- A. 无痛性全程肉眼血尿
- B. 血红蛋白尿
- C. 初始血尿
- D. 疼痛伴血尿
- E. 终末血尿伴膀胱刺激征

2. 在我国慢性肾衰竭最常见的病因是

- A. 结石
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 多囊肾
- D. 糖尿病肾病
- E. 肾盂肾炎

3. 某患者因急性胰腺炎拟行急诊手术, 下列护理措施不妥的是

- A. 将备用床改为麻醉床
- B. 测量生命体征
- C. 通知医生协助体检
- D. 口渴时少量饮水
- E. 评估患者收集资料

4. 患者女, 30 岁。产后第 4 天出现会阴侧切伤口感染, 细菌培养结果为金黄色葡萄球菌感染。下列哪种抗生素最可能对该细菌存在耐药性

- A. 头孢菌素
- B. 青霉素
- C. 甲硝唑
- D. 红霉素
- E. 两性霉素 B

5. 输卵管峡部妊娠时, 最易出现的病理结局是

- A. 输卵管妊娠流产
- B. 陈旧性宫外孕
- C. 继发性腹腔妊娠
- D. 输卵管妊娠破裂
- E. 孕卵向宫腔生长

6. 消化性溃疡的确诊依靠

- A. B 型超声检查
- B. 胃液分析
- C. 典型的周期性和节律性上腹部疼痛
- D. X 线钡餐检查和 (或) 内镜检查
- E. 是否有幽门螺杆菌感染

7. 为预防巨大肾结石碎石后引起“石街”, 应采取的卧位是

- A. 平卧位
- B. 头高足低位
- C. 患侧卧位
- D. 健侧卧位
- E. 头低位

※8. 引起 3 岁患儿化脓性脑膜炎的常见病原菌是

A. 脑膜炎奈瑟菌

B. 肺炎链球菌

C. 白色念珠菌

D. 大肠埃希菌

E. 流感嗜血杆菌

9. 脊柱出现胸椎后凸的时间是

- A. 出生时
- B. 3 个月
- C. 6 个月
- D. 9 个月
- E. 12 个月

10. 下列维生素 D 活性最强的是

- A. 维生素 D₂
- B. 维生素 D₁
- C. 1-羟维生素 D
- D. 1,25-二羟维生素 D₂
- E. 25-羟维生素 D

11. 引起心脏后负荷过重的常见原因是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 甲状腺功能亢进症
- D. 原发性高血压
- E. 慢性严重贫血

12. 腰麻术后让患者去枕平卧的主要目的是

- A. 预防头痛发生
- B. 预防呕吐窒息
- C. 预防伤口出血
- D. 减轻伤口疼痛
- E. 预防血压下降

13. 治疗猩红热的首选药物是

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 氯霉素
- D. 克林霉素
- E. 氨苄西林

14. 对于“新生儿硬肿症”入院的患儿, 家长可能不会出现的心理是

- A. 焦虑不安
- B. 自我责怪
- C. 角色紊乱
- D. 害怕担忧
- E. 否认疾病

15. 以假小叶形成为主要病理改变的疾病是

- A. 慢性肝淤血
- B. 弥漫型肝炎
- C. 急性重型肝炎
- D. 肝硬化
- E. 亚急性重型肝炎

16. 腹部受到冲击伤时, 最容易发生破裂的脏器是

- A. 肾
- B. 肠
- C. 胃
- D. 肝
- E. 脾

17. 阿托品对解除有机磷农药中毒的何种症状无效

- A. 肺部湿啰音
- B. 多汗、流涎
- C. 平滑肌痉挛
- D. 肌纤维颤动
- E. 瞳孔缩小

18. Graves 病的主要病因是

- A. 遗传因素
- B. 病毒感染
- C. 自身免疫
- D. 细菌感染
- E. 精神刺激

19. 营养不良的病因主要是缺乏

- A. 热能和(或)维生素
- B. 热能和(或)蛋白质
- C. 热能和(或)脂肪
- D. 热能和(或)水
- E. 热能和(或)糖

20. 营养性缺铁性贫血, 服用铁剂停药的时间应是

- A. 血红蛋白量恢复正常后 2 个月
- B. 血红蛋白量恢复正常时
- C. 血红蛋白量恢复正常后 1 周
- D. 血红蛋白量恢复正常后 2 周
- E. 血红蛋白量恢复正常后 1 个月

21. 12 小时尿标本加入 40% 甲醛作为防腐剂的检查项目是

- A. 尿糖定量检查
- B. 17-酮类固醇、17-羟类固醇检查
- C. 尿酸定量检查
- D. 尿蛋白定量
- E. 艾迪计数

22. 图示肌肉注射定位法是

- A. 上臂三角肌定位法
- B. 臀中肌、臀小肌注射定位法
- C. 肌外侧肌定位法
- D. 臀大肌注射十字定位法
- E. 臀大肌注射连线定位法



23. 胃次全切术后第 2 日的患者应采取

- A. 仰卧位
- B. 半坐卧位
- C. 侧卧位
- D. 端坐位
- E. 中凹卧位

24. 按照《护士条例》的要求, 申请护士执业注册应当具备的条件中错误的是

- A. 在教学、综合医院完成 8 个月以上护理临床实习
- B. 完成中等职业学校普通全日制 3 年以上的护理专业课程学习并取得相应学历证书
- C. 通过国务院卫生主管部门组织的护士执业资格考试
- D. 获得经省级以上卫生行政部门确认免考资格的普通中等卫生(护士)学校护理专业毕业文凭者, 可以免于护士执业考试
- E. 符合国务院卫生主管部门规定的健康标准

25. 患者, 男, 34 岁。骑摩托车时遭遇车祸, 右下肢骨折, 大量出血, 急诊入院。急诊科护士在医生到来前应立即

- A. 为患者注射止痛药物
- B. 给患者止血、测血压, 建立静脉通路

C. 向保卫部门报告

D. 详细询问事故的原因

E. 劝慰患者耐心等待医生

26. 某患者因病需进行器官移植, 术后恢复良好, 心怀感激, 多次向责任护士打听捐赠者家庭住址, 想登门致谢。面对患者的请求, 责任护士正确的做法是

- A. 宣传捐献者事迹
- B. 给患者捐赠者的电话, 让其电话致谢
- C. 婉拒患者的请求
- D. 建议给予经济补偿
- E. 与患者一道登门致谢

27. 患者男, 65 岁, 因前列腺肥大行手术治疗。术后一周医生告知患者晚上可能拔除尿管, 但未开具医嘱。次日晨, 护士因未给患者拔除尿管而受到患者及其家属抱怨, 护士因此指责该医生。导致这次医护关系冲突的原因是

- A. 角色心理差位
- B. 角色理解欠缺
- C. 角色压力过重
- D. 角色权利争议
- E. 角色期望冲突

28. 人体中, 中医五行归类的“五体”是指

- A. 爪、脉、肉、皮、骨
- B. 筋、舌、肉、皮、骨
- C. 筋、脉、肉、皮、骨
- D. 筋、脉、肉、发、骨
- E. 筋、脉、肉、皮、鼻

29. 六淫指的是

- A. 风、寒、暑、湿、燥、火六种正常气候变化
- B. 痰饮、瘀血、疔气等六种致病因素
- C. 内风、内火、内寒、内湿、内燥、外火六种致病因素
- D. 风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称
- E. 外风、外湿、外燥、外暑、外火、内寒六种致病因素

30. 在患者皮肤松弛或有皱纹处针刺时, 应该使用下列哪种进针方法

- A. 捻转法
- B. 提插法
- C. 舒张进针法
- D. 指切进针法
- E. 夹持进针法

31. 关于护理差错和医疗事故的区别, 叙述错误的是

- A. 因为医务人员责任心不强
- B. 都分为四级
- C. 都违反了法规
- D. 后果不同
- E. 都给患者带来了痛苦

32. 患者, 女, 55 岁。因肺结核住院治疗, 今早主诉昨晚夜间多梦易醒, 下午医生开出医嘱: 地西洋 5mg, po, sos。但患者当晚睡眠良好, 该项医

嘱未执行。值班护士应于次日上午,在该项医嘱栏内

- A. 用蓝笔写上“失效” B. 用红笔写上“失效”
C. 用红笔写上“未用” D. 用蓝笔写上“未用”
E. 用蓝笔写上“作废”

33. 患者,女,32岁。发热待查收入院。查体:体温 39.9°C ,脉搏130次/分,呼吸28次/分,血压110/70mmHg,神志清楚,急性病面容,患者诉头痛剧烈。入病区后,值班护士首先应

- A. 立即通知医生诊治患者,及时执行医嘱
B. 询问病史
C. 备好急救药品及物品
D. 填写住院病历和有关护理表格
E. 自我介绍

34. 为了改善睡眠质量,老年人睡前宜

- A. 加强活动 B. 多饮水
C. 加餐 D. 阅读兴奋书籍
E. 用热水泡脚

35. 胆囊摘除术后,患者病情稳定应采取

- A. 俯卧位 B. 半坐卧位
C. 平卧位 D. 端坐位
E. 头高足低位

36. 食管癌的早期表现是

- A. 消瘦 B. 进行性吞咽困难
C. 呕吐 D. 吞咽哽咽感
E. 持续性胸背痛

37. 孕妇缺钙最常见的症状是

- A. 腰骶部疼痛 B. 下肢浮肿
C. 腓肠肌痉挛 D. 尿频
E. 妊娠高血压疾病

38. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是

- A. 支气管扩张 B. 支气管肺癌
C. 支气管哮喘 D. 慢性支气管炎
E. 肺炎链球菌肺炎

※39. 良性前列腺增生,哪种情况应选择手术治疗

- A. 轻度梗阻 B. 全身情况不良
C. 残余尿量20ml D. 无症状的
E. 引起肾功能不良

40. 一护生在某二级甲等医院完成毕业实习后,未通过护士执业资格考试。护理部考虑其在实习期间无护理差错,且内科护士严重短缺,因此聘用其任内外科护士。护理部的这种做法违反的是

- A. 侵权责任法 B. 民法通则
C. 护士条例 D. 护理机构管理办法
E. 医疗事故处理条例

41. 患者,女,54岁。因膀胱肿瘤需做膀胱镜检查,

患者检查时应取

- A. 膝胸卧位 B. 截石位
C. 去枕仰卧位 D. 侧卧位
E. 端坐位

42. 高位截瘫患者出现排尿障碍,主要表现为

- A. 少尿 B. 尿潴留
C. 无尿 D. 尿崩症
E. 尿失禁

43. 患者,男,45岁。乙肝史12年,近来自觉右上腹胀痛,首选的检查是

- A. 腹腔镜 B. B超
C. 肝动脉造影 D. 核素肝扫描
E. MRI

44. 患者,男,26岁。因头痛、呕吐5日来院就诊。查体:患者步态不稳,站立时向后倾倒,医生高度怀疑为颅内肿瘤。根据以上表现,可能为颅内哪个部位的肿瘤

- A. 大脑半球 B. 鞍区
C. 松果体区 D. 小脑蚓部
E. 脑干

45. 能动态监测产妇产程进展和识别难产的重要手段是

- A. 多普勒听胎心 B. 阴道检查
C. 肛门检查 D. 胎儿监护
E. 产程图

46. 患者,女,30岁。妊娠10周,休息时胸闷、气急。查体:脉搏120次/分,呼吸22次/分,肺底有湿啰音,处理应是

- A. 避免激动
B. 多休息,少活动
C. 立即终止妊娠

D. 控制心力衰竭后终止妊娠

E. 控制心力衰竭后继续妊娠

47. 孕中期孕妇监测的重点是

- A. 避免病毒感染 B. 确定基础血压
C. 做好分娩准备 D. 定期产前检查
E. 防止胎儿畸形

48. 患者,男,36岁。因打架斗殴致左腰部被刺伤,查体:伤口处未见明显出血,但血压测不到,应考虑

- A. 腰部挫伤 B. 肾蒂裂伤
C. 肾部分裂伤 D. 肾全层裂伤
E. 肾挫伤

49. 患者,男,57岁。踝部挤压伤后出现局部红、肿、热、痛,边界不清,伴低热。应首先考虑为

- A. 疖 B. 痈

- C. 脓肿
E. 急性蜂窝织炎
50. 患者,女,23岁。已婚,婚后不久出现发热、腰痛、尿频、尿急1周就诊。诊断为急性肾盂肾炎。该疾病最常见的致病菌是
- A. 大肠埃希菌
B. 溶血性链球菌
C. 葡萄球菌
D. 阴沟肠杆菌
E. 结核杆菌
51. 患者,男,42岁。患尿毒症。在静脉输入5%碳酸氢钠溶液的过程中突然发生手足抽搐。首先应给予
- A. 静脉注射地西泮
B. 肌内注射地西泮
C. 静脉注射苯妥英钠
D. 口服碳酸钙
E. 静脉注射葡萄糖酸钙
52. 患者,男,40岁。尿毒症病情加重,出现恶心、呕吐、厌食、少尿2天,血清钾 11mmol/L 。若不紧急处理则可能导致
- A. 窒息
B. 心力衰竭
C. 心律失常
D. 呼吸衰竭
E. 呼吸衰竭
53. 患者,女,40岁。平常嗜烟酒,有胆道结石病史。昨晚暴饮暴食后,出现左上腹疼痛。最可能的疾病是
- A. 急性胰腺炎
B. 胆道阻塞
C. 肝硬化
D. 胆囊穿孔
E. 原发性肝癌
54. 患者,男,48岁。大面积烧伤后6小时入院。查体:心率120次/分,血压 $70/50\text{mmHg}$,尿少。发生上述状况最可能的原因是
- A. 创面细菌感染造成感染性休克
B. 大量水分蒸发造成脱水
C. 疼痛导致的生理反应
D. 大量红细胞丧失造成肺换气障碍
E. 大量体液从血管内渗出引起低血容量性休克
55. 患者,男,34岁。用力排便后出现肛门剧痛,无便血,检查见肛管皮下暗紫色肿块,有触痛。首先考虑的是
- A. 肛裂
B. 血栓性外痔
C. 嵌顿性内痔
D. 肛门皮下脓肿
E. 直肠息肉
56. 患儿,男,11个月。呕吐、腹泻4日,近9个小时无尿。查体:呼吸深快,精神萎靡,意识模糊,面色苍白,前囟、眼窝明显凹陷,哭时无泪,皮肤弹性极差,脉细弱,四肢厥冷。首先应给予的治疗是
- A. 4:3:2液 180ml/kg 静脉滴注
B. 1.4%碳酸氢钠溶液 40ml/kg 静脉注射
C. 3:2:1液 40ml/kg 静脉滴注
D. 2:1等张含钠液 20ml/kg 快速静脉滴注
E. 4:2:3液 50ml/kg 静脉滴注
57. 男婴,8个月,腹泻3天,大便15~16次/日,蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括
- A. 精神状态
B. 尿量
C. 前卤
D. 皮肤弹性
E. 肠鸣音
58. 患者,男,35岁。突然呕血 1000ml ,伴柏油样大便。首选的止血药为
- A. 垂体后叶素
B. 安络血
C. 酚磺乙胺
D. 维生素K
E. 抗血纤溶芳酸
59. 患者,女,52岁,教师。左颈肩痛半年,伴左手麻木1月,诊断为颈椎病。以下诊断依据可靠的是
- A. 颈肩部疼痛
B. 手指麻木
C. 颈部活动受限
D. X线显示颈椎骨质增生
E. Hoffmann征(+)
60. 患者,男,24岁。乘车时右腿搭在左腿上,膝盖顶住前坐椅背,当突然刹车时,右膝部受撞击后髌关节不能活动,且右大腿后侧、小腿后侧及外侧和足部感觉消失。X线摄片:髌关节脱位合并髌臼骨折、股骨头骨折。该髌关节脱位的类型为
- A. 前脱位
B. 中心脱位
C. 后脱位
D. 侧方脱位
E. 下脱位
61. 患者,男,50岁。有高血压史12年。喝酒后忽感头晕,随即倒地昏迷,被家人急送入院,入院拟诊为急性脑出血,查体:左侧偏瘫,血压 $200/110\text{mmHg}$ 。下列对该患者的治疗原则错误的是
- A. 控制血压
B. 降低颅压
C. 密切观察生命体征
D. 应用抗凝剂
E. 应用止血药
62. 患者,男,27岁。上感2周后,突然发生急性、对称性、弛缓性瘫痪,伴肢体的麻木不适感,拟诊为急性炎症性脱髓鞘性多发性神经炎。脑脊液检查出现特征性的表现为
- A. 脑脊液细胞数量降低
B. 脑脊液浑浊
C. 脑脊液血性
D. 脑脊液蛋白含量降低

- E. 脑脊液蛋白-细胞分离现象
63. 患者,男,24岁。头额部摔伤后立即昏迷,送医院后逐渐清醒,2小时后再度昏迷。查体:呼吸12次/分,脉搏60次/分。应考虑为
- A. 轻度脑挫裂伤 B. 脑震荡
C. 急性硬膜下血肿 D. 急性硬膜外血肿
E. 重度脑挫裂伤
64. 男婴,出生3日,出生时前囟为1.5~2cm,测量方法是
- A. 最长径线 B. 对边中点连线的长度
C. 边长 D. 对角线长度
E. 周长
65. 患者,女,28岁。产后一年,要求放置宫内节育器。下列哪项不属于放置宫内节育器的并发症
- A. 感染 B. 节育器嵌顿
C. 子宫穿孔 D. 节育器异位
E. 子宫癌变
66. 患者,男,50岁。患原发性高血压12年,一直应用硝苯地平控制血压。该药的药理作用是
- A. 抑制水钠重吸收
B. 抑制肾素释放
C. 阻滞 α 受体
D. 抑制血管紧张素II生成
E. 阻止钙离子进入心肌细胞
67. 有机磷农药中毒时,代谢失常的神经递质是
- A. 多巴胺 B. 乙酰胆碱
C. 5-羟色胺 D. 肾上腺素
E. 去甲肾上腺素
68. 服用磺胺类药物治疗尿路感染时,加服碳酸氢钠的作用是
- A. 抗炎 B. 增加尿量
C. 碱化尿液 D. 保护尿路黏膜
E. 增加肾血流量
69. 对类风湿关节炎的描述不正确的是
- A. 基本病变为滑膜炎
B. 发病与自身免疫有关
C. 不引起脏器损害
D. 类风湿因子为阳性
E. 有皮下结节示病情活动
70. 患儿女,体健,4岁半时应复种下列哪种疫苗
- A. 百白破疫苗 B. 乙肝疫苗
C. 脊髓灰质疫苗 D. 甲肝疫苗
E. 卡介疫苗
71. 患者,女,60岁。急性心肌梗死,经溶栓治疗后,疼痛缓解,但出现缓慢性心律。常应用的药物是
- A. 美托洛尔 B. 呋塞米
C. 硝酸异山梨酯 D. 硝酸甘油
E. 阿托品
72. 关于幻觉的概念,正确的是
- A. 客观刺激作用于感觉器官的感知体验
B. 缺乏相应客观刺激时的虚幻知觉体验
C. 对客观事物的胡思乱想
D. 客观刺激作用于人脑的过程
E. 对客观事物的错误感知
73. 感知觉障碍不包括下列哪项
- A. 幻觉 B. 错觉
C. 感知综合障碍 D. 内感性不适
E. 思维破裂
- ※74. 患者,男,66岁。有慢性支气管炎病史18年。近3日来发热、咳嗽、咳痰加重,痰液黏稠呈砖红色胶冻状。该患者最可能的诊断是
- A. 肺炎链球菌肺炎 B. 克雷伯杆菌肺炎
C. 军团菌肺炎 D. 肺炎支原体肺炎
E. 金黄色葡萄球菌肺炎
- ※75. 患者,男,30岁。因反复咳嗽、咳大量脓痰5年,加重1周入院,诊断为支气管扩张。该患者在施行体位引流时,错误的是
- A. 夜间继续吸氧
B. 引流在餐前进行
C. 引流完毕后协助患者漱口
D. 引流时间每次30分钟以上
E. 引流时指导并鼓励患者有效咳嗽
76. 患者,女,19岁。因突发呼气性呼吸困难1小时入院,过去5年每逢春季有类似发作史。查体:双肺满布哮鸣音,诊断为支气管哮喘。该疾病诊断的主要依据是
- A. 血液中嗜酸粒细胞增多
B. PaO_2 和 SaO_2 降低, PaCO_2 升高
C. 胸透示横膈下降、肺透亮度增加
D. 肺功能检测有阻塞性通气障碍
E. 有反复发作史,呼气性呼吸困难和两肺广泛哮鸣音
77. 患者,男,49岁。慢性咳嗽、咳痰10余年,气促、心悸3天入院。X线检查示肺动脉段明显凸出。该患者肺动脉高压的主要机制可能是
- A. 肺部感染 B. 红细胞增多
C. 肺小动脉痉挛 D. 血液黏稠度增加
E. 肺毛细血管床减少
78. 地高辛用于治疗心力衰竭的主要药理作用是
- A. 扩张冠状动脉 B. 增强心肌收缩力
C. 减轻心脏前负荷 D. 减少心律失常发生

E. 减慢房室传导

79. 患儿,男,7岁。高热、昏迷、抽搐3日后因呼吸衰竭抢救无效死亡。为明确死因,最可靠的检查方法是

- A. 抽血分离病毒 B. 取脑组织分离病毒
C. 取脑脊液分离病毒 D. 血凝抑制试验
E. 特异性 IgM 抗体检查

80. 患儿,男,1岁半。出生时接种过卡介苗,常低热、盗汗,OT 1:2000,硬结直径 15mm,持续 7 天。提示

- A. 有过结核感染 B. 无结核感染
C. 变态反应 D. 活动性结核

E. 接种过卡介苗后的反应

81. 患者,男,51岁。因出现右下肢发凉、怕冷就诊,医师让其平卧,患肢抬高 45°,3 分钟后出现麻木、疼痛、足部皮肤苍白,随后让其坐起,下肢自然下垂于床沿。此时,足部皮肤出现潮红色,提示患肢严重供血不足。该试验为

- A. 波氏试验 B. 屈氏试验 I
C. 屈氏试验 II D. 肢体抬高试验

E. 勃格运动

82. 患者,男,29岁。因左小腿骨折被送至急诊室。护士为他做的最重要的工作是

- A. 给镇痛药 B. 提供一张床铺
C. 送一杯水,做好安慰 D. 做石膏托固定
E. 拿来夹板,临时固定

83. 患者,女,38岁。患甲状腺功能亢进半年,手术前服用碘剂治疗。此药的作用机制错误的是

- A. 使甲状腺缩小变硬
B. 可以减少甲状腺的血流量
C. 抑制甲状腺素合成
D. 减少甲状腺球蛋白分解
E. 抑制甲状腺素释放

84. 患儿,女,9个月。在睡眠时常烦躁哭闹、入睡难。今晒太阳后突发全身抽搐 5 次,每次约 1 分钟,抽搐停止后精神如常。体温 37.5℃,诊断为维生素 D 缺乏性手足搐搦症。护士遵医嘱为其补钙,正确的方法是

- A. 缓慢静脉注射
B. 肌肉注射
C. 补维生素 D 后,再补钙
D. 皮下注射
E. 口服补钙

85. 患儿,女,8个月。以“间断腹泻 3 个月,厌食 2 个月”入院。查体:患儿神志清楚,精神反应差,皮肤黏膜苍白。血常规:血红蛋白 75g/L,

红细胞 $3.8 \times 10^{12}/L$ 。根据病情护士应考虑患儿为

- A. 珠蛋白生成障碍性贫血
B. 生理性贫血
C. 营养性巨幼红细胞性贫血
D. 再生障碍性贫血
E. 营养性缺铁性贫血

86. 患者,女,55岁。入院后诊断为“亚急性细菌性心内膜炎”,需抽血做血培养。护士采集血标本时应抽血

- A. 1~2ml B. 3~4ml
C. 5~6ml D. 7~8ml
E. 10~15ml

87. 患者,男,45岁。一周来晨起眼睑水肿,排尿不适,尿色发红,血压偏高,疑为急性肾小球肾炎。采集 24 小时尿标本时,其正确的采集时间是

- A. 晨 7:00 至次日晨 7:00
B. 晨 11:00 至次日晨 11:00
C. 午 12:00 至次日午 12:00
D. 晚 7:00 至次日晚 7:00
E. 晚 0:00 至次日晚 0:00

88. 患儿,男,9个月。因间断发热、咳嗽半个月,拟诊“支气管炎”,给予口服“氨苄西林”治疗。护士给患者做口腔护理时发现其口腔黏膜破溃,创面上附着白色膜状物,用棉签将附着物拭去后创面有出血。护士应该给他选用的口腔护理溶液是

- A. 2%~3%硼酸溶液 B. 0.9% NaCl 溶液
C. 甲硝唑溶液 D. 2%碳酸氢钠溶液
E. 3%过氧化氢溶液

89. 患者,女,58岁。腹部手术后卧床,皮肤护理时需要预防压疮发生,因为长时间采取了易产生剪切力的下列哪种体位

- A. 头高足低位 B. 仰卧屈膝位
C. 半坐卧位 D. 仰卧中凹位
E. 左侧卧位

90. 患者,女,34岁。为协助胆道疾病诊断,需行十二指肠引流。正确体位是

- A. 俯卧位 B. 仰卧屈膝位
C. 侧卧位 D. 头低足高位
E. 半坐卧位

91. 患者,男,42岁。因剧烈腹泻来诊,高度怀疑为霍乱。正在等待检查结果以确认诊断。此时,对该患者的正确处置方法是

- A. 收住入本院消化科病房
B. 在留下联系电话后要求其回家等通知

- C. 有护士陪伴时患者可外出活动
D. 在指定场所单独隔离
E. 要求患者尽快自行前往市疾控中心确诊
92. 患者,女,42岁。行子宫肌瘤切除术,医嘱“青霉素皮内试验”。错误的做法是
A. 如青霉素过敏须做皮试
B. 青霉素试验液的剂量是20~50U
C. 青霉素试验液应现配现用
D. 询问患者最后一次使用青霉素的时间
E. 皮试前应准备急救药物
93. 患者,男,36岁。因食用不洁食物引起腹泻、呕吐。对纠正体内电解质失调有显著效果的溶液是
A. 浓缩白蛋白 B. 右旋糖酐
C. 晶体溶液 D. 5%碳酸氢钠溶液
E. 5%葡萄糖溶液
- ※94. 患者,女,19岁。因患先天性心脏病、房间隔缺损,择期手术。在术中应输入的血液制品是
A. 红细胞悬液 B. 冰冻血浆
C. 自体输血 D. 血小板浓缩悬液
E. 白细胞浓缩悬液
95. 患者,男,59岁。鼻饲喂食。正确测量胃管插入长度的方法是
A. 从耳垂至剑突的距离
B. 从眉心至剑突的距离
C. 从前发际至胸骨柄的距离
D. 从发际至鼻尖再到耳垂的距离
E. 从前发际至剑突的距离
96. 患者,男,49岁。口腔术后1天,鼻饲进食。两次喂食间隔时间至少为
A. 4小时 B. 3小时
C. 2小时 D. 1.5小时
E. 1小时
97. 患者,男,57岁。医嘱明日上午九时在硬膜外麻醉下行腹部探查术。今晚、明晨需行大量不保留灌肠。灌肠过程中患者出现脉速、面色苍白、出冷汗。正确的处理方法是
A. 停止灌肠,通知医生
B. 降低液面,嘱患者深呼吸
C. 升高液面,快速灌入液体
D. 移动或挤捏肛管
E. 控制调节器,减慢液体灌入速度
98. 患者,男,48岁。因卵巢囊肿摘除术后感到疼痛,医生于4pm开出医嘱:阿法罗定10mg,im,sos。此医嘱失效的时间是

- A. 7pm B. 11pm
C. 次日4am D. 次日4pm
E. 医生注明的停止时间
- ※99. 患者,女,68岁。股骨颈骨折,非手术治疗,持续皮牵引。护士为其制定的护理措施不恰当的是
A. 严格按照骨科制定的常规实施
B. 与医疗工作相协调
C. 能保证患者的安全
D. 具体、明确
E. 体现个体化的护理
100. 患者候诊时突然剧烈腹痛,面色苍白,出冷汗,呼吸急促。候诊室护士首先应
A. 让患者到患者少的科室看病
B. 安排患者提前就诊
C. 给患者测量血压
D. 安慰患者
E. 请医生加速诊疗速度
101. 患者,女,56岁。艾滋病患者。需要吸痰时,做法错误的是
A. 吸痰前洗手,戴好口罩、护目镜
B. 吸痰前应戴手套
C. 不与其他患者共用中心吸引系统
D. 用过的吸痰管及纱布装入高危品袋中焚烧
E. 吸痰后吸痰管误落地上,立即进行地面的清洁处理
102. 患者,女,42岁。因脊髓损伤致尿失禁,给予留置导尿管。下述护理措施正确的是
A. 随时倾倒尿液,并提高引流管
B. 每周更换集尿袋
C. 每月做尿常规检查1次
D. 每周用消毒棉球擦拭尿道口
E. 发现尿液浑浊时进行膀胱冲洗

二、II型题(A₃/A₄型题):下列每个病例下设若干考题,请根据各考题题干所提供的信息,从每道题A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号对应答案所属的方框涂黑。

(103~106题共用题干)

患者,男,30岁。半小时前因汽车撞伤头部入院,入院时已昏迷。

103. 仰卧时该患者容易发生压疮的部位是
A. 髌部 B. 骶尾部
C. 背部 D. 头部
E. 坐骨结节

104. 对于此患者应采取的护患关系模式是

- A. 共同参与型
- B. 主动-被动型
- C. 指导-合作型
- D. 并列互补型
- E. 相互独立型

※105. 患者皮肤若因水肿而变薄, 出现水疱。是属于压疮的

- A. 淤血红润期
- B. 溃疡期
- C. 炎症浸润期
- D. 坏死溃疡期
- E. 败血症期

106. 该患者治疗无效不幸死亡。目前医学界主张判断死亡的诊断标准是

- A. 瞳孔缩小
- B. 脑死亡
- C. 呼吸停止
- D. 心跳停止
- E. 各种反射消失

(107~109 题共用题干)

患者, 男, 60 岁。近 2 个月来咳嗽, 痰中带血, 经抗感染、对症治疗症状改善, 但胸片示右肺门旁 3cm×3cm 左右肿块影, 边缘模糊, 右肺尖有钙化。吸烟, 10 年前曾患右上肺结核, 已治愈, 平素体健。

107. 为确诊最恰当的检查方法是

- A. 痰脱落细胞学检查
- B. 经胸壁穿刺活检
- C. 支气管纤维镜检查
- D. 胸部 X 线片
- E. 纵隔镜检查

108. 该患者确诊为中央型肺癌, 行右全肺叶切除术加淋巴结切除术, 最不可能发生的并发症是

- A. 出血
- B. 感染
- C. 肺不张
- D. 肺水肿
- E. 腹泻

109. 该患者手术后第 1 日, 其护理措施中错误的是

- A. 协助患者深呼吸及咳嗽
- B. 适当给予镇痛药
- C. 24 小时补液量控制在 2000ml 内
- D. 取头低仰卧位引流排痰
- E. 患者生命体征平稳后, 协助其床旁站立移步

(110~112 题共用题干)

患者, 男, 45 岁。活动后突然出现剧烈头痛, 喷射性呕吐, 随后意识模糊, 无肢体瘫痪, 脑膜刺激征阳性, CT 检查见高密度影, 既往体健。

110. 该病最可能的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下隙出血
- E. 短暂性脑缺血发作

111. 本病最常见的病因是

- A. 先天性脑动脉瘤
- B. 脑动脉粥样硬化

C. 血小板减少

D. 凝血机制障碍

E. 高血压

112. 该患者病因诊断的主要依据是

- A. 脑超声检查
- B. MRI 检查
- C. CT 检查
- D. 脑血管造影
- E. 脑脊液检查

(113~115 题共用题干)

患者, 女, 68 岁。2 年前丈夫病故后, 经常独自流泪, 近 1 年来常出现记忆障碍。前几日, 患者独自外出后未归, 后被家人找到。

113. 该患者最可能是

- A. 脑卒中
- B. 妄想症
- C. 抑郁症
- D. 焦虑症
- E. 早期阿尔茨海默病

114. 对于该疾病, 目前临床最常用的治疗药物是

- A. 抗焦虑药物
- B. 抗抑郁药物
- C. 抗躁狂药物
- D. 乙酰胆碱酯酶抑制剂
- E. 促进代谢药物

115. 社区护士家庭访视时, 注意到其女儿照料患者的过程中采取以下做法, 其中不正确的是

- A. 为防止患者走失, 不让她外出, 把他整日关在家里
- B. 在她衣服上写名字和家中电话
- C. 尽量让患者自己的事情自己做
- D. 让患者帮忙料理一些家务
- E. 为帮助患者记忆, 会常和她一起看过去的生活照片

(116~118 题共用题干)

患儿, 男, 胎龄 34 周, 日龄 4 日。出生体重为 2105g。脉搏 135 次/分, 呼吸佳, 四肢能活动, 全身皮肤红嫩。

116. 依据体重分类, 此患儿属于

- A. 极低出生体重儿
- B. 巨大儿
- C. 正常出生体重儿
- D. 超低出生体重儿
- E. 低出生体重儿

※117. 与此患儿外观特征不符的是

- A. 足底布满纹路
- B. 皮肤薄嫩, 胎毛多
- C. 耳郭不清楚
- D. 乳房无结节
- E. 头发细如绒毛

118. 此患儿护理措施中错误的是

- A. 晨间护理时室温调到 27~28℃, 相对湿度 55%~65%
- B. 与足月儿分开, 实施保护性隔离
- C. 喂养时首选母乳
- D. 给予合适的体位, 常采取侧卧位
- E. 密切观察患儿病情, 及时报告医生

(119、120 题共用题干)

患者,男,33 岁。因溺水后获救被送至医院急诊 EICU,经抢救后,现患者呼吸心跳已经恢复。

119. 目前该患者应该重点进行的步骤是

- A. 脑复苏
- B. 一期复苏
- C. 二期复苏
- D. 上呼吸机
- E. 电除颤

120. 关于低温疗法的护理,哪一项是错误的

- A. 不宜翻身和移动体位
- B. 体温不低于 32℃
- C. 保持水、电解质平衡
- D. 严密观察生命体征
- E. 复温时先停冬眠药物,后撤降温

实践能力

一、I 型题 (A₁/A₂ 型题): 请从各题 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号对应答案所属的方框涂黑。

1. 输卵管结扎术的所结扎输卵管的部位是

- A. 间质部
- B. 伞部
- C. 壶腹部
- D. 峡部
- E. 漏斗部

2. 慢性子宫颈炎症的主要症状是

- A. 接触性出血
- B. 白带增多
- C. 月经过多
- D. 阴道流血
- E. 外阴皮肤瘙痒

3. 某患者入院行宫颈癌根治术。术前 1 日,护士为其所做的准备工作中不包括

- A. 灌肠
- B. 备血
- C. 备皮
- D. 导尿
- E. 皮试

4. 在第三产程中,对产妇的评估最重要的是

- A. 乳汁分泌的情况
- B. 宫缩情况,阴道流血的量及颜色
- C. 体温
- D. 疼痛
- E. 会阴伤口情况

5. 35 岁产妇,因胎儿宫内窘迫行低位产钳助产术娩出一活婴。产后 3 天诉会阴部疼痛难忍。查体:会阴部肿胀,左侧切口红肿、有触痛。以下处理不正确的是

- A. 红外线照射
- B. 50%硫酸镁湿敷切口
- C. 每日冲洗外阴
- D. 取健侧卧位
- E. 1:5000 高锰酸钾溶液坐浴

6. 某孕妇,妊娠 30 周。因出现无诱因,无痛性阴道流血来院检查。此时一般不主动进行的检查是

- A. 测量血压
- B. 胎心监护
- C. 超声检查
- D. 腹部检查

E. 阴道检查

7. 某孕妇,28 岁,妊娠 36 周来院进行产检。哪项指标最能够反映胎儿生长发育状况

- A. 孕妇体重
- B. 胎方位
- C. 胎心率
- D. 宫高与腹围
- E. 胎动

8. 一般患者短时间肛门检查最常用的体位是

- A. 蹲位
- B. 膝胸卧位
- C. 左侧卧位
- D. 截石位
- E. 仰卧位

9. 患者,男,35 岁。排便时肛门滴出鲜血。不痛,考虑该患者为

- A. I 期内痔
- B. II 期内痔
- C. 血栓性外痔
- D. 混合痔
- E. 肛裂

10. 患者,男,41 岁。诊断为胆总管结石。拟行胆总管切开取石、T 管引流术。护士告知患者及家属放置 T 管的主要作用是

- A. 引流胆汁和减压
- B. 方便进行弹道冲洗
- C. 防止胆汁进入腹膜腔
- D. 促进伤口引流
- E. 防止胆汁进入十二指肠

11. 患者,男,43 岁。因胆道梗阻出现黄疸,尿中有胆红素,其尿液颜色为

- A. 淡黄色
- B. 红色
- C. 乳白色
- D. 酱油色
- E. 黄褐色

12. 某妊娠合并糖尿病产妇,孕期无其他合并症。于妊娠 39 周剖宫产一健康男婴。对于新生儿应重点监测的内容是

- A. 大小便
- B. 体重
- C. 黄疸
- D. 血糖
- E. 体温

13. 葡萄胎患者手术后避孕的最佳方式是

- A. 针剂避孕药
- B. 宫内节育器避孕
- C. 口服避孕药避孕
- D. 皮下埋植法避孕
- E. 阴茎套,阴道隔膜

14. 孕妇, 26 岁。妊娠 39 周, 上午家务劳动时突感胎动频繁, 至傍晚胎动渐减弱、消失, 急诊入院, 听诊胎心音 90 次/分。下列护理措施不妥的是
- A. 左侧卧位, 间断吸氧
B. 行胎心监护
C. 嘱孕妇增加营养和休息即可, 继续观察病情
D. 协助做好剖宫产的准备
E. 做好新生儿的抢救和复苏准备
15. 患儿, 男, 8 岁。以呕吐、惊厥、烦躁、高热 3 小时入院。查体: 体温 39.6℃, 心率 120 次/分, 右下肢呈半屈曲状, 膝上部股骨下段处剧痛, 局部红、肿、热伴有压痛, 分层穿刺抽出浑浊液体, 涂片为脓细胞, 初步诊断为化脓性骨髓炎。用抗生素抗感染治疗 3 日后, 体温仍 39.5℃。此时对患儿应采取的最重要治疗措施是
- A. 应用镇痛药
B. 加大抗生素剂量
C. 卧床休息制动
D. 手术开窗引流
E. 复方氨基比林肌肉注射
16. 患者, 男, 58 岁。患左侧腹股沟斜疝, 半小时前背重物时疝块突然增大、不能回纳, 疝块紧张发硬伴疼痛和压痛。考虑其可能是
- A. 易复性疝
B. 难复性疝
C. 滑动性疝
D. 嵌顿性疝
E. 绞窄性疝
17. 早期诊断子宫内膜癌最常用的方法是
- A. 超声检查
B. 宫颈活检
C. 分段诊刮
D. 宫颈刮片
E. 妇科检查
18. 处理良性葡萄胎时, 下列哪项不对
- A. 应取水疱送病理检查
B. 均应做预防性化疗
C. 40 岁以上疑癌变者可考虑子宫切除
D. 吸宫术中预防子宫穿孔
E. 一旦确诊即行清宫
19. 1 岁女婴, 诊断动脉导管未闭 6 个月。于 3 天前突发发热, 咳嗽, 近 1 天来, 咳嗽、呼吸急促, 三凹征明显, 尿少, 急诊入院。查体: 体温 38.2℃, 脉搏 158 次/分, 呼吸 56 次/分, 肝肋下 4cm。护士还可观察到的表现是
- A. 周围血管征
B. 杵状指
C. 缺氧发作
D. 蹲踞症状
E. 黄绿视
20. 患儿, 女, 1 岁。以腹泻 2 日、无尿 7 小时入院。经过补液治疗后已开始排尿, 护士按照医嘱给予继续补液 200ml。该液体中可以最多加入 10% 氯化钾
- A. 14ml
B. 6ml
C. 8ml
D. 10ml
E. 12ml
21. 患者, 女, 30 岁。妊娠 39 周, 临产, 规律宫缩 12 小时, 胎膜已破 3 小时。肛查宫口开大 5cm, 胎先露 S+2。下列诊断正确的是
- A. 正常潜伏期
B. 正常活跃期
C. 潜伏期延长
D. 活跃期延长
E. 胎膜早破
22. 患者, 女, 30 岁。宫内妊娠 43 周, 未临产, NST 2 次无反应, OCT 10 分钟内出现晚期减速 2 次, 1 周前 E/C 比值为 15, 现仅为 7, 下列处理正确的是
- A. 吸氧后观察
B. 人工破膜
C. 缩宫素引产
D. 立即剖宫产
E. 口服雌激素
23. 胆道结石手术患者 T 管拔除之前, 应先试夹管 1~2 天, 同时注意重点观察
- A. 意识、血压、腹痛
B. 血压、呼吸、体温
C. 腹痛、体温、黄疸
D. 脉搏、血压、黄疸
E. 腹痛、呼吸、体温
24. 某孕妇, G2P0, 妊娠 30 周。规律下腹疼痛伴阴道血性分泌物 6 小时。查体: 胎位 LOA, 心率 138 次/分, 宫缩 20 秒/7~8 分钟, 宫缩力弱, 肛查胎先露 S-3, 宫颈宫缩, 宫口可容一指尖。目前最恰当的处理措施是
- A. 严密观察等待自然分娩
B. 滴注缩宫素加强宫缩
C. 阴道检查后确定分娩方式
D. 立即行剖宫产终止妊娠
E. 抑制宫缩保胎治疗
25. 高龄初产妇, 妊娠 39 周。产程进展 24h, 宫口开大 4cm 给予静脉滴注缩宫素后, 宫缩持续不缓解, 胎心 98 次/分, 耻骨联合处有压痛, 导尿时出现血尿。应考虑为
- A. 前置胎盘
B. 胎盘早剥
C. 痉挛性子宫
D. 先兆子宫破裂
E. 子宫收缩过强
26. 患者, 女, 53 岁。右膝关节下持续性疼痛 5 日, 以夜间为甚。查体: 右膝关节下明显肿胀, 皮温增高, 静脉怒张, 膝关节活动受限, X 线检查胫骨上端可见 Codman 三角。该患者最可能是
- A. 骨软骨瘤
B. 骨巨细胞瘤
C. 骨肉瘤
D. 骨样骨瘤
E. 软骨肉瘤
27. 患者, 男, 55 岁。诊断为颅内肿瘤, 已行手术切除肿瘤, 手术后颅内创腔放置引流。关于引流管的护理错误的是
- A. 创腔引流瓶高度一般应与头部创腔保持一致

- B. 引流管一般放置 3~4 日,待脑脊液转清即可拔管术后
- C. 术后 48 小时内可随意改变引流瓶的高度
- D. 术后早期引流量较多时可适当抬高引流瓶
- E. 不可随意降低或抬高引流袋
28. 患者,女,33 岁。经前乳房胀痛及出现肿块,月经后自行消退。应考虑
- A. 乳腺癌 B. 乳腺纤维瘤
- C. 乳腺肉瘤 D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳管内乳头状瘤
29. 预防室性心律失常的最佳方法是
- A. 适宜的锻炼 B. 保持情绪稳定
- C. 良好的饮食习惯 D. 经常进行健康体检
- E. 控制器质性心脏病病情
30. 患者,男,43 岁。胃溃疡病史 14 年。近 2 个月出现无规律上腹痛,恶心、腹胀、食欲缺乏加重,体重下降,经过规则治疗无明显效果。大便潜血持续阳性。根据上述症状和体征,提示患者可能有
- A. 幽门梗阻
- B. 胃溃疡合并出血
- C. 胃溃疡合并穿孔
- D. 胃溃疡合并恶变
- E. 胃溃疡合并胃炎
31. 患者,男,43 岁。因十二指肠溃疡并发瘢痕性幽门梗阻入院。术前护理中哪一项是特殊准备
- A. 皮肤准备 B. 心理护理
- C. 每晚洗胃 D. 术前用药
- E. 备血,皮试
32. 患者,男,44 岁。消化性溃疡 5 年,突发上腹部疼痛 2 小时,全腹部疼痛半小时入院。查体:急性病面容,全腹压痛、反跳痛。下列哪项体征最有助于诊断消化性溃疡合并穿孔
- A. 腹肌紧张 B. 肠鸣音消失
- C. 腹式呼吸减弱 D. 肝浊音界消失
- E. 移动性浊音阳性
33. 乙型肝炎的主要传播途径是
- A. 粪-口传播 B. 水传播
- C. 食物传播 D. 血液传播
- E. 媒介传播
34. 患者,男,40 岁。患类风湿关节炎,近日来手足及膝关节肿胀,疼痛加重,活动后疼痛减轻,伴有食欲缺乏、乏力等不适。其护理措施不正确的是
- A. 足底防护足板 B. 必要时使用夹板
- C. 维持膝关节屈曲位 D. 取平卧位,脊背挺直
- E. 卧床休息
35. 患者,女,20 岁。急性白血病。实验室检查:白细胞 $43 \times 10^9/L$,红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$,血红蛋白 $67g/L$,血小板 $10 \times 10^9/L$ 。此时,应着重观察患者的
- A. 活动耐力 B. 尿量
- C. 营养状况 D. 颅内出血征兆
- E. 月经量
36. 慢性左心功能不全最早出现的症状是
- A. 咳粉红色泡沫痰 B. 心源性哮喘
- C. 心源性水肿 D. 劳力性呼吸困难
- E. 食欲缺乏
37. 患者女,60 岁。慢性咳嗽、咳痰 30 年,下肢水肿 1 年。近半个月咳嗽加重,痰量增加,为黄色脓痰。呼吸困难,腹胀明显,食欲缺乏,诊断为慢性肺源性心脏病,呼吸衰竭。对患者进行的健康教育,不妥的内容是
- A. 可以长期应用抗生素预防呼吸道感染
- B. 避免吸入刺激性气体
- C. 尽量少去人多拥挤的地方,减少呼吸道感染的机会
- D. 鼓励患者进行耐寒锻炼,如坚持冷水洗脸
- E. 积极改善膳食结构,加强营养
38. 电动吸引器吸痰的适应证不包括
- A. 手术后伤口疼痛不敢咳嗽者
- B. 全麻术后未清醒患者
- C. 晚期癌症患者
- D. 年老体弱无力排痰患者
- E. 心力衰竭患者
39. 下列不属于医疗事故预防措施的是
- A. 建立并完善各种规章制度和诊疗操作规范
- B. 加强医德医风教育
- C. 不断提高医疗护理技术
- D. 严格控制探视
- E. 积极改善服务态度
40. 容易燃烧的药物是
- A. 维生素 C B. 硝普钠
- C. 过氧乙酸、糖衣片 D. 环氧乙烷
- E. 甲肝疫苗
41. 患者,女,55 岁。慢性肾小球肾炎 5 年,经住院治疗后病情明显好转,医嘱尿蛋白定量检查。采集标本正确的方法是
- A. 行导尿术 B. 留 24 小时尿
- C. 留中段尿 5ml D. 随时留尿 100ml
- E. 睡前留尿 100ml
42. 患者,男,50 岁。因“神志不清、行为异常 5

- 天,昏迷1天”入院,既往有肝硬化病史8年。目前身体虚弱,生命体征尚平稳,四肢发凉。护士用热水袋为其进行保暖,正确的方法是
- A. 热水袋内水温为70℃
B. 叮嘱家属随时更换袋内热水
C. 热水袋置于腹部
D. 热水袋水温与室温相同后撤走热水袋
E. 热水袋外裹毛巾
43. 患者,女,54岁。坐骨结节发生坏死溃疡期压疮,余无特殊。可给予的饮食类别是
- A. 高蛋白,低维生素 B. 高蛋白,低膳食纤维
C. 高蛋白,高维生素 D. 低蛋白,高膳食纤维
E. 低蛋白,低维生素
44. 患者,男,52岁。因急性胃肠炎入院,患者诉严重腹胀、腹痛。护士为减轻患者疼痛,应给患者取
- A. 俯卧位 B. 中凹卧位
C. 头高足低位 D. 侧卧位
E. 端坐位
45. 患者,男,32岁。因肠梗阻入院,医嘱补钾,其浓度不应超过
- A. 0.3% B. 0.5% C. 1%
D. 3% E. 5%
46. 患儿,女,2岁。因外伤行破伤风抗毒素过敏试验。20分钟后结果示局部皮丘红肿,硬结直径1.6cm,红晕直径4.1cm,自述有痒感。应采取的处理措施是
- A. 将抗毒素分4次逐渐增加剂量注射
B. 在对侧前臂做对照试验后再注射
C. 待患者症状消失后再全量注射
D. 停用破伤风抗毒素
E. 将抗毒素分成4等份,分次注射
47. 休克型肺炎的患者应用抗生素和补液治疗。提示患者病情好转、血容量已补足的体征不包括
- A. 口唇红润 B. 心率快,120次/分
C. 尿量>30ml/h D. 收缩压>90mmHg
E. 四肢温暖
48. 患者,男,18岁。诊断为急性肾炎,护士在进行评估时,不需要收集的资料是
- A. 母亲的过敏史 B. 父亲的婚育史
C. 家族史 D. 心理状态
E. 身高、体重
49. 某医院实行护理部主任—科护士长—病区护士长的护理管理模式,请问该医院管理的层次数是
- A. 5级 B. 4级 C. 3级
D. 2级 E. 1级
50. 大面积烧伤急救时,口渴患者应给予
- A. 热开水 B. 淡盐水
C. 纯净水 D. 糖开水
E. 凉茶水
51. 再生障碍性贫血一般不出现的表现是
- A. 面色苍白 B. 皮肤紫癜
C. 肛周感染 D. 肝、脾、淋巴结肿大
E. 全血细胞减少
52. 慢性肺源性心脏病,肺、心功能失代偿期,临床最突出的表现是
- A. 呼吸衰竭 B. 右侧心力衰竭
C. 左侧心力衰竭 D. 呼吸困难
E. 咳嗽、咳痰
53. 患者,男,41岁。头痛1年,近2个月头痛加重,伴有喷射性呕吐。烦躁后出现意识障碍,左侧瞳孔缩小,后又散大,对光反应迟钝,右侧肢体运动障碍,呼吸加快。CT示左顶叶肿瘤。首先采取的急救措施应是
- A. 20%甘露醇快速静脉滴注
B. 脑脊液体外引流
C. 去骨瓣减压
D. 气管插管,保持呼吸道通畅
E. 立即开颅切除肿瘤
54. 患儿,男,出生18日。生命体征平稳,母乳喂养,吸吮可。出院时护士应告知家长的正确指导是
- A. 培养良好的生活习惯 B. 预防外伤
C. 预防感染 D. 训练按时排便
E. 及时添加蛋黄
55. 3个月婴儿,体重6kg,给予8%糖牛奶喂养,每日需要牛奶的量是
- A. 660ml B. 460ml
C. 580ml D. 720ml
E. 620ml
56. 患者,男,70岁。因慢性肺源性心脏病并发肺炎,右侧心力衰竭入院治疗。护士核对医嘱时,应提出质疑的是
- A. 一级护理
B. 头孢美唑钠2.0g+5%葡萄糖100ml, ivgtt, q12h
C. 持续吸氧6L/min
D. 沐舒坦30mg+0.9%氯化钠100ml, ivgtt, tid
E. 氢氯噻嗪20mg, po, Bid
- ※57. 患者,男,45岁。诊断为膀胱结石,行碎石术后,护士发现膀胱冲洗液颜色较红。正确的处理是
- A. 立即送手术室 B. 用冰盐水冲洗