

大養  
家生

家庭实用百科全书  
**养生大系**



中草药配伍既能照顾复杂病情，又可增强疗效，减少毒副作用。对此，《神农本草经》有言：“有单行者，有相须者，有相使者，有相畏者，有相恶者，有相反者，有相杀者，凡此七情，合和时视之。”可见，中草药的配对与禁忌乃人们不可不知之事。

## 中医精神 世代相传

李春深◎编著

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

# 中草药配对与禁忌

李春深 编著

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

图书在版编目( CIP )数据

中草药配对与禁忌 / 李春深编著 .—天津：天津  
科学技术出版社，2018.1

ISBN 978 - 7 - 5576 - 3438 - 4

I. ①中… II. ①李… III. ①中药配伍—基本知识②  
中药—禁忌(中医)—基本知识 IV. ① R289.1 ② R285.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 169232 号

---

责任编辑：孟祥刚

责任印制：王 莹

---

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社出版

出版人：蔡 颖

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话：(022) 23332390 (编辑室)

网址：[www.tjkjcbs.com.cn](http://www.tjkjcbs.com.cn)

新华书店经销

三河市天润建兴印务有限公司

---

开本 640×920 1/16 印张 28 字数 400 000

2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定价：32.00 元

## 前　　言

中药配伍，即根据病情、治法和药物的性能，选择两种以上药物同用的用药方法。在传统中医学里有十八反，十九畏等等。中药配伍禁忌即某些因配方后可产生相反、相恶关系。服中药的禁忌大致可分为三种情况：①中药配伍禁忌；②孕妇用药禁忌；③服药期间饮食禁忌。

中药配伍禁忌即某些药物因配方后可产生相反、相恶关系，使彼此药效降低或引生毒副反应，故而禁忌同用。根据中医古籍规定，常见属配伍禁忌的中草药有：乌头与半夏、瓜蒌、贝母、白芨、白蔹，甘草与海藻、甘遂、芫花、大戟，藜芦与人参、丹参、玄参、沙参、苦参、细辛、芍药，硫磺与朴硝、水银与砒霜、狼毒与密陀僧、巴豆与牵牛、丁香与郁金、乌头与犀牛、人参与五灵脂、牙硝与三棱、官桂与赤石脂等。孕妇用药禁忌要为避免动胎、堕胎而设。因孕后妇女多对大寒大热、峻泻滑利、破血祛瘀及毒性较大的药物耐受性差，故而相关药物必须忌用。常见孕妇禁忌的中草药有：巴豆、牵牛、大戟、麝香、三棱、水蛭、莪术、斑蝥、虻虫、甘遂、芫花、商陆等；孕妇须慎用的中药有桃仁、红花、大黄、干姜、肉桂、枳实、附子等。

配对禁忌，是指两种以上药物混合使用或药物制成制剂时，发生体外的相互作用，出现使药物中和、水解、破坏失效等理化反应，这时可能发生浑浊、沉淀、产生气体及变色等外观异常的现象。有些药品配对使药物的治疗作用减弱，导致治疗失败；有些药品配对使副作用或毒性增强，引起严重不良反应；还有些药品配对使治疗作用过度增强，超出了机体所能耐受的能力，也可引起不良反应，乃至危害病人等。这些配对均属配对禁忌。

# 目 录

## 第一篇 常用中草药配伍与应用（上）

解表药	1
祛风湿药	21
温里药	33

## 第二篇 常用中草药配伍与应用（中）

芳香化湿药	45
渗湿利水药	54
泻下药	71
涌吐药	83

## 第三篇 常用中草药配伍与应用（下）

清热药	86
化痰止咳药	131
理气药	154
理血药	169

## 第四篇 常用中草药禁忌与应用（上）

解表药	206
清热药	233
泻下药	281
祛风湿药	297

## 第五篇 常用中草药禁忌与应用（中）

化湿药	315
利水渗湿药	322
温里药	341
理气药	352
消食药	366

## 第六篇 常用中草药禁忌与应用（下）

驱虫药	372
止血药	378
活血化瘀药	389
化痰止咳平喘药	415

# 第一篇 常用中草药配伍与应用（上）

## 解 表 药

解表药又叫发表药，是以解肌、开腠、发汗为主要作用的药物。根据其温凉属性的不同，分辛温和辛凉两类。

本类药物用于感受外邪，表现发热恶寒、头疼身痛、脉浮等表证症状者。其中大部分药物有宣肺的功效，故兼能止咳平喘；部分药物有祛散风寒湿邪作用，可兼治风寒湿邪所致的肢体疼痛。此外，对斑疹初起和透发不畅，疮疡初起营卫失和的发冷、发烧、身痛，水湿停郁于肌腠的上半身水肿，亦可用。

外感疾病因四时气候的差异、病人素质的强弱，治疗亦应有别。例如，风寒宜辛温解表，风热宜辛凉解表，挟暑者宜解表祛暑，挟湿者宜解表化湿，阳虚者应助阳解表，阴虚者应滋阴解表，气虚者应益气解表，血虚者应养血解表等，须选药辨证配伍。

应用本类药物应注意不可汗出过多而导致耗散阳气、损伤阴津。对体虚多汗、津液亏耗及疮疡已溃、淋病、失血的患者，应慎用或禁用。

### （一）辛温解表药

辛温解表药性味辛温，发散力较强，用于外感风寒出现恶寒、发热、头疼、身痛、颈项不舒、无汗或有汗、鼻塞、脉浮紧或浮缓、舌苔薄白等表寒证症状者。表实者选解表发汗作用较强的药物，并配宣达肺气与调和营卫的药；表虚者选解肌发表药，配调和营卫的药。二者都需酌情选配调和胃气之品，使谷气内充，外邪不复入，余邪则不复留。此

外，对气、血、阴、阳虚弱者，寒饮、咳喘、内热、挟湿、挟暑等，应佐以随症药。

本类药物发汗力较强，应用时除应遵守解表药的一般禁忌外，对阴虚阳亢、下虚上实者应慎用。

## 麻 黄

**【性味归经】** 性温，味辛、微苦。入肺、膀胱经。

**【功效】** 发汗，止喘，宣痹，利尿。本品辛温发散，轻扬宣泄，为发汗峻药。因有宣肺作用，而为止风寒喘咳的要药；因有散寒作用而可宣痹止痛；又因能宣肺气下达膀胱，故可通调水道而有利尿消肿的功效。

### 配伍应用

**麻黄 桂枝** 麻黄解表发汗，桂枝解肌发表。合用能解肌发表散寒，适用于外感风寒表实无汗症。

麻黄善宣卫气、散表寒，桂枝长于通血脉、温经散寒，一宣达气机，一通畅血脉，故能温经通脉、散风寒湿邪而治疗痹痛。常与其他温经散寒止痛药物同用，如〈桂枝芍药知母汤〉即与附子、防风等同用。

**麻黄 杏仁** 取麻黄散寒宣肺定喘，杏仁降气止咳。相使为用，有散寒止咳定喘作用，长于治疗风寒咳嗽、气喘。

**麻黄 生石膏** 麻黄得生石膏之辛凉，能制其温燥之偏，但不减低其定喘效能。相配则清泄肺热平喘，可用于治热邪壅肺的咳嗽、气喘、鼻煽。加杏仁、甘草为《伤寒论》〈麻杏石甘汤〉，清热宣肺平喘的功效显著，对肺炎、支气管炎、小儿麻疹合并肺炎均有疗效。再加桑白皮泻肺平喘为〈五虎汤〉，止喘效果更佳。并常佐黄芩泻肺火，效愈彰著。

**麻黄 干姜** 麻黄得干姜之温中燥湿化痰，有温肺散寒、化饮止喘的功效，常用于寒饮喘咳。如〈小青龙汤〉与细辛、半夏同用，取其温中除饮、和胃降逆，与五味子同用，取其散中有收，后世治肺寒痰饮喘咳，多遵循此法则。若痰郁化热见烦躁、咳吐不爽者，可参照〈小青龙加石膏汤〉〈厚朴麻黄汤〉方意，佐生石膏、黄芩清肺火，其效果

较好。

**麻黄 熟地黄** 麻黄宣气通络，得熟地黄而不辛燥，熟地黄补阴，佐麻黄能去其腻滞。相使为用，有益肾补虚止喘咳的功效，可用于寒湿阻滞脉络的阴疽，或肾虚寒饮喘咳。

**麻黄 附子** 麻黄辛温，宣通经络散外寒。附子辛热，温通经脉祛里寒。相配则温经通脉、助阳散寒，可用于风寒痹痛及阳虚外感、浮肿。若加炙甘草为《金匱要略》〈麻黄附子汤〉。取炙甘草益中气，鼓舞麻黄使水气自除，达皮腠使水气为汗液，但应有附子助阳，更鼓舞麻黄功效。治水气病脉沉者。

**麻黄 白术** 取麻黄宣肺气下达膀胱通调水道，白术健脾燥湿。相使为用，有益气化湿利尿作用，可用于水肿病初起，并可与茯苓皮、桑白皮之类渗利药同用，以增强利尿效力。

**【常用量】** 1.5~9克。

### 桂 枝

**【性味归经】** 性温，味辛、甘。入心、肺、膀胱经。

**【功效】** 解肌发表，温阳通脉。本品辛温散寒，透达营卫，解肌发表。甘温通血脉、助心阳。解肌发表，能治外感风寒有汗或无汗的表证；温经散寒，可治虚寒腹痛及风寒湿痹、阳虚水停诸症；温阳通脉，能治血寒经闭、少腹胀痛等症；助心阳，能治心阳不振之心悸、不寐等症。

#### 配伍应用

**桂枝 白芍** 桂枝解表能和卫阳，白芍滋敛能和营阴。相配解表则卫阳通畅而不伤营阴，滋敛则营阴调和而不滞阳气，宜用于外感风寒、营卫不和的表虚自汗者。

取桂枝温中散寒，白芍缓急止痛，合用有温中补虚、健脾止痛的功能，常用于里虚腹痛。

**桂枝 附子** 桂枝解肌散表浅风寒，附子补阳祛深伏寒湿。合用能温经通阳、祛寒止痛，可治阳虚外感风寒湿邪的畏冷、四肢疼痛。

**桂枝 甘草** 相伍为《伤寒论》〈桂枝甘草汤〉。取桂枝通心阳，炙

甘草益心气。合用辛甘化阳、益气通脉而补心脾，常用于治胸阳受损的心悸气短。原方治“发汗过多，其人叉手自冒心、心下悸、欲得按者。”若加半夏，为《伤寒论》〈半夏桂枝甘草〉，治“少阴病咽中痛”，取半夏生用有麻木止痛之功。

**桂枝 茯苓** 取桂枝通阳化气，茯苓健脾利湿。合用通阳利湿，可治阳虚水肿；取桂枝温阳通脉，茯苓补益心脾，可用于治心阳不振的心悸、气短。

**桂枝 牡蛎** 取桂枝通畅心阳，牡蛎潜镇亢阳、收敛正气。常与龙骨同用，增强镇静安神效力，治疗心阳不振所致阳浮于上，阴伤于下而出现烦躁、失眠者。三药加白芍、生姜、大枣、甘草为《金匱要略》〈桂枝龙骨牡蛎汤〉，可治虚劳失精、多梦。

**桂枝 丹参** 取桂枝通心气，丹参活心血。合用能通阳活血，可用于心阳不振、瘀血痹阻的心悸、胸痛及血虚有瘀的惊悸、失眠等症。

**桂枝 吴茱萸** 二药均可散寒。桂枝通阳化气、散经脉之寒，吴茱萸温中和肝胃、助脾肾之阳，且能疏肝下气。相配有化阴寒凝滞的功效。常人〈四物汤〉治妇女冲任虚寒的月经不调、小腹冷痛诸症。

**桂枝 桃仁** 取桂枝温阳通脉而和血散瘀，桃仁破血散瘀而通脉络。相配有温阳通络散瘀的功效，可用于妇女血瘀症块及外伤性瘀血阻滞脉络的疼痛。

**桂枝 生姜** 取桂枝解肌发表，生姜解表散寒。同用增强发散风寒之力。生姜又有和胃祛湿之功，故常用于外感风寒、胃脘不适或恶心呕吐者。

**【常用量】** 3~9克。

**【参考】** 本品为樟科植物肉桂的嫩枝。

本品对阳盛阴虚及一切出血疾患不宜用。

据现代医药研究，本品含挥发油，其中主要成分为桂皮醛。此外，还有乙酸桂皮脂及苯丙酸乙酯等。有镇痛、强心、健胃及刺激汗腺分泌、扩张皮肤血管而发汗散热的作用。桂皮酚可抑制炭疽杆菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌及沙门氏菌的作用。

## 细 辛

**【性味归经】** 性温，味辛。入心、肺、肾经。

**【功效】** 散风，祛寒，止痛，化饮。本品辛温香窜，辛可散风，温可祛寒，既能发散肌表风寒以治感冒，又能温散经脉寒湿而治疗痛；香窜升散有通窍止痛的功用，可治鼻塞、头疼、齿痛；温行水气，有化饮止喘咳的效能，常用于寒饮喘咳。为散风寒止痛的常用药。

### 配伍应用

**细辛 麻黄** 取二药的表散风寒作用，可治疗外感风寒；取细辛温肺化饮，麻黄宣肺定喘，可止风寒痰饮喘咳；取细辛温散经脉寒湿，麻黄宣散肌表风寒，可治风寒湿痹而止痛。加附子温阳通脉，为《伤寒论》〈麻黄附子细辛汤〉，治伤寒少阴发热、脉沉者。

**细辛 柴胡** 细辛升肾阳而散寒止痛，柴胡升肝经清阳而疏泄郁结。合用能升正气上济于头，散经气之郁而止痛，可用于风寒郁遏经气不宣或外伤引起的头痛。

**细辛 五味子** 取细辛温肺化饮，五味子收敛肺气。一散一敛，相反而相成，功效更显著，为治寒饮喘咳的常用配伍。

**细辛 生地黄** 细辛善于止痛，但其性辛燥升散，得生地黄滋阴清热，可去其燥烈升散之弊，而有清热止痛的功效。可用于风热头痛、牙痛。

**【常用量】** 1.5~3 克。

**【参考】** 本品为马兜铃科植物北细辛及华细辛的全草。

历代文献记载，细辛单味服用不可过钱，过量有气闭致死之说。临床有配等量甘草入煎剂而用至三钱者，亦无此弊，供参考。

本品对虚性头痛、肺虚咳喘者忌用。反藜芦。

据现代医药研究，本品含挥发油，其中主要成分为甲基丁香酚、蒎烯、细辛酮，有解热、镇痛和抗革兰氏阳性细菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌等作用。若大量服用于动物，初呈兴奋现象，继而陷于麻痹，渐而是随意运动及呼吸运动减退，反射消失，终以呼吸麻痹而死亡。

## 羌 活

**【性味归经】** 性温，味辛、苦。入膀胱、肝、肾经。

**【功效】** 表散风寒，祛湿止痛。本品辛能升散，温能祛寒，苦能燥湿，既能发表散寒，又能除湿疗痹而通利关节，行散止痛，尤其善于祛上半身的风寒湿邪。为外感风寒及风寒湿痹疼痛的常用药。

### 配伍应用

**羌活 川芎** 二药都有升散止痛的功用，但羌活升散气分风寒湿邪而止痛，川芎则活血行气、祛风止痛。相配有散风行气、活血止痛的功效，可用于一般外感疾病的身疼肢痛、风寒湿痹疼痛及偏正头痛。

**羌活 防风** 二药都有祛风湿止痛作用，相须为用能增强功效，可用于风寒诸症。例如〈九味羌活汤〉即与苍术、白芷、细辛、川芎等同用，除风湿止疼痛效力更好，可治外感风寒湿邪的头痛、肢体疼痛。

**羌活 独活** 二药都能祛风湿，但羌活偏于散表浅的风湿，而独活偏于除深伏的风湿。相须为用，可散风除湿、通络止痛，用于治疗风寒湿痹。常与防风、苍术同用，以增强祛风燥湿止痛作用。

**羌活 藁本** 二药都有表散风寒、祛湿止痛的作用。羌活善于祛上半身之风寒湿邪，藁本长于上达头顶。相配可用于外感风寒湿邪所致的头痛。上半身肢体酸痛等症。

**【常用量】** 6~9克。

**【参考】** 本品为伞形科多年生草本植物羌活的根茎。

本品对血虚痹痛但不属风寒湿邪为病者慎用。

据现代医药研究，本品含有挥发油、有机酸及生物碱等，其中挥发油对皮肤真菌有抑制作用。

## 紫 苏

**【性味归经】** 性温，味辛。入肺、脾经。

**【功效】** 解表散寒，理气安胎。本品辛温芳香，有宣畅气机之功。紫苏叶长于发表，但解表发汗之力较缓，多用于感冒胸闷、发热无

汗、咳嗽、呕吐。紫苏梗善于理气宽中行滞，多用于肺脾气滞的胸腹胀满、呕吐嗳气及胎动不安。此外，能解鱼、蟹中毒。

### 配伍应用

**紫苏 藿香** 二药都能解表理气，温中化浊。而紫苏理气作用较强，藿香化湿效力较胜。常相配用，治疗外感风寒挟湿症，对有腹痛、吐泻者疗效更好。

**紫苏 桔梗** 紫苏解表祛痰，桔梗宣肺止咳祛痰。相配可用于感冒风寒鼻塞、咳嗽痰多等症。常与杏仁、前胡同用，其止咳效力更显著。

**紫苏 砂仁** 取二药都有理气安胎的功用，可用于气机不畅的胸腹满闷、胎动不安；取紫苏理气宽中行滞，砂仁开胃行气消食，可用于脾胃气滞的脘腹胀满、呕吐等症。

**紫苏 黄连** 取紫苏理气安胎，黄连清热燥湿止呕，相使为用有清热燥湿安胎之功，可治妊娠呕吐、心烦不安。

**【常用量】** 4~9克。

**【参考】** 本品为唇形科植物紫苏的叶。

据现代医药研究，本品含有挥发油。体外实验有抑制葡萄球菌的作用。煎剂能扩张皮肤血管，刺激汗腺神经而发汗。此外，还有减少支气管分泌物、缓解支气管痉挛及促进消化液分泌、增强胃蠕动的效能。

据现代医药研究，本品含有挥发油，主要成分为右旋薄荷酮、消旋薄荷酮及柠檬烯等，能促进皮肤血液循环，增强汗腺分泌，有轻微的解热、解疼作用及促进疮癩病变组织的破坏和吸收。体外试验，能抑制结核杆菌的生长。

### 防 风

**【性味归经】** 性温，味辛、甘。入膀胱、肝、脾经。

**【功效】** 解表散风，除湿止痉。本品气薄性升，缓而不燥，可祛周身之风，尤以祛在表之上之风为强，兼能胜湿，为治外感风寒湿邪的头痛、身痛及风寒湿痹关节酸痛的常用药。以其散风解痉作用，可治疗破伤风、痉挛、抽搐等症。炒用可止血，常用于血痢、便血等。

### 配伍应用

**防风 秦艽** 防风散风除湿，性温不燥，秦艽散风通络，兼除湿热郁蒸的骨蒸潮热。相配能祛风除湿、活络止痛而无疏散辛燥之偏，适用于热痹及风寒湿痹体弱血虚者。

**防风 苍术** 二药均有表散风湿作用。但防风偏于散风，除湿次于苍术，苍术偏于燥湿，散风次于防风。相配则善于治风湿痹痛及脾湿感受风寒引起的水泻。

**防风 天南星** 防风祛风除湿，天南星辛散而专祛经络之风痰。相配能祛风湿、除痰通络。可用于外邪引起的风痰壅滞经络之头痛、身痛、麻木。《本事方》以此二味名〈玉真散〉，取其祛痰散风解痉作用，治疗破伤风、痉挛、抽搐。

**【常用量】** 4.5~9克。炒用9~15克。

**【参考】** 本品为伞形科植物防风的根。

据现代医药研究，本品含有挥发油、甘露醇、酚性物质及多糖，可解因大肠杆菌及 $\beta$ -一四氢萘胺伤寒混合菌苗引起的发烧。煎剂有发汗解热镇痛的作用。此外，对羊毛状小芽孢杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌均有抑制作用。

据报道，本品同甘草煎服，可解砒及食物中毒。

### 白芷

**【性味归经】** 性温，味辛。入肺、胃、大肠经。

**【功效】** 祛风除湿止痛，活血排脓。本品辛香升散，可祛风除湿止痛，常用于感受风寒的肢体疼痛、头痛，尤以治眉棱骨痛为优，且治妇女寒湿带下腹痛。以其辛温能通散活血，可治疮疡肿痛、脓排不畅，以其兼有芳香通窍的功效，可治鼻渊。

### 配伍应用

**白芷 藁本** 二药均有上行祛风散寒止痛的功效，相配则散寒止痛效力显著，可治风寒头痛，尤以头顶痛多用。

**白芷 细辛** 取二药辛香升散、通窍止痛的功效，相须为用，可治

疗风寒头痛、鼻渊头痛及眉棱骨痛等。

**白芷 桔梗** 二药都有排脓作用，且白芷兼能活血，桔梗升提气血而能消肿，相须相使，功效更好。常相配用，治疗疮疡已溃，脓成而不易外出者。

**白芷 川芎** 二药都辛香走散，上行于头，有止痛的功效。但白芷偏于升散，川芎长于活血行气，有“头痛必用川芎”的说法。配荆芥、紫苏治风寒头痛；配菊花、茶叶治风热头痛，均有佳效。

**白芷 甘草** 取白芷止痛，甘草补脾胃缓急止痛，且可缓白芷辛温之性。相配能增强止痛效力，可用于胃溃疡病疼痛，有一定疗效。

**白芷 贝母** 二药相伍为《寿世保元》〈立效散〉。取白芷通散活血、消痈疡肿痛，贝母开气机郁结、清热化痰。相配有行气活血、清热化痰、消肿之功。治妇人乳房漫肿、硬痛（妇女生育后患此病者名外吹乳，怀孕后患此病者名内吹乳）。

**白芷 独活** 取白芷辛香、通散活血；独活辛散，通络祛风湿。若加薄荷辛凉行散、解郁行气，为《秦世保之》〈正颜丹〉，治口眼咽喉邪。

**【常用量】** 3~9克。

**【参考】** 本品为伞形科植物白芷的根。

本品对阴虚火旺者忌用，疮疡溃后脓尽者不宜再用。

据现代医药研究，本品含有挥发油和白芷毒素。白芷毒素少量能兴奋中枢神经，可使呼吸增强、血压上升，甚者呕吐。大量服后可呈现强直性及间接性的痉挛，终至麻痹。此外，对大肠杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、绿脓杆菌、霍乱弧菌、结核杆菌及皮肤真菌均有抑制作用。

## 辛夷

**【性味归经】** 性温，味辛。入肺、胃经。

**【功效】** 表散风寒，温肺通窍。本品辛温升散，体轻性浮，既能发散风寒表症，又散肺中风邪而升清阳以通鼻窍。常用于外感风寒鼻塞，尤为治鼻渊的要药。

### 配伍应用

**辛夷 苍耳子** 二药均有上行疏风通窍作用，相配疗效较佳，为治疗风寒鼻塞、鼻渊头痛的常用配伍。有热者常与生石膏、薄荷、黄芩同用。据称配菊花、茜草治疗上额窦炎有显著疗效。

**辛夷 白芷** 二药均能发散风寒，辛夷尤能散风邪、升清阳而通鼻窍，白芷芳香通窍、祛风止痛。相配功效甚好，可用治鼻渊及风寒头痛。

**辛夷 菊花** 取辛夷升清阳而通鼻窍，菊花清肝泄热、解毒消肿。辛夷辛温，菊花苦寒，寒温相济，最得配方之妙，可用于治鼻渊、头痛。

**辛夷 细辛** 二药都有发散风寒、温肺通窍的作用。辛夷尤能通窍，细辛长于止痛。相配功效更好，可治风寒鼻塞、头痛。

**【常用量】** 3~9克。

**【参考】** 本品为木兰科植物辛夷的花蕾。

据现代医药研究，本品含有挥发油，有收缩鼻黏膜血管作用，可治各种鼻炎，尤其对过敏性鼻炎疗效更好。此外，其非挥发性成分有兴奋子宫和降低血压作用。

### 葱 白

**【性味归经】** 性温，味辛。入肺、胃经。

**【功效】** 解表散寒、通阳利水。本品辛能发散，温可散寒，为感冒风寒、恶寒发热、头痛、鼻塞、咳嗽的常用药。其辛温通阳走散，可奏止痛下乳、利水之效，亦可用于小便不利、乳汁不行等症。

### 配伍应用

**葱白 豆豉** 二药相伍为《千金方》〈葱白香豉汤〉。葱白发汗通阳，豆豉解表退热。相配有发表散寒、解肌退热之功，可用于外感风寒、发热、头痛无汗。

**葱白 生姜** 二药均能表散风寒。葱白兼可通阳止痛，生姜散寒和胃止呕。相配功著，常用治外感风寒症兼见呕吐者。

**葱白 千姜** 取葱白通阳，干姜回阳。相配有消阴升阳之效，可治

少阴下利、阳衰阴盛、表现恶寒、脉微者。若加附子为《伤寒论》〈白通汤〉，为治上症的专方。

**【常用量】** 3~9克或2~3寸。

**【参考】** 本品为百合科植物葱的近根部白茎。

本品对表虚多汗者忌用。

据现代医药研究，本品含挥发油，其主要成分为蒜素，又含维生素C、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、烟酸等。

据报道，本品能刺激神经，促消化液分泌，预防消化器内寄生虫之寄生。体外试验葱之挥发油对痢疾杆菌有抗菌作用，对皮肤真菌有不同程度的抑制作用。葱白滤液在试管内能杀阴道滴虫。此外，能预防感冒，治急性乳腺炎等。

## (二) 辛凉解表药

辛凉解表药性味多辛凉，有解表泄热的作用，适用于外感风热或温燥之邪引起的肺气不宣、肌表疏泄失常，出现发热重、恶寒轻、口渴有汗或无汗、舌苔薄白而干或微黄、脉浮数等表热证，以及风热所致的喘咳、斑疹未透或疮疡初起见有上述症状者，亦可选用。常佐以宣肺泄热、和胃生津之品。若风热上蒸咽喉肿痛者，应佐以清热利咽、消肿解毒药；疹毒内盛应佐以清热凉血解毒药；若表实无汗亦可少佐辛温解表药；体质素为阴虚血少或病后营血未复者，应适当佐以滋阴养血之品，以防散阴动血；若有出血者，应佐以凉血养血药。

### 薄 荷

**【性味归经】** 性凉，味辛。入肺、肝经。

**【功效】** 散风热，清头目，利咽喉，解气郁。本品轻清芳香，辛凉行散，为表散风热、清利头目、疹出不透及风疹瘙痒的常用药，且有辛散解郁、芳香辟秽的作用，可用于肝气不舒所致的胸胁胀闷及暑月痧胀、吐泻、腹痛。

#### 配伍应用

**薄荷 菊花** 二药均有疏散风热、清利头目的功用，且薄荷舒肝，