

SHIYONG CHUANRANBING HULI
SHITIJI DAAN

实用传染病护理

试题及答案

主编 谢幸尔



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

实用传染病护理 试题及答案

主编 谢幸尔



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

实用传染病护理试题及答案 / 谢幸尔主编. —北京: 科学技术文献出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5189-3046-3

I. ①实… II. ①谢… III. ①传染病—护理学—资格考试—习题集 IV. ① R473.5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 166775 号

实用传染病护理试题及答案

策划编辑: 孙江莉

责任编辑: 王瑞瑞

责任校对: 张叫咪

责任出版: 张志平

出 版 者 科学技术文献出版社

地 址 北京市复兴路15号 邮编 100038

编 务 部 (010) 58882938, 58882087 (传真)

发 行 部 (010) 58882868, 58882874 (传真)

邮 购 部 (010) 58882873

官方网址 www.stdp.com.cn

发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者 虎彩印艺股份有限公司

版 次 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16

字 数 241千

印 张 12

书 号 ISBN 978-7-5189-3046-3

定 价 35.00元



版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换

编委会

主 编：谢幸尔

副 主 编：鲁桂兰 周新风 吴荣珍 庄旭华

参编人员：（按姓氏笔画为序）

王园园	朱娟芳	刘晓玲	孙 月	孙平波	孙兰珍
杨建梅	李雪梅	沙鸭云	沈 娟	沈红卫	张丽华
陈 燕	陈玉芹	陈菊娣	范春红	周长兰	居朝霞
孟秀凤	赵晓玲	洪树芹	翁秀凤	浦海芹	黄慧懿

前 言

传染病是威胁人类生存与健康、阻碍社会经济发展的最主要危害之一。随着社会文明的推进，生活水平的提高，抗生素的发现，疫苗的成功研制和临床应用，原有的各类传染病得到了有效控制。近年来，新发、突发传染病的发病率呈上升趋势，相关传染病及其护理知识的书籍也应运而生，但用于检测学习效果的书籍少见。在护理学作为一级护理学学科的今天，如何使广大从事传染病护理工作的人员更好地掌握常见传染病护理的相关知识和技能，应对新形势下新发、突发传染病的护理，更专业地服务于传染病患者，编写了《实用传染病护理试题及答案》一书。

《实用传染病护理试题及答案》一书将临床常见的 17 种传染病的知识点以试题的方式列出，包括单选题、多选题和案例分析题，在题目及答案上强调实用性，题目简明扼要，要点突出，易于记忆，便于指导，体现了护理学学科的应用性与实践性。期望本书能对提高护理人员的工作实践能力有所帮助。

本书编写过程中得到省内多家医院同行的支持与帮助，在此一并致谢！由于编者专业水平、理论知识的局限，加之时间仓促，书中难免存在许多不足，恳请广大读者在学习使用过程中予以指导纠正。

江苏省南通市第三人民医院

谢幸尔

2017 年 5 月

目 录

第一章 病毒感染性疾病护理	1
第一节 病毒性肝炎	1
第二节 流行性乙型脑炎	72
第三节 狂犬病	75
第四节 人感染高致病性禽流感	79
第五节 流行性腮腺炎	88
第六节 麻疹	91
第七节 流行性出血热	92
第八节 水痘	97
第九节 艾滋病	99
第十节 手足口病	118
第二章 细菌感染性疾病护理	124
第一节 猩红热	124
第二节 流行性脑脊髓膜炎	127
第三节 伤寒	131
第四节 细菌性痢疾	137
第五节 霍乱	141
第三章 肺结核护理	147
第四章 疟疾护理	178

第一章 病毒感染性疾病护理

第一节 病毒性肝炎

一、单项选择题

1. 甲型肝炎特异性诊断指标为 ()。
A. HAV RNA B. HAV - IgG C. 抗 - HAV - IgM
D. 抗 - HAV - IgG E. HBcAg
2. 经口传播的肝炎有 ()。
A. 甲肝 B. 乙肝 C. 丙肝 D. 丁肝 E. 庚肝
3. 甲型、戊型肝炎隔离期自发病日起 ()。
A. 1 周 B. 2 周 C. 3 周 D. 1 个月 E. 2 个月
4. HAV 是哪种肝炎病毒的英文表达 ()。
A. 甲型肝炎病毒 B. 乙型肝炎病毒 C. 丙型肝炎病毒
D. 丁型肝炎病毒 E. 戊型肝炎病毒
5. 慢性肝炎是指急性肝炎病程超过 ()。
A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 6 个月 E. 12 个月
6. 病死率最高的肝炎是 ()。
A. 急性黄疸型肝炎 B. 急性无黄疸型肝炎 C. 中度慢性肝炎
D. 重型肝炎 E. 以上都不是
7. 慢性重型肝炎早期, 凝血酶原活动度为 ()。
A. 60% ~ 70% B. 50% ~ 60% C. 40% ~ 50%
D. 30% ~ 40% E. 20% ~ 30%
8. 慢性重型肝炎中期, 凝血酶原活动度为 ()。
A. 50% ~ 60% B. 40% ~ 50% C. 30% ~ 40%
D. 20% ~ 30% E. 10% ~ 20%
9. 慢性重型肝炎晚期, 凝血酶原活动度为 ()。
A. 50% ~ 60% B. 40% ~ 50% C. 30% ~ 40%
D. 20% ~ 30% E. < 20%
10. 下列肝炎病毒基因组归类于 DNA 病毒的是 ()。
A. 甲型肝炎 B. 乙型肝炎 C. 丙型肝炎
D. 丁型肝炎 E. 戊型肝炎

11. 下列试验中反映肝细胞坏死严重程度最有价值的指标是 ()。
 - A. 丙氨酸氨基转移酶
 - B. 天门冬氨酸氨基转移酶
 - C. 白蛋白
 - D. 球蛋白
 - E. 凝血酶原活动度
12. 某医务工作者在给一 HbeAg 阳性患者采血时, 不小心刺破手指, 下列处理最为重要的是 ()。
 - A. 立即酒精消毒
 - B. 接种乙型肝炎疫苗
 - C. 肌注高效价乙肝免疫球蛋白
 - D. 肌注高效价乙肝免疫球蛋白, 接种乙型肝炎疫苗
 - E. 定期复查肝功能和 HBV - IgM
13. HDV 是一种缺陷性 RNA 病毒, 原因是 ()。
 - A. HDV 必须有 HBV 或其他嗜肝 DNA 病毒的辅助才能复制、表达抗原及引起肝损害
 - B. HDV 必须有 HAV 的辅助才能复制、表达抗原及引起肝损害
 - C. HDV 必须有 HEV 的辅助才能复制、表达抗原及引起肝损害
 - D. HDV - RNA 不能编码病毒结构蛋白质
 - E. HDV - RNA 在无 HBV 的辅助情况下, 不能自行复制
14. 对急性重型肝炎诊断价值最小的是 ()。
 - A. 丙氨酸氨基转移酶 $> 1000 \text{ U/L}$
 - B. 肝性脑病
 - C. 血清胆红素 $> 171 \mu\text{mol/L}$
 - D. 肝脏进行性缩小
 - E. 腹水、中毒性鼓肠
15. 肝动脉栓塞化疗术后护理措施正确的是 ()。
 - A. 术后禁食 2h, 流质饮食逐渐过渡到正常饮食, 减少恶心、呕吐的发生
 - B. 卧床, 术侧肢体制动, 伸直 24h, 防止出血, 严禁翻身
 - C. 穿刺处压迫止血 15min, 加压包扎, 沙袋压迫 12h
 - D. 观察病情变化, 监测生命体征, 高热患者给予降温措施
 - E. 观察患者术侧肢体血液循环情况, 注意皮温变化, 不需要注意足背动脉搏动情况
16. 下面不是肝脏穿刺术注意事项的是 ()。
 - A. 术前禁食
 - B. 术前测量血压、脉搏
 - C. 术后患者应卧床休息 24h
 - D. 术后 4h 内每 15 ~ 30min 测血压、脉搏 1 次
 - E. 若出现血压下降、脉搏细速、出冷汗、面色苍白等内出血现象, 应立即通知医生配合抢救

17. 重型肝炎主要观察要点不包括 ()。
 - A. 消化道症状进行性加重
 - B. 黄疸迅速加深
 - C. 肝脏缩小
 - D. 皮肤瘀点瘀斑
 - E. 肝掌、蜘蛛痣
18. 重型肝炎的主要临床表现是 ()。
 - A. 黄疸迅速加深, 血清胆红素高于 $160\mu\text{mol/L}$
 - B. 肝脏迅速增大
 - C. 出血倾向、PTA 低于 60%
 - D. 腹水、中毒性鼓肠
 - E. 多尿、血尿素氮降低
19. 重型肝炎的治疗方法不包括 ()。
 - A. 促进肝细胞再生
 - B. 肝性脑病的防治
 - C. 继发感染的防治
 - D. 止血治疗
 - E. 加强锻炼
20. 下列不是丙型肝炎传播途径的是 ()。
 - A. 输血或血制品途径
 - B. 粪-口途径
 - C. 注射途径
 - D. 母婴传播
 - E. 日常生活密切接触途径
21. 肝脏结构和功能的基本单位为 ()。
 - A. 肝细胞
 - B. 肝小叶
 - C. 肝窦
 - D. 肝实质
 - E. 肝门
22. 肝癌结节破裂出血可引起 ()。
 - A. 黄疸加深
 - B. 腹部剧痛
 - C. 食欲减退
 - D. 高热不退
 - E. 呕血不止
23. 肝癌患者肝叶切除手术后 24h 内重点观察的并发症是 ()。
 - A. 肺部感染
 - B. 肝脓肿
 - C. 酸中毒
 - D. 出血
 - E. 腹腔感染
24. 原发性肝癌最易转移的部位是 ()。
 - A. 肝内
 - B. 肺
 - C. 左锁骨上淋巴结
 - D. 骨
 - E. 腹腔内种植
25. 与原发性肝癌发病有密切关系的因素不包括 ()。
 - A. 甲型肝炎
 - B. 乙、丙型肝炎
 - C. 肝硬化
 - D. 亚硝胺类
 - E. 黄曲霉毒素
26. 可通过疫苗预防的肝炎是 ()。
 - A. 甲肝
 - B. 自身免疫性肝炎
 - C. 丙肝
 - D. 丁肝
 - E. 戊肝
27. 甲型肝炎的主要传播途径是 ()。
 - A. 母婴传播
 - B. 经血液传播
 - C. 性接触传播
 - D. 日常生活密切接触传播
 - E. 生食毛蚶
28. 以下观念错误的是 ()。
 - A. 医务人员在穿隔离衣前后必须进行手卫生
 - B. 处理清洁、无菌物品之前必须进行手卫生

- C. 处理污染物之后必须进行手卫生
D. 进行无菌操作前必须进行手卫生
E. 脱手套前必须进行手卫生,脱手套后无须进行手卫生
29. 下列除哪项以外需执行血液、体液隔离 ()。
- A. 甲肝 B. 乙肝 C. 丙肝 D. AIDS E. 丁肝
30. 下列不是甲肝主要传播途径的是 ()。
- A. 注射、输血传播 B. 飞沫传播 C. 母婴传播
D. 粪-口传播 E. 性接触传播
31. 下列生物制品可作为乙型肝炎的人工被动免疫的是 ()。
- A. 抗毒素 B. 丙种球蛋白 C. 胎盘球蛋白
D. 乙型肝炎疫苗 E. 乙肝特异性高效价免疫球蛋白
32. 下列哪组血清学检查结果提示乙型肝炎有较大的传染性 ()。
- A. 抗-HBc (+)
B. HBsAg (+), HBeAg (-), 抗-HBc (+)
C. HBsAg (+), 抗-HBe (-)
D. HBsAg (+), HBeAg (+)
E. 抗-HBs (+)
33. 目前预防乙型肝炎的最佳措施是 ()。
- A. 隔离患者
B. 加强医院内消毒隔离及献血员检查
C. 丙种球蛋白被动免疫
D. 加强粪便管理及水源保护
E. 消灭蚊、蝇
34. 急性病毒性肝炎早期最主要的治疗措施是 ()。
- A. 卧床休息 B. 保肝药物 C. 免疫制剂
D. 抗病毒药物 E. 维生素类药物
35. 引起乙型肝炎感染在家庭内聚集现象的主要因素是 ()。
- A. 注射途径 B. 粪-口传播 C. 母婴传播
D. 性传播 E. 飞沫传播
36. 能制备乙型肝炎疫苗的是 ()。
- A. HBcAg B. 抗-HBe C. HBsAg D. HBeAg E. 抗-HBs
37. 具有保护作用的抗体是 ()。
- A. 抗-HBs B. 抗-HBe C. 抗-HBc D. 抗-HCV E. 抗-HDV
38. HBcAg 不易在血液中测到的原因是 ()。
- A. HBcAg 滴度低
B. HBcAg 出现晚

- C. 存在于受感染的肝细胞核内
D. 存在于受感染的肝细胞胞膜内
E. 以上均不是
39. 下列关于自身免疫性肝病描述中不正确的是 ()。
- A. 男性多见
B. 慢性迁延性疾病
C. 早期可表现为关节痛和皮疹
D. 类似病毒性肝炎的表现, 如乏力、食欲缺乏、厌油
E. 晚期发展为肝硬化
40. 病毒性肝炎急性期患者最佳的饮食是 ()。
- A. 高能量、低脂肪饮食
B. 高蛋白、低脂肪饮食
C. 适合患者口味的清淡饮食
D. 高蛋白、高维生素饮食
E. 以上均不是
41. 重型肝炎预防感染的护理措施是 ()。
- A. 保持病室空气流通, 减少探视
B. 做好病室环境消毒
C. 做好口腔、皮肤护理, 防止口腔、肺部及皮肤感染
D. 加强营养, 提高机体免疫力
E. 以上均是
42. 对急性重型肝炎诊断意义较小的是 ()。
- A. 重度黄疸
B. ALT 增高
C. 肝性脑病
D. 凝血酶原活动度减少
E. 肝脏迅速缩小
43. 灭活甲型肝炎病毒的最低温度条件是 ()。
- A. 56℃, 30min
B. 100℃, 3min
C. 60℃, 4h
D. 100℃, 5min
E. 80℃, 3min
44. 肝炎后肝硬化引起肾功能衰竭的诱因是 ()。
- A. 上消化道出血
B. 血容量不足
C. 大量利尿、多次放腹水
D. 合并感染
E. 以上均是
45. 黄疸型肝炎患者皮肤瘙痒的原因是 ()。
- A. 胆盐沉积刺激皮肤神经末梢
B. 皮肤过敏
C. 疾病本身症状
D. 皮肤干燥
E. 以上均不是
46. 乙型肝炎病毒属于 ()。
- A. RNA 病毒
B. DNA 病毒
C. EB 病毒
D. 巨细胞病毒
E. ADR 病毒

47. HBsAg 阳性、HBeAg 阳性说明此患者 ()。
- A. 无传染性 B. 具有免疫力 C. 病情比较稳定
- D. 病情不稳定 E. 具有传染性
48. 重型肝炎患者出血原因是 ()。
- A. 骨髓造血功能障碍, 血小板减少
- B. 凝血因子合成障碍
- C. 毛细血管脆性增加
- D. 维生素 K 吸收障碍
- E. 以上均不是
49. 乙型肝炎潜伏期为 ()。
- A. 1~2 周 B. 2~3 周 C. 4~5 周
- D. 4 周~6 个月 E. 28~140 天
50. 下列不是急性病毒性肝炎主要临床表现的是 ()。
- A. 食欲减退、恶心 B. 乏力 C. 消瘦
- D. 肝大及肝功能损害 E. 腹泻
51. 重型肝炎时应用乳果糖的目的是 ()。
- A. 增加肝脏营养 B. 补充能量 C. 酸化肠道减少氨吸收
- D. 减少肝细胞坏死 E. 以上均是
52. 有关病毒性肝炎的流行病学表现, 下列错误的是 ()。
- A. 甲肝可因食物或水源污染暴发流行
- B. 输血后肝炎仅见于乙型肝炎
- C. 家庭内密切传播可见于各型肝炎
- D. 母婴垂直传播主要见于乙型肝炎
- E. 以上均是
53. 在急性病毒性肝炎中, 最早出现肝功能改变的是 ()。
- A. 丙氨酸氨基转移酶升高
- B. 血清胆碱酯酶活力升高
- C. 血清胆固醇明显降低
- D. 血清胆红素明显增高
- E. 天门冬氨酸氨基转移酶升高
54. 慢性乙型肝炎复发的诱因是 ()。
- A. 过度劳累 B. 酗酒 C. 不合理用药
- D. 以上均是 E. 以上均不是
55. 目前治疗慢性乙型肝炎首选的抗病毒药物是 ()。
- A. 拉米夫定和膦甲酸钠 B. γ -干扰素和拉米夫定
- C. α -干扰素和恩替卡韦 D. δ -干扰素和齐多夫定
- E. β -干扰素和拉米夫定

56. 下列乙型肝炎患者的临床表现正确的是 ()。
- 重叠感染 HDV 等其他肝炎病毒, 可顿挫病情
 - 重型肝炎时凝血酶原活动度应 $>40\%$
 - 乙肝病毒感染是原发性肝癌的主要原因
 - 急性淤胆型肝炎易转化为胆汁性肝硬化
 - 慢性肝炎无肝外器官的损害
57. 病毒性肝炎的临床经过, 下列错误的是 ()。
- 甲型肝炎少见慢性病程
 - 乙型肝炎多呈慢性病程
 - 丁型肝炎少见慢性病程
 - 丙型肝炎多呈慢性病程
 - 戊型肝炎多呈急性病程
58. 与发生原发性肝癌关系最密切的疾病是 ()。
- 肝脓肿
 - 中毒性肝炎
 - 肝包虫病
 - 乙型肝炎
 - 以上均不是
59. 对 HBeAg 阳性母亲所生下的新生儿行预防乙肝的免疫处理最恰当的方法是 ()。
- 丙种球蛋白
 - 高效价乙肝免疫球蛋白
 - 乙肝疫苗
 - 乙肝疫苗 + 高效价免疫球蛋白
 - 乙肝疫苗 + 丙种球蛋白
60. 慢性病毒性肝炎的病程一般超过 ()。
- 2 周
 - 1 个月
 - 2 个月
 - 4 个月
 - 6 个月
61. 下列生化指标能反映肝脏合成功能的是 ()。
- 白蛋白
 - 球蛋白
 - ALT 和 AST
 - 谷氨酰转肽酶
 - 总胆汁酸
62. 服用下列哪种药物时需监测听力和肾功能? ()
- 谷氨酸钾
 - 新霉素
 - 谷氨酸钠
 - 甘露醇
 - 以上均不是
63. 原发性肝癌经淋巴转移最常见的部位是 ()。
- 锁骨上淋巴结
 - 主动脉旁淋巴结
 - 胰腺旁淋巴结
 - 肝门淋巴结
 - 脾门淋巴结
64. 人体内最主要的产氨场所是 ()。
- 肾脏
 - 肠道
 - 肝脏
 - 大脑
 - 骨骼肌
65. 患者, 男, 45 岁, 右肋痛 3 个月, 巩膜轻度黄染, 肝于吸气时肋下 1.0cm, 质中等, 右膈外侧抬高, B 超提示: 肝内大小不等的结节样回声, 边缘不整齐, HBsAg (+), 甲胎蛋白为 $100\mu\text{g/L}$, 最大可能的诊断是 ()。
- 乙型肝炎
 - 肝硬化
 - 阿米巴肝脓肿

- D. 原发性肝癌 E. 淤胆型肝炎
66. 下列不是乙型肝炎主要传播途径的是 ()。
- A. 血液传播 B. 体液传播 C. 接触传播
- D. 分泌物传播 E. 母婴垂直传播
67. 肝穿刺术前准备中错误的一项是 ()。
- A. 测定肝功能、凝血酶原时间
- B. 术前禁食 6h
- C. 测量生命体征
- D. 情绪紧张者可遵医嘱使用镇静剂
- E. 以上均不是
68. 目前诊断小肝癌和微小肝癌的最佳检查方法是 ()。
- A. 甲胎蛋白 B. 超声检查 C. CT
- D. 肝穿刺活检 E. X 线肝血管造影
69. 人工肝支持治疗术后护理措施错误的是 ()。
- A. 治疗结束后, 人工肝室护士与病区护士认真交接
- B. 观察穿刺部位有无渗液、渗血
- C. 深静脉置管处应保持管道在位, 如遇滑出, 可消毒后再次手法送至原位置
- D. 监测生命体征的变化
- E. 为减少导管腔内污染, 对留置的双腔导管应避免其他用途
70. 肝炎合并糖尿病患者中, 健康指导内容错误的一项是 ()。
- A. 指导患者选择合适的鞋袜, 做好足部护理
- B. 口服 α -糖苷酶抑制剂, 如阿卡波糖, 指导患者与第一口饭同时嚼服
- C. 血糖高于 16mmol/L 时, 鼓励患者进行有氧运动降低血糖, 如打太极、慢跑等
- D. 行胰岛素治疗的患者, 使用中的胰岛素可以放在常温下保存, 时间不超过 28 天
- E. 以上均不是
71. 肝炎患者行核苷类药物抗病毒治疗期间, 不需要常规监测的项目是 ()。
- A. 肝功能 B. 血常规 C. 血压
- D. HBV-DNA E. 肾功能
72. 甲型病毒性肝炎的消化道隔离期为自发病之日起 ()。
- A. 1 周 B. 2 周 C. 3 周 D. 4 周 E. 5 周
73. 重型肝炎的分型不包括 ()。
- A. 急性重型肝炎 B. 亚急性重型肝炎 C. 慢性重型肝炎
- D. 肝炎肝硬化 E. 慢加急性重型肝炎
74. 肝穿刺的部位是 ()。
- A. 右锁骨中线 8~9 肋间 B. 右锁骨中线 9~10 肋间

- C. 右侧腋前线 8~9 肋间
D. 右侧腋中线 8~9 肋间
E. 右侧腋中线 9~10 肋间
75. 抗 HAV - IgM 阳性常提示 ()。
A. 有 HAV 保护性抗体
B. 甲型肝炎疫苗接种后
C. 存在 HAV 近期感染
D. 甲型肝炎既往感染者
E. 慢性 HAV 携带状态
76. 有关原发性肝癌的临床表现, 下列不正确的是 ()。
A. 可完全不痛或仅有轻微钝痛
B. 不会出现急腹症表现
C. 有时表现为膈肌抬高
D. 位于肋弓下的癌结节最易被触及
E. 有时在腹壁上可听到吹风样血管杂音
77. 陈女士, 26 岁, 妊娠 8 个月, 查血发现 HBsAg 阳性, 其他各项肝炎病毒血清标记物检测均为阴性, 血清丙氨酸氨基转移酶 20U/L。为防止新生儿感染乙肝病毒, 最重要的健康指导是 ()。
A. 积极进行护肝治疗
B. 立即肌注高效价乙肝免疫球蛋白
C. 立即使用乙型肝炎疫苗
D. 抗病毒治疗
E. 新生儿出生后进行全程免疫
78. 原发性胆汁性肝硬化临床表现中错误的是 ()。
A. 早期常有瘙痒症状
B. 一般不伴有其他免疫性疾病
C. 有胆汁淤积的表现
D. 中晚期会伴有门脉高压表现
E. 腹水
79. 肝癌非手术治疗的首选方法是 ()。
A. 放射治疗
B. 抗肿瘤化学药物治疗
C. 中医治疗
D. 肝动脉化疗栓塞治疗
E. 生物和免疫治疗
80. 以下关于肝脏的功能不正确的是 ()。
A. 肝脏每天分泌 600~1000mL 胆汁, 胆汁的 97% 为水分
B. 将由门静脉进入肝脏的葡萄糖转化为糖原储存, 当体内血糖降低时, 又将肝糖原分解为葡萄糖并释放入血循环, 以维持血糖浓度在一定水平
C. 肝脏间接参与造血
D. 肝脏合成的凝血物质包括纤维蛋白质, 凝血酶原和凝血因子 V、VII、VIII、IX、XI、XII
E. 肝脏的 Kupffer 细胞经过吞噬作用, 处理细菌、色素和其他物质
81. 诊断原发性肝癌最有价值的实验室检查项目是 ()。
A. 癌胚抗原
B. 甲胎蛋白
C. 碱性磷酸酶
D. 乳酸脱氢酶
E. γ -谷氨酰转肽酶

82. 急性黄疸型肝炎黄疸前期最突出的症状是 ()。
 - A. 呼吸道症状
 - B. 消化道症状
 - C. 神经系统症状
 - D. 精神症状
 - E. 皮肤瘙痒症状
83. 急性重型肝炎早期最突出、最有诊断意义的症状是 ()。
 - A. 黄疸迅速加深
 - B. 出血倾向加重
 - C. 精神 - 神经系统症状
 - D. 血清丙氨酸氨基转移酶显著升高
 - E. 腹水和肾衰竭
84. 不是急性戊型肝炎治疗措施的是 ()。
 - A. 卧床休息
 - B. 保肝药物治疗
 - C. 免疫制剂治疗
 - D. 维生素类药物治疗
 - E. 抗病毒治疗
85. 下列疾病不属于自身免疫性肝病的是 ()。
 - A. 自身免疫性肝炎
 - B. 原发性胆汁性肝硬化
 - C. Dubin Jonson 综合征
 - D. 原发性硬化性胆管炎
 - E. 肝豆状核变性
86. 关于 HBV 的说法, 错误的一项是 ()。
 - A. 能耐受一般浓度化学消毒剂
 - B. 65℃, 10h 可灭活
 - C. 100℃, 10min 可灭活
 - D. 煮沸即可灭活
 - E. 高压蒸汽消毒可灭活
87. 患者, 男, 35 岁, 因“发热、尿黄 3 天”就诊, 门诊以“病毒性肝炎 (甲型)”收治入院。对于该患者应采取的隔离是 ()。
 - A. 严密隔离
 - B. 消化道隔离
 - C. 体液隔离
 - D. 虫媒隔离
 - E. 接触隔离
88. 下列症状和体征与甲型病毒性肝炎不相关的是 ()。
 - A. 起病发热, 乏力、厌食、巩膜黄染
 - B. 乏力、厌食、恶心、尿色加深
 - C. 腹胀、肝质地硬、脾大
 - D. 皮肤黄染、轻度瘙痒
 - E. 腹软、肝大质软、轻度叩击痛
89. 下列哪项检查结果阳性表明乙型肝炎患者有较强的传染性? ()
 - A. 抗 - HBe
 - B. 抗 - HBc
 - C. HBeAg
 - D. 抗 - HBs
 - E. HBsAg
90. 上消化道出血的范围是 ()。
 - A. 贲门以上出血
 - B. 幽门以上出血
 - C. Treitz 韧带以上出血
 - D. 空回肠交界处以上出血
 - E. 回盲部以上出血

91. Dane 颗粒核心部分不包括 ()。
- A. 环状双股 DNA B. DNA - P C. HBcAg
D. HBsAg E. HBeAg
92. 下列重型肝炎患者的护理措施不妥的是 ()。
- A. 观察黄疸是否进行性加深 B. 观察消化道症状是否改善
C. 给予高脂、高蛋白饮食 D. 绝对卧床休息 E. 专人陪护
93. 婴儿接种乙型肝炎疫苗的时间为出生后 ()。
- A. 0 个月、1 个月、6 个月 B. 0 个月、3 个月、6 个月
C. 1 个月、3 个月、6 个月 D. 0 个月、2 个月、6 个月
E. 1 个月、2 个月、6 个月
94. 接种乙型肝炎疫苗对预防乙型肝炎的传播具有重要意义, 其重点接种对象是 ()。
- A. 急性乙型肝炎患者 B. 慢性乙型肝炎患者
C. 乙型肝炎病毒携带者 D. HBsAg 阳性母亲生下的新生儿
E. 接受过输血或应用血制品的患者
95. 关于乙型肝炎的流行病学, 下列错误的是 ()。
- A. 基本不通过粪 - 口传播 B. 无水和食物型暴发流行
C. 无家庭聚集现象 D. 呈散在性发病
E. 无明显季节高峰
96. 对肝炎病毒最可靠的消毒剂是 ()。
- A. 来苏水 B. 75% 乙醇 C. 过氧乙酸
D. 37% ~ 40% 甲醛熏蒸 E. 苯扎溴铵
97. 急性重型肝炎的主要病理变化是 ()。
- A. 毛细胆管淤积 B. 肝细胞灶性坏死
C. 汇管区结缔组织增生 D. 肝细胞广泛性坏死
E. 肝小叶及汇管区单核细胞浸润
98. 丙型肝炎的主要传播途径是 ()。
- A. 饮食传播 B. 水源传播 C. 经输血传播
D. 经体液传播 E. 共用牙刷、剃须刀
99. 患者以往健康, 检查发现, 丙氨酸氨基转移酶 1333.6U/L, 血清总胆红素 $8.55\mu\text{mol/L}$, 甲型肝炎抗原阳性, HBsAg 阴性, HBcAb 阴性, 此患者诊断为 ()。
- A. 急性乙型肝炎 B. 甲型肝炎隐性感染
C. 急性甲型肝炎, 无黄疸型 D. 甲型肝炎病毒携带者
E. 甲型肝炎恢复期患者