



鸡形目



GALLIFORMES



142. 黑琴鸡

Black Grouse (*Lyrurus tetrix*)

黑琴鸡隶属于鸡形目雉科。体长40–60厘米。雌雄体型和体色差异明显。雄鸟全身羽毛黑色，具有蓝绿色的金属光泽；红色的冠状肉瘤形成眉块，翅上有白色斑块；三对外侧尾羽延长，并向外弯曲，与西洋古琴的形状十分相似，所以有“黑琴鸡”的美名。雌鸟羽毛大都是棕褐色，布满黑色和赭褐色横斑。虹膜褐色，喙暗褐色，腿暗褐色。亚种分化较多。分布范围由欧洲西部及北部至西伯利亚及朝鲜。栖息的海拔高度一般在600–900米，活动于针叶林、针阔叶混交林或森林草原地区。善于鸣叫，尤其是雄鸟，能颤动整个身体，发出一连串类似于吹水泡和拉风箱的美妙歌声。



143. 斯里兰卡鸡鹑

Sri Lanka Spurfowl (*Galloperdix bicalcarata*)


斯里兰卡鸡鹑隶属于鸡形目雉科。体长30-35厘米。雄鸟易于辨识：尾部和翅栗色，上体、肩羽和翼上覆羽具有白色纵纹，前胸至腹部鳞状的白色羽毛具黑色羽缘，眼周裸皮呈红色。雌鸟通体呈栗色，头部棕灰，喉部白色。虹膜棕黄至棕红色，嘴红色，脚红色。分布于斯里兰卡海拔高至2100米的原始森林潮湿地带，偶尔见于东南部的干旱地区。以种子、浆果、白蚁及其他昆虫为食，尤其喜欢紫云菜属植物的种子。成群或以小家庭单元活动。雄性鸣声较为典型，为“吁哟哟，吁哟哟……”，也有“突，突，突……奇科奇科”的音节类型。



144. 赤鸡鹑

Red Spurfowl (*Galloperdix spadicea*)


赤鸡鹑隶属于鸡形目雉科。体长35–38厘米。体态较修长，尾羽颜色较暗，上体鳞状斑纹较为明显。雌鸟与雄鸟相比顶冠颜色较深，背部的鳞状斑纹较窄且颜色较深。虹膜棕黄色，嘴红色，脚红色。分布于印度次大陆，分布海拔为300–1250米，在局部地区可高至2300米。栖息的生境类型多样，包括干旱和潮湿的山地灌丛以及竹林。主要在林中取食种子、浆果，也吃无脊椎动物。常于清晨和黄昏在林间小路和农田边缘地带活动，成3–5只的小群。雄性鸣声为急促的“咯咯”重复声，后转为紧张的“咯咯”声，然后以粗哑的吠声结束。



145. 彩鸡鹑

Painted Spurfowl (*Galloperdix lunulata*)

彩鸡鹑隶属于鸡形目雉科。体长27-34厘米。雄鸟白色密集的斑点是其辨识特征，头、胸、翅和尾部深绿色，上体、翼上覆羽、臀部和胁部栗色。雌鸟面部栗色或褐色，喉部皮黄色，胸部赭黄色。虹膜棕色，嘴棕色，脚棕灰至深灰色。分布于印度次大陆东部的恒河平原以及孟加拉西部，分布海拔低于1000米。栖息于干旱地区的荆棘灌丛及竹林。以种子、草茎和浆果为食，也取食小型陆生软体动物、昆虫和白蚁。



146. 红头林鹧鸪

Crimson-headed Partridge (*Haematortyx sanguiniceps*)


红头林鹧鸪隶属于鸡形目雉科。体长约25厘米。体色的鉴别特征明显。雌雄个体色型相似，头、颈和最长的尾下覆羽深红色，余部羽毛灰黑色。虹膜棕色并有黄色的眼底，嘴黄色，脚灰色。雌鸟无距，体色更偏棕黑色，喉、颈、胸偏橙褐色。分布于婆罗洲北部的山区，海拔范围1000-1700米。主要栖息于低山森林、河流冲积平原和山地丛林。以浆果和昆虫为食。鸣声为重复的双音节“唵吭—唵吭”声，也有刺耳响亮的叫声。



147. 赤胸山鹧鸪

Red-breasted Partridge (*Arborophila hyperythra*)


赤胸山鹧鸪隶属于鸡形目雉科。体长约25-27厘米。喉至胸红褐色、两胁有黑白色点斑为其识别特征。雄鸟上体暗褐色，羽毛末端具有黑色细纹，翼羽末端具有黑色宽斑。雌鸟与雄鸟体色相似但体型较小，两胁的黑白色斑较小且偏棕。虹膜灰色，嘴黑色，脚橙红色。分布于婆罗洲中北部的山区，海拔范围600-1890米，局部地区可高至3050米。活动于原始林和低山地带的次生林，栖息于浓密灌丛和竹林。主要以种子、水果及昆虫为食。鸣声为双音节，先发出一串清亮的哨声，稍后声调和节拍逐渐上升。



148. 台湾灰胸竹鸡

Taiwan Bamboo Partridge (*Bambusicola sonorivox*)

台湾灰胸竹鸡隶属于鸡形目雉科。体长约33厘米。脸、颈侧及上胸灰蓝色，颊及喉栗色；上背、胸侧及两胁有月牙形的大块褐斑；外侧尾羽栗色；前胸蓝灰色，向上延伸至两肩和上背，形成环状，环后缘至两胁变为栗红色斑纹；后胸、腹和尾下覆羽棕黄色；飞行时翼下有两块白斑。雌鸟和雄鸟相似，但稍小，且跗蹠无距。虹膜红褐，嘴褐色，脚绿灰色。是灰胸竹鸡的亚种之一，只作为留鸟分布于中国台湾地区，为台湾特有亚种。以家庭群栖居。飞行笨拙、径直。活动于干燥的矮树丛、竹林灌丛。善鸣叫，鸣声尖锐而响亮，雌鸟发出单调的“嘀、嘀”短声，雄鸟声音及声调酷似“扁罐罐、扁罐罐”，常连续鸣叫数十次，特别在繁殖期连鸣不已。



149. 斑翅山鹑

Daurian Partridge (*Perdix dauurica*)

斑翅山鹑隶属于鸡形目雉科。体长约28厘米。雄鸟头顶、枕和后颈暗灰褐色，具棕白色羽干纹，纹末端常扩大成点；脸、喉中部及腹部橘黄色，下胸至腹部中央具马蹄形黑色块斑；喉侧羽长而尖，呈须状。雌鸟羽色和雄鸟基本相同，但胸部无橘黄色及黑色。虹膜棕色，嘴近黄，脚黄色。分布范围从中亚至西伯利亚、蒙古及中国北部，在我国分布于新疆西北部、青海、甘肃、内蒙古、陕西、宁夏、山西、河北及东北。栖息于森林草原、灌丛草地、低山丘陵和农田荒地等各类生境中，多在向阳、避风少雪处活动，晚上成群栖于低地。除繁殖期外常成群活动，特别是在秋季和冬季，常成15至25只、甚至50只的大群活动，冬末群体逐渐变小，到繁殖期则完全成对活动。叫声为典型的“嘎嘎”声。

