

2016新大纲版

**国家临床
执业医师资格考试
全真模拟题集**

文都医学考试研究中心◎策划

顾艳南◎编著

中国医药科技出版社

2016 新大纲版

**国家临床
执业医师资格考试
全真模拟题集**

**文都医学考试研究中心◎策划
顾艳南◎编著**

中国医药科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家临床执业医师资格考试全真模拟题集/顾艳南编著. —北京:中国医药科技出版社,2016.6

ISBN 978-7-5067-8532-7

I. ①国… II. ①顾… III. ①临床医学-资格考试-习题集 IV. ①R4-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第133810号

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787×1092mm¹/₁₆

印张 13¹/₄

字数 404千字

版次 2016年6月第1版

印次 2016年6月第1次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8532-7

定价 42.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

资格考试时代的“考证”正在深刻地改变着我们的生活:一些人没有学历而走上了以考证来追求幸福生活的道路;另一些人即使大学毕业了,也辛辛苦苦地参加证书考试;甚至有一些人在读完博士后还苦于考证带来的压力。不管什么形式的学习,只要能通过考试就好。随着社会发展的深入,加强职业准入是社会发展的必然,每一种证书都是一块职业市场的敲门砖。成功人看趋势,失败人看潮流。在资格证考试和学历考试具有同样法律地位且越来越被社会认可的趋势下,你“认证”了吗?

医师资格考试正成为医学界一项非常热门的资格考试,而且每家医院都要求执业人员持证上岗。中国知名教育品牌“文都教育”在考研西医综合图书市场火爆销售近八年并得到广大学子的认可后,紧跟步伐,适时推出医师资格考试辅导用书:《国家临床执业医师资格考试全真模拟题集》、《国家临床执业助理医师资格考试全真模拟题集》,为您考试的成功增添了一项可靠的选择,胜算的砝码。

《国家临床执业医师资格考试全真模拟题集》、《国家临床执业助理医师资格考试全真模拟题集》各含4套模拟试题,每套试题的编写都严格以国家临床执业医师资格考试大纲和国家临床助理医师资格考试大纲为依据。在编写过程中,作者花费大量时间与精力深入分析了考纲精神及要求,并细心对比了历年考纲与历年考题之间的联系,使本书所编撰的4套模拟试题从不同层面与角度体现考纲的目标,暗含考纲的考查方向。本书无疑将成为您参加考试最贴近真题的训练场。

由于时间仓促,错误在所难免,考生们在使用本系列参考书的过程中如发现不足和错误之处,请随时指正,我们将不胜感激!

如有问题,可以随时与顾艳南老师联系,顾老师博客:<http://gu-yannan.blog.sohu.com>。

祝每一位考生顺利通过考试,拿到医师资格证书!

编 者

2016年5月

目 录

国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(一)	1
第一单元	1
第二单元	13
第三单元	25
第四单元	37
参考答案	49
国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(二)	51
第一单元	51
第二单元	62
第三单元	74
第四单元	85
参考答案	98
国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(三)	100
第一单元	100
第二单元	112
第三单元	123
第四单元	135
参考答案	150
国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(四)	152
第一单元	152
第二单元	165
第三单元	177
第四单元	189
参考答案	203

国家临床执业医师资格考试全真模拟试题(一)

第一单元

A1 型题(1~50 题)

以下每一考题有 A、B、C、D、E 5 个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 关于医疗事故技术鉴定组织的说法中,错误的是
A. 医疗事故技术鉴定组织是医学会
B. 医学会是一个独立存在的社会团体法人
C. 医学会是非盈利性医学社会组织
D. 省、自治区、直辖市地方医学会负责组织再次医疗事故技术鉴定工作
E. 医学会分为省、市两级
2. 医疗机构应当对麻醉药品处方进行专册登记,加强管理。按照《麻醉药品和精神药品管理条例》的规定,麻醉药品处方至少保存
A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年 E. 5 年
3. 食品企业直接用于食品生产加工的水必须符合
A. 矿泉水标准要求 B. 纯净水标准要求
C. 生活饮用水卫生标准要求 D. 蒸馏水标准要求
E. 矿物质水标准要求
4. 下列关于艾滋病防治工作原则的表述不正确的是
A. 坚持预防为主、防治结合的方针 B. 建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制
C. 加强宣传教育 D. 采取行为干预和关怀救助等措施
E. 坚持预防为主、治疗为辅的方针
5. 公民发现食品商店销售的食物有质量问题,应当向哪个部门投诉
A. 质量技术监督部门 B. 食品药品监督部门
C. 工商行政管理部门 D. 食品安全委员会
E. 国家质检总局
6. 药品生产企业需要以第二类精神药品为原料生产普通药品,应当将年度需求计划报哪个部门
A. 所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门
B. 国务院药品监督管理部门
C. 所在地省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门
D. 所在地省、自治区、直辖市人民政府
E. 国务院
7. 公共场所经营者安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作的,由县级以上地方人民政府卫生行政部门责令限期改正,并处以罚款
A. 一百元以上一千元以下 B. 两百元以上两千元以下
C. 三百元以上三千元以下 D. 五百元以上五千元以下

- E. 四百元以上四千元以下
8. 下列符合医师开具处方要求的是
- A. 医师利用计算机开具、传递普通处方时,应当同时打印出纸质处方,其格式与手写处方一致
- B. 急诊处方一般不超过 5 日用量
- C. 为住院患者开具的麻醉药品处方最长不超过 3 日
- D. 为门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品注射剂,每张处方不得超过 5 日常用量
- E. 第二类精神药品一般每张处方不得超过 15 日常用量
9. 国家实行特殊管理的药品不包括
- A. 麻醉药品
- B. 疫苗
- C. 精神药品
- D. 医疗用毒性药品
- E. 放射性药品
10. 哪个机构负责全国处方的开具、调剂、保管等相关工作
- A. 国务院
- B. 国务院卫生主管部门
- C. 国务院药品监督管理部门
- D. 国务院疾病预防控制机构
- E. 国务院办公厅
11. 在描述频数表资料的集中位置时,下面哪一项不正确
- A. 中位数与百分位数
- B. 均数与标准差
- C. 均数与几何均数
- D. 算术均数
- E. P50
12. 在方差分析中,多个样本均数间各均数的两两比较常用
- A. q 检验
- B. u 检验
- C. 成组 t 检验
- D. 配对 t 检验
- E. 方差分析
13. 概率大小在 0 和 1 之间的事件是
- A. 不可能发生的事件
- B. 小概率事件
- C. 必然发生的事件
- D. 随机事件
- E. 极可能发生事件
14. 就下表资料分析甲乙两医院乳腺癌手术后 5 年生存率(%)

腋下淋巴结转移	甲医院			乙医院		
	病例数	生存数	生存率 %	病例数	生存数	生存率 %
无	45	35	77.77	300	215	71.67
有	710	450	63.38	83	42	50.60
合计	755	485	64.24	383	257	67.10

- A. 可将甲乙两医院病例数合并作为标准人口数后,再计算标化率
- B. 可将甲乙两医院生存数合并作为标准人口数后,再计算标化率
- C. 可选定一个标准生存率进行计算
- D. 可直接进行比较,不需标化
- E. 以上均不是
15. 统计上小概率事件通常是指
- A. 一次实验或观察中该事件一定不发生的事件
- B. 一次实验或观察中该事件发生的可能性很小
- C. 一次实验或观察中该事件一定发生的事件
- D. 一次实验或观察中该事件可能发生也可能不发生的事件
- E. 一次实验或观察中该事件发生的可能性很大
16. 肱骨干中段骨折最容易并发桡神经损伤,桡神经损伤后,表现为桡神经支配区域的感觉及运动障碍,下列哪项与桡神经损伤无关
- A. 右手垂腕畸形
- B. 右拇指不能背伸及外展
- C. 右手第 2~5 指掌指关节不能伸直
- D. 右手背虎口区感觉障碍

- E. 右拇指不能对掌
17. 引起二氧化碳潴留的主要机制是
- A. 动静脉分流 B. 通气不足 C. 无效腔通气
D. 通气/血流比例失调 E. 弥散障碍
18. 治疗三度房室传导阻滞最有效的措施是
- A. 口服 β 受体阻断剂 B. 植入心脏起搏器 C. 口服阿托品
D. 冠状动脉内支架置入 E. 静脉推注利多卡因
19. RNA 指导的 DNA 合成称为
- A. 复制 B. 转录 C. 整合 D. 翻译 E. 反转录
20. 甲亢时心律失常最常见的是
- A. 交界性期前收缩 B. 室性期前收缩 C. 房性期前收缩
D. 心房纤颤 E. 心房扑动
21. 心绞痛发作时最有效、作用最快、使用最简便的药物是
- A. 阿替洛尔(氨酰心安) B. 阿司匹林 C. 硝苯地平(心痛定)
D. 硝酸甘油舌下含化 E. 速效救心丸
22. “危险三角”的疖肿危险在于
- A. 脓毒症 B. 菌血症 C. 化脓性海绵状静脉窦炎
D. 眼部感染 E. 转移性脓肿
23. 骨折功能复位标准,正确的说法是
- A. 长骨干横骨折对位至少达 3/4 B. 下肢侧方成角移位不需矫正
C. 前臂双骨折只需对位良好 D. 下肢缩短移位成人不超过 2 厘米
E. 旋转移位必须矫正
24. 根据肺癌的 TNM 分期, $T_3N_0M_0$ 应为
- A. I A 期 B. II A 期 C. III A 期 D. I B 期 E. II B 期
25. 锥体束征可见于
- A. 重症肌无力 B. 进行性脊肌萎缩症 C. 震颤麻痹
D. 肌萎缩侧索硬化症 E. 进行性肌营养不良
26. 抗甲状腺药物治疗一般疗程应为
- A. 症状缓解后即可停药 B. 症状缓解后三个月 C. 症状缓解后半年
D. 疗程 > 一年 E. 疗程 > 一年半
27. 心脏收缩力增强时静脉回心血量增加的主要原因是
- A. 收缩期室内压高 B. 舒张期室内压低 C. 动脉血压升高
D. 血流速度加快 E. 心输出量增加
28. 慢性萎缩性胃炎伴重度不典型增生适宜的治疗措施是
- A. H_2 受体拮抗剂 B. 质子泵抑制剂 C. 促胃动力药物
D. 中药等促进其逆转 E. 手术治疗
29. 急性肺淤血时,肺泡腔内的主要成分是
- A. 心力衰竭细胞 B. 纤维蛋白 C. 水肿液
D. 中性粒细胞 E. 黏液
30. 下列哪一项检查结果提示胎儿的肝脏已发育成熟
- A. 羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值 > 2 B. 羊水中肌酐值 $\geq 2\text{mg}$
C. 羊水中胆红素类物质值 < 0.02 D. 羊水中脂肪细胞出现率 15%
E. 羊水淀粉酶值 $\geq 450\text{IU/L}$
31. 侵蚀性葡萄胎行清宫术时,下列哪项处理是不正确的
- A. 一旦确诊后应及时清宫 B. 一般采用吸宫术
C. 首先应选择小号吸管至大号吸管 D. 子宫缩小后可慎重刮宫
E. 刮出物送组织学检查

32. 结肠癌病灶穿透肠壁,无淋巴结转移的是
A. DukesA1期 B. DukesA2期 C. DukesB期 D. DukesC期 E. DukesD期
33. 如果大脑失去对脑干和脊髓的抑制作用,可出现
A. Kernig 征阳性 B. Brudzinski 征阳性 C. Babinski 征阳性
D. Hoffmann 征阳性 E. 桡骨骨膜反射阳性
34. 关于子宫内膜的病理变化,下列说法错误的是
A. 增生期子宫内膜是月经周期中的增生期的正常变化
B. 无排卵型功血也可出现增生期子宫内膜
C. 子宫内膜腺癌型增生过长是一种癌前病变
D. 子宫内膜腺囊型增生过长是无排卵性功血的表现
E. 萎缩型子宫内膜是无排卵性功血的表现
35. 下列哪项不符合先兆子痫的临床表现
A. 有重度妊高征的高血压、尿蛋白表现 B. 尿蛋白 $<0.5\text{g}/24\text{h}$
C. 尿量少于 $50\text{ml}/\text{d}$ D. 视物模糊
E. 头痛、眩晕
36. 心理测量题目的选定办法是
A. 心理专家的经验命题 B. 社会调查法收集问题 C. 临床病例分析
D. 高等统计筛选 E. 以上都是
37. 肱骨干骨折最常见的并发症是
A. 肱动脉损伤 B. 肱静脉损伤 C. 尺神经损伤 D. 正中神经损伤 E. 桡神经损伤
38. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄者,最常见的心律失常是
A. 室性期前收缩 B. 房室传导阻滞 C. 心房颤动与扑动 D. 室性心动过速 E. 束支传导阻滞
39. 最常见的先天性心脏病是
A. 房间隔缺损 B. 法洛四联症 C. 室间隔缺损 D. 肺动脉狭窄 E. 动脉导管未闭
40. 下列哪一项不是口服避孕药的禁忌证
A. 严重心血管疾病患者 B. 急、慢性肝炎或肾炎患者 C. 急性宫颈炎患者
D. 甲状腺功能亢进患者 E. 哺乳期妇女
41. 对于再生障碍性贫血的骨髓象叙述不正确的是
A. 增生部位粒细胞、红细胞两系成熟停滞于晚期阶段
B. 一般表现为增生低下
C. 巨核细胞可能不减少
D. 浆细胞等非造血细胞可增多
E. 淋巴细胞亦相对增多
42. 左侧瞳孔直接对光反射消失,而间接对光反射存在,病变在
A. 右侧视神经 B. 左侧视神经 C. 左侧动眼神经
D. 右侧动眼神经 E. 左侧交感神经
43. 引起婴幼儿腹泻的主要原因是
A. 轮状病毒感染 B. 受凉 C. EB 病毒感染 D. 细菌感染 E. 饮食不当
44. 孕激素的生理作用是
A. 增强子宫收缩力,增强子宫平滑肌对催产素的敏感性
B. 使宫颈口闭合,黏液减少、变稠、拉丝度减少
C. 使阴道上皮增生和分化
D. 使乳腺管增生,乳头、乳晕着色
E. 加强输卵管节律性收缩的振幅
45. 关于高血压病药物治疗的选择,下列哪项不正确
A. 无并发症高血压病患者——利尿剂
B. 轻中度高血压病伴支气管哮喘者—— β 受体阻断剂

- C. 伴糖尿病并有微量蛋白尿者——ACEI
 D. 伴有妊娠者——钙通道阻滞剂
 E. 伴有痛风者——ARB(血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂)
46. 关于肱骨髁上骨折(屈曲型),下列哪项是错误的
 A. 多由直接暴力所致
 B. 骨折线由后下斜向前上
 C. 常并发血管及神经损伤
 D. 治疗原则与伸直型相似,但复位方向相反
 E. 复位后石膏托固定肘关节于屈曲 $40^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 位
47. 脑脊液的主要吸收部位在
 A. 脉络丛
 B. 侧脑室
 C. 颅顶、颅底的蛛网膜绒毛
 D. 软脑膜
 E. 血管周围间隙
48. 为降低心脏病孕妇的死亡率,下列哪项防治措施不适宜
 A. 为防止体重加重过多,宜减少脂肪的摄入,并进低蛋白饮食
 B. 积极防止并发症并及早治疗妊娠期的各种感染尤其是上呼吸道感染
 C. 如发现死胎宜行穿颅术尽快结束分娩
 D. 当胎儿娩出后,应将沙袋置于孕妇腹部
 E. 产后需给广谱抗生素,预防感染
49. 骨筋膜室综合征最常见于以下哪个部位
 A. 前臂掌侧
 B. 大腿
 C. 上臂
 D. 手
 E. 足
50. 肿瘤转移的确切依据是
 A. 肿瘤细胞侵入静脉
 B. 肿瘤细胞侵入动脉
 C. 肿瘤细胞栓塞于远隔器官
 D. 肿瘤细胞出现在血液中
 E. 在远隔器官形成与原发瘤同一组织学类型的肿瘤

A2 型题(51~100 题)

每一道考题下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案,答题时,只需从中选择一个最合适的作为正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

51. 女性,48 岁,Graves 病甲状腺次全切除术后 10 年。近 3 个月心慌、怕热、多汗、手颤抖,体重下降 5kg。血 TSH、FT₃、FT₄ 检查证实甲亢复发,服他巴唑 2 周后因严重药疹而停药。下一步治疗应
 A. 他巴唑加抗过敏药物
 B. 改用丙硫氧嘧啶
 C. 放疗
 D. 再次手术治疗
 E. 用核素¹³¹I 治疗
52. 男,42 岁,左侧口角流涎 2 周,查体:左侧额纹变浅,眼裂变大,左侧口角下垂,鼻唇沟变浅,左侧舌前 2/3 味觉减退,病变为
 A. 左侧面神经内耳病变
 B. 左侧面神经管部病变
 C. 左侧面神经膝状神经节病变
 D. 左侧桥小脑脚病变
 E. 左侧面神经茎乳孔病变
53. 女性,50 岁,因便血 2 个月就诊。直肠镜检查发现距肛缘 4cm 的直肠前壁处有一 2cm × 2cm 肿块,活检经病理检查为直肠乳头状腺癌,最佳的手术方式是
 A. 经肛局部切除术
 B. 骶后径路局部切除术
 C. 腹会阴联合直肠癌根治术
 D. 经腹直肠癌切除、骶前吻合术
 E. 经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术
54. 患者,女,48 岁,反复尿频、尿急、尿痛、夜尿增多、低热 1 年余,近 2 天来高热,上述症状加剧入院。每次发作用抗生素治疗有效。既往有肺结核病史,血压 165/95mmHg,尿蛋白少许,白细胞 8 个/HP,红细胞肾孟造影示肾盂肾盏瘢痕狭窄扩张,尿菌培养阴性,诊断最可能是
 A. 慢性肾小球肾炎
 B. 慢性肾盂肾炎
 C. 急性肾盂肾炎
 D. 肾结石
 E. 肾结核

55. 男性,19岁,1小时前被刺伤左胸,急诊,血压80/50mmHg(10.7/6.7kPa),心率120次/分,伤口不断有血液流出,快速输入血浆代用品及血液制品1000ml后,血压未见改善。积极的抢救措施应该是
- A. 内科医生会诊,纠正休克
B. 心电图检查,排除心脏疾患
C. 缝合伤口,加压包扎
D. 体外心脏按压,增加心搏出量
E. 继续输血补液,立即准备开胸探查止血
56. 女性,25岁,闭经9周,腰痛,阴道流血多于月经量1天,子宫如9周妊娠大小,宫口有组织物堵塞,宫颈无举疼,最恰当的处理是
- A. 予以保胎治疗
B. 立即行刮宫术
C. 继续观察
D. 进一步查尿hCG明确诊断
E. 给予输液及止血剂
57. 25岁初孕妇,末次月经2000年3月10日。于2000年10月13日就诊,检查宫底在脐上2横指,枕右前位,胎心率正常。现在应是
- A. 妊娠满30周,宫底高度符合正常情况
B. 妊娠满30周,宫底高度低于正常
C. 妊娠满31周,宫底高度符合正常情况
D. 妊娠满31周,宫底高度低于正常
E. 妊娠满32周,宫底高度低于正常
58. 女性,30岁,妊娠6周发生甲状腺功能亢进,甲状腺肿大伴有局部压迫症状,选择下列哪项治疗最恰当
- A. 服用抗甲状腺药物
B. 终止妊娠后,服用抗甲状腺药物
C. 终止妊娠后,手术治疗
D. 终止妊娠后,¹³¹I治疗
E. 不终止妊娠,手术治疗
59. 男,2岁,因间断抽搐半年就诊,1岁以后智能渐落后,皮肤色泽变浅,头发变黄,常有呕吐,对明确诊断最有意义的检查是
- A. 染色体核型分析
B. 血钙
C. 尿有机酸分析
D. 脑电图
E. 血TSH、T₄
60. 女性,28岁,肥胖、头痛伴闭经半年,查体:血压180/110mmHg,向心性肥胖,满月脸,皮肤薄,有痤疮,腹壁有宽大紫纹,下肢胫前凹陷性水肿。为明确库欣综合征,拟检查
- A. 血浆皮质醇
B. 尿游离皮质醇
C. PET
D. 小剂量地塞米松抑制试验
E. 大剂量地塞米松抑制试验
61. 受凉后口角向右歪斜,左侧额纹消失,左侧眼睑不能闭合,左侧鼻唇沟变浅,露齿时口角偏向右侧,可能是
- A. 左侧周围性面神经麻痹
B. 右侧中枢性面神经麻痹
C. 左侧中枢性面神经麻痹
D. 双侧周围性面神经麻痹
E. 右侧周围性面神经麻痹
62. 左下肢无力2个月,伴右下肢半身麻木。查右剑突水平以下痛温觉减退,左膝腱反射亢进,左巴氏征(+),左髂前上棘以下音叉振动觉减退,左足趾位置觉减退病变为
- A. 左侧胸髓6水平后索损害
B. 右侧胸髓6水平后索损害
C. 右侧胸髓6水平半侧损害
D. 左侧胸髓6水平半侧损害
E. 胸髓6水平横贯损害
63. G1P0,孕41周,宫口开大4~5cm,胎心100次/分,胎心监测示“晚期减速”,胎儿头皮血pH7.18,最恰当的处理为
- A. 面罩吸氧
B. 产妇左侧卧位,等待自然分娩
C. 加宫缩抑制剂缓解宫缩
D. 立即剖宫产
E. 待宫口开全,阴道助产缩短第二产程
64. 40岁妇女,月经周期延长,经量增多及经期延长,此次月经量多,持续15天,妇科检查子宫稍大稍软。以下哪种止血措施更为有效
- A. 静脉注射立止血
B. 刮宫术
C. 口服大量安宫黄体酮

- D. 口服大剂量雌激素 E. 口服甲睾酮
65. 35 周婴儿出生体重 2000 克, 生后体温不升, 需放置在暖箱中, 暖箱的正确相对湿度是
A. 80% B. 70% C. 60% D. 50% E. 40%
66. 女性, 23 岁, 诊断为 1 型糖尿病 5 年。近几日来, 感食欲减退、烦渴、多饮、多尿明显, 时有呕吐, 皮肤弹性差。实验室检查: 空腹血糖 24.7mmol/L, 尿糖阳性, 酮体强阳性, 血碳酸氢根 14mmol/L, 以下最合理治疗组合方案是
A. 饮食控制 B. 饮食控制 + 口服降糖药
C. 饮食控制 + 中效胰岛素 D. 长效胰岛素 + 口服降糖药
E. 小剂量普通胰岛素加入生理盐水中, 平均 0.1U/(kg·h), 持续静滴
67. 女性, 62 岁, 反复咳嗽 3 个月, 在外院以右下肺炎治疗 1 个月未见好转, CT 提示右下肺大面积斑片状阴影, 部分呈小结节状。此时应考虑诊断为
A. 肺鳞癌 B. 小细胞肺癌 C. 粟粒性肺结核
D. 细支气管肺泡癌 E. 燕麦细胞癌
68. 男, 1 岁, 面色苍白 1 个月, 易疲乏, 时而烦躁, 纳差。体检: 肝肋下 3cm, 质中, 脾肋下 1.5cm。查血常规: Hb 86g/L, RBC $3.45 \times 10^{12}/L$, MCV 68fL, MCH 20pg, MCHC 0.26。最可能的诊断是
A. 叶酸缺乏性贫血 B. 再生障碍性贫血 C. 缺铁性贫血
D. 维生素 B₁₂ 缺乏性贫血 E. 生理性贫血
69. 女性 30 岁, 双下肢无力 2 个月, 查体双上肢肌力正常, 双下肢肌力 3 级, 肌张力高, 跟腱反射亢进, 病理反射(+), 其病变部位可能是
A. 胸髓 B. 腰膨大 C. 颈膨大 D. 高颈髓 E. 脊髓前角细胞
70. 男, 38 岁, 中上腹部不适、面色苍白、四肢末端麻木 3 年, 无黑便。下列哪项有助于恶性贫血的诊断
A. 大便潜血试验 B. 小细胞低色素性贫血
C. 胃镜检查提示慢性胃炎 D. 幽门螺杆菌检测阳性
E. 胃炎分析提示胃酸缺乏
71. 女性, 34 岁, 月经量进行性减少, 现闭经半年, 泌乳 3 个月, 首选检查项目应是
A. 孕激素试验 B. 血 hCG 测定 C. 血 PBL 测定 D. 性激素测定 E. 血常规
72. 女性, 56 岁, 颈粗 20 余年, 查体甲状腺 I 度肿大, 多个结节, 最大达 5.0cm, 诊断为单纯性结节性甲状腺肿。因气管受压, 于 3 周前接受了手术治疗。术后处理是
A. 不需用药、定期观察 B. 多食含碘丰富的食物 C. 忌用含碘食物或药物
D. 长期服甲状腺素 E. 核素¹³¹I 治疗
73. 一中年男性, 头痛进行性加重 3 个月, 近来经常出现恶心、呕吐, 眼底检查发现视神经乳头水肿, 最大可能是
A. 血管性头痛 B. 肌紧张性头痛 C. 颅内占位性病变
D. 丛集性头痛 E. 神经性头痛
74. 7 个月婴儿, 医院出生, 根据其免疫特点和传染病发生的情况, 完成计划免疫和预防接种应不包括
A. 卡介苗 B. 脊髓灰质炎减毒糖丸活疫苗 C. 百白破三联针
D. 乙肝疫苗 E. 麻疹成毒活疫苗
75. 中年男性, 反复上腹疼痛 5 年余, 平卧时加重, 弯腰可减轻。查体: 上腹部轻压痛, X 线腹部摄片左上腹部钙化, 可能的诊断为
A. 慢性胆囊炎 B. 慢性胃炎 C. 慢性胰腺炎
D. 慢性十二指肠球炎 E. 慢性肝炎
76. 男, 60 岁, 左眼球不能外展, 左额纹及鼻唇沟消失, 示齿口角右偏, 伸舌右偏, 无舌肌萎缩, 右侧上下肢中枢性瘫, 病变位于
A. 左侧脑桥及左侧延髓 B. 右侧脑桥及延髓 C. 左侧脑桥及延髓
D. 左侧脑桥 E. 右侧脑桥

77. 女性,65岁,糖尿病多年,渐出现双侧手足麻木,发凉,查体四肢远端痛觉减退,四肢远端肌力4级,近端力正常,其病变部位为
A. 脑干 B. 末梢神经 C. 神经丛 D. 脊髓 E. 神经根
78. 10个月男孩,诊断为“化脓性脑膜炎”,经有效抗生素治疗10天,病情好转,体温正常,近3天又发热、抽搐、前囟饱满,颅缝分离。应首先考虑
A. 脑水肿 B. 脑室管膜炎 C. 脑性低钠血症 D. 硬脑膜下积液 E. 脑积水
79. 男,30岁,患甲状腺功能亢进症。突然出现双下肢不能动。检查:双下肢膝腱反射减退,无肌萎缩。血钾测定 2.3mmol/L 。你认为最可能是下列哪种情况
A. 慢性甲亢性肌病 B. 周期性瘫痪 C. 周围神经炎 D. 重症肌无力 E. 癔症
80. 17岁男性,外伤性高流量肠外瘘,接受肠外营养3周,肠外+肠内营养已1周,近3天体温波动在 $37.1\sim 37.3^{\circ}\text{C}$,尿糖 $+++\sim++++$ 。今晚病人突发畏寒、发热,达 41°C 。查体:BP $120/80\text{mmHg}$,神清,颈部锁骨下静脉导管周围皮肤稍红,腹部平坦,无明显触压痛,肠鸣音无亢进。该病人最大可能为
A. 肠间感染 B. 膈下感染 C. 静脉导管感染 D. 真菌感染 E. 输液反应
81. 初产妇,孕39周,双胎,第一胎儿臀位脐带脱垂,臀牵引娩出,第二胎儿头位自娩,产后20分钟突然阴道出血 200ml ,无胎盘剥离征象。此时应如何处理
A. 观察胎盘剥离迹象,协助胎盘娩出 B. 牵引脐带,挤压宫底,迫使胎盘娩出
C. 手取胎盘 D. 检查软产道,除外损伤
E. 输液,静脉注射缩宫素
82. 26岁风湿性心脏病患者,现妊娠45天出现心力衰竭,其处理原则应是
A. 立即行负压吸宫术终止妊娠 B. 控制心力衰竭后继续妊娠
C. 边控制心力衰竭边终止妊娠 D. 控制心力衰竭后行负压吸宫术
E. 控制心力衰竭后行钳刮术
83. 男性,45岁,确诊原发性肾上腺皮质功能减退症2年,因停药再次入院。行OGTT典型的结果是
A. 糖尿病曲线 B. 糖耐量减低
C. 空腹高血糖、2小时低血糖 D. 血糖曲线低平
E. 空腹低血糖、2小时高血糖
84. 一位19岁的女患者双侧甲状腺弥漫性肿大1年,甲状腺未触及结节,无震颤,未闻及血管杂音,脉搏84次/分,血压 $15/10\text{kPa}$,血 T_3 和 T_4 在正常范围,对此患者应如何治疗
A. 口服甲巯咪唑(他巴唑) B. 口服小剂量甲状腺素 C. 口服复方碘溶液
D. 口服放射性核素 E. 手术切除肿大的甲状腺
85. 中年男性,有胃癌家族史,因胃部不适行胃镜检查,结果示幽门螺杆菌(Hp)相关性慢性胃炎伴重度肠上皮化生和活动性炎,对此病人最好的处理为
A. 定期X线造影复查 B. 定期胃镜复查 C. 根除Hp治疗
D. 手术切除胃,预防胃癌 E. 黏膜保护剂治疗
86. 男性患者,48岁,诊断“肺结核、肺心病”5年,近3天受凉后出现发热、咳嗽、咳痰加重,咳黄痰,呼吸困难不能平卧。查体:颈静脉怒张,双肺广泛散在干湿性啰音。心率115次/分,肝肋下 3cm ,双下肢水肿。该患者最重要的治疗措施是
A. 利尿治疗 B. 强心剂 C. 血管扩张剂 D. 呼吸兴奋剂 E. 有效抗生素
87. 女,35岁。停经3个月,阴道不规则流血3天,妇科检查子宫如4个月妊娠大小,B超显示宫腔内落雪征。首先考虑
A. 自然流产 B. 双胎妊娠 C. 妊娠合并子宫肌瘤
D. 葡萄胎 E. 羊水过多
88. 患者,女,50岁,咳嗽、咳白痰伴乏力、盗汗1个月,近1周来出现发热,体温 37.5°C ,伴胸闷、气短,心前区不适。查体:双肺未闻及干、湿性啰音,心脏向两侧扩大,心音遥远。胸片右上肺见斑片状阴影,密度不均,内有可疑空洞,心影呈烧瓶状,最可能的诊断是
A. 急性心梗 B. 结核性心包炎,继发性肺结核 C. 肿瘤性心包炎

- D. 急性非特异性心包炎 E. 化脓性心包炎
89. 女, 38 岁, 双肾上腺手术后 5 年病理为增生, 近 3 年消瘦, 进行性皮肤色素沉着, 头痛伴视力下降, 垂体 CT 示蝶鞍明显扩大。初步诊断为 Nelson 综合征。最不符合诊断的检查结果是
- A. 血皮质醇高 B. 血 β -促脂素高 C. 血糖低
D. 血 N-POMC 高 E. 血 ACTH 明显升高
90. 男, 26 岁, 突然出现左口角抽搐, 后出现左侧上肢、下肢抽动, 继而出现四肢抽搐, 其病变部位是
- A. 左侧中央前回上部 B. 右侧中央前回上部 C. 左侧中央前回下部
D. 右侧中央前回下部 E. 左侧中央后回
91. 男, 57 岁, 突发左面神经周围性瘫, 双眼不能向左侧凝视, 右侧偏瘫, 右侧 Babinski 征阳性, 病变在
- A. 内囊病变延及桥脑 B. 左侧内囊 C. 左侧脑桥
D. 右侧内囊 E. 右侧脑桥
92. 女, 42 岁, 近 2 年乏力、恶心、食欲差、皮肤变黑, 血压 90/55mmHg, 血钾 4.0mmol/L、血钠 122mmol/L, 诊断的最可能病因是
- A. 肾上腺皮质增生 B. 肾上腺皮质癌 C. 肾上腺萎缩
D. 异位 ACTH 综合征 E. 肾上腺结核
93. 患者, 男性, 60 岁, 排尿困难 3 个月, 体检发现前列腺稍硬, 为排除前列腺癌意义最大的实验室检查项目是
- A. 血癌胚抗原 B. 血酸性磷酸酶 C. 血甲胎球蛋白
D. 血碱性磷酸酶 E. 血前列腺特异抗原
94. 25 岁初产妇, 妊娠 38 周, 规律宫缩 8 小时, 未破膜, 宫口开大 3cm, 胎心 140 次/分。本例正确处置应是
- A. 严密观察产程进展 B. 人工破膜
C. 静注 25% 葡萄糖液内加维生素 C D. 静脉滴注缩宫素, 加速产程进展
E. 立即行剖宫产术
95. 女, 29 岁, 停经 17 周, 1 个月来间断少量阴道出血, 检查腹部无明显压痛、反跳痛, 子宫颈口未开, 子宫增大如孕 8 周, 最可能的诊断为
- A. 先兆流产 B. 难免流产 C. 不全流产 D. 完全流产 E. 过期流产
96. 男性, 39 岁, 体重 65kg, 外伤引起急性失血 800ml, 经手术后已止血。现脉搏 90 次/分, 血压 105/70mmHg, Hb110g/L, 患者家属强烈要求输血。此时医生应
- A. 给患者输全血 200ml B. 给患者输红细胞悬液 1 单位 C. 给患者输血浆 200ml
D. 给患者输洗涤红细胞 1 单位 E. 不给患者输血
97. 男, 5 岁, 高热 1 天, 第 2 天出现全身皮肤弥漫性充血发红, 可见密集均匀的红色细小丘疹, 面部潮红, 唇周苍白, 咽扁桃体充血水肿, 舌乳头红肿突起。最可能的诊断是
- A. 风疹 B. 麻疹 C. 幼儿急疹 D. 猩红热 E. 水痘
98. 患者男, 62 岁, 为右利手, 意识清, 能理解他人讲话内容, 但不能表达自己的意图, 病变在
- A. 左侧额上回后部 B. 左侧角回 C. 左侧顶上小叶
D. 左侧额中回后部 E. 左侧额下回后部
99. 男性, 20 岁, 右胸撞伤后疼痛, 呼吸 20 次/分, 脉搏 85 次/分, 胸廓挤压征阳性, 胸片右肺压缩 5%, 最恰当的处理是
- A. 胸膜腔穿刺抽气 B. 胸腔闭式引流 C. 镇痛观察
D. 输液 E. 吸氧
100. 男性患者, 50 岁, 咳大量黏液痰, 无明显发热等中毒症状, 进行性呼吸困难。胸片呈弥漫性结节阴影, 不均匀, 不等大, 密度低。肾脏正常, 长期居住北方, 无粉尘接触史, 应首先考虑哪项诊断
- A. 粟粒型肺结核 B. 矽肺 C. 肺吸虫病
D. 肺肾出血综合征 E. 细支气管肺泡癌

A3/A4 型题 (101 ~ 126 题)

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、

C、D、E 5 个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

(101~103 题共用题干)

女,56 岁,反复右中上腹胀痛 6 年,进食油腻食物后多发,时有夜间痛,无反酸、嗝气。体检:肥胖外观,腹部查体无阳性体征。胃镜提示:慢性萎缩性胃炎,幽门螺杆菌阳性。

101. 该患者按“慢性胃炎”治疗无效,应该排除

- | | | |
|---------|-----------|---------|
| A. 食管病变 | B. 十二指肠疾病 | C. 胆胰疾病 |
| D. 小肠病变 | E. 横结肠病变 | |

102. 下一步选择哪项检查

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| A. 钡餐 X 线检查 | B. 复查胃镜和病理检查 | C. 腹部 B 超检查 |
| D. 腹部 CT 检查 | E. 腹部 MRI 检查 | |

103. 有胃癌家族史,如果排除胃外疾病,下一步可能的处理手段是

- | | | |
|--------------|------------|-----------|
| A. 质子泵抑制剂 | B. 使用促动力药物 | C. 中医中药治疗 |
| D. 根除幽门螺杆菌治疗 | E. 手术治疗 | |

(104~106 题共用题干)

孕妇,G1P0 孕 41 周,阴道流液 16 小时入院。查体:腹围 98cm,宫高 36cm,胎位 LOA,胎心 136 次/分,不规则宫缩,骨盆外测量正常,宫颈管已展平,宫口容 1 指,先露 S-3。

104. 此时最恰当的处理是

- | | | |
|----------|--------------|----------|
| A. 阴道检查 | B. 给氧 | C. 静滴缩宫素 |
| D. 肥皂水灌肠 | E. 静滴抗生素预防感染 | |

105. 以上最可能的诊断是

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| A. 头盆不称 | B. 原发宫缩乏力 | C. 继发宫缩乏力 |
| D. 潜伏期延长 | E. 高直前位 | |

106. 经过上述处理后,宫缩 30~35 秒/2~3 分,宫口开大 5cm,先露 S-1,胎心正常,下列处理哪一项是最不恰当的

- | | | |
|-----------|------------|---------|
| A. 给氧 | B. 抗生素预防感染 | C. 胎心检查 |
| D. 注意羊水性状 | E. 加大缩宫素用量 | |

(107~108 题共用题干)

一青年女性,被人发现昏迷且休克,屋内有火炉,且发现有敌敌畏空瓶。查体:体温 36℃,BP 90/60mmHg,四肢厥冷,腱反射消失,心电图一度房室传导阻滞,尿糖(+),尿蛋白(+),血液的 COHb 为 60%。

107. 最可能的诊断是

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| A. 急性巴比妥类中毒 | B. 急性有机磷农药中毒 | C. 急性 CO 中毒 |
| D. 糖尿病酮症酸中毒 | E. 急性亚硝酸盐中毒 | |

108. 首要的治疗方法是

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| A. 20% 甘露醇 250ml 快速静滴 | B. 冬眠疗法 | C. 血液透析 |
| D. 能量合剂 | E. 氧气疗法 | |

(109~110 题共用题干)

男性,25 岁,由交通闭塞的山区至都市打工半年,近 1 个月出现咳嗽、无痰,近 1 周体温 38℃ 左右,口服抗炎药物效果不佳,胸片见右肺门团块状密度增高影。

109. 该患者可能的诊断是

- | | | |
|------------|--------|--------|
| A. 肺门淋巴结结核 | B. 肺癌 | C. 淋巴瘤 |
| D. 淋巴结炎 | E. 结节病 | |

110. 为进一步明确诊断,首选做哪项检查

- | | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|----------|
| A. PPD 皮试 | B. 胸部 CT | C. 纤支镜 | D. 经皮肺活检 | E. 痰病理检查 |
|-----------|----------|--------|----------|----------|

(111~112 题共用题干)

48 岁,男性,右上肢发作性抽搐 3 月,初从右侧手拇指开始,后扩散至整个上肢,查体见右上肢痛,温觉稍

减弱,右上肢腱反射稍亢进,双侧病理征未引出,余未见明显异常。

111. 病变最可能的部位是

- A. 右臂丛神经 B. 右大脑皮层 C. 左大脑皮层 D. 左颈膨大 E. 左丘脑

112. 首先应做的辅助检查是

- A. 头部 CT 或 MRI B. 脑电图 C. 颈椎 X 线片或 MRI
D. 腰穿脑脊液检查 E. 肌电图

(113~115 题共用题干)

女性,28 岁,腹胀、腹痛 2 个月,近 1 个月来出现便秘,伴发热、乏力及盗汗。查体:右下腹轻压痛,移动性浊音(+),腹腔积液化验为渗出性改变,PPD 强阳性。

113. 最有可能的诊断是

- A. 肠结核 B. 结核性腹膜炎 C. 肝硬化腹腔积液
D. 卵巢囊肿 E. 腹膜癌

114. 该患者入院 3 天后出现呕吐,腹痛加重,无排气及排便,病情变化有可能是

- A. 急性胃肠炎 B. 肠梗阻 C. 肠穿孔 D. 胃溃疡 E. 克罗恩病

115. 需首先做哪种检查

- A. 胸片 B. 血电解质 C. 钡餐透视 D. 立位腹平片 E. 血沉

(116~118 题共用题干)

中年男性,近 2 个月来感胸闷、憋气、乏力,渐出现少尿、下肢水肿。查体:颈静脉充盈,BP 90/60mmHg,心浊音界向两侧扩大,心音低钝,肝大,肝颈静脉回流征(+).心电图:肢体导联低血压,Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段弓背向下抬高 0.1~0.2mV;X 线检查示心脏阴影普遍性向两侧扩大,心脏搏动减弱。

116. 该患者诊断是

- A. 扩张型心肌病 B. 缺血性心肌病 C. 心包积液
D. 心肌梗死 E. 克山病

117. 有助于确定的最简单、易行、可靠的方法是

- A. 心电图检查 B. X 线胸片 C. 超声心动图
D. 心包活检 E. 胸部 CT

118. 心包穿刺的目的不包括

- A. 渗液细菌培养 B. 寻找瘤细胞 C. 渗液的细胞分类
D. 解除心脏压塞 E. 解除疼痛

(119~121 题共用题干)

男,44 岁,心悸怕热,手颤乏力 1 年,大便不成形,每日 3~4 次,体重下降 20kg,查体:脉搏 90 次/分,血压 128/90mmHg,皮肤潮湿,双手细颤,双眼突出,甲状腺弥漫性Ⅱ度肿大,可闻及血管杂音,心率 104 次/分,律不齐,心音强弱不等,腹平软,肝脾肋下未及,双下肢无水肿。

119. 为明确诊断,首选检查是

- A. 甲状腺摄¹³¹I 率 B. 血 TSH、T₃、T₄ C. T₃ 抑制实验
D. TBH 兴奋实验 E. 血沉

120. 本例心律不齐最可能是

- A. 窦性心律不齐 B. 阵发性期前收缩 C. 心房颤动
D. 心房扑动 E. 室颤

121. 本患者治疗首选是

- A. 丙硫氧嘧啶 B. 立即行甲状腺大部分切除 C. 核素¹³¹I
D. 普萘洛尔 E. 甲状腺全切

(122~124 题共用题干)

女性,62 岁,反复咳嗽 3 个月,在外院以右下肺炎治疗 1 个月未好转,胸片及 CT 片提示右下肺大面积斑片状阴影,部分呈小结节状。

122. 为明确诊断,应进行
A. 肺活检 B. 心包活检 C. 胸膜活检 D. 胸 MRI 检查 E. 胸超声波检查
123. 经过上述诊断措施后仍不能确诊,此时应考虑哪种诊断的可能
A. 肺鳞癌 B. 小细胞肺癌 C. 粟粒性肺结核
D. 细支气管肺泡癌 E. 燕麦细胞癌
124. 进一步的治疗措施应为
A. 手术治疗 B. 放射治疗 C. 化学治疗 D. 免疫治疗 E. 中医中药治疗
- (125 ~ 126 题共用题干)
- 10 岁女孩,间断发热,咳嗽半年余,经抗感染治疗无明显好转,拍胸片后诊断为原发性肺结核,痰菌阴性,其父患肺结核 5 年,对 HE 耐药
125. 该患儿抗结核治疗方案的制定主要依据是
A. 父亲的药敏结果 B. 患儿痰药敏结果 C. 遵循儿童用药原则
D. 初治方案 2HRSE/4HR E. 父亲的药敏结果及儿童用药原则
126. 该患儿的治疗方案中不应该包括下列哪种药物
A. 喹诺酮类 B. INH C. RFP D. PZA E. SM
- B 型题 (127 ~ 150 题)**
- 以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。
- (127 ~ 128 题共用备选答案)
- A. 先兆流产 B. 难免流产 C. 过期流产 D. 不全流产 E. 完全流产
127. 容易发生失血性休克的是
128. 可能发生播散性血管内凝血的是
- (129 ~ 131 题共用备选答案)
- A. 三叉丘系 B. 外侧丘系 C. 内侧丘系 D. 脊髓丘脑束 E. 内侧纵束
129. 听觉传导径路
130. 深感觉传导径路
131. 痛、温觉传导径路
- (132 ~ 133 题共用备选答案)
- A. 巴氏消毒法 B. 高压蒸气灭菌法 C. 干烤法
D. 紫外线照射 E. 滤过除菌
132. 常用于血清除菌的是
133. 常用于手术器械灭菌的是
- (134 ~ 135 题共用备选答案)
- A. 矽肺 B. 肺含铁血黄素沉着症 C. 特发性肺间质纤维化
D. 细支气管肺泡癌 E. 急性血行播散性肺结核
134. 男性,50 岁,煤矿工人,吸烟 30 年,近 5 年出现咳嗽、气短,并逐年加重,无发热,胸片示双肺结节影(直径 1 ~ 3mm),肺门阴影密度增加,可见蛋壳样钙化的淋巴结。诊断应考虑
135. 女性,40 岁,患风湿性心脏病二尖瓣狭窄 10 年,近 5 年反复多次出现心力衰竭,X 线片示双肺弥散性小结节影,肺门较密集,中外带稀少。应考虑
- (136 ~ 137 题共用备选答案)
- A. 胆汁 B. 胆素 C. 血红素 D. 胆固醇 E. 胆绿素
136. 体内可转变成为胆色素的原料是
137. 体内可转变成为胆汁酸的原料是