

中国科学院华南植物园
中山大学
辽宁医巫闾山国家级自然保护区
沈阳农业大学

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主编 叶华谷 张凤秋 刘梅 曾飞燕 第五辑 (二十一—二十五) (二十一)



化学工业出版社

中国科学院华南
中山大学
辽宁医巫闾山国家级自然保护区
沈阳农业大学

中国药用植物

主 编 叶华谷 张凤秋 刘 梅 曾飞燕
CHINESE MEDICINAL PLANTS

第五辑(二十一—二十五)

(二十一)



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式,收录我国野生及栽培的药用植物共200种(包括亚种、变种及变型),主要从植物资源利用的角度,介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等,有些种类还有附方。为了安全起见,在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样,提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.二十一/叶华谷等主编. —北京:化学工业出版社,2018.2
ISBN 978-7-122-30806-1

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第257323号

责任编辑:李丽 吴文静

责任校对:边涛

装帧设计:百彤文化传播

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码:100011)

印装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2018年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:79.00元

版权所有 违者必究


本书编写人员

主 编：叶华谷 张凤秋 刘 梅 曾飞燕
执行主编：张凤秋 刘 梅
副 主 编：张树鹏 蔡京津 刘晓峰 郑 珺 叶育石
编写人员：叶华谷 段士民 王喜善 曾飞燕 易思荣 卢元贤
于 慧 王发国 付 琳 莫 伟 叶育石 全 健
刘 梅 刘 冰 刘 文 朱 强 吴林芳 张树鹏
张 征 张丽霞 张忠廉 张慧晔 孙尚传 李书渊
陆颂规 李如良 李巧玲 李泽贤 李海涛 杜怡枫
杨 毅 杨科明 肖 波 陈巧明 陈玉笋 陈海山
易思荣 林汝顺 邹 滨 郑 珺 金慧英 侯惠娴
夏 静 秦新生 曹洪麟 曹照忠 黄 娅 黄志海
曾飞燕 曾宪禹 管志斌 管燕红 翟俊文 倪静波
练续文 熊秉红 张凤秋 卢 野 肇 谟 刘晓峰
刘学军 王玉环 白国华 石慧敏 阚 颖 迟海鹏
陈红梅 赵仙仙 庄天涯 陈少峰 李健容 裴男才
蔡京津 白瑞兴
摄 影：张凤秋 刘 梅

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项(CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项(KSCX2-YW-Z-1004)、
植物园国家标准体系建设与评估(Y421051001)、植物园迁地
保护植物编目及信息标准化(2009FY120200)”项目资助出版。





前 言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、基原、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类按拉丁名首字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《中华本草》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

六道木	<i>Abelia biflora</i>	2
无梗五加	<i>Acanthopanax sessiliflorus</i>	4
椴叶槭	<i>Acer negundo</i>	6
色木槭	<i>Acer mono</i>	8
北乌头	<i>Aconitum kusnezoffii</i>	10
软枣猕猴桃	<i>Actinidia arguta</i>	12
展枝沙参	<i>Adenophora divaricata</i>	14
东北羊角芹	<i>Aegopodium alpestre</i>	16
苍葱	<i>Allium victorialis</i>	18
乌头叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis aconitifolia</i>	20
榆叶梅	<i>Amygdalus triloba</i>	22
东北点地梅	<i>Androsace filiformis</i>	24
黑水当归	<i>Angelica amurensis</i>	26
尖萼楼斗菜	<i>Aquilegia oxysepala</i>	28
黑北极果	<i>Arctous alpinus</i> var. <i>japonicus</i>	30
北马兜铃	<i>Aristolochia contorta</i>	32
东北南星	<i>Arisaema amurense</i>	34
辽细辛	<i>Asarum heterotropoides</i> var. <i>manshuricum</i>	36
兴安天门冬	<i>Asparagus dauricus</i>	38
龙须菜	<i>Asparagus schoberioides</i>	40
华黄耆	<i>Astragalus chinensis</i>	42
背扁黄耆	<i>Astragalus complanatus</i>	44
达乌里黄耆	<i>Astragalus dahuricus</i>	46
糙叶黄耆	<i>Astragalus scaberrimus</i>	48

东北蹄盖蕨	<i>Athyrium brevifrons</i>	50
禾秆蹄盖蕨	<i>Athyrium yokoscense</i>	52
轴藜	<i>Axyris amaranthoides</i>	54
中华秋海棠	<i>Begonia grandis</i> subsp. <i>sinensis</i>	56
射干	<i>Belamcanda chinensis</i>	58
细叶小檗	<i>Berberis poiretii</i>	60
坚桦	<i>Betula chinensis</i>	62
黑桦	<i>Betula dahurica</i>	64
假贝母	<i>Bolbostemma paniculatum</i>	66
斑种草	<i>Bothriospermum chinense</i>	68
花蔺	<i>Butomus umbellatus</i>	70
翠菊	<i>Callistephus chinensis</i>	72
膜叶驴蹄草	<i>Caltha membranacea</i>	74
过山蕨	<i>Camptosorus sibiricus</i>	76
红花锦鸡儿	<i>Caragana rosea</i>	78
白花碎米荠	<i>Cardamine leucantha</i>	80
异穗苔草	<i>Carex heterostachya</i>	82
大花金挖耳	<i>Carpesium macrocephalum</i>	84
田葛缕子	<i>Carum buriaticum</i>	86
豆茶决明	<i>Cassia nomame</i>	88
大叶朴	<i>Celtis koraiensis</i>	90
百金花	<i>Centaurium pulchellum</i> var. <i>altaicum</i>	92
菊叶香藜	<i>Chenopodium foetidum</i>	94
尖头叶藜	<i>Chenopodium acuminatum</i>	96
流苏树	<i>Chionanthus retusus</i>	98
银线草	<i>Chloranthus japonicus</i>	100
大三叶升麻	<i>Cimicifuga heracleifolia</i>	102
褐毛铁线莲	<i>Clematis fusca</i>	104
地丁草	<i>Corydalis bungeana</i>	106

堇叶延胡索	<i>Corydalis fumariifolia</i>	108
小黄紫堇	<i>Corydalis raddeana</i>	110
齿瓣延胡索	<i>Corydalis turtschaninovii</i>	112
全缘栒子	<i>Cotoneaster integerrimus</i>	114
水栒子	<i>Cotoneaster multiflorus</i>	116
达乌里苾苳	<i>Cymbaria dahurica</i>	118
白首乌	<i>Cynanchum bungei</i>	120
大花杓兰	<i>Cypripedium macranthum</i>	122
翠雀	<i>Delphinium grandiforum</i>	124
溪洞碗蕨	<i>Dennstaedtia wilfordii</i>	126
无毛溲疏	<i>Deutzia glabrata</i>	128
东北溲疏	<i>Deutzia amurensis</i>	130
大花溲疏	<i>Deutzia grandiflora</i>	132
草瑞香	<i>Diarthron linifolium</i>	134
穿龙薯蓣	<i>Dioscorea nipponica</i>	136
宝珠草	<i>Disporum viridescens</i>	138
花旗杆	<i>Dontostemon dentatus</i>	140
葶苈	<i>Draba nemorosa</i>	142
绒果芹	<i>Eriocycla albescens</i>	144
狼毒	<i>Euphorbia fischeriana</i>	146
林大戟	<i>Euphorbia lucorum</i>	148
斑地锦	<i>Euphorbia maculata</i>	150
齿翅蓼	<i>Fallopia dentato-alata</i>	152
篱蓼	<i>Fallopia dumetorum</i>	154
雪柳	<i>Fontanesia fortunei</i>	156
平贝母	<i>Fritillaria ussuriensis</i>	158
长白山龙胆	<i>Gentiana jamesii</i>	160
笔龙胆	<i>Gentiana zollingeri</i>	162
粗根老鹳草	<i>Geranium dahuricum</i>	164
突节老鹳草	<i>Geranium krameri</i>	166

蝎子草	<i>Girardinia cuspidata</i>	168
山皂荚	<i>Gleditsia japonica</i>	170
野皂荚	<i>Gleditsia microphylla</i>	172
长蕊石头花	<i>Gypsophila oldhamiana</i>	174
水葫芦苗	<i>Halerpestes cymbalaria</i>	176
北黄花菜	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	178
刺榆	<i>Hemiptelea davidii</i>	180
狗娃花	<i>Heteropappus hispidus</i>	182
长药八宝	<i>Hylotelephium spectabile</i>	184
天仙子	<i>Hyoscyamus niger</i>	186
河北木蓝	<i>Indigofera bungeana</i>	188
花木蓝	<i>Indigofera kirilowii</i>	190
长萼鸡眼草	<i>Kummerowia stipulacea</i>	192
落叶松	<i>Larix gmelinii</i>	194
黄花落叶松	<i>Larix olgensis</i>	196
华北落叶松	<i>Larix principis-rupprechtii</i>	198
大山黧豆	<i>Lathyrus davidii</i>	200
杜香	<i>Ledum palustre</i>	202
雀儿舌头	<i>Leptopus chinensis</i>	204
辽藁本	<i>Ligusticum jeholense</i>	206
辽东水蜡树	<i>Ligustrum obtusifolium</i> subsp. <i>suave</i>	208
柳穿鱼	<i>Linaria vulgaris</i> var. <i>sinensis</i>	210
野亚麻	<i>Linum stelleroides</i>	212
北桑寄生	<i>Loranthus tanakae</i>	214
东北石松	<i>Lycopodium clavatum</i>	216
地笋	<i>Lycopus lucidus</i>	218
黄连花	<i>Lysimachia davurica</i>	220
狭叶珍珠菜	<i>Lysimachia pentapetala</i>	222
狼尾草	<i>Lysimachia barystachys</i>	224
天女花	<i>Magnolia sieboldii</i>	226

楸子	<i>Malus prunifolia</i>	228
蝙蝠葛	<i>Menispermum dauricum</i>	230
砂引草	<i>Messerschmidia sibiric</i>	232
种阜草	<i>Moehringia lateriflora</i>	234
雨久花	<i>Monochoria korsakowii</i>	236
疣草	<i>Murdannia keisak</i>	238
睡莲	<i>Nymphaea tetragona</i>	240
月见草	<i>Oenothera biennis</i>	242
球子蕨	<i>Onoclea sensibilis</i>	244
黄花列当	<i>Orobanche pycnostachya</i>	246
分株紫萁	<i>Osmunda cinnamomea</i>	248
全叶山芹	<i>Ostericum maximowiczii</i>	250
人参	<i>Panax ginseng</i>	252
刺尖前胡	<i>Peucedanum elegans</i>	254
石防风	<i>Peucedanum terebinthaceum</i>	256
太平花	<i>Philadelphus pekinensis</i>	258
蜜甘草	<i>Phyllanthus ussuriensis</i>	260
东北山梅花	<i>Philadelphus schrenkii</i>	262
红松	<i>Pinus koraiensis</i>	264
油松	<i>Pinus tabulaeformis</i>	266
二叶舌唇兰	<i>Platanthera chlorantha</i>	268
椴子芹	<i>Pleurospermum uralense</i>	270
西伯利亚远志	<i>Polygala sibirica</i>	272
柳叶刺蓼	<i>Polygonum bungeanum</i>	274
叉分蓼	<i>Polygonum divaricatum</i>	276
耳叶蓼	<i>Polygonum manshuriense</i>	278
箭叶蓼	<i>Polygonum sieboldii</i>	280
皱叶委陵菜	<i>Potentilla ancistrifolia</i>	282
大萼委陵菜	<i>Potentilla conferta</i>	284
狼牙委陵菜	<i>Potentilla cryptotaeniae</i>	286

匍枝委陵菜	<i>Potentilla flagellaris</i>	288
肾叶报春	<i>Primula loesener</i>	290
东北扁核木	<i>Prinsepia sinensis</i>	292
蔓孩儿参	<i>Pseudostellaria davidii</i>	294
孩儿参	<i>Pseudostellaria heterophylla</i>	296
内折香茶菜	<i>Isodon inflexa</i>	298
蓝萼香茶菜	<i>Isodon japonica</i> var. <i>glaucocalyx</i>	300
乌苏里鼠李	<i>Rhamnus ussuriensis</i>	302
小叶鼠李	<i>Rhamnus parvifolia</i>	304
锐齿鼠李	<i>Rhamnus arguta</i>	306
牛皮杜鹃	<i>Rhododendron aureum</i>	308
高山杜鹃	<i>Rhododendron lapponicum</i>	310
兴安杜鹃	<i>Rhododendron dauricum</i>	312
火炬树	<i>Rhus typhina</i>	314
东北茶藨子	<i>Ribes mandshuricum</i>	316
风花菜	<i>Rorippa globosa</i>	318
沼生蔊菜	<i>Rorippa islandica</i>	320
山刺玫	<i>Rosa davurica</i>	322
伞花蔷薇	<i>Rosa maximowiziana</i>	324
肥皂草	<i>Saponaria officinalis</i>	326
筐柳	<i>Salix linearistipularis</i>	328
刺沙蓬	<i>Salsola ruthenica</i>	330
五味子	<i>Schisandra chinensis</i>	332
多裂叶荆芥	<i>Schizonepeta multifida</i>	334
纤弱黄芩	<i>Scutellaria dependens</i>	336
京黄芩	<i>Scutellaria pекinensis</i>	338
火焰草	<i>Sedum stellariifolium</i>	340
红枝卷柏	<i>Selaginella sanguinolenta</i>	342
中华卷柏	<i>Selaginella sinensis</i>	344
坚硬女娄菜	<i>Silene firma</i>	346

女娄菜	<i>Silene aprica</i>	348
鹿药	<i>Smilacina japonica</i>	350
花楸树	<i>Sorbus pohuashanensis</i>	352
甘露子	<i>Stachys sieboldii</i>	354
紫筒草	<i>Stenosolenium saxatile</i>	356
瘤毛獐牙菜	<i>Swertia pseudochinensis</i>	358
卵叶獐牙菜	<i>Swertia wilfordi</i>	360
红瑞木	<i>Swida alba</i>	362
小叶巧玲花	<i>Syringa pubescens</i> subsp. <i>microphylla</i>	364
白花蒲公英	<i>Taraxacum pseudo-albidum</i>	366
东北红豆杉	<i>Taxus cuspidata</i>	368
箭头唐松草	<i>Thalictrum simplex</i>	370
展枝唐松草	<i>Thalictrum squarrosom</i>	372
赤廔	<i>Thladiantha dubia</i>	374
辽椴	<i>Tilia mandshurica</i>	376
蒙椴	<i>Tilia mongolica</i>	378
钝萼附地菜	<i>Trigonotis amblyosepala</i>	379
黑榆	<i>Ulmus davidiana</i>	380
旱榆	<i>Ulmus glaucescens</i>	381
宽叶荨麻	<i>Urtica laetevirens</i>	382
毛穗藜芦	<i>Veratrum maackii</i>	384
鸡腿堇菜	<i>Viola acuminata</i>	386
早开堇菜	<i>Viola prionantha</i>	388
山葡萄	<i>Vitis amurensis</i>	390
岩蕨	<i>Woodsia ilvensis</i>	392
耳羽岩蕨	<i>Woodsia polystichoides</i>	394
青花椒	<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	396
参考文献.....		398
拉丁名索引.....		399
中文名索引.....		401



六道木

Abelia biflora Turcz.

【别名】二花六道木、六条木

【基原】来源于忍冬科六道木属六道木 *Abelia biflora* Turcz. 的果实入药。

【形态特征】落叶灌木，高1~3 m。叶长圆形至长圆状披针形，长2~6 cm，宽0.5~2 cm，顶端尖至渐尖，基部钝至渐狭成楔形，全缘或中部以上羽状浅裂而具1~4对粗齿，上面深绿色，下面绿白色；叶柄长2~4 mm，基部膨大且成对相连，被硬毛。花单生于小枝上叶腋，无总花梗；花梗长5~10 mm，被硬毛；小苞片三齿状，齿1长2短，花后不落；萼筒圆柱形，疏生短硬毛，萼齿4枚，狭椭圆形或倒卵状长圆形，长约1 cm；花冠白色、淡黄色或带浅红色，狭漏斗形或高脚碟形，外面被短柔毛，杂有倒向硬毛，4裂，裂片圆形，筒为裂片长的三倍，内密生硬毛；雄蕊4枚，二强，着生于花冠筒中部，内藏，花药长卵圆形；子房3室，仅1室发育，花柱长约1 cm，柱头头状。果实具硬毛，冠以4枚宿存而略增大的萼裂片；种子圆柱形，长4~6 mm，具肉质胚乳。花期5~6月；果期8~9月。


【生境】生于多石质山地灌丛或高山岩石缝隙中。

【分布】黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西。朝鲜也有分布。

【采集加工】夏季采收果实，除去杂质，洗净晒干。

【性味功能】祛风湿，消肿毒。

【主治用法】治风湿筋骨疼痛，痈毒红肿。用量6~12 g。



无梗五加

Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.)
Seem.

【别名】短梗五加、乌鴉子

【基原】来源于五加科五加属无梗五加 *Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem. 的根皮入药。

【形态特征】落叶灌木或小乔木，高2~5m；树皮暗灰色或灰黑色，有纵裂纹和粒状裂纹；枝灰色，无刺或疏生刺；刺粗壮，直或弯曲。叶有小叶3~5；叶柄长3~12cm，无刺或有小刺；小叶片纸质，倒卵形或长圆状倒卵形至长圆状披针形，稀椭圆形，长8~18cm，宽3~7cm，顶端渐尖，基部楔形，两面均无毛，边缘有不整齐锯齿，稀重锯齿状，侧脉5~7对，明显，网脉不明显；小叶柄长2~10mm。头状花序紧密，球形，直径2~3.5cm，有花多数，5~6个稀多至10个组成顶生圆锥花序或复伞形花序；总花梗长0.5~3cm，密生短柔毛；花无梗；萼密生白色茸毛，边缘有5小齿；花瓣5，卵形，浓紫色，长1.5~2mm，外面有短柔毛，后毛脱落；子房2室，花柱全部合生成柱状，柱头离生。果实倒卵状椭圆球形，黑色，长1~1.5cm，稍有棱，宿存花柱长达3mm。花期8~9月；果期9~10月。

【生境】生于针阔混交林及阔叶林林下、林缘、山坡、沟谷及路旁等处。

【分布】黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、华北、陕西。日本、朝鲜、俄罗斯远东地区也有分布。

【采集加工】春、秋季采挖根，剥取根皮晒干备用。

【性味功能】味辛，性温。祛风湿，壮筋骨，活血祛瘀。

【主治用法】治风湿性关节炎，腰膝疼痛，筋骨痿软，水肿，小便不利，阳痿囊湿，寒湿脚气，神疲体倦，小儿行迟，跌打损伤等。用量10~15g。

【附方】

1. 治风湿痛：无梗五加根皮15g，鸡血藤20g，海风藤20g，威灵仙15g，水煎服。

2. 治筋骨痿软，膝足无力：无梗五加根皮15g，牛膝20g，桑寄生30g，木瓜15g，水煎服。

3. 治肾炎水肿：无梗五加根皮15g，茯苓皮25g，生姜皮15g，大腹皮15g，陈皮10g，水煎服。