

中医临床经典丛书

东汉·张仲景◎著

伤寒论




传
媒
集
团
社
公
司

中医临床经典丛书

东汉·张仲景◎著

伤寒论



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒论 / (东汉) 张仲景著. —太原 : 山西科学技术出版社, 2018. 2

(中医临床经典丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 5658 - 7

I. ①伤… II. ①张… III. ①《伤寒论》 IV. ①R222. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 010796 号

校注者：高丽娜 李 倩

伤寒论

出版人：赵建伟

著 者：东汉·张仲景

责任编辑：王璇

责任发行：阎文凯

封面设计：杨宇光

出版发行：山西出版传媒集团·山西科学技术出版社

地址：太原市建设南路 21 号 邮编：030012

编辑室电话：0351-4922135

投稿邮箱：shanxikeji@qq.com

发行电话：0351-4922121

经 销：全国新华书店

印 刷：运城日报印刷厂

网 址：www.sxkxjscbs.com

微 信：sxkjcb

开 本：890mm×1240mm 1/32 印张：3

字 数：58 千字

版 次：2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月山西第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5377 - 5658 - 7

定 价：18.00 元

本社常年法律顾问：王葆柯

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与发行部联系调换。

宋刻《伤寒论》序

夫《伤寒论》，盖祖述大圣人之意，诸家莫其伦拟。故晋·皇甫谧序《甲乙针经》云：伊尹以元圣之才，撰用《神农本草》，以为《汤液》；汉·张仲景论广《汤液》，为数十卷，用之多验。近世太医令王叔和，撰次仲景遗论甚精，皆可施用，是仲景本伊尹之法，伊尹本神农之经，得不谓祖述大圣人之意乎！

张仲景，《汉书》无传，见《名医录》云：南阳人，名机，仲景乃其字也。举孝廉，官至长沙太守。始受术于同郡张伯祖，时人言，识用精微过其师。所著论，其言精而奥，其法简而详，非浅闻寡见者所能及。自仲景于今八百余年，唯王叔和能学之，其间如葛洪、陶（弘）景、胡洽、徐之才、孙思邈辈，非不才也，但各自名家，而不能修明之。开宝中，节度使高继冲，曾编录进上，其文理舛错，未尝考正。历代虽藏之书府，亦阙于雠校，是使治病之流，举天下无或知者。国家诏儒臣，校正医书，臣奇续被其选，以为百病之急，无急于伤寒。

今先校定张仲景《伤寒论》十卷，总二十二篇，证外合三百九十七法，除复重，定有一百一十二方。今请颁行。

太子右赞善大夫臣 高保衡

尚书屯田员外郎臣 孙 奇

尚书司封郎中秘阁校理臣

林亿等谨上

张仲景原序

论曰：余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也！怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，唯名利是务；崇饰其末，忽弃其本，华其外而淬其内。皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，惠及祸至，而方震栗；降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉？而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地；蒙昧昧，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也。

余宗族素多，向余二百。建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤

橫天之莫救，乃勤求古訓，博采众方，撰用《素問》《九卷》《八十一難》《陰陽大論》《胎胪药錄》，并《平脉辨證》，為《傷寒雜病論》合十六卷，雖未能盡愈諸病，庶可以見病知源，若能尋余所集，思過半矣。

夫天布五行，以運萬類，人稟五常，以有五臟，經絡府俞，陰陽會通，玄冥幽微，變化難極，自非才高識妙，豈能探其理致哉！上古有神農、黃帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少師、仲文，中世有長桑、扁鵲，漢有公乘陽庆及倉公，下此以往，未之聞也。

觀今之醫，不急思求經旨，以演其所知，各承家技，始終順旧。省疾問病，務在口給，相對斯須，便處湯藥；按寸不及尺，握手不及足，人迎、趺陽，三部不參，動數發息，不滿五十，短期未知決診，九候曾無彷彿；明堂齶庭，盡不見察，所謂窺管而已。夫欲視死別生，實為難矣。孔子云：生而知之者上，學則亞之。多聞博識，知之次也。余宿尚方術，請事斯語。

目 录

辨太阳病脉证并治（上）	(1)
桂枝汤方	(2)
桂枝加葛根汤方	(3)
桂枝加附子汤方	(3)
桂枝去芍药汤方	(4)
桂枝去芍药加附子汤方	(4)
桂枝麻黄各半汤方	(5)
桂枝二麻黄一汤方	(5)
白虎加人参汤方	(6)
桂枝二越婢一汤方	(6)
桂枝去桂加茯苓白术汤方	(6)
甘草干姜汤方	(7)
芍药甘草汤方	(7)
调胃承气汤方	(7)
四逆汤方	(7)
辨太阳病脉证并治（中）	(9)

葛根汤方	(9)
葛根加半夏汤方	(9)
葛根黄芩黄连汤方	(10)
麻黄汤方	(10)
小柴胡汤方	(11)
大青龙汤方	(11)
小青龙汤方	(12)
桂枝加厚朴杏子汤方	(13)
干姜附子汤方	(15)
桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方	(15)
麻黄杏仁甘草石膏汤方	(15)
桂枝甘草汤方	(16)
茯苓桂枝甘草大枣汤方	(16)
厚朴生姜半夏甘草人参汤方	(16)
茯苓桂枝白术甘草汤方	(17)
芍药甘草附子汤方	(17)
茯苓四逆汤方	(17)
五苓散方	(18)
茯苓甘草汤方	(18)
梔子豉汤方	(19)
梔子甘草豉汤方	(19)
梔子生姜豉汤方	(19)
梔子厚朴汤方	(20)
梔子干姜汤方	(20)

真武汤方	(20)
禹余粮丸方 (方佚)	(21)
小柴胡汤方	(22)
小建中汤方	(23)
大柴胡汤方	(24)
柴胡加芒硝汤方	(24)
桃核承气汤方	(25)
柴胡加龙骨牡蛎汤方	(25)
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方	(26)
桂枝加桂汤方	(27)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤方	(27)
抵当汤方	(28)
抵当丸方	(29)
辨太阳病脉证并治 (下)	(30)
大陷胸丸方	(30)
大陷胸汤方	(31)
小陷胸汤方	(32)
文蛤散方	(32)
五苓散方	(33)
三物小白散方	(33)
柴胡桂枝汤方	(34)
柴胡桂枝干姜汤方	(34)
半夏泻心汤方	(35)
十枣汤方	(36)

大黄黄连泻心汤方	(36)
附子泻心汤方	(36)
生姜泻心汤方	(37)
甘草泻心汤方	(37)
赤石脂禹余粮汤方	(38)
旋覆代赭汤方	(38)
麻黄杏子甘草石膏汤方	(39)
桂枝人参汤方	(39)
瓜蒂散方	(40)
白虎加人参汤方	(40)
黄芩汤方	(41)
黄芩加半夏生姜汤方	(41)
黄连汤方	(41)
桂枝附子汤方	(42)
去桂加白术汤方	(42)
甘草附子汤方	(43)
白虎汤方	(43)
炙甘草汤方	(43)
辨阳明病脉证并治	(45)
调胃承气汤方	(48)
大承气汤方	(48)
小承气汤方	(48)
白虎汤方	(50)
梔子豉汤方	(51)

白虎加人参汤	(51)
猪苓汤方	(51)
蜜煎导方	(52)
土瓜根方（附方佚）	(53)
猪胆汁方（附方）	(53)
茵陈蒿汤方	(53)
吴茱萸汤方	(54)
麻子仁丸	(55)
梔子檗皮汤方	(56)
麻黄连轺赤小豆汤方	(57)
辨少阳病脉证并治	(58)
小柴胡汤方	(58)
辨太阴病脉证并治	(60)
桂枝加芍药汤方	(61)
桂枝加大黄汤方	(61)
辨少阴病脉证并治	(62)
麻黄细辛附子汤方	(63)
麻黄附子甘草汤方	(64)
黄连阿胶汤方	(64)
附子汤方	(64)
桃花汤方	(65)
猪肤汤方	(65)
甘草汤方	(66)
桔梗汤方	(66)

苦酒汤方	(66)
半夏散及汤方	(66)
白通汤方	(67)
白通加猪胆汁汤方	(67)
真武汤方 (附加減法)	(67)
通脉四逆汤方	(68)
四逆散方	(68)
猪苓汤方	(69)
辨厥阴病脉证并治	(70)
乌梅丸方	(71)
当归四逆汤方	(73)
当归四逆加吴茱萸生姜汤方	(73)
茯苓甘草汤方	(74)
麻黄升麻汤方	(74)
干姜黄芩黄连人参汤方	(75)
通脉四逆汤方	(76)
白头翁汤方	(76)
辨霍乱病脉证并治	(78)
四逆加人参汤方	(78)
五苓散方	(79)
理中丸方	(79)
通脉四逆加猪胆汁汤方	(80)
辨阴阳易瘥后劳复病脉证并治	(81)
烧裈散方	(81)

枳实栀子豉汤方	(81)
牡蛎泽泻散方	(82)
理中丸方	(82)
竹叶石膏汤方	(82)

辨太阳病脉证并治（上）

一、太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

二、太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。

三、太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。

四、伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。

五、伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。

六、太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘝疭；若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

七、病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳，七日愈；发于阴，六日愈。以阳数七，阴数六故也。

八、太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故

也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。

九、太阳病欲解时，从巳至未上。

一〇、风家，表解而不了了者，十二日愈。

一一、病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

一二、太阳中风，阳浮而阴弱。阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出。啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

桂枝汤方

桂枝三两（去皮） 芍药三两 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘）

上五味，㕮咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身痏痏微似有汗者益佳，不可令如水流离，病必不除。若一服汗出病瘥，停后服，不必尽剂。若不汗，更服依前法；又不汗，后服小促其间，半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

一三、太阳病，头痛发热，汗出恶风，桂枝汤主之。

一四、太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。

桂枝加葛根汤方

葛根四两 麻黄三两（去节） 芍药二两 生姜三两
(切) 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 桂枝二两
(去皮)

上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去上沫；内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啜粥。余如桂枝法将息及禁忌。

一五、太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法；若不上冲者，不得与之。

一六、太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病；桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。

一七、若酒客病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。

一八、喘家作，桂枝汤加厚朴、杏子佳。

一九、凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。

二〇、太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。

桂枝加附子汤方

桂枝三两（去皮） 芍药三两 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 附子一枚（炮，去皮，