

助产技术服务人员资格 考试复习题解

主 审	王德智		
主 编	刘彩霞	徐 玲	
副主编	张静芝	田崇阳	

沈阳出版社

前 言

对开展助产技术服务的医疗保健机构实行执业许可证制度，对从事助产技术服务人员进行资格考试考核，实行持证上岗制度，是贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》，加强助产技术服务质量管理，提高助产技术服务水平，依法保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质的重要措施。

为配合各地开展对助产技术服务人员进行资格考试考核工作，帮助从事助产技术服务人员更快地重点地掌握和运用助产技术知识，适应目前采用的多选题考试方法，我们编写了这本《助产技术服务人员资格考试复习题解》，并由中国医科大学妇产科教授、《中国实用妇科与产科》杂志主编王德智作为本书的主审。

本书突出实用性。试题采用了国内外使用较多并被公认的多选题新题型。这种新的题型既可考察临床理论知识，又可紧密地结合临床实践考察助产技术服务人员独立分析和解决问题的能力，使考题更具实用性。本书涵盖的知识面广，且有一定的深度，不仅适用于助产技术服务人员资格考试前的复习、辅导，也可作为从事助产技术服务人员临床医疗工作指导用书、教师教学辅导用书。

由于本书撰稿时间仓促，作者水平有限，难免存在不当之处，欢迎批评指正。

编 者

1997年6月

使用说明

为了帮助从事助产技术服务人员适应目前采用的多选题考试，现将本书中多选题类型及答题要求介绍如下：

一、A 型题

A 型题即最佳选择题，是目前最常用的多选题。其中分 A_1 、 A_2 、 A_3 型题， A_1 型题为回忆性题， A_2 型题为解释性题，即提出一个病例，作出正确判断和诊断， A_3 型题为解决性题，根据所给病例提出处理方法。A 型题的组成是在一段叙述性的题干后，然后列出 A、B、C、D、E 五个备选答案供选择，五个备选答案中只有一个是最佳、最适宜或最正确的（亦可能试题要求指出错误的一个），称为正确答案或正确选择，其余四个称为干扰答案、迷惑答案或不正确的选择。干扰答案可以完全不正确，也可以部分正确，但不是最佳选择。应试者应仔细思考，精心推敲，排除干扰答案，选出一个最佳答案。

例题一：

初产妇 25 岁，妊娠 40 周，规律性宫缩 5 小时，宫口开大 3cm，先露儿头 S^{-2} ，7 小时宫口开大 5cm，先露 S^0 ，9 小时宫口开全，先露 S^{+1} ，10 小时先露 S^{+1} ，最恰当的诊断是：

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长

C. 第二产程延长

D. 胎头下降延缓

E. 胎头下降阻滞

本题正确答案应为 E。

二、B 型题

B 型题又称配伍题。本类试题形式是首先列出五个备选答案，随后有几道考题。应试者应在五个备选答案中给每道试题选配一个最合适、最正确的答案。B 型题不同于 A 型题之处是数道考题共用一组答案，每一个答案可被重复选择，也可不被选择。B 型题主要考核知识的密切相关性。

例题二：问题 122—124

A. 潜伏期延长

B. 活跃期延长

C. 活跃期停滞

D. 第二产程延长

E. 正常产程

122. 初产妇，26 岁，妊娠 39 周，临产于 8:00 时，12:00 时宫口开大 4cm，先露儿头 S^{-2} ，21:00 时，宫口开大 8cm，诊断为

123. 初产妇，24 岁，妊娠 40 周，临产于 4:00 时，9:00 时宫口开大 3cm，15:00 时宫口开全，16:00 时胎儿娩出，诊断为

124. 初产妇，35 岁，妊娠 38 周，临产于 0:00 时，10:00 时宫口开大 3cm，16:00 时宫口开全，18:30 时产钳助娩一女活婴，诊断为

正确答案：122. B 123. E 124. D

目 录

第一章 女性生殖系统解剖

A 型题	(1)
B 型题	(5)
参考答案	(6)

第二章 孕期监护及保健

A 型题	(7)
B 型题	(13)
参考答案	(14)

第三章 高危妊娠

A 型题	(16)
B 型题	(23)
参考答案	(24)

第四章 正常分娩

A 型题	(25)
B 型题	(46)
参考答案	(52)

第五章 异常分娩

A 型题	(54)
B 型题	(77)

参考答案	(80)
------------	------

第六章 妊娠、分娩并发症、合并症

A 型题	(82)
------------	------

B 型题	(123)
------------	-------

参考答案	(129)
------------	-------

第七章 母乳喂养

A 型题	(132)
------------	-------

B 型题	(139)
------------	-------

参考答案	(140)
------------	-------

第八章 新生儿生理特点及其处理

A 型题	(141)
------------	-------

B 型题	(147)
------------	-------

参考答案	(148)
------------	-------

第九章 新生儿常见疾病

A 型题	(149)
------------	-------

B 型题	(155)
------------	-------

参考答案	(157)
------------	-------

第十章 有关法律法规

A 型题	(158)
------------	-------

参考答案	(163)
------------	-------

第一章 女性生殖系统解剖

A 型题

1. 骨产道通常指的是下列哪项？（ ）
A. 骨盆
B. 大骨盆
C. 中骨盆
D. 真骨盆
E. 假骨盆
2. 我国妇女最常见的骨盆类型是哪一种？（ ）
A. 女型
B. 男型
C. 类人猿型
D. 扁平型
E. 混合型
3. 下列哪项属于正常骨盆？（ ）
A. 女型骨盆
B. 男型骨盆
C. 偏斜骨盆
D. 扁平骨盆
E. 类人猿型骨盆
4. 关于女性骨盆，下列哪项是正确的？（ ）
A. 入口平面的前后径大于横径
B. 入口平面的斜径大于横径
C. 中骨盆的横径大于前后径
D. 出口平面的横径大于前后径

- E. 出口平面的前后径大于横径
5. 关于正常骨产道，下列哪些是正确的？（ ）
- A. 骨盆入口平面是骨盆最宽平面
 - B. 骨盆出口平面是骨盆最宽平面
 - C. 骨盆出口平面是骨盆最窄平面
 - D. 中骨盆平面是骨盆最窄平面
 - E. 中骨盆平面是骨盆最宽平面
6. 子宫最狭窄的部分是指下列哪项？（ ）
- A. 解剖学内口
 - B. 组织学内口
 - C. 子宫峡部
 - D. 子宫颈管
 - E. 子宫颈外口
7. 关于子宫峡部，下列哪项是错误的？（ ）
- A. 指宫体与宫颈间最狭窄的部分
 - B. 子宫峡部的上端为解剖学内口
 - C. 子宫峡部的下端为组织学内口
 - D. 在非孕期长约 1cm
 - E. 妊娠足月拉长达 5—6cm
8. 除下列哪项外，均为女性生殖器官的邻近器官？（ ）
- A. 尿道
 - B. 膀胱
 - C. 输尿管
 - D. 直肠
 - E. 乙状结肠
9. 哪种肌肉不属于骨盆底浅层肌肉？（ ）
- A. 球海绵体肌
 - B. 坐骨海绵体肌
 - C. 会阴浅横肌
 - D. 肛门外括约肌
 - E. 肛提肌
10. 正常会阴体厚度是：（ ）

A. 1—2cm

B. 2—3cm

C. 3—4cm

D. 4—5cm

E. 5—6cm

11. 关于骨盆的组成, 下列哪项是正确的? ()

A. 骶骨、尾骨、髌骨

B. 骶尾骨、髌骨

C. 骶尾骨、坐骨、耻骨

D. 髌骨、耻骨、坐骨

E. 骶骨、尾骨及左右两块髌骨

12. 分娩时骨盆腔稍有扩大是因为哪项原因? ()

A. 宫缩力

B. 胎儿通过骨盆腔的被动扩张

C. 羊膜破裂时羊水冲力

D. 受激素的影响

E. 骨质疏松

13. 哪项与女型骨盆特点不符? ()

A. 入口略呈圆形

B. 耻骨弓较宽

C. 入口横径较前后径稍长

D. 骶骨的前面平直

E. 两侧坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$

14. 下列哪项不属于女性外生殖器? ()

A. 阴道

B. 大阴唇

C. 阴道前庭

D. 阴阜

E. 阴蒂

15. 关于女性内生殖器组成, 下列哪项是正确的? ()

A. 子宫、附件、输卵管

B. 阴道、子宫、附件

C. 阴道、子宫、卵巢

D. 子宫、输卵管、阴道

E. 子宫、输卵管、卵巢

16. 关于子宫的作用, 下列哪项不正确? ()

A. 胎儿生长发育的场所

B. 产生月经

C. 卵子受精的场所

D. 分娩时, 收缩使胎儿娩出

E. 有内分泌功能

17. 子宫得以维持正常位置主要依靠：()

A. 4 对韧带、盆底肌肉和筋膜的支托

B. 子宫 4 对韧带对子宫的维持

C. 主要靠阔韧带

D. 主要靠子宫骶骨韧带和主韧带

E. 直肠和膀胱的支持

18. 女性内生殖器官的血液供应主要来自下列哪种动脉？

()

A. 子宫动脉

B. 卵巢动脉

C. 阴道动脉

D. 阴部内动脉

E. 髂内动脉

19. 下列叙述哪项是错误的？()

A. 卵巢表面无腹膜

B. 卵巢皮质内有数以万计的原始卵泡

C. 卵巢是决定女性的器官

D. 成年女子的卵巢体积为 $7 \times 4 \times 3 \text{ (cm)}^3$

E. 卵巢髓质内无卵泡

20. 关于成年妇女的子宫，下列哪项是错误的？()

A. 子宫重约 50 克

B. 长约 7—8 厘米

C. 宽约 4—5 厘米

D. 厚约 2—3 厘米

E. 宫腔容量约 50 毫升

21. 子宫动脉来自于下列何种动脉？()

A. 腹主动脉

B. 髂内动脉

C. 髂外动脉

D. 阴道动脉

E. 肾动脉

22. 左卵巢静脉回流到：()
- A. 下腔静脉 B. 髂总静脉
- C. 肾静脉 D. 髂内静脉
- E. 子宫静脉
23. 关于子宫峡部，下列哪项是正确的？()
- A. 下端是解剖学内口 B. 上端是组织学内口
- C. 非孕时长约 2 厘米 D. 临产后可长达 15 厘米
- E. 妊娠时形成子宫下段
24. 供应阴道上段的动脉是下列哪项？()
- A. 阴道动脉 B. 阴部内动脉
- C. 痔中动脉 D. 子宫动脉
- E. 卵巢动脉

B 型题

25—27

- A. 骨盆入口略呈三角形 B. 骨盆入口略呈纵卵圆形
- C. 骨盆入口呈扁平型 D. 骨盆入口略呈圆形
- E. 骨盆入口略呈不规则形
25. 女型骨盆：()
26. 男型骨盆：()
27. 类人猿型骨盆：()

28—31

- A. 9cm B. 10cm
- C. 11cm D. 11.5cm
- E. 13cm

28. 骨盆入口前后径平均约：()

29. 骨盆出口前后径平均约：()

30. 骨盆出口横径平均约：()

31. 中骨盆横径平均约：()

32—35

A. 骨盆入口横径

B. 骨盆出口横径

C. 骨盆入口前后径

D. 骨盆出口前后径

E. 中骨盆横径

32. 坐骨结节间径可反应：()

33. 骶耻外径可反应：()

34. 粗隆间径可反应：()

35. 髂嵴间径可反应：()

参 考 答 案

A 型题

1. D	2. A	3. A	4. E	5. D	6. C
7. E	8. E	9. E	10. C	11. E	12. D
13. D	14. A	15. B	16. C	17. A	18. E
19. D	20. E	21. B	22. C	23. E	24. D

B 型题

25. D	26. A	27. B	28. C	29. D	30. A
31. B	32. B	33. C	34. E	35. A	

第二章 孕期监护及保健

A 型题

1. 目前我国采用的围产期概念是哪项? ()
 - A. 妊娠满 20 周至产后 4 周
 - B. 妊娠满 20 周至产后 1 周
 - C. 妊娠满 28 周至产后 4 周
 - D. 妊娠满 28 周至产后 1 周
 - E. 从胚胎形成至产后 1 周
2. 首次产前检查应在何时进行为最合适? ()
 - A. 妊娠早期
 - B. 妊娠 14 周
 - C. 妊娠 20 周
 - D. 妊娠 24 周
 - E. 妊娠 28 周
3. 首次产前检查后, 正常妊娠期间还需做几次产前检查? ()
 - A. 5 次
 - B. 6 次
 - C. 7 次
 - D. 8 次
 - E. 9 次
4. 孕妇初感胎动的时间是: ()
 - A. 16—18 周
 - B. 18—20 周

- C. 20—22 周
D. 22—24 周
E. 24—26 周
5. 正常胎心率是：()
A. 80—100 次/分
B. 100—120 次/分
C. 120—160 次/分
D. 140—180 次/分
E. 160—200 次/分
6. 在孕妇腹部听诊中，哪种音响与母体脉搏数相一致？
()
A. 胎心音
B. 脐带杂音
C. 胎动杂音
D. 子宫杂音
E. 肠管杂音
7. 关于骨盆测量，除下列哪项外都为正常值？()
A. 髂棘间径 25cm
B. 髂嵴间径 28cm
C. 骶耻内径 12cm
D. 骶耻外径 16cm
E. 坐骨结节间径 9cm
8. 正常骨盆的坐骨棘间径值为：()
A. 11cm
B. 10cm
C. 9cm
D. 8cm
E. 7cm
9. 骨盆出口横径增宽见于哪类骨盆？()
A. 佝偻病性扁平骨盆
B. 单纯扁平骨盆
C. 漏斗骨盆
D. 横径狭窄骨盆
E. 骨软化症骨盆
10. 测量骶耻外径的标志点是：()

- A. 耻骨联合上缘至第五腰椎棘突下
 B. 耻骨联合中点至髂后上棘连线中点上 1.5cm
 C. 耻骨联合中点至菱形窝上角下 1.5cm
 D. 耻骨联合上缘中点至菱形窝上角
 E. 耻骨联合上缘中点至髂嵴连线下 2cm
11. 骨盆的真结合径是指下列哪项? ()
 A. 对角径
 B. 坐骨棘间径
 C. 骨盆入口前后径
 D. 骶耻外径
 E. 髂嵴间径
12. 骶耻外径的正常值是: ()
 A. 10—12cm
 B. 12—14cm
 C. 14—16cm
 D. 16—18cm
 E. 18—20cm
13. 作为推算预产期的根据哪项不合适? ()
 A. 末次月经
 B. 孕妇体重
 C. 妊娠反应
 D. 初觉胎动
 E. 孕早期检查
14. 下列妊娠期保健, 哪项是正确的? ()
 A. 产前检查应从妊娠 20 周开始
 B. 孕早期检查只是为了确定是否怀孕
 C. 产前检查应每月检查一次
 D. 妊娠期系列产前检查应从妊娠 28 周起
 E. 血压较基础血压增高 4/2kPa (30/15mmHg) 为异常
15. 关于腹部四步触诊法, 下列哪项是错误的? ()
 A. 孕妇取仰卧两腿伸直位
 B. 第一步触宫底高度
 C. 第二步触胎背及肢体侧
 D. 第三步触胎先露

E. 第四步校对胎先露的诊断

16. 枕右前时，在孕妇腹壁上听胎心音，最清楚的部位可能是：（ ）
- A. 在脐右上方 B. 在脐左上方
C. 在脐右侧方 D. 在脐左侧方
E. 在脐右下方
17. 除哪项外，均可作为孕早期的诊断依据？（ ）
- A. 子宫增大变软，呈球形
B. 阴道壁及宫颈呈紫蓝色
C. 黑格氏征（Hegar's sign）阳性
D. 黄体酮试验阳性
E. 尿 HCG 阳性
18. 目前我国孕产妇死亡原因顺位中首位是下列哪项？（ ）
- A. 妊高征 B. 妊娠合并心脏病
C. 产后出血 D. 羊水栓塞
E. 产褥感染
19. 早期妊娠是指下列哪项？（ ）
- A. 妊娠 8 周末以前 B. 妊娠 10 周末以前
C. 妊娠 12 周末以前 D. 妊娠 14 周末以前
E. 妊娠 16 周末以前
20. 哪项检查不能判断胎盘功能？（ ）
- A. 测定孕妇尿雌三醇值（ E_3 ）
B. 检测羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值（L/S）
C. 测定尿雌激素/肌酐比值（E/C）
D. 测定血清胎盘泌乳素值（HPL）