


医学考试应试指南系列丛书

诊断学 应试指南

(第2版)

主编 马明信



- 本科生复习考试用书
- 研究生入学考试用书
- 执业医师资格考试用书



北京大学医学出版社

医学考试应试指南系列丛书

本科生复习考试用书 / 研究生入学考试用书 / 执业医师资格考试用书

诊断学应试指南

(第2版)

主 编 马明信

副主编 欧晋平

加油!

编 委 (按姓氏笔画排序)

马明信 刘 刚 刘彬彬

李海潮 张宝妮 欧晋平

高 文 高燕明 谢鹏雁

北京大学医学出版社

ZHENDUANXUE YINGSHI ZHINAN

图书在版编目 (CIP) 数据

诊断学应试指南 / 马明信主编. —2 版. —北京:
北京大学医学出版社, 2016.6

(医学考试应试指南系列丛书)

ISBN 978-7-5659-1392-1

I. ①诊… II. ①马… III. ①诊断学 - 研究生
入学考试 - 自学参考资料 IV. ① R44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 100150 号

诊断学应试指南 (第 2 版)

主 编: 马明信

出版发行: 北京大学医学出版社

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

电 话: 发行部 010-82802230; 图书邮购 010-82802495

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京瑞达方舟印务有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 冯智勇 责任校对: 金彤文 责任印制: 李 啸

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 18 字数: 454 千字

版 次: 2016 年 6 月第 2 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5659-1392-1

定 价: 38.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

《诊断学应试指南》第1版出版以来，对大学本科生诊断学考试和毕业前综合考试、硕士研究生和博士研究生入学考试、国家执业医师资格考试、住院医师规范化培训考试、主治医师晋升考试等多层次的考前复习及自我专业知识学习和考查均起到了很好的帮助和指导作用，也得到了读者较好的评价。但由于第1版出版距今时间已久，有些题目已不符合当今需求，有些内容也需要更新。因此，该书第2版以《诊断学》（第8版）为基础，参考最新内、外、妇、儿各学科领域的国内经典教材及北京大学医学出版社《物理诊断学》（第3版）进行了内容更新，坚持突出重点、覆盖面广、针对性强的特色；在题型上，为适应目前以考核岗位胜任力为导向的考试要求，适应临床工作和各种考试、考核的需要，删除了一些不适合的题目，增加了一些新题，特别是在A型题中增多了A2型题和新增加了A3/A4型题，取消了C型题。

本书由北京大学各附属医院从事临床及研究生教育、管理第一线的中青年专家组织编写。由于本书内容多、试题量大，难免有不妥之处，还望读者和关心此项工作的老师们给予批评指正，编者在此诚表谢意。

编 者

答题说明

本书选择题包括 A、B、X 型三类（在每章中均给出正确答案，无解释）：

A 型题 从 5 个备选答案中选出一个最佳答案。

B 型题 各题从列出的备选答案中选出最合适的一个，每项备选答案可被选一次、多次或不选。

X 型题 可选 2~4 项不等，要求对每一选项做出对或错的回答。

名词解释和问答题的答案主要给出答案要点，为了便于理解，答案均较详细；填空题均给出正确答案。

目 录

第一章 常见症状和问诊.....	1	参考答案	156
应试习题	1		
参考答案	30		
第二章 基本检查法及一般检查.....	41	第九章 排泄物、分泌物及体液检测	160
应试习题	41	应试习题	160
参考答案	54	参考答案	165
第三章 头、颈部检查.....	59	第十章 肾脏和肝脏常用实验室检测	168
应试习题	59	应试习题	168
参考答案	68	参考答案	172
第四章 胸部检查（除外心脏和血管）	72	第十一章 临床常用生物化学检测... ..	175
应试习题	72	应试习题	175
参考答案	84	参考答案	180
第五章 心脏和血管检查.....	90	第十二章 临床免疫学和病原体检测	183
应试习题	90	应试习题	183
参考答案	107	参考答案	198
第六章 腹部检查.....	114	第十三章 其他检测.....	203
应试习题	114	应试习题	203
参考答案	132	参考答案	205
第七章 生殖器、肛门、直肠、脊柱与四肢及神经系统检查.....	139	第十四章 心电图（包括动态心电图、运动负荷试验）和超声心动图检查.....	207
应试习题	139	应试习题	207
参考答案	145	参考答案	225
第八章 临床血液学、血栓与止血检测	149	第十五章 肺功能检查.....	233
应试习题	149	应试习题	233

目 录

参考答案	242	模拟试卷（一）	263
		参考答案	270
第十六章 内镜检查	246		
应试习题	246	模拟试卷（二）	273
参考答案	251	参考答案	279
第十七章 临床常用诊断技术	255		
应试习题	255		
参考答案	259		

第一章 常见症状和问诊

应试习题

一、名词解释

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 症状 | 17. constipation |
| 2. 弛张热 | 18. 黄疸 |
| 3. fever type | 19. Rotor 综合征 |
| 4. 紫癜 | 20. 痛风 |
| 5. 水肿 | 21. hematuria |
| 6. hemoptysis | 22. 膀胱刺激征 |
| 7. 胸痛 | 23. oliguria |
| 8. 中心性发绀 | 24. 尿失禁 |
| 9. 吸气性呼吸困难 | 25. 眩晕 |
| 10. palpitation | 26. 晕厥 |
| 11. 干呕 | 27. 惊厥 |
| 12. dysphagia | 28. stupor |
| 13. 呕血 | 29. 主诉 |
| 14. 柏油便 | 30. 现病史 |
| 15. 牵涉痛 | 31. 开放性提问 |
| 16. 渗出性腹泻 | |

二、填空题

1. 人的正常体温是随测量部位不同而异，腋表为 36 ~ 37℃，口表为 36.3 ~ 37.2℃，肛表为 36.5 ~ 37.7℃。
2. 多数患者的发热是由于致热原所致，致热原包括 内生 和 外生 两大类。
3. 引起发热的病因甚多，临床上可区分为 感染性 和 非感染性 两大类。
4. 稽留热是指体温恒定地维持在 39~40℃ 以上，24 小时内波动范围不超过 1℃。常见于 大叶性肺炎、斑疹伤寒和伤寒 的高热期。
5. 血小板异常引起的出血一般见于三种情况，即血小板数 、血小板数 和血小板 。
6. 根据水肿发生的部位不同，可分为 水肿和 水肿。根据水肿部位指压皮肤有无凹陷，又分为 水肿和 水肿。
7. 咳嗽的临床表现的问诊包括询问咳嗽的 、 与 和咳

嗽的_____。

8. 每日咯血量_____为小量,_____为中等量,_____为大量。大量咯血主要见于_____、_____和_____。

9. 引起胸痛的原因主要为胸部疾病,常见的有胸壁疾病、_____,_____,_____和其他疾病。

10. 当毛细血管内血液的还原血红蛋白超过_____时,皮肤黏膜即可出现_____。血红蛋白低于_____时,即使 SaO_2 有明显降低,亦难发现_____。

11. 根据呼吸困难的发生机制和临床表现特点,将呼吸困难分为五种类型,即_____呼吸困难、_____呼吸困难、_____呼吸困难、_____呼吸困难和_____呼吸困难。

12. 心律失常是引起心悸的一个重要原因,当心动_____,_____或_____时,均可出现心悸。

13. 呕吐中枢位于_____。呕吐是一个复杂的反射动作,其过程可分为三个阶段,即_____,_____和_____。

14. 按照发生机制吞咽困难可以分为_____和_____两大类。

15. 当消化道出血量达血容量的_____时,多无血压、脉搏等变化;出血量达血容量的_____以上时,会出现急性失血症状;若出血量达血容量的_____以上时,会出现休克等。

16. 腹痛的发生机制分为三种,即_____腹痛、_____腹痛和_____腹痛。

17. 由霍乱弧菌外毒素引起的腹泻为_____;由甲状腺功能亢进症引起的腹泻为_____;由各种肠道炎症疾病引起的腹泻为_____。

18. 便秘是指大便次数_____,一般每周少于_____。便秘按病因分为_____和_____两大类。

19. 隐性黄疸时,血清胆红素达_____;临床见到黄疸时,血清胆红素超过_____。

20. 黄疸按病因学分类可分为_____,_____,_____和_____。按胆红素性质分类可分为_____和_____。

21. 腰背痛按其解剖部位分为_____,_____,_____四大类。

22. 关节痛的常见病因包括如下六类,即_____,_____,_____,_____,_____和_____。

23. 肉眼血尿是指_____;显微镜血尿是指_____。健康人运动后血尿称_____。

24. 正常成人白天排尿_____次,夜间_____次。生理性尿频见于_____,_____和_____。

25. 正常成人 24 小时尿量平均约为_____;若 24 小时尿量小于_____或每小时尿量小于_____称为少尿;若 24 小时尿量超过_____称为多尿。

26. 少尿和无尿按病因和发病机制分为_____,_____和_____三类。

27. 多尿伴神经症状见于_____;多尿伴烦渴、多饮见于_____;多尿伴多饮、多食及消瘦见于_____。

28. 排尿困难按病因和发生机制可分为_____和_____两大类。

29. 引起消瘦的内分泌代谢疾病常见于_____、_____、_____和_____。
30. 引起头痛的病因包括_____、_____、_____和_____。
31. 鼻窦炎的头痛常发生于清晨或_____，丛集性头痛常发生在_____。
32. 眩晕按病因和发生机制分为_____、_____、_____、_____和_____。
33. 眩晕伴恶性、呕吐见于_____、_____。
34. 晕厥按病因分类大致分为_____、_____、_____和_____四类。
35. 抽搐与惊厥的病因可分为_____、_____和_____。
36. 意识障碍可有不同程度的表现，临床包括_____、_____、_____、_____。
37. 昏迷按其程度可区分为_____、_____、_____三个阶段。
38. 意识障碍伴瘫痪见于_____、_____等。
39. 意识障碍伴高血压见于_____、_____、_____等。
40. 焦虑的临床表现可表现为_____、_____、_____。
41. 现病史问诊的内容包括_____、_____、_____、_____、_____、_____和_____。
42. 既往史包括患者既往的_____和过去曾经患过的_____、_____、外伤、_____、_____、_____史。

三、选择题

A 型题

1. 正常人体温可有波动，但 24 小时内波动幅度一般不超过的度数是 1.2
A. 0.5℃
B. 1℃
C. 1.5℃
D. 2℃
E. > 2℃
2. 下列关于正常人体温常有变异的说法，错误的是 1.3
A. 妇女排卵后体温较高
B. 妇女月经期体温较高
C. 运动后体温略高
D. 进食后体温略高
E. 老年人体温略低
3. 下列属产热过多引起发热的是 1.4
A. 细菌感染
B. 大面积烧伤
C. 风湿热
D. 甲状腺功能亢进症

E. 中暑

4. 通过血 - 脑脊液屏障直接作用于体温调节中枢引起发热的是 C
A. 病原体产生的外源性致热原
B. 病原体产生的内源性致热原
C. 白细胞产生的内源性致热原
D. 白细胞产生的外源性致热原
E. 白细胞及病原体产生的代谢产物
5. 不直接通过体温调节中枢，仅需内源性致热原发挥作用的是 C
A. 肿瘤坏死因子
B. 嗜酸性粒细胞
C. 病原微生物
D. 干扰素
E. 白介素 -1
6. 体温在 39℃ 以上，24 小时内波动 < 1℃，这种热型是 1.5
A. 弛张热
B. 稽留热
C. 间歇热

- D. 波状热
E. 不规则热
7. 下列疾病中出现间歇热的是 **C**
A. 布氏杆菌病
B. 霍奇金淋巴瘤
C. 疟疾
D. 结核病
E. 斑疹伤寒
8. 下列发热性疾病中, 最常伴寒战的是
A. 结核病
B. 风湿热
C. 猩红热
D. 败血症
E. 布氏杆菌病
9. 下列疾病中出现回归热的是 **B**
A. 急性肾盂肾炎
B. 霍奇金淋巴瘤
C. 疟疾
D. 结核病
E. 斑疹伤寒
10. 关于皮肤黏膜紫癜的直径 (mm), 正确的是 **B**
A. 1 ~ 2
B. 3 ~ 5
C. 6 ~ 7
D. 8 ~ 9
E. ≥ 10
11. 下列出血最常由血管壁异常引起的是 **D**
A. 眼底出血
B. 软组织血肿
C. 肌肉出血
D. 皮肤瘀斑
E. 关节腔出血
12. 下列疾病中, 紫癜高出皮面伴痒感的是 **B**
A. 单纯性紫癜
B. 过敏性紫癜
C. 老年性紫癜
D. 血小板减少性紫癜
E. 机械性紫癜
13. 四肢对称性紫癜伴有关节痛、腹痛、血尿的是 **D**
A. 血栓性血小板减少性紫癜
B. 药物免疫性血小板减少性紫癜
C. 特发性血小板减少性紫癜
D. 过敏性紫癜
E. 血小板无力症
14. 下列属于非凹陷性水肿的是 **E**
A. 心源性水肿
B. 肾源性水肿
C. 肝源性水肿
D. 特发性水肿
E. 黏液性水肿
15. 下列各项中, 不属于肝源性水肿发生机制的是 **B**
A. 门静脉压力增高
B. 组织液胶体渗透压增高
C. 肝淋巴液生成增多
D. 血浆胶体渗透压降低
E. 钠与水潴留
16. 心力衰竭患者水肿通常首先出现的部位是 **D**
A. 眼睑
B. 双手
C. 颜面
D. 身体最低部位
E. 腹部
17. 下列不属于产生水肿的因素是 **D**
A. 钠与水潴留
B. 毛细血管通透性增加
C. 毛细血管滤过压升高
D. 血浆胶体渗透压升高
E. 淋巴回流受阻
18. 水肿这一症状的概念不包括 **A**
A. 肺水肿
B. 腹水
C. 胸腔积液
D. 心包积液
E. 象皮肿

19. 下列不属于全身性水肿的是 C
- 肝源性水肿
 - 营养不良性水肿
 - 乳腺癌根治术后的上肢水肿
 - 药物性水肿
 - 妊娠水肿
20. 下列不属于右心衰竭致心源性水肿时的体征是 D
- 双下肢水肿
 - 肝大
 - 颈静脉怒张
 - 双肺底对称性湿啰音
 - 肝颈静脉回流征阳性
21. 下列无助于肾源性水肿与心源性水肿鉴别的是 E
- 水肿开始部位
 - 水肿发展快慢
 - 水肿的伴随症状
 - 水肿的伴随体征
 - 水肿严重程度
22. 有关水肿病人既往史的问诊, 下列意义最小的是 C
- 心脏病史
 - 肝病史
 - 肺病史
 - 肾病史
 - 过敏性疾病史
23. 咯血是指咳出血液的部位为
- 全呼吸道
 - 咽部以下呼吸道
 - 喉部以下的呼吸道
 - 隆突以下的支气管
 - 肺部出血
24. 大咯血的定义为日咯血量大于的毫升数是
- 100
 - 200
 - 300
 - 500
 - 1000
25. 在我国, 引起咯血的首要病因是
- 慢性支气管炎
 - 肺癌
 - 肺结核
 - 肺栓塞
 - 血管炎
26. 肾衰竭患者咯血最常见的情况是
- 支气管扩张
 - 肺癌
 - 肺结核
 - 原发性肺动脉高压
 - Goodpasture 综合征
27. 有关咯血和呕血的鉴别, 下列不正确的是
- 咯血不会出现黑便
 - 呕血常为咖啡色
 - 出血常混有痰液见于咯血
 - 咯血的 pH 为碱性
 - 呕血前往往有恶心
28. 咯血患者抗 GBM 抗体阳性见于的疾病是
- 系统性红斑狼疮
 - Goodpasture 综合征
 - 原发性小血管炎
 - Behcet 病
 - 特发性肺含铁血黄素沉着症
29. 咯血患者 ANCA 阳性常见的情况是
- 支气管扩张
 - Goodpasture 综合征
 - 原发性小血管炎
 - Behcet 病
 - 特发性肺含铁血黄素沉着症
30. 下列胸部 X 线片有空洞的疾病中, 不会出现咯血的是
- 肺结核
 - 肺癌
 - 肺炎
 - 特发性肺含铁血黄素沉着症
 - Wegener 肉芽肿
31. 大咯血患者突然出现面色青紫、烦

- 躁、出冷汗，其原因最可能是
- A. 精神紧张
 - ☒ B. 窒息
 - C. 合并脑血管意外
 - D. 低血糖
 - E. 合并感染
32. 因支气管静脉曲张破裂所致咯血最常见的情况是
- A. 肺结核
 - B. 肺脓肿
 - C. 肺栓塞
 - ☒ D. 二尖瓣狭窄
 - E. Wegener 肉芽肿
33. 可以引起咳粉红色泡沫样痰的疾病是 急性肺水肿
- ☒ A. 急性左心衰竭
 - B. 支气管扩张
 - C. 慢性支气管炎
 - D. 支气管肺癌
 - E. 肺炎球菌肺炎
34. 呼吸浅快见于的情况是
- A. 哮喘
 - B. 急性左心衰竭
 - C. 服用镇静剂过量
 - D. 脑出血
 - ☒ E. 大量腹水
35. 下列情况中，不会出现深大呼吸的是
- ☒ A. 肺性脑病
 - B. 肾小管酸中毒
 - C. 酮症酸中毒
 - D. 癉症
 - E. 尿毒症
36. 慢性劳力性呼吸困难患者，肺功能检查示限制性通气功能障碍，最可能患的疾病是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 肺气肿
 - ☒ C. 严重胸膜肥厚
 - D. 原发性肺动脉高压
 - E. 哮喘
37. 见到端坐呼吸的情况是
- A. 酮症酸中毒
 - ☒ B. 急性左心衰竭
 - C. 肺栓塞
 - D. 重症肺炎
 - E. 一侧大量胸腔积液
38. 深大呼吸产生的原因是
- ☒ A. 代谢性酸中毒
 - B. 代谢性碱中毒
 - C. 呼吸性酸中毒
 - D. 呼吸性碱中毒
 - E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
39. 最常见到叹息样呼吸的情况是
- A. 癉症
 - B. 贫血
 - ☒ C. 抑郁症
 - D. 镇静剂过量
 - E. 有机磷中毒
40. 下述疾病中，不表现为劳力性呼吸困难的是
- A. 贫血
 - B. 肺气肿
 - C. 慢性充血性心力衰竭
 - D. 肺间质纤维化
 - ☒ E. 癉症
41. 慢性充血性心力衰竭最早出现的症状是
- A. 端坐呼吸
 - B. 咳粉红色泡沫痰
 - ☒ C. 夜间阵发性呼吸困难
 - D. 下肢水肿
 - E. 颈静脉怒张
42. 下列体征中，不支持哮喘急性发作的是
- A. 双肺呼吸音显著减弱
 - B. 双肺叩诊过清音
 - C. 奇脉
 - ☒ D. 奔马律

- E. 颈静脉怒张
43. 呼吸困难患者胸部X线片出现Kerley B线的是
- A. 肺间质纤维化
 - B. 急性左心衰
 - C. 慢性充血性心力衰竭
 - D. ARDS
 - E. 气胸
44. 下列情况中会出现三凹征的是
- A. 结节性甲状腺肿
 - B. 肺癌纵隔转移致一侧声带麻痹
 - C. 右下叶背段支气管内膜结核
 - D. 气管隆突圆柱状瘤
 - E. 假性球麻痹
45. 下列呼吸困难类型中, 最可能是由左心功能衰竭所致的是
- A. 劳力性呼吸困难
 - B. 吸气性呼吸困难
 - C. 呼气性呼吸困难
 - D. 混合性呼吸困难
 - E. 夜间阵发性呼吸困难
46. 下列症状或体征中, 不属于哮喘急性发作特点的是
- A. 双肺满布哮鸣音
 - B. 双肺呼吸音减弱
 - C. 不能平卧
 - D. 双肺大量湿啰音
 - E. 奇脉
47. 下列疾病中出现干咳较少的是
- A. 哮喘
 - B. 结核性胸膜炎
 - C. 支原体肺炎
 - D. 支气管扩张
 - E. 支气管肺癌
48. 咳大量脓性痰的病因是
- A. 支气管扩张
 - B. 支原体肺炎
 - C. 充血性心力衰竭
 - D. 慢性支气管炎
 - E. 肺泡癌
49. 晨起咳嗽、咳痰加重见于的疾病是
- A. 浸润性肺结核
 - B. 肺淤血
 - C. 气胸
 - D. 慢性支气管炎
 - E. 支气管肺癌
50. 夜间咳嗽明显的疾病是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 支气管扩张
 - C. 肺癌
 - D. 肺脓肿
 - E. 二尖瓣狭窄
51. 引起大量泡沫样痰的疾病是
- A. 肺脓肿
 - B. 肺泡癌
 - C. 充血性心力衰竭
 - D. 慢性支气管炎
 - E. 空洞性肺结核
52. 引起粉红色泡沫样痰的疾病是
- A. 肺栓塞
 - B. 支气管肺癌
 - C. 肺含铁血黄素沉着症
 - D. 急性左心衰竭
 - E. 支气管扩张
53. 咳出痰有恶臭味的疾病是
- A. 空洞性肺结核
 - B. 肺囊肿继发感染
 - C. 吸入性肺炎
 - D. 大肠埃希菌肺炎
 - E. 厌氧菌所致肺脓肿
54. 下述药物中易引起顽固性干咳的是
- A. 呋塞米(速尿)
 - B. 洋地黄
 - C. ACEI类药物
 - D. 硝苯地平
 - E. 阿替洛尔
55. 剧烈咳嗽后出现左侧前胸部疼痛, 局部胸壁压痛(+), 可能出现该情况的是
- A. 心绞痛

- B. 支气管胸膜瘘
C. 气胸
D. 肋骨骨折
E. 食管破裂
56. 分布于小气道内的咳嗽感受器是
A. 机械感受器
B. 化学感受器
C. 神经感受器
D. 压力感受器
E. 其他感受器
57. 分布于大气道的咳嗽感受器最可能的是
A. 压力感受器
B. 化学感受器
C. 机械感受器
D. 其他感受器
E. 神经感受器
58. 刺激性干咳患者查体发现三凹征, 最可能的原因是
A. 支气管内膜结核
B. 异物吸入
C. 周围性肺癌
D. 肿瘤转移所致一侧喉返神经麻痹
E. 支气管囊肿
59. 有关心绞痛和心血管神经官能症所致胸痛的鉴别, 最首先做的是
A. ECG
B. 询问病史
C. UCG
D. 冠脉造影
E. 运动试验
60. 最常见胸痛随深呼吸而加重的情况是
A. 心肌梗死
B. 带状疱疹
C. 胸膜炎
D. 肺栓塞
E. 肺癌
61. 胸壁疾病和胸膜疾病的主要区别是
A. 局部有无压痛
B. 咳嗽时胸痛是否加重
C. 有无发热
D. 有无呼吸困难
E. 胸痛有无放射
62. 下列不属于心绞痛表现特点的是
A. 好发于胸骨后
B. 呈针刺样胸痛
C. 可以放射至腹部
D. 发作多与劳力有关
E. 舌下含服硝酸甘油后 3 分钟内缓解
63. 引起左肩部疼痛的病因是
A. 左上叶肺炎
B. 左舌叶肺炎
C. 左下叶肺炎
D. 心包炎
E. 胰腺炎
64. 引起胸痛后双上肢血压差别悬殊的情况是
A. 心肌梗死
B. 主动脉夹层
C. 心包炎
D. 大动脉炎
E. 心肌炎
65. 左侧前胸部疼痛与咳嗽无关的情况是
A. 左侧肋骨骨折
B. 左侧胸膜炎
C. 左侧气胸
D. 心绞痛
E. 左肺癌胸膜转移
66. 有关发绀的叙述, 正确的是
A. 常见于重度贫血患者
B. SaO_2 常常小于 85%
C. 血清还原血红蛋白浓度必须大于 50g/L
D. 通过吸氧均可缓解
E. 可见于 CO 中毒
67. 引起肠源性发绀的病因是

- A. 有机磷中毒
B. 酒精中毒
C. 亚硝酸盐中毒
D. 大肠埃希菌毒素吸收
E. 内毒素休克
68. 发绀患者肺部听诊有爆裂音的疾病是
A. 肺炎
B. 慢性充血性心力衰竭
C. 矽肺
D. 特发性肺间质纤维化
E. ARDS
69. 肠源性发绀的特点是
A. 病情进展缓慢
B. 和肠毒素吸收有关
C. 氧疗后症状迅速改善
D. 使用亚甲蓝可以使发绀消退
E. 静脉血放置于空气中很快转变为鲜红色
70. 由于先天性心脏病所致的异常通道出现发绀时, 分流量至少应大于的比例是
A. 1/10
B. 1/5
C. 1/4
D. 1/3
E. 1/2
71. 口唇无发绀, 而四肢末梢出现发绀见于的疾病是 周围性发绀
A. 慢性支气管炎
B. 右心衰竭
C. 左心衰竭
D. 肠源性发绀
E. 高铁血红蛋白血症
72. 静脉血经异常通道进入体循环动脉血中所致发绀常见的病因是 D
A. 肺炎
B. 右心衰竭
C. 严重休克
D. 法洛四联症
E. 阻塞性肺气肿
73. 下列属于病理性心悸病因的是
A. 剧烈运动
B. 大量饮酒
C. 大量饮咖啡
D. 心脏瓣膜病
E. 应用肾上腺素
74. 下列不属于心脏搏动增强引起心悸的是
A. 阵发性室上性心动过速
B. 脚气病性心脏病
C. 动脉导管未闭
D. 室间隔缺损
E. 风湿性心脏瓣膜病
75. 关于心悸病人的体格检查, 下列意义最小的是
A. 脉率和脉律
B. 血压
C. 甲状腺
D. 心脏
E. 脾
76. 下列疾病引起的呕吐中, 不属于反射性呕吐的是
A. 尿毒症
B. 消化性溃疡
C. 肠梗阻
D. 肝炎
E. 急性腹膜炎
77. 下列情况引起的呕吐中, 不属于中枢性呕吐的是
A. 脑膜炎
B. 急性胆囊炎
C. 高血压脑病
D. 糖尿病酮中毒
E. 药物吗啡
78. 下列属于神经性呕吐的是
A. 脑炎致呕吐
B. 青光眼致呕吐
C. 胃肠神经症致呕吐
D. 急性阑尾炎致呕吐

- E. 腹型过敏性紫癜致呕吐
79. 晚上或夜间呕吐见于的疾病是
- A. 幽门梗阻
B. 早期妊娠
C. 尿毒症
D. 神经性呕吐
E. 鼻窦炎
80. 餐后即刻呕吐见于的情况是
- A. 颅内高压
B. 神经性呕吐
C. 幽门梗阻
D. 慢性酒精中毒
E. 功能性消化不良
81. 引起喷射性呕吐的病因是
- A. 消化性溃疡
B. 尿毒症
C. 颅内高压
D. 肠梗阻
E. 急性腹膜炎
82. 下列部位出血中, 不属于上消化道出血的是
- A. 食管
B. 肝、胆
C. 胃
D. 回肠
E. 十二指肠
83. 上消化道出血最常见的病因是
- A. 食管或胃底静脉曲张破裂
B. 急性胃黏膜病变
C. 胃癌
D. 血友病
E. 消化性溃疡
84. 消化道出血病人的粪便性状, 与下列因素关系最小的是
- A. 出血的病因
B. 出血的部位
C. 出血的量
D. 出血的速度
E. 血液在消化道内停留的时间
85. 便血鲜红不与粪便混合, 仅黏附于粪便表面见于的疾病是
- A. 急性细菌性痢疾
B. 直肠癌
C. 阿米巴痢疾
D. 结肠息肉
E. 肠伤寒
86. 成人出现粪便隐血阳性时, 消化道出血量至少大于
- A. 10ml
B. 9ml
C. 8ml
D. 6ml
E. 5ml
87. 出现黑便时, 消化道出血量至少应超过
- A. 10ml
B. 30ml
C. 50ml
D. 80ml
E. 100ml
88. 下列引起慢性腹痛的疾病是
- A. 肠梗阻
B. 胆道蛔虫症
C. 异位妊娠破裂
D. 胃、十二指肠溃疡
E. 门静脉血栓形成
89. 下列属于内脏性腹痛特点的是
- A. 腹痛程度剧烈而持续
B. 可有局部腹肌强直
C. 腹痛可因咳嗽、体位变化而加重
D. 常不伴恶心、呕吐、出汗等自主神经兴奋症状
E. 腹痛部位不确切, 接近腹中线
90. 不出现餐后腹痛的疾病是
- A. 十二指肠溃疡
B. 胆囊疾病
C. 胰腺疾病
D. 胃部肿瘤
E. 消化不良
91. 腹痛于躯体前屈时明显, 而直立位