



国家护士(师)资格考试



直通车系列

2018

护理学(护师)考试 考点难点解析

主编 贺静 辛颖

- ▶ **高含金量** 高频考点全覆盖, 含历年真题
- ▶ **高针对性** 常见考点难点深度剖析
- ▶ **高附加值** 附赠3套押题卷, 网络试题免费试做
- ▶ **高含金量+高针对性+高附加值=高通过率**

中国医药科技出版社

国家护士(师)资格考试直通车系列

2018

护理学(护师)考试 考点难点解析

主编 贺 静 辛 颖
编者 巩 莹 田 娟 曹 阳
张 婷 沈星星 赵 剑
刘 杰 田 峰 门 彤
潘 盼 韩 燕 梁轶群
组织 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为国家护士(师)资格考试直通车系列图书之一,全书共6章,分别为内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、基础护理学和医疗机构从业人员行为规范与医学伦理学。书后有综合复习测试练习。各章的习题紧扣考试大纲,包含常考知识点、重点、难点等,除个别题目外,都有详细的解析、全面的考点分析、答题思路和方法,以帮助考生尽快理解、掌握知识点,并能做到举一反三,使考生在做题过程中查漏补缺、巩固知识。

图书在版编目(CIP)数据

2018 护理学(护师)考试考点难点解析 / 贺静, 辛颖主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2017. 7

国家护士(师)资格考试直通车系列

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9277 - 6

I. ①2… II. ①贺… ②辛… III. ①护理学 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. ①R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 087005 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889 × 1194mm $1/_{16}$

印张 16 $1/_{4}$

字数 410 千字

版次 2017 年 7 月第 1 版

印次 2017 年 7 月第 1 次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9277 - 6

定价 36.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



前 言

护理学（护师）考试是为贯彻原人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自2001年正式开始实行。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，是单位聘任相应技术职务的必要依据。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，我们特组织有关专业教师编写了《2018 护理学（护师）考试考点难点解析》。本书严格按照实际考试的题型分布进行编写，能有效地帮助考生进行考前自测，考查和反馈复习成果，对考生应试有较强的针对性和指导性。本书依托考试大纲、历年常考知识点、重点和难点进行选题，并对试题进行详细的解析，全面地分析考点，指出答题思路和方法，以帮助考生尽快理解、掌握知识点和能做到举一反三。特别是本书包含了部分历年真题中的重点、难点试题，供考生参考复习。

《2018 护理学（护师）考试考点难点解析》全书的亮点：

1. 专业的编写委员会。编写成员均是在高校任职的一线教师兼在医院任职，对护理学（护师、主管护师）专业技术资格考试有着十多年的教学、培训经验。特别感谢西安交通大学医学院附属红会医院及广西科技大学等单位参与编写本书的各位老师。

2. 试题的含金量高。本书紧扣考试大纲，精选历年常考知识点、重点、难点。书中还包含历年真题、冲刺试题。

3. 解析全面详细、举一反三。

4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

预祝各位考生，搭乘本“直通车”，顺利通过考试。

编 者
2017年3月

目 录

第一章 内科护理学	1
第二章 外科护理学	51
第三章 妇产科护理学	105
第四章 儿科护理学	134
第五章 基础护理学	163
第六章 医疗机构从业人员行为规范与医学伦理学	202
测试练习	213

第一章 内科护理学

一、A1/A2 型题

1. 扁桃体超过咽腭弓, 但不超过咽后壁中线, 应为
- A. 扁桃体高度肿大
 - B. 扁桃体 I 度肿大
 - C. 扁桃体 II 度肿大
 - D. 扁桃体 III 度肿大
 - E. 扁桃体中度肿大
2. 紫癜与充血性皮疹最主要的区别是
- A. 指压是否褪色
 - B. 是否高出皮肤
 - C. 直径大小
 - D. 血小板是否减少
 - E. 凝血时间是否正常
3. 下列情况中, 可引起气管向患侧移位的是
- A. 胸腔积液
 - B. 肺不张
 - C. 气胸
 - D. 纵隔肿瘤
 - E. 肺气肿
4. 下列各种叩诊音只有在异常情况下才会出现的为
- A. 清音
 - B. 实音
 - C. 浊音
 - D. 过清音
 - E. 鼓音
5. 正常人肩胛间区的叩诊音是
- A. 清音
 - B. 浊音
 - C. 实音
 - D. 鼓音
 - E. 过清音
6. 在严重创伤或感染时, 最易受损的器官是
- A. 肾
 - B. 肝
 - C. 脑
 - D. 肺
 - E. 心
7. 病人男, 80 岁。平素体健, 社区医生为其查

体测量血压结果为 140/60mmHg, 心率 59 次/分, 律齐, 心尖部偶可闻及第三心音, 呼吸 18 次/分。请问该检查结果中哪项的病理意义最大

- A. 呼吸频率加快
 - B. 收缩压升高
 - C. 出现异常心音
 - D. 心率低于正常
 - E. 脉压增大
8. 病人, 近 1 周来感乏力、食欲不振、巩膜黄染, 医嘱要求查碱性磷酸酶, 应何时取血
- A. 饭前
 - B. 饭后 2 小时
 - C. 即刻
 - D. 睡前
 - E. 晨起空腹时
9. 病人, 几日来大便次数增加, 每日 10 次左右, 便中带血及黏液, 呈果酱样, 疑阿米巴痢疾, 需取便标本, 留取的标本应置于
- A. 无菌蜡纸盒
 - B. 培养管
 - C. 加盖的便盆
 - D. 加温的容器
 - E. 普通便盆
10. 病人, 1 周前行胃大部切除术, 术后持续高热不退, 痰多, 黄色黏稠, 不易咳出, 双肺底满布湿啰音, 疑肺炎, 需做作痰培养。以下叙述不正确的是
- A. 应用朵贝尔液及清水漱口后留取
 - B. 嘱病人做深呼吸后用力咳痰
 - C. 应准备广口的无菌培养瓶
 - D. 应即刻留取痰标本
 - E. 应立即送检
11. 病人, 高热 5 天, 可疑败血症, 医嘱做血培养, 其目的是
- A. 查血中白细胞数量
 - B. 查血中红细胞数量
 - C. 测氨基转移酶活性

- D. 查心肌酶活性
E. 寻找致病菌
12. 前胸壁计数肋骨的重要体表标志是
A. 胸骨上窝 B. 胸骨角
C. 胸骨柄 D. 剑突
E. 胸骨下角
13. 左心室增大时, 其心尖冲动的位置
A. 向左移位 B. 向右移位
C. 向左下移位 D. 向左上移位
E. 向下移位
14. 产生第一心音的主要机制是
A. 主动脉瓣、肺动脉瓣关闭
B. 主动脉瓣、肺动脉瓣开放
C. 二尖瓣、三尖瓣关闭
D. 二尖瓣、三尖瓣开放
E. 心房、心室肌收缩
15. 腹部反跳痛发生的机制是
A. 肠腔胀气及炎症
B. 内脏肿大及淤血
C. 肝、胰肿瘤有淋巴结转移
D. 壁层腹膜受炎症累及
E. 胆总管结石
16. 下列腹腔脏器, 正常情况下不能被触及的是
A. 肝脏 B. 脾脏
C. 肾脏 D. 膀胱
E. 横结肠
17. 关于慢性支气管炎的描述, 哪项错误
A. 指气管、支气管黏膜的慢性感染性炎症
B. 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
C. 常并发阻塞性肺气肿
D. 吸烟是其主要病因
E. 临床可分为单纯型、喘息型
18. 刺激性呛咳或带金属音的咳嗽应首先考虑
A. 上呼吸道感染 B. 肺部病变早期
C. 左心功能不全 D. 支气管扩张
E. 支气管肺癌
19. 病人血气分析 PaO_2 小于 60mmHg , PaCO_2 大于 50mmHg 时宜选用的氧流量为
A. 持续低流量 B. 持续高流量
C. 间断低流量 D. 乙醇湿化高流量
E. 高压氧
20. 正常肠鸣音为每分钟
A. 2次以下 B. 4~5次
C. 6~8次 D. 8次以上
E. 10次以上
21. 门静脉梗阻时, 腹壁静脉的血流方向正确的是
A. 脐水平以上向下, 脐水平以下向上
B. 均向上
C. 脐水平以上向上, 脐水平以下向下
D. 均向下
E. 无规律
22. 肝逐渐肿大, 质地坚硬如石, 有结节, 最常见于
A. 肝淤血 B. 慢性肝炎
C. 肝癌 D. 脂肪肝
E. 急性肝炎
23. 病理反射为
A. 刺激皮肤黏膜引起的反射
B. 刺激骨骼肌腱引起的反射
C. 椎体束受损的表现
D. 脑膜受到激惹后的表现
E. 椎体束亢进的表现
24. 下列关于静脉采血的叙述, 错误的是
A. 应根据采血的目的不同选择不同的时间采血
B. 止血带压迫时间过长会影响测定结果
C. 建议使用真空采血器
D. 需空腹采血时, 应尽可能延长空腹的时间
E. 不能从输液的血管采血
25. 关于气胸的处理, 哪项是错误的
A. 气胸量小于 20% , 症状轻微, 不需排气
B. 如肺萎缩时间长, 宜用高负压排气
C. 交通性气胸应行胸腔闭式引流
D. 血气胸可作低位胸腔插管引流
E. 复发性气胸可用四环素注入胸腔造成粘连
26. 关于结核菌素试验结果的描述下列正确的是

- A. 凡是结核菌素试验阴性都可以除外结核
 B. 卡介苗接种成功, 结核菌素反应多呈阳性
 C. 重症肺结核的结核菌素反应为阳性
 D. 结核菌素试验阳性, 肯定有结核病
 E. 初次感染结核后 4 周内, 结核菌素试验阳性
27. 肺炎链球菌肺炎的铁锈色痰的最主要原因
 A. 痰里有大量红细胞
 B. 痰里混有大量肺泡巨噬细胞
 C. 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
 D. 红细胞破坏后释放含铁血黄素
 E. 痰里有大量浆液
28. 下列实验室检查指标中, 最能反映贫血程度的是
 A. 红细胞计数
 B. 血细胞比容
 C. 红细胞沉降率
 D. 网织红细胞计数
 E. 血红蛋白定量
29. 下列关于正常尿液的描述错误的是
 A. 尿比重在 1.015 ~ 1.025
 B. 为弱酸性
 C. 尿液透明
 D. 24 小时尿量大于 2500ml
 E. 呈淡黄色至黄色
30. 肺癌病人进行纤维支气管镜检查后不能立即喝水, 是为了防止
 A. 呕吐
 B. 喷嚏
 C. 呃逆
 D. 误吸
 E. 咳嗽
31. 正常人昼夜尿最高比重与最低比重之差不少于
 A. 0.010
 B. 0.008
 C. 0.006
 D. 0.007
 E. 0.009
32. 护士在病人粪便隐血试验前, 不用特意嘱咐病人避免服用的是
 A. 铁剂
 B. 动物血
 C. 肝
 D. 豆制品
 E. 大量绿叶蔬菜
33. 肝细胞病变时, 下列血清蛋白增加的是
 A. 白蛋白
 B. α_2 -球蛋白
 C. α_1 -球蛋白
 D. β -球蛋白
 E. γ -球蛋白
34. 高钾血症是指血钾浓度超过
 A. 3.5mmol/L
 B. 4.5mmol/L
 C. 5mmol/L
 D. 5.5mmol/L
 E. 7mmol/L
35. 下列有关荧光透视检查的描述, 错误的是
 A. 一般需在暗室内进行
 B. 可观察器官的运动
 C. 清晰度较 X 线摄影好
 D. 不适宜对密度和厚度差别小的器官进行检查
 E. 无客观记录, 不利于病变前后的比较
36. 关于肺炎链球菌肺炎的临床表现, 下列哪项是错误的
 A. 最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、咳痰与胸痛
 B. 咳痰呈红棕色胶冻状
 C. 可出现呕吐、腹痛、腹泻
 D. 严重者可出现昏迷
 E. 可出现发绀与口周疱疹
37. 慢性呼吸衰竭缺氧的典型表现是
 A. 呼吸频率变慢
 B. 三凹征
 C. 发绀
 D. 头痛
 E. 肺性脑病
38. 最常见的成人肺结核是
 A. 原发型肺结核
 B. 血行播散型肺结核
 C. 浸润型肺结核
 D. 慢性纤维空洞型肺结核
 E. 结核性胸膜炎
39. 肺结核大咯血最主要的致死原因是
 A. 失血性休克
 B. 重度贫血
 C. 窒息
 D. 心力衰竭
 E. 呼吸衰竭
40. 为预防肺结核的发生和流行, 在下列措施中最为关键的一环是
 A. 自出生后开始定期接种卡介苗

- B. 隔离排菌的结核病人
C. 合理化疗, 治愈排菌病人
D. 加强营养、锻炼身体、增强抵抗力
E. 为易感者及与排菌病人密切接触的人预防性用药
41. II型呼吸衰竭病人的主要诱因是
A. 过度劳累 B. 精神紧张
C. 呼吸道感染 D. 营养不良
E. 长期吸烟
42. 治疗上呼吸道感染的措施, 下列哪项不妥
A. 适当休息
B. 体温超过 39℃ 时物理降温
C. 呼吸道隔离, 防止交叉感染
D. 多饮水
E. 常规应用抗生素治疗
43. 肺结核病人痰结核菌检查由阳性转为阴性表示
A. 痊愈
B. 不必休息
C. 病变静止
D. 不必进行呼吸道隔离
E. 可停用抗结核药物
44. 下列关于排痰的措施, 不妥的是
A. 多饮水以利于痰液稀释
B. 痰多且无力咳痰者应以祛痰为主
C. 咳嗽反射减弱或消失的病人应给予机械吸痰
D. 为了增加病人的耐受能力, 体位引流应在餐后半小时内进行
E. 勤翻身拍背可促进排痰
45. 确定给氧方法和浓度的首要指标是
A. 发绀的轻重
B. 呼吸困难的程度
C. 神志状态
D. 病情和血气检查
E. 肺功能检查结果
46. 进行腹式呼吸锻炼时, 下列动作中应予以纠正的是
A. 吸气时腹部用力挺出
B. 呼气时腹部尽力收缩
C. 深吸快呼
D. 鼻吸口呼
E. 深吸慢呼
47. 左心衰竭可能的症状不包括
A. 夜间阵发性呼吸困难
B. 心悸
C. 劳累性呼吸困难
D. 严重者可发生端坐呼吸
E. 心前区疼痛
48. 急性心肌梗死发生心室颤动的先兆是
A. 室性期前收缩频发成对多源
B. 室上性阵发性心动过速
C. 房性期前收缩
D. 二度房室传导阻滞
E. 心房纤颤
49. 急性肺水肿病人使用地高辛主要用于
A. 扩张冠脉 B. 排钾利尿
C. 减慢心率 D. 增强心脏搏动
E. 纠正心律失常
50. 急性心肌梗死病人, 除下列哪种心律失常外, 均需立即报告医生, 紧急处理
A. 室性期前收缩呈 R-on-T 现象
B. 多源性室性期前收缩
C. 频发室性期前收缩
D. 房性期前收缩
E. 心室颤动
51. 治疗心室颤动最有效的措施是
A. 同步直流电复律
B. 胸外心脏按压
C. 心脏内注射肾上腺素
D. 静脉注射利多卡因
E. 非同步电击复律
52. 不符合心源性水肿的是
A. 水肿从眼睑开始
B. 水肿呈凹陷性
C. 体循环淤血导致水肿
D. 水肿部位易发生溃烂
E. 摄入钠盐过多可加重水肿
53. 下列保持气道通畅的护理措施错误的是
A. 指导病人有效咳嗽

- B. 湿化气道
 C. 嘱病人控制饮水量 $< 1000\text{ml/d}$, 以减少痰液的生成
 D. 痰液黏稠者, 给予雾化吸入
 E. 长期卧床病人定时翻身、拍背
54. 诊断慢性阻塞性肺气肿下列哪项检查最有意义
- A. X线检查
 B. 血气分析
 C. 结核菌素试验
 D. 肺功能测定
 E. 肺部CT
55. β_2 受体激动剂首选的给药方式为
- A. 口服 B. 吸入
 C. 肌内注射 D. 静脉滴入
 E. 直肠给药
56. 下列抗结核药属于抑菌药的是
- A. 异烟肼 B. 吡嗪酰胺
 C. 乙胺丁醇 D. 链霉素
 E. 利福平
57. 肺源性心脏病主要的死亡原因是
- A. 心力衰竭 B. 心律失常
 C. 肝功能衰竭 D. 肺性脑病
 E. 感染性休克
58. 急性心肌梗死24小时内禁用
- A. β 受体阻滞剂 B. 钙拮抗剂
 C. 硝酸酯制剂 D. 洋地黄制剂
 E. 镇痛
59. 1999年世界卫生组织规定血压分级标准, 其中1级高血压标准为
- A. 收缩压 $140 \sim 159\text{mmHg}$, 舒张压 $90 \sim 99\text{mmHg}$
 B. 收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$, 舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$
 C. 绝大多数病人高血压病因不明
 D. 血压升高是某些疾病的表现之一
 E. 收缩压 $160 \sim 179\text{mmHg}$, 舒张压 $100 \sim 110\text{mmHg}$
60. 高血压病人降压时, 出现头晕、眼花、眩晕应该
- A. 增加降压药剂量 B. 撤换降压药
 C. 给予镇静剂 D. 立即平卧
 E. 调整生活节奏
61. 不会引起心悸发生的因素是
- A. 大量饮酒 B. 低血糖反应
 C. 大量输液 D. 应用阿托品
 E. 高热
62. 下列引起心力衰竭的病因中属于心脏容量负荷过重的因素是
- A. 心肌梗死
 B. 二尖瓣关闭不全
 C. 糖尿病心脏病
 D. 主动脉瓣狭窄
 E. 肺动脉高压
63. 有关左心衰竭的描述, 下列哪项不正确
- A. 病理生理改变为肺循环淤血
 B. 最早出现的是端坐呼吸
 C. 咳嗽、咳痰呈白色泡沫样
 D. 如发生急性肺水肿则咳大量粉红色泡沫痰
 E. 最典型的表现是阵发性夜间呼吸困难
64. 在急性心力衰竭治疗中可以同时减轻心脏前、后负荷的药物是
- A. 氨苯蝶啶 B. 硝酸甘油
 C. 哌唑嗪 D. 硝普钠
 E. 酚妥拉明
65. 洋地黄类药物较严重的不良反应是
- A. 胃肠道反应
 B. 呼吸系统反应
 C. 心血管系统反应
 D. 泌尿系统反应
 E. 神经系统反应
66. 病人男, 65岁。高血压17年, 突发头痛、视物模糊、失语, 测血压 $210/130\text{mmHg}$ 。下列降压药物应首先选择
- A. 卡托普利 B. 呋塞米
 C. 硝普钠 D. 维拉帕米
 E. 普萘洛尔
67. 病人女, 65岁。因慢性心力衰竭入院, 给予利尿、强心治疗。护士在给予病人强心药物地高辛时, 下列哪种情况不可以给药
- A. 病人血压 $150/90\text{mmHg}$

- B. 病人存在心房颤动
 - C. 病人存在便秘
 - D. 病人存在呼吸困难
 - E. 病人心率 56 次/分
68. 病人女，30 岁。护士发现其突然意识丧失伴抽搐，呼吸断续，瞳孔散大，大小便失禁。病人可能
- A. 生物学死亡
 - B. 脑死亡
 - C. 心脏骤停
 - D. 终末事件
 - E. 临床死亡
69. 护士对于使用排钾利尿剂病人的护理措施不妥的是
- A. 服药期间监测血钾
 - B. 可补充含钾高的食物
 - C. 口服补充钾盐应在饭前服用
 - D. 静脉补钾每 500ml 液体中氯化钾不宜超过 1.5g
 - E. 利尿剂应用时间以早晨和日间为宜
70. 进行电复律治疗时，护士操作配合不妥的是
- A. 使病人仰卧于绝缘床上
 - B. 撤去心电监护仪
 - C. 电极板均匀涂抹导电糊
 - D. 电极板紧贴病人皮肤
 - E. 除颤前医护人员远离床单位
71. 病人男，60 岁。因突发心前区疼痛，疼痛难忍，并伴有胸闷憋气，来医院就诊，病人既往有糖尿病史 5 年、胃溃疡 10 年。经检查医生诊断为前间壁心肌梗死，特征性心电图变化出现在
- A. $V_1 \sim V_4$ 导联
 - B. $V_1 \sim V_6$ 导联
 - C. $V_3 \sim V_5$ 导联
 - D. V_6 、I、aVL 导联
 - E. $V_1 \sim V_6$ 及 I、aVL 导联
72. 风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄最常出现的早期症状是
- A. 夜间阵发性呼吸困难
 - B. 劳力性呼吸困难
 - C. 急性肺水肿
 - D. 双下肢水肿

- E. 肝区疼痛
73. 风湿性心脏病长期卧床的心力衰竭病人，当下肢静脉血栓形成时，如血栓脱落可导致的栓塞部位是
- A. 肾栓塞
 - B. 脑栓塞
 - C. 肺栓塞
 - D. 脾动脉栓塞
 - E. 下肢动脉栓塞
74. 心绞痛胸痛发作持续时间一般不超过
- A. 3 分钟
 - B. 5 分钟
 - C. 10 分钟
 - D. 15 分钟
 - E. 30 分钟
75. 下列关于心绞痛的描述不准确的是
- A. 胸痛持续时间多在 1~5 分钟内
 - B. 胸痛一般持续不超过 15 分钟
 - C. 休息或含服硝酸甘油后几分钟内缓解
 - D. 常由体力劳动或情绪激动诱发
 - E. 发作时暂时性血压降低
76. 下列与原发高血压发病相关的因素中，不包括
- A. 遗传因素
 - B. 自身免疫缺陷
 - C. 精神过度紧张
 - D. 体重超重
 - E. 摄入钠盐较多
77. 十二指肠球部溃疡的疼痛规律为
- A. 无一定规律
 - B. 疼痛 - 进食 - 缓解
 - C. 进食 - 疼痛 - 无缓解
 - D. 进食 - 疼痛 - 缓解
 - E. 疼痛 - 进食 - 疼痛
78. 三（四）腔气囊管压迫止血适用于
- A. 食管静脉曲张破裂出血
 - B. 急性出血性糜烂性胃炎出血
 - C. 胃癌并出血
 - D. 胆道出血
 - E. 消化性溃疡并发出血
79. 判断上消化道出血继续或再出血，下列哪项不对
- A. 反复呕血
 - B. 黑便次数增加伴肠鸣音亢进
 - C. 血红蛋白测定与红细胞计数继续下降

- D. 网织红细胞计数持续下降
E. 血压继续下降

80. 肝硬化所致消化道出血, 抢救出血性休克的措施中, 下列哪项是错误的

- A. 迅速建立静脉通道
B. 烦躁者给予吗啡或巴比妥类药物
C. 积极补充血容量
D. 保持呼吸道通畅
E. 严密监测生命体征的变化

81. 除了哪项均明确表明上消化道大出血尚未停止

- A. 黑便次数增多伴肠鸣音亢进
B. 网织红细胞计数持续增高
C. 黑便由糊状变为成形略带黄色
D. 呕吐物由咖啡色转为鲜红色
E. 血尿素氮恢复正常后又升高

82. 慢性胃炎的预防原则下列哪项不妥

- A. 戒烟戒酒
B. 长期服用抑制胃酸分泌的药物
C. 彻底治疗幽门螺杆菌
D. 避免服用刺激性药物和食物
E. 进食要有规律

83. 主细胞可分泌

- A. 促胃液素
B. 胃酸
C. 胃蛋白酶原
D. 胃蛋白酶
E. 碱性黏液

84. 胃壁分为黏膜层、黏膜下层、肌层、浆膜层4层, 其中黏膜层主要由下列哪几种细胞组成

- A. 主细胞
B. 壁细胞
C. 黏液细胞
D. B细胞
E. 主细胞、壁细胞和黏液细胞

85. 消化系统疾病最常见的症状和体征包括

- A. 呕血及黑便
B. 腹痛
C. 腹泻
D. 黄疸、恶心、呕吐
E. 以上都是

86. 上消化道出血的特征性表现是

- A. 氮质血症
B. 发热
C. 失血性周围循环衰竭

D. 呕血与黑便

E. 意识模糊

87. 自身免疫性胃炎病人出现恶性贫血是由于血中有抗内因子抗体存在而影响

- A. 维生素C的吸收
B. 维生素C的降解
C. 维生素B₁₂的吸收
D. 维生素B₁₂的降解
E. 维生素K的吸收

88. 下列哪项不是急性胃炎的病因

- A. 药物
B. 暴饮暴食
C. 细菌毒素
D. 急性应激
E. 自身免疫反应

89. 消化性溃疡的发生与何种病原菌感染有关

- A. 链球菌
B. 肺炎球菌
C. 幽门螺杆菌
D. 金黄色葡萄球菌
E. 大肠埃希菌

90. 消化性溃疡的主要症状是

- A. 上腹痛
B. 恶心、呕吐
C. 营养不良
D. 贫血
E. 便血

91. 雷尼替丁抑制胃酸分泌的作用机制是

- A. 与溃疡面结合形成保护屏障
B. 抑制壁细胞分泌H⁺, K⁺-ATP酶
C. 与盐酸作用形成盐和水
D. 通过选择性竞争结合H₂受体, 使壁细胞分泌胃酸减少
E. 可刺激局部内源性前列腺素的合成

92. 下列哪一项是十二指肠溃疡的主要病因

- A. 幽门螺杆菌感染
B. 胃酸分泌过多
C. 应激和心理因素
D. 遗传因素
E. 吸烟

93. 对消化性溃疡有确诊价值的是

- A. X线钡餐检查
B. 胃镜检查
C. 胃液分析
D. 粪便隐血检查
E. 幽门螺杆菌检查

94. 奥美拉唑抑制胃酸分泌的作用机制是

- A. 与溃疡面结合形成保护屏障
B. 使壁细胞的H⁺, K⁺-ATP酶失活

- C. 与盐酸作用形成盐和水
D. 通过选择性竞争结合 H_2 受体, 使壁细胞分泌胃酸减少
E. 可刺激局部内源性前列腺素的合成
95. 溃疡性结肠炎所致腹泻特点为
A. 大便多呈糊状, 混有黏液、脓血, 里急后重常见
B. 大便多呈糊状, 质稀薄, 色鲜红不伴里急后重感
C. 大便不成形, 柏油样便
D. 米泔水样便, 伴里急后重
E. 白陶土样便, 不伴里急后重
96. 溃疡性结肠炎病人最常见的护理问题是
A. 体液不足 B. 知识缺乏
C. 焦虑 D. 腹泻
E. 有皮肤完整性受损的危险
97. 肝硬化病人腹水顽固持续不退, 可采用的较好的治疗方法为
A. 应用利尿剂
B. 甘露醇导泻
C. 腹腔穿刺放腹水
D. 定期输新鲜血
E. 腹水浓缩回输
98. 晚期肝硬化发生酸碱平衡紊乱中最常见的是
A. 呼吸性碱中毒 B. 代谢性碱中毒
C. 代谢性酸中毒 D. 呼吸性酸中毒
E. 呼吸性碱中毒、代谢性酸中毒
99. 与蜘蛛痣形成有关的因素是
A. 血小板减少
B. 血中雌激素增加
C. 毛细血管脆性增加
D. 凝血机制障碍
E. 严重感染
100. 急性胰腺炎病人血液淀粉酶开始升高的时间是
A. 1~3 小时 B. 6~12 小时
C. 24~36 小时 D. 36~48 小时
E. 3~5 天
101. 不符合门静脉高压病理改变的是
A. 脾大 B. 脾功能亢进
C. 消化道器官淤血 D. 腹水形成
E. 中心静脉压高
102. 在急性胰腺炎的发病因素中, 哪项最常见
A. 感染 B. 腹部外伤
C. 胰管梗阻 D. 胆石症和胆道疾病
E. 暴饮暴食
103. 急性胰腺炎最重要的治疗措施是
A. 解痉止痛 B. 抗休克治疗
C. 抑制胰腺分泌 D. 抗菌治疗
E. 使用胰蛋白酶抑制剂
104. 血氨升高是肝性脑病的发病机制之一, 氨吸收的主要部位在
A. 胃 B. 十二指肠
C. 小肠 D. 结肠
E. 直肠
105. 单纯水肿型胰腺炎, 不应有的表现是
A. 腹痛 B. 腹胀
C. 休克 D. 呕吐
E. 发热
106. 上消化道大量出血是指数小时内失血量超过
A. 400ml B. 500ml
C. 800ml D. 1000ml
E. 1500ml
107. 上消化道出血病因诊断的首选检查措施为
A. X 线钡餐造影检查
B. 选择性动脉造影
C. 内镜检查
D. 化验检查
E. 吞线试验
108. 下面有关食管胃底静脉曲张破裂出血病人的饮食护理不妥的是
A. 出血期间应禁食
B. 止血后即可渐进高热量、高蛋白饮食
C. 避免粗糙、坚硬食物
D. 避免刺激性食物
E. 应细嚼慢咽

109. 呕吐严重且呕吐量大的是
- A. 胃炎 B. 幽门梗阻
C. 胃溃疡 D. 胆石症
E. 肝炎
110. 下列不符合急性出血坏死型胰腺炎表现的是
- A. 出现腹膜刺激征 B. 持续剧烈腹痛
C. 突然休克或昏迷 D. 发热持续不退
E. 年老体弱者腹痛更明显
111. 急性胰腺炎最基本的治疗方法是
- A. 解痉止痛 B. 使用抗生素
C. 抗休克治疗 D. 禁食及胃肠减压
E. 使用糖皮质激素
112. 诊断急性胰腺炎时, 血清淀粉酶至少应超过
- A. 300U/dl B. 200U/dl
C. 600U/dl D. 500U/dl
E. 150U/dl
113. 结核性腹膜炎最常见的并发症是
- A. 肠痿 B. 下消化道出血
C. 急性胃穿孔 D. 肠梗阻
E. 腹腔脓肿
114. 对进行胃镜检查的病人下列哪项护理措施不正确
- A. 检查前禁食 12 小时
B. 检查前半小时给予阿托品皮下注射
C. 检查前协助病人摘除义齿
D. 检查后无须禁食, 可进少量流食
E. 告诉病人检查后出现的咽部不适会自行消失
115. 肾脏结构和功能的基本单位是
- A. 肾小体 B. 肾小管
C. 肾单位 D. 髓祥
E. 集合管
116. 下列哪些激素不是由肾脏分泌的
- A. 肾素
B. 血管紧张素
C. 前列腺素
D. 促红细胞生成因子
E. 1, 25 - 二羟骨化醇
117. 下列关于肾性高血压的发生机制描述不妥的是
- A. 按发生机制分为容量依赖型高血压和肾素依赖型高血压
B. 容量依赖型高血压是由水钠潴留导致血容量增加引起
C. 肾素依赖型高血压是由于肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统被激活引起
D. 肾性高血压绝大多数是肾素依赖型
E. 限制水钠摄入或增加水钠排泄可改善容量依赖型高血压
118. 引起肾病综合征的各种疾病中, 下列哪项属于原发性肾病综合征
- A. 糖尿病肾病 B. 过敏性紫癜肾
C. 慢性肾炎 D. 狼疮性肾炎
E. 肾淀粉样变
119. 不符合肾病综合征诊断标准的是
- A. 大量蛋白尿 (>3.5g/d)
B. 高脂血症
C. 高血压
D. 水肿
E. 低蛋白血症
120. 应用环磷酰胺治疗慢性肾小球肾炎, 应特别注意
- A. 胃肠道反应 B. 血压升高
C. 继发感染 D. 出血性膀胱炎
E. 低血钾
121. 对轻度氮质血症的慢性肾炎病人的护理措施不当的是
- A. 蛋白质的摄入量每日每千克体重 0.6 ~ 0.8g, 其中 60% 以上为高生物效价蛋白质
B. 保证每日供给充足热量
C. 盐的摄入量为每天 1 ~ 3g, 同时补充多种维生素
D. 避免病人发生感染
E. 每日尿量 < 1000ml 者不用限制水的摄入
122. 急性肾盂肾炎病人取中段尿进行细菌培养, 有诊断意义的是
- A. 细菌数大于 10^2 /ml
B. 细菌数大于 10^4 /ml

- C. 细菌数大于 $10^5/\text{ml}$
- D. 细菌数小于 $10^5/\text{ml}$
- E. 细菌数 $10^2 \sim 10^5/\text{ml}$

123. 关于肾盂肾炎治疗错误的是

- A. 应用磺胺、氨基糖苷类抗生素需碱化尿液
- B. 应用喹喏类抗生素需酸化尿液
- C. 选用敏感药物
- D. 应用解痉药物, 减轻排尿不适
- E. 药物应用至症状消失, 尿检阴性后停药

124. 下列关于蛋白尿的描述不妥的是

- A. 每日尿蛋白量持续超过 150mg 称为蛋白尿
- B. 每日尿蛋白量大于 2.5g 为大量蛋白尿
- C. 生理性蛋白尿一般持续时间较短
- D. 有蛋白尿时, 排出的尿液表面有细小泡沫, 且不易消失
- E. 生理性蛋白尿是由于运动、体位变化、发热、寒冷等因素引起, 去除诱因后蛋白尿在短期内消失

125. 白细胞尿是指新鲜尿离心沉渣后每高倍镜视野白细胞数

- A. 0~3 个
- B. 超过 3 个
- C. 超过 5 个
- D. 超过 8 个
- E. 超过 10 个

126. 慢性肾小球肾炎发病的起始因素为

- A. 急性肾小球肾炎迁延不愈所致
- B. 细菌感染所致
- C. 病毒感染导致
- D. 免疫介导炎症
- E. 遗传因素

127. 慢性肾炎病人 24 小时尿蛋白量多为

- A. 大于 $150\text{mg}/\text{d}$
- B. 小于 $1\text{g}/\text{d}$
- C. 小于 $1.5\text{g}/\text{d}$
- D. $1 \sim 3\text{g}/\text{d}$
- E. 大于 $3.5\text{g}/\text{d}$

128. 下列哪项不是诱发慢性肾炎肾功能恶化的因素

- A. 感染
- B. 超负荷的蛋白饮食
- C. 肾毒性药物的使用
- D. 长期应用抗血小板药物
- E. 劳累

129. 病人男, 40 岁。既往有肾小球肾炎史, 因病情稳定上班工作。近日在体检时发现血压升高, 来医院复查, 证实为慢性肾小球肾炎急性发作, 为迅速而有效地缓解症状, 下列哪项措施最佳

- A. 卧床休息
- B. 低糖饮食
- C. 利尿降压
- D. 激素疗法
- E. 中医疗法

130. 病人女, 32 岁。因双侧腰背酸痛, 尿频, 尿急, 尿痛 7 天就诊。T 39.5°C , 双肾叩击痛(++), 尿检: 蛋白(+), 脓细胞(+++), 红细胞(+), 诊断为急性肾盂肾炎, 下列哪项不是其护理诊断

- A. 体温过高
- B. 排尿异常
- C. 焦虑
- D. 知识缺乏
- E. 预感性悲哀

131. 病人女, 25 岁。尿毒症病人, 近日每天晨间出现恶心、呕吐, 护士应如何指导病人

- A. 睡前勿进食, 勿饮水
- B. 睡前食少许点心
- C. 睡前饮水 1~2 次
- D. 晨间饮水 1~2 次
- E. 起床前先服止吐剂

132. 下列属于原发性肾病综合征的是

- A. 糖尿病肾病
- B. 过敏性紫癜肾炎
- C. 狼疮性肾炎
- D. 慢性肾炎
- E. 肾淀粉样变

133. 肾盂肾炎病人尿路感染最常见的致病菌为

- A. 葡萄球菌
- B. 变形杆菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 副大肠埃希菌
- E. 粪链球菌

134. 下列关于急性肾盂肾炎的护理措施中不妥的是

- A. 进食清淡富有营养的食物, 补充多种维生素
- B. 多饮水, 每天饮水量超过 2000ml
- C. 体温过高时宜进行物理降温
- D. 采用平卧位卧床休息可以减轻疼痛
- E. 心理护理以减轻病人紧张、焦虑情绪

135. 下列慢性肾衰竭临床表现中, 哪项为最早、最突出的表现

- A. 高血压

- B. 心力衰竭
C. 贫血
D. 胃肠道症状如食欲不振、恶心、呕吐等
E. 出血倾向
136. 下列由慢性肾衰竭引起的肾性骨病中, 最常见的是
A. 肾性骨软化症
B. 纤维囊性骨炎
C. 骨质疏松症
D. 肾性骨硬化症
E. 无菌性股骨头坏死
137. 大部分急性白血病施行骨髓移植的最佳时机是
A. 发作最严重时 B. 第一次完全缓解时
C. 联合化疗的同时 D. 第二次完全缓解时
E. 进行化疗之前
138. 关于慢性粒细胞白血病的叙述, 错误的是
A. 大多由急性转化而来
B. 慢性粒细胞白血病急变大多预后不良
C. 慢性粒细胞白血病急变用原药化疗无效
D. 国内以慢性粒细胞白血病最多见
E. 以中年发病多见
139. 慢性粒细胞白血病最有特征性的体征是
A. 胸骨压痛 B. 浅表淋巴结肿大
C. 巨脾 D. 皮肤紫癜
E. 贫血貌
140. 血液透析病人最常见的并发症是
A. 出血 B. 致热源反应
C. 低血压 D. 失衡综合征
E. 过敏反应
141. 下列关于腹膜透析病人发生腹膜炎时的处理措施中不当的是
A. 用透析液 1000ml 连续冲洗 3~5 次
B. 暂时改作间断腹膜透析 (IPD)
C. 腹膜透析液内加抗生素
D. 全身应用抗生素
E. 若抗感染 2~4 周后仍不能控制, 及时更换强效抗生素
142. 关于血友病, 下列说法错误的是
A. 血友病 A 和 B 都是 X 染色体隐性遗传
B. 多自幼即有轻微损伤后出血倾向
C. 反复关节腔出血不会遗留后遗症
D. 主要表现为软组织、肌肉和负重关节出血
E. 出血症状出现越早病情越重
143. 下列有关血细胞功能的叙述中不妥的是
A. 成熟红细胞可结合和输送氧气
B. 功能正常的血小板是止血的重要基础
C. 淋巴细胞经过胸腺作用后称为 T 淋巴细胞
D. B 淋巴细胞主要参与细胞免疫
E. 功能正常的中性粒细胞是人的主要防御机制之一
144. 贫血的定义是指单位容积的外周血液中
A. 循环血容量低于正常下限
B. 红细胞数和血红蛋白量低于正常
C. 红细胞数和血细胞比容低于正常
D. 红细胞数和网织红细胞数低于正常
E. 红细胞数、血红蛋白量和 (或) 血细胞比容低于正常
145. 脑血栓形成的临床表现特点不包括
A. 常在情绪激动、活动过度、用力排便时发生
B. 可有头痛、眩晕、肢体麻木等先兆
C. 多发生于有动脉硬化、糖尿病、高脂血症的中老年人
D. 常表现出各种类型的偏瘫
E. 可无意识障碍
146. 下列哪种癫痫类型应该用药物尽快制止发作
A. 简单的部分性发作
B. 单纯失神发作
C. 强直阵挛发作
D. 癫痫持续状态
E. 复杂部分性发作
147. 下面哪项是诊断癫痫的重要检查手段
A. 神经系统体格检查
B. 脑电图检查
C. 脑血管造影
D. CT
E. 脑脊液检查
148. 弥散性血管内凝血 (DIC) 最常见的病

因是

- A. 肿瘤性疾病 B. 感染性疾病
C. 广泛性手术 D. 产科疾病
E. 烧伤

149. DIC 典型的临床表现不包括

- A. 全身瘀斑 B. 淋巴结肿大、肝脾大
C. 休克 D. 巩膜黄染
E. 肺栓塞

150. DIC 的首要治疗措施是

- A. 肝素抗凝
B. 输浓缩血小板
C. 去除诱因, 治疗原发病
D. 补充凝血因子
E. 抗纤溶治疗

151. 治疗慢性型特发性血小板减少性紫癜的首选方案为

- A. 输新鲜血小板 B. X 线脾区照射
C. 使用止血药 D. 使用糖皮质激素
E. 做脾切除

152. 急性白血病感染的主要原因是

- A. 组织浸润 B. 成熟粒细胞减少
C. 白细胞增高 D. 血小板减少
E. 正常红细胞生成减少

153. 急性白血病病人需要实行保护性隔离的是

- A. 化疗期间 B. 发热的时候
C. 骨髓象增生活跃 D. 白细胞 $< 1 \times 10^9/L$
E. 肝脾、淋巴结大

154. 确诊甲状腺功能亢进的实验室检查是

- A. 三酰甘油(甘油三酯)增高
B. 三碘甲状腺原氨酸增高
C. β_1 -微球蛋白增高
D. 磷酸肌酸激酶减少
E. 丙氨酸氨基转移酶减少

155. 根据血红蛋白下降程度, 中度贫血是指

- A. $Hb < 150g/L$
B. 男性 $Hb < 120g/L$, 女性 $Hb < 110g/L$
C. $Hb < 90g/L$
D. $Hb < 60g/L$
E. $Hb < 30g/L$

156. 病人血小板低于下列哪个值时, 护士应警惕发生颅内出血

- A. $100 \times 10^9/L$ B. $80 \times 10^9/L$
C. $60 \times 10^9/L$ D. $40 \times 10^9/L$
E. $20 \times 10^9/L$

157. 对腰椎穿刺术病人护理不正确的是

- A. 术中密切观察病人的生命体征
B. 术后即可扶病人于床边活动
C. 有颅内压增高表现者, 不宜多饮水
D. 密切观察脑疝先兆
E. 采集标本及时送检

158. 下列脑血栓形成急性期的护理措施, 哪项不妥

- A. 按危重病期护理
B. 平卧位, 头偏向一侧
C. 保持安静, 避免搬动
D. 注意保暖
E. 头部冷敷

159. 一侧脑神经下运动神经元瘫痪, 及对侧肢体上运动神经元瘫痪, 称为

- A. 偏瘫 B. 四肢瘫
C. 单瘫 D. 交叉瘫
E. 截瘫

160. 甲状腺功能减退症的最常见原因是

- A. 原发性甲状腺功能减退症
B. 手术
C. 垂体肿瘤
D. 放射
E. 下丘脑病变

161. 甲状腺功能减退的药物护理中服用甲状腺激素不正确的是

- A. 从小剂量开始
B. 用药前后测脉搏
C. 不可随意增减或停药
D. 定时测体重
E. 直接从生理剂量开始

162. 甲状腺功能减退症的临床表现不包括

- A. 疲乏 B. 怕冷、反应迟钝
C. 记忆力减退 D. 精神兴奋
E. 月经不调