

2018年

国家护士执业资格考试权威推荐用书

护士执业资格考试 押题密卷

(第3版)

主编 尹安春

中国医药科技出版社



— 扫我 —
让考试变得简单

2016年国家护士执业资格考试权威推荐用书

护士执业资格考试押题密卷

(第3版)

- | | | |
|-----|-----|--------------|
| 主 编 | 尹安春 | |
| 编 者 | 尹安春 | 大连医科大学附属第一医院 |
| | 郭慧芳 | 大连医科大学附属第一医院 |
| | 贾立红 | 大连医科大学附属第一医院 |
| | 张淑萍 | 北京市第六医院 |
| | 纪楠 | 北京市第六医院 |
| | 彭丽丽 | 中日友好医院 |
| | 陈雪 | 北京妇产医院 |
| | 马方方 | 中国人民解放军空军总医院 |
| | 邵菱玲 | 中国人民解放军空军总医院 |
| | 张颖 | 朝阳市第二医院 |
| | 高秀宏 | 朝阳市中心医院 |
| | 张楠 | 大连市万卷图书馆 |
| | 修士会 | 朝阳市中心医院 |
| | 王克勤 | 朝阳市第二医院 |
| | 王淑艳 | 朝阳市第二医院 |

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书结合 2018 年考试大纲,精选六套全真押题密卷,每套试卷分为专业实务和实践能力两部分,全面把握考试趋势,精准预测考题,真正达到提升解题能力、夺取高分的目的。让您一书在手,考试无忧。

本书作为国家护士执业资格考试教材的配套教辅,除供参加考试的人员使用外,还可供专科、本科护理学专业,全日制和成人教育的学生在临床教学、实习教学环节使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

护士执业资格考试押题密卷/尹安春主编. —3 版. —北京:中国医药科技出版社, 2017. 8

2018 年国家护士执业资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9440 - 4

I. ①护… II. ①尹… III. ①护士 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R192.6 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 180871 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm ¹/₁₆

印张 9 ³/₄

字数 196 千字

初版 2016 年 1 月第 1 版

版次 2017 年 8 月第 3 版

印次 2017 年 8 月第 1 次印刷

印刷 北京九天众诚印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9440 - 4

定价 24.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

国家护士执业资格考试实行全国统一组织、统一大纲、统一试题、统一评分标准。该考试由国家卫生和计划生育委员会（简称：卫生计生委）具体组织实施，地、市以上卫生行政部门的医政部门承担本地区的考试实施工作。考试合格者，将获得国家卫生计生委颁发的《中华人民共和国护士执业证书》。该证书在全国范围内有效。考生需要凭此证书向卫生行政部门申请执业注册，可以说是护理专业从业人员必备证书之一，无论是各专业从事教学工作的教师，还是处于学习中的学生，在实际的教学及学习过程中，都迫切需要实用性强、有针对性、能够突出考试重点和难点的考题，以方便考生练习、检测知识点的掌握情况。

本书是经过深入研究考试规律，紧扣 2018 年考纲和考点，适应考生复习习惯而编写出的适合考生应试需要的、实用的考试用书。建议与《护士执业资格考试 10 日通关特训》《护士执业资格考试高频考点随身记》配合使用。为了广大考生能够随学随练，本书配套手机端免费在线答题试卷。微信添加公众号“医药卫生答题榜”即可参与。

本书涉及内容广泛，虽经全体编者反复修改，但由于水平和能力有限，难免有不妥之处，恳请广大读者多提宝贵意见。

编 者
2017 年 6 月

目 录

押题密卷一	1	押题密卷五	98
专业实务	1	专业实务	98
实践能力	13	实践能力	109
押题密卷二	26	押题密卷六	122
专业实务	26	专业实务	122
实践能力	37	实践能力	134
押题密卷三	50	押题密卷一参考答案	146
专业实务	50	押题密卷二参考答案	147
实践能力	61	押题密卷三参考答案	148
押题密卷四	74	押题密卷四参考答案	149
专业实务	74	押题密卷五参考答案	150
实践能力	85	押题密卷六参考答案	151

押题密卷一

专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 人体的热能营养素是 ()。
 - A. 糖类、维生素、矿物质
 - B. 糖类、脂肪、蛋白质
 - C. 脂肪、糖类、维生素
 - D. 蛋白质、脂肪、维生素
 - E. 蛋白质、糖类、微量元素
2. 正常女性颈管黏膜被覆的上皮为 ()。
 - A. 单层高柱状上皮
 - B. 复层立方上皮
 - C. 复层鳞状上皮
 - D. 单层鳞状上皮
 - E. 复层柱状上皮
3. 护士巡视病房时，发现患者输液不滴，注射部位肿胀，患者主诉疼痛，无回血。该护士为此患者应采取的措施为 ()。
 - A. 热敷注射部位下端血管，按摩肿胀部位
 - B. 用力挤压输液管，直至液体通畅
 - C. 检查滴管各接头部位是否松动，上端输液管和滴管内有无漏气或裂隙
 - D. 拔出针头，另选血管更换针头重新穿刺
 - E. 调整针头位置或适当变换肢体位置
4. 无菌盘在未污染的情况下可使用 ()。
 - A. 1 小时
 - B. 4 小时

- C. 8 小时
 - D. 12 小时
 - E. 24 小时
5. 婴幼儿上呼吸道感染并易发中耳炎的原因是 ()。
 - A. 缺乏免疫球蛋白
 - B. 咽鼓管短、宽、粗，呈水平位
 - C. 鼻窦口相对较大
 - D. 咽部狭窄、垂直
 - E. 扁桃体炎症扩散
 6. 低钾性碱中毒最可能出现于 ()。
 - A. 尿毒症
 - B. 胃手术后
 - C. 大量输血
 - D. 术后少尿
 - E. 严重创伤
 7. 有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是 ()。
 - A. 青霉素
 - B. 小檗碱
 - C. 制霉菌素
 - D. 蒙脱石散
 - E. 双歧杆菌
 8. 毛细支气管炎的主要临床特点为 ()。
 - A. 呼吸困难、咳嗽
 - B. 咳嗽、发热、发绀
 - C. 喘息、三凹征和气促
 - D. 喘息、咳嗽、发热
 - E. 呼吸困难、咳嗽、发热
 9. 哮喘持续状态是指严重哮喘持续时间达 ()。
 - A. 6 小时
 - B. 10 小时
 - C. 12 小时
 - D. 24 小时
 - E. 48 小时

10. 系统性红斑狼疮患者最常用的治疗药物是 ()。
- A. 布洛芬 B. CTX
C. 阿司匹林 D. 硝苯地平
E. 泼尼松
11. 患者, 女性, 25 岁。右小腿有 $250\text{px} \times 125\text{px}$ 的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是 ()。
- A. 等渗氯化钠溶液
B. 0.02% 呋喃西林溶液
C. 0.1% 依沙吖啶溶液
D. 含氯石灰硼酸溶液
E. 5% 氯化钠溶液
12. 预防破伤风最可靠、最有效的方法是 ()。
- A. 应用肾上腺皮质激素
B. 应用青霉素
C. 彻底清除坏死组织和异物
D. 注射人体免疫球蛋白
E. 彻底清创和注射 TAT
13. 护士为患者分发口服药后将一次性药杯收回, 正确的处理方法是 ()。
- A. 直接丢弃 B. 消毒后销毁
C. 清洗后销毁 D. 消毒后备用
E. 清洗后备用
14. 患者, 女性, 33 岁。患有抑郁症, 有严重睡眠紊乱, 护士观察到患者睡眠的特点是 ()。
- A. 易醒 B. 早醒
C. 时醒时睡 D. 睡眠过度
E. 入睡困难
15. 患者, 男性, 68 岁。昏迷, 用热水袋时要求水温不超过 50°C , 其原因是 ()。
- A. 加深患者昏迷程度
B. 皮肤抵抗力下降
C. 血管对热反应过敏
D. 局部感觉迟钝
E. 机体对热敏感度增加
16. 对肝硬化食管-胃底静脉曲张破裂出血的患者, 为了防止肝性脑病应禁忌进行的操作是 ()。
- A. 肥皂水清洁灌肠
B. 乳果糖灌肠
C. 硫酸镁导泻
D. 生理盐水清洁灌肠
E. 少量输液
17. 颅内手术后, 剧烈转动头部可引起的并发症是 ()。
- A. 休克 B. 脑出血
C. 脑干损伤 D. 脑栓塞
E. 脑疝
18. 治疗小儿肺炎时, 抗生素的使用时间是体温正常后 ()。
- A. 2~3 天 B. 4~5 天
C. 5~7 天 D. 8~9 天
E. 10~12 天
19. 护士增进个人人际关系吸引力的要素, 不包括 ()。
- A. 敏锐的询问
B. 绝对地保密
C. 适度的同感心
D. 提供治疗性的环境
E. 无条件地关心患者, 给予温暖
20. 患儿, 女, 10 岁。剑突下突发阵发性“钻顶样”剧烈腹痛 3 小时, 呕出一条蛔虫, 患儿立即全身发抖, 双目紧闭, 面色苍白, 查体不配合。患儿的主要心理反应为 ()。
- A. 焦虑 B. 自卑
C. 孤独 D. 恐惧
E. 绝望
21. 属于传染病预防措施的是 ()。
- A. 计划免疫 B. 封锁疫区
C. 环境消毒 D. 限制集会

- E. 停工停课
22. 高热患者用冰袋降温的原理是 ()。
- A. 传导 B. 对流
C. 辐射 D. 蒸发
E. 蒸发加对流
23. 在护理评估的资料整理中, 以下属于客观资料的是 ()。
- A. 进食后感觉恶心
B. 体温 39.1°C
C. 经常便秘
D. 常有入睡困难
E. 持续腹痛 3 小时
24. 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是 ()。
- A. 头晕 B. 皮疹
C. 乏力 D. 便秘
E. 口干
25. 下列哪个疾病非乙类传染病 ()。
- A. 脊髓灰质炎
B. 传染性非典型肺炎
C. 艾滋病
D. 黑热病
E. 狂犬病
26. 糖尿病时尿量较多的机制是 ()。
- A. 肾脏浓缩功能下降
B. 渗透性利尿
C. 肾脏滤过率增高
D. 肾功能不全
E. 肾脏重吸收功能下降
27. 利尿剂降低血压的主要作用机制是 ()。
- A. 阻断 α 受体 B. 阻断 β 受体
C. 减少血容量 D. 扩张小动脉
E. 阻滞钙通道
28. 患者, 女性, 10 岁。发热 4 天, 伴有咳嗽, 全腹疼痛。查体: 体温 $38 \sim 39^{\circ}\text{C}$, 右下肺有湿啰音, 全腹轻度腹胀, 腹肌紧张, 压痛, 反跳痛, 肠鸣音减弱。腹腔穿刺抽出无臭味脓汁。诊断为腹部感染合并原发性腹膜炎。该患儿腹腔脓液涂片镜检最有可能检出的致病菌是 ()。
- A. 溶血性链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 大肠埃希菌
D. 变形杆菌
E. 厌氧类杆菌
29. 截瘫患者足部用支架是为了 ()。
- A. 防止水肿 B. 患者舒适
C. 防止关节僵硬 D. 防止肌萎缩
E. 防止畸形
30. HIV 感染后对免疫系统造成损害, 主要的机制是损害哪类细胞 ()。
- A. 中性粒细胞
B. B 淋巴细胞
C. $\text{CD4}^{+}\text{T}$ 淋巴细胞
D. $\text{CD8}^{+}\text{T}$ 淋巴细胞
E. 自然杀伤 (NK) 细胞
31. 患儿, 4 岁半。护士为其洗脸时, 擦拭眼睛的方法是 ()。
- A. 由外眦向内眦来回擦
B. 由上眼睑向下眼睑方向擦拭
C. 由内眦向外眦擦拭
D. 由外眦向内眦或由内眦向外眦均可
E. 由外眦向内眦擦拭
32. 急性感染性喉炎患儿烦躁不安时最好选用 ()。
- A. 水合氯醛 B. 异丙嗪
C. 氯丙嗪 D. 地西洋
E. 苯巴比妥
33. 关于类风湿关节炎的相关描述, 说法不正确的是 ()。
- A. 类风湿因子为阳性, 伴有压痛, 反复发作
B. 是一种自身免疫性疾病

- C. 与环境、感染、遗传、性激素及精神状态等因素密切相关
D. 无关节外病变损害
E. 关节病变常呈对称性
34. 护士小王, 上午9点将患者的被褥放在天台上日光暴晒消毒, 她应该将被褥收回的时间是 ()。
A. 上午10点 B. 上午11点
C. 中午12点 D. 下午2点
E. 下午3点
35. 遇到灾难事故, 护理人员主动提出到救灾第一线去工作, 这体现护理人员 ()。
A. 良好的科学文化素质
B. 崇高的职业道德素质
C. 规范的实践操作能力
D. 扎实的专业理论知识
E. 具备评判性思维能力
36. 肝硬化合并上消化道出血最主要的原因是 ()。
A. 食管-胃底静脉曲张破裂
B. 凝血功能障碍
C. 胃溃疡活动性出血
D. 缺乏维生素K
E. 血小板减少
37. 取坐位测量血压时, 应使肱动脉 ()。
A. 平第2肋软骨, 与心脏在同一水平上
B. 平第3肋软骨, 与心脏在同一水平上
C. 平第4肋软骨, 与心脏在同一水平上
D. 平腋前线, 与心脏在同一水平上
E. 平腋后线, 与心脏在同一水平上
38. 新生儿败血症最常见的病原菌是 ()。
A. 拟杆菌 B. 厌氧菌
C. 白色念珠菌 D. 铜绿假单胞菌
E. 金黄色葡萄球菌
39. 治疗甲状腺功能减退症采用的甲状腺制剂替代法, 其目标是 ()。
A. 给最大剂量迅速纠正甲减症状
B. 以小剂量开始, 逐渐纠正甲减症状
C. 给最小剂量纠正甲状腺功能减退症, 不产生明显不良反应
D. 给药剂量以患者不产生不良反应为准
E. 给药剂量使血药浓度保持在较高水平上
40. 有关护士仪表的叙述, 不正确的是 ()。
A. 仪容清新素颜
B. 姿态应体现护士高傲的品质
C. 护士的步速快、步幅小而均匀
D. 护士的衣着应平整、简洁、大方
E. 可简单地化淡妆
41. 硫喷妥钠可以用于 ()。
A. 吸入麻醉 B. 分离麻醉
C. 局部麻醉 D. 椎管内麻醉
E. 静脉快速诱导
42. 根据胸内血量多少, 血胸可分为: 小量血胸、中等量血胸和大量血胸。其中大量血胸的胸内出血量为 ()。
A. >800ml B. >900ml
C. >1000ml D. >1200ml
E. >1500ml
43. 下列哪种方法能帮助深部脓肿的诊断 ()。
A. B超 B. 用针穿刺
C. X线检查 D. 细菌培养
E. 检查有无波动感
44. 做碘过敏试验的时间应在碘化物造影检查前 ()。
A. 2周 B. 1周
C. 3~5天 D. 2~3天
E. 1~2天
45. 对诊断心肌梗死特异性最高的酶是 ()。

- A. CK B. LDH
C. AFP D. AST
E. CK-MB
46. 以下属于护士义务的是 ()。
- A. 参与公共卫生和疾病预防控制
B. 对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议
C. 获得与本人业务能力和学术水平相应的专业技术职务、职称
D. 从事有感染传染病危险工作的护士, 应当接受职业健康监护
E. 按照国家有关规定获取工资报酬、享受福利待遇、参加社会保险
47. 患者, 男性, 60 岁。因“COPD 并发自发性气胸”入院。住院期间出现 $T38.5^{\circ}\text{C}$, 考虑合并细菌感染。最常见的致病菌是 ()。
- A. 葡萄球菌 B. 结核杆菌
C. 卡他莫拉菌 D. 肺炎链球菌
E. 流感嗜血杆菌
48. 短效口服避孕药用法正确的是 ()。
- A. 连服 1 个月不能间断
B. 自月经周期第 5 天起每晚 2 片
C. 自月经周期第 5 天起每晚 1 片
D. 自月经周期第 4 天起每晚 1 片
E. 若漏服 1 片于次晨补服 2 片
49. 某新生儿, 日龄 5 天, 出生体重 3kg, 目前体重 2.8kg, 妈妈很担心孩子的体重会继续下降, 护士向妈妈解释孩子的体重将恢复正常, 下列解释正确的是
- A. 1 天内恢复正常
B. 7 天内恢复正常
C. 10 天内恢复正常
D. 2 周内恢复正常
E. 3 周内恢复正常
50. 急性心肌梗死患者中 50% ~ 80% 患者病前有先兆, 其最常见表现为 ()。
- A. 自发性心绞痛
B. 稳定型心绞痛
C. 变异型心绞痛
D. 混合性心绞痛
E. 新发生心绞痛, 原有心绞痛加重
51. 急性淋巴管炎患者首选的抗生素是 ()。
- A. 庆大霉素 B. 青霉素
C. 头孢菌素 D. 卡那霉素
E. 氨苄西林
52. 患者, 男性, 35 岁。胃肠道术后第 1 天尚未排气, 但患者感觉饥饿要求进食, 护士首先应采取的措施是
- A. 直接拒绝患者请求
B. 询问患者想进食的食物
C. 告知其不能进食的原因
D. 告知可进食的食物种类
E. 直接将此情况报告医生
53. 护士在铺床时, 不符合节力原则的是 ()。
- A. 上身保持一定弯度
B. 按使用顺序放置用物
C. 铺床时尽量靠近床边
D. 备齐物品, 计划周全
E. 使用肘部力量, 动作平稳
54. 脑死亡的诊断标准不包括 ()。
- A. 自主呼吸停止
B. 脑电波消失
C. 瞳孔散大
D. 脑干反射消失
E. 不可逆的深度昏迷
55. 患者, 女性, 32 岁。因患子宫肌瘤入院。护士在采集病史时, 应重点追溯的内容是 ()。
- A. 月经史 B. 两便情况
C. 饮食习惯 D. 高血压家族史
E. 是否长期使用雌激素
56. 患者的 CVP 为 $4\text{cmH}_2\text{O}$, 血压 $69/$

- 49mmHg, 尿量每小时 11ml, 护士应该为患者采取的措施是 ()。
- A. 输血 B. 补充体液
C. 收缩血管 D. 改善微循环
E. 纠正酸中毒
57. 患者, 女性, 32 岁, 今晨在腰麻下行子宫肌瘤切除术, 术前护士为其插导尿管, 该护士向患者解释插导尿管的目的是 ()。
- A. 便于手术进行
B. 避免术中出现尿失禁
C. 避免术中误伤膀胱
D. 引出尿液, 以防术后尿潴留
E. 术后冲洗尿道, 以防感染
58. 某慢性呼吸衰竭痰多的患者, 在使用哪种药物后可能因为痰液黏稠度增加而使排痰困难加重 ()。
- A. 泼尼松 B. 沙丁胺醇
C. 呋塞米 D. 氨茶碱
E. 盐酸氨溴索
59. 单纯性机械性肠梗阻的临床特点是 ()。
- A. 持续性绞痛, 频繁呕吐
B. 持续性胀痛, 肠鸣音消失
C. 持续性剧痛, 腹胀不对称
D. 腹胀明显, 肛门停止排气
E. 阵发性腹痛伴肠鸣音亢进
60. 妊娠 6 个月以前胎心音听诊最清楚部位是 ()。
- A. 左上腹 B. 右上腹
C. 左下腹 D. 右下腹
E. 脐下正中线处
61. 医院的管理环境着重强调的是 ()。
- A. 医院的基本设施
B. 医院的建筑设计
C. 医院的规章制定
D. 医院的医疗技术水平
E. 医院的噪声污染
62. 患儿, 12 个月, 因腹泻、呕吐入院。诊断为重型婴儿腹泻, 补液 6 小时后排尿, 但出现精神萎靡、心音低钝、四肢无力、腹胀、肠鸣音减弱, 应考虑为 ()。
- A. 低血钙 B. 低血镁
C. 低血钠 D. 低血钾
E. 酸中毒
63. 患者, 女性, 47 岁。经常便后出血, 经检查为痔疮, 行痔疮手术。术后热水坐浴的目的是 ()。
- A. 保暖, 解痉 B. 消肿, 镇痛
C. 减少出血 D. 治疗炎症
E. 消毒伤口
64. 拟行胆总管结石切除术的某患者感到焦虑, 对于减轻焦虑最为合适的护理措施是 ()。
- A. 告知患者手术是常规治疗方法
B. 为患者提供其想知道的有关术后信息
C. 告知患者转移注意力以减轻焦虑
D. 强调术后遵从医嘱的重要性
E. 强调术前情绪稳定的重要性
65. 在护患关系发展的过程中, 护士在结束期的重点是 ()。
- A. 实施护理措施
B. 获取患者的相关信息
C. 评价护理目标实现的情况
D. 与患者建立信任关系
E. 确认患者的需要
66. 某护理部主任, 把工作分配给总护士长等管理人员, 对于例行性业务按照常规措施和标准执行, 她加以必要的监督和指导, 只有特殊情况时她来处理。她可集中精力研究及解决全局性管理问题, 也调动了下级的工作积极性。这种工作方式遵循的组织原则是 ()。
- A. 精于高效原则

- B. 执行与监督分设原则
C. 集权分权结合原则
D. 任务和目标一致的原则
E. 专业化分工与协作的原则
67. 丙型肝炎的主要传播途径是 ()。
A. 粪-口传播 B. 水传播
C. 食物传播 D. 血液传播
E. 媒介传播
68. 患者, 男性, 25 岁。留取 24 小时尿标本测尿肌酐, 护士应在尿液中加入的防腐剂是 ()。
A. 甲苯 B. 甲醛
C. 乙醛 D. 稀盐酸
E. 浓盐酸
69. 值班护士在听到呼叫器传来呼救: “××床的患者突然昏迷了”。此时护士去病室的行姿应为 ()。
A. 慢步走 B. 快步走
C. 跑步 D. 小跑步
E. 快速跑步
70. 患者, 男性, 36 岁, 输液后沿静脉走行出现条索状红线、肿胀、疼痛, 若用酒精热湿敷宜选用的浓度是 ()。
A. 10% B. 20%
C. 45% D. 75%
E. 95%
71. 患者, 男性, 56 岁, Ⅲ度烧伤面积大于 60%, 入院后的护理级别是 ()。
A. 重症护理 B. 特级护理
C. 一级护理 D. 二级护理
E. 三级护理
72. 患者, 女性, 35 岁。转移性右下腹痛 5 小时, 伴恶心、呕吐。查体: 体温 39℃, 精神萎靡, 腹硬, 麦氏点有固定压痛, 需急诊手术治疗。平车转送中不正确的操作是 ()。
A. 固定输液针头, 保证液体通畅
B. 患者头部卧于护士推车的一侧
C. 下坡时, 使患者头部位于坡下防止坠车
D. 上坡时, 护士应位于坡下防止平车下滑
E. 进入手术间时护士在前, 用身体顶开房门
73. 患者, 男性, 55 岁。肾盂肾炎 4 年, 今因腰痛、低热就诊。其中与发病密切相关的护理资料是 ()。
A. 年龄 B. 男性
C. 口服激素 D. 职业
E. 患有前列腺肥大症
74. 患者, 女性, 26 岁。月经增多 6 个月, 以缺铁性贫血收入院。最主要的治疗措施是 ()。
A. 病因治疗
B. 铁剂治疗
C. 止血药物治疗
D. 富铁食物饮食治疗
E. 输血输液, 补充血容量
75. “120” 接诊了一名车祸致昏迷的患者, 脑部 CT 提示颅内大量出血, 需立刻行开颅手术。患者无亲属陪伴, 也无证实其身份和联系人的信息, 依据《侵权责任法》的规定, 术前正确的做法是 ()。
A. 通知手术室准备手术
B. 报告派出所寻找家属
C. 报告科室负责人获批
D. 报告医院负责人获批
E. 报告卫生行政部门负责人获批
76. 下列药物过敏实验的皮试液浓度正确的是 ()。
A. 青霉素: 500U/0.1ml
B. 链霉素: 2500U/0.1ml
C. 普鲁卡因: 0.25mg/0.1ml
D. 细胞色素 C: 0.75mg/0.1ml

- E. 破伤风抗毒素: 150IU/0.1ml
77. 患儿, 胎龄 38 周, 出生体重 2900g, 身长 50cm, 皮肤红润, 胎毛少, 足纹明显, 此婴儿最可能是 ()。
- A. 早产儿 B. 足月儿
C. 过期产儿 D. 足月小样儿
E. 小于胎龄儿
78. 某医院预防保健科护士在执行流感疫苗接种操作前, 发现部分疫苗出现浑浊现象。护士应采取的措施是 ()。
- A. 停止接种, 通知疾控中心
B. 就地销毁, 记录经过
C. 先接种疫苗, 报卫计委处理
D. 先接种疫苗, 再报医院处理
E. 停止接种, 报告医院相关部门处理
79. 患者, 男性, 25 岁。在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。恰当的术后饮食护理是 ()。
- A. 术后应禁食 48 小时
B. 术后即进普通饮食
C. 术后应胃肠减压
D. 术后应静脉供给营养 3 天
E. 若术后 6 小时无恶心即可进流质饮食
80. 某三级甲等医院 ICU, 共有 10 张床位。按照国家卫生计生委对 ICU 护士与床位比的要求, 该科室配备的护士人数应不少于 ()。
- A. 10 名 B. 15 名
C. 20 名 D. 25 名
E. 30 名
81. 某孕妇产前检查时, 宫高为剑突下 2 指, 则该孕妇的妊娠周数大约为 ()。
- A. 满 24 周 B. 满 28 周
C. 满 32 周 D. 满 36 周
E. 满 40 周
82. 患者, 男, 50 岁, 因原发性肝癌入院, 其发病有可能与以下哪项肝病有关 ()。
- A. 乙型肝炎 B. 肝结核
C. 肝血管瘤 D. 肝囊肿
E. 肝脓肿
83. 患者, 男性, 55 岁。因“食欲不佳, 胃部不适”来门诊就诊。候诊时患者突然感到腹痛难忍, 头冒冷汗, 四肢冰冷, 呼吸急促。门诊护士应 ()。
- A. 协助患者平卧候诊
B. 安抚患者, 劝其耐心等待
C. 安排患者提前就诊
D. 给予患者镇痛剂缓解疼痛
E. 请医生加速诊治前面患者
84. 某患者胸部外伤后, 第 4~7 肋骨各有 2 处以上闭合性骨折, 无气胸体征, 其不会出现病理生理改变是 ()。
- A. 纵隔扑动
B. 回心血量下降
C. 反常呼吸运动
D. 胸膜腔负压消失
E. 缺氧、二氧化碳潴留
85. 患者, 男性, 65 岁。发现右腹股沟内侧包块 3 年余。3 天前腹股沟包块突然增大, 变硬, 不能还纳, 伴剧烈疼痛。8 小时前疼痛有所缓解, 但出现发热。患者最有可能出现了 ()。
- A. 易复性疝 B. 难复性疝
C. 嵌顿性疝 D. 绞窄性
E. 急性阑尾炎
86. 患者, 女性, 60 岁, 肝性脑病。近日出现烦躁, 有时神志不清, 静脉输液时有躁动。护士为患者使用约束带时, 要注意许多要点, 但除外 ()。
- A. 松紧合适
B. 局部置衬垫
C. 维护患者的自尊
D. 每 6 小时松解 1 次
E. 注意被约束肢体的皮肤颜色

87. 患者：“我每天都要喝一点酒。”护士：“请问您每天具体喝多少？”护士使用的沟通技巧是（ ）。
- A. 叙述 B. 重复
C. 澄清 D. 反映
E. 反馈
88. 患者，男性，48岁。脑外伤，在全麻下行颅内探查术。术后的床单位应是（ ）。
- A. 麻醉床，床中部和床上部各铺一橡胶单、中单
B. 暂空床，床中部和床上部各铺一橡胶单、中单
C. 暂空床，床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单
D. 麻醉床，床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单
E. 备用床，床中部和床上部各铺一橡胶单、中单
89. 患者，男，63岁，因心房颤动住院治疗，心率114次/分，心音强弱不等，心律不规则，脉搏细弱，且极不规则，此时护士准确观察脉搏与心率的方法是（ ）。
- A. 一人测心率，一人测脉率
B. 两人分别测脉率和心率，取两者平均值
C. 两人分别测脉率和心率，但应同时起、止
D. 先测脉率，同时观测呼吸频率，后测心率
E. 先测心率，同时观测呼吸频率，再测脉率
90. 患者，女，42岁。因车祸入院，吸氧时家属自行将氧流量调至10L/min，6小时后患者出现恶心、烦躁不安、面色苍白、干咳、胸痛、进行性呼吸困难。该患者最可能发生的情况是（ ）。
- A. 气胸 B. 肺气肿
C. 氧中毒 D. 肺水肿
E. 急性左心衰
91. 患者，女性，25岁，已婚，有原发性痛经史，1年内无生育计划，治疗其原发性痛经最好选用（ ）。
- A. 口服促排卵药
B. 口服雌激素
C. 口服避孕药
D. 口服镇静药
E. 口服前列腺素合成酶抑制剂
92. 患者，女性，52岁，消瘦3个月，查体发现左侧锁骨上窝淋巴结肿大，质地坚硬，无压痛，活动度小。考虑可能的疾病是（ ）。
- A. 胃癌 B. 肺癌
C. 淋巴结核 D. 淋巴结炎
E. 霍奇金病
93. 患者，女性，50岁，胆石症多年。3日前腹痛、寒战、高热和黄疸，在门诊抗生素静脉滴注效果不显著，今日患者神志不清，血压80/50mmHg，考虑为（ ）。
- A. 急性坏疽性胆囊炎
B. 胆总管结石症
C. 胆囊穿孔腹膜炎
D. 急性重症胆管炎
E. 胆道蛔虫伴感染
94. 患者，男性，33岁，施工塌方致左大腿骨折。接诊时首先应注意的并发症是（ ）。
- A. 感染 B. 休克
C. 内脏损伤 D. 愈合障碍
E. 筋膜室综合征
95. 患者，女性，36岁。车祸导致腹部闭合性损伤，疼痛剧烈。明确诊断后，护士遵医嘱给予镇痛剂，其目的是（ ）。
- A. 便于手术
B. 便于观察病情

- C. 预防和控制感染
- D. 有利于与患者的沟通
- E. 减轻伤痛刺激并防止神经源性休克

二、以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上按照题号，将所选答案对应字母的方框涂黑。

(96~97题共用题干)

患者，男性，40岁。汉族，教师。以“心慌、气短、疲乏”为主诉入院。护士入院评估：P120次/分，BP70/46mmHg，脉搏细弱；口唇发绀、呼吸急促，患者自制力差、便秘。此外还收集了患者的既往病史、家庭关系、排泄等资料。

96. 以下属于患者主观资料的是 ()。
- A. P120次/分，心慌、气短
 - B. 心慌、气短、脉搏细弱
 - C. P120次/分，BP70/46mmHg，脉搏细弱
 - D. 心慌、疲乏、口唇发绀
 - E. 心慌、气短、疲乏
97. 患者应该优先解决的问题是 ()。
- A. 低效性呼吸型态：发绀、呼吸急促
 - B. 语言沟通障碍
 - C. 便秘
 - D. 营养失调
 - E. 潜在并发症：心律不齐

(98~100题共用题干)

患者，男性，68岁。因患膀胱癌住院，入院时，护士主动与其交流：“您好，我是您的责任护士，有事请找我。”患者治疗多日病情不见好转，情绪低落，化疗不良反应重。护士悉心照顾、鼓励，患者深受感动。患者经治疗后即将出院，对护士的服务非常满意。

98. 该责任护士与该患者的关系模式属于 ()。
- A. 共同参与型

- B. 主动-被动型
- C. 指导-合作型
- D. 自主-合作型
- E. 被动-主动型

99. 影响患者与责任护士沟通的因素不包括 ()。

- A. 患者的感受
- B. 患者的情绪
- C. 患者的身体状况
- D. 患者的籍贯
- E. 护士的专业能力

100. 患者出院时，责任护士最主要的工作是 ()。

- A. 向患者交代出院后的注意事项
- B. 评价护理措施
- C. 征求患者意见，寻找护理工作中问题
- D. 保持与患者的信任关系
- E. 评估患者，制定随访计划

(101~102题共用题干)

孕妇，29岁。妊娠38周，规律宫缩6小时，入院待产。枕左前位，估计胎儿体重2700g，胎心136次/分。阴道检查：宫口开大3cm，未破膜，S=+1，骨盆外测量未见异常。

101. 此时选择的恰当分娩方式是 ()。

- A. 择期剖宫产
- B. 急诊剖宫产术
- C. 自然阴道分娩
- D. 胎头吸引器辅助阴道分娩
- E. 会阴切开辅助阴道分娩

102. 若宫缩逐渐减弱，总产程已11小时，胎膜已破，宫口开大8cm，则恰当的处理是 ()。

- A. 肌肉注射缩宫素
- B. 肌肉注射哌替啶
- C. 肌肉注射地西泮
- D. 静脉滴注缩宫素

E. 补充营养, 适当休息

(103 ~ 104 题共用题干)

患者, 男, 20 岁, 严重荨麻疹。医嘱: 10% 葡萄糖酸钙 10ml, iv, st。

103. 护士实施静脉注射, 不正确的操作是 ()。

- A. 用 5% 碘附 (碘伏) 消毒皮肤
- B. 止血带结扎在穿刺点 6cm 以上
- C. 穿刺时针梗与皮肤成 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D. 认真执行三查七对、检查溶液是否合格
- E. 选择粗、直、有弹性的末梢血管穿刺

104. 静脉穿刺时, 不正确的做法是 ()。

- A. 固定注射针头
- B. 推注前再次核对
- C. 注射时速度可以稍快
- D. 注射前应排尽注射器内空气
- E. 使患者保持舒适位置, 观察患者有无不适

(105 ~ 107 题共用题干)

患者, 女, 30 岁, 患乙型肝炎住院 60 天, 痊愈出院。

105. 护士对床单位的处理不妥的是 ()。

- A. 消毒时应关闭门窗
- B. 床垫、褥、棉胎暴晒 4 小时
- C. 消毒后开窗通风, 铺好备用床
- D. 消毒液擦拭病床、床旁桌椅
- E. 病室用 2% 过氧乙酸加热熏蒸 2 小时

106. 消毒患者的毛衣, 最佳的方法是 ()。

- A. 喷雾消毒
- B. 日光暴晒
- C. 高压消毒
- D. 微波消毒
- E. 环氧乙烷熏蒸

107. 消毒患者的信件、票证, 宜采用的方法是 ()。

- A. 高压消毒
- B. 日光暴晒

C. 微波消毒

D. 含氯消毒剂

E. 甲醛熏蒸消毒

(108 ~ 109 题共用题干)

患者, 女, 25 岁。诊断为厌食症。患者病情危重, 极度消瘦, 需要插胃管补充营养。

108. 判断胃管是否在胃内的最好方法是 ()。

- A. 用注射器抽出胃内容物
- B. 将胃管末端放入水中, 观察有无气泡逸出
- C. 让患者晃动身体, 感觉胃内有无异物
- D. 用注射器向胃内注入 10ml 药液听气过水声
- E. 用注射器向胃内注入 10ml 空气听气过水声

109. 为患者插胃管时, 其操作要点应除外 ()。

- A. 插管前评估插管长度
- B. 向患者解释操作目的
- C. 协助患者取半坐卧位或舒适卧位
- D. 插入一定长度后检查胃管是否在胃内
- E. 插管时患者有呛咳、呼吸困难, 嘱其张口做深呼吸

(110 ~ 111 题共用题干)

患者, 男, 75 岁。因突然晕倒急诊入院, 诊断为脑血管意外。家属告知, 患者高血压 10 年, 自服药物控制高血压。

110. 能够判断患者意识状态的指标是 ()。

- A. 生命体征
- B. 肌腱反射
- C. 角膜反射
- D. 疼痛刺激反应
- E. 瞳孔对光反射

111. 患者恢复期, 为鼓励其饮食自理应采取的措施是 ()。

- A. 嘱患者慢慢进食
- B. 护士或家属帮助喂饭

- C. 将餐具放到患者手里
- D. 将食物和餐具置于患者方便拿取处
- E. 先给患者喂食, 剩少许患者自己进食

(112~115 题共用题干)

患者, 男, 38 岁, 76kg。双手和右膝关节以下被开水烫伤, 创面明显水肿, 剧烈疼痛, 局部有大小不等的水疱。

112. 其烧伤深度为 ()。
- A. I 度
 - B. 浅 II 度
 - C. 深 II 度
 - D. III 度
 - E. IV 度
113. 其烧伤面积是 ()。
- A. 5%
 - B. 12%
 - C. 15%
 - D. 20%
 - E. 25%
114. 对于该患者的急救措施不当的是 ()。
- A. 大量补液
 - B. 迅速脱离热源
 - C. 创面涂抹甲紫
 - D. 迅速送往医院
 - E. 用大量自来水冲洗双下肢
115. 该患者烧伤后第一个 24 小时应补的液体总量是 ()。
- A. 1710ml
 - B. 1855ml
 - C. 2280ml
 - D. 3710ml
 - E. 4280ml

(116~118 题共用题干)

患者, 女, 40 岁, 已婚, 孕 1 产 0, 月经周期规律, 4~5 日/30 日。末次月经为 4 月 1 日, 持续 5 日, 4 月 6 日干净, 现已妊娠 6 周。

116. 推算预产期, 正确的是 ()。
- A. 本年 7 月 14 日

- B. 本年 11 月 4 日
- C. 本年 12 月 8 日
- D. 下一年元月 6 日
- E. 下一年元月 8 日

117. 孕期应做以下检查, 但除了 ()。

- A. B 超检查
- B. 常规血象检查
- C. 血 AFP 检查
- D. 胎儿性别检查
- E. 羊水染色体检查

118. 此患者最可能出现的异常是 ()。

- A. 早产
- B. 急产
- C. 血 AFP 升高
- D. 胎儿神经管畸形
- E. 胎儿染色体异常

(119~120 题共用题干)

护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制 4 年护理专业课程学习, 本人拟申请护士执业注册。

119. 不属于申请护士执业注册的条件是 ()。
- A. 年龄 18 周岁以上
 - B. 护理专业学历证书
 - C. 健康证明
 - D. 护士执业资格考试成绩合格证明
 - E. 户籍证明
120. 从事护理活动唯一合法的凭证是 ()。
- A. 在校成绩单
 - B. 实习证明
 - C. 护理专业学历证书
 - D. 护士执业资格考试成绩合格证明
 - E. 护士执业资格证书