

1. 一口红

【来源】 冬青科植物具柄冬青 *Ilex pedunculosa* Miq. 的干燥叶。全年均可采收,摘取叶片,晒干。

【原植物】 常绿灌木,高达 5m。叶薄革质,卵形至矩圆状椭圆形,长 5~8cm,宽 2~3cm,中部或近顶端处常有细锯齿;叶柄长 12~17mm。花 4~5 数,雌雄异株;雄花 3~9 朵排成聚伞花序,花冠直径 3mm;雌花单生叶腋,3 朵花组成的聚伞花序则少见,花梗细长,长 4~4.5cm。果球形,直径 7~8mm,红色;分核 5 颗,在背部中间有 1 条纹。花期 5 月,果熟期 10 月。

生于山坡林中或灌丛中。分布于湖北、湖南、贵州及辽宁(大连)、安徽、浙江、江西、台湾、广西。

【炮制】 取原药材,拣去杂质,洗净,切段,晒干。

【药性与功效】 苦、涩,凉。赶风除湿,散瘀止血。

【应用经验】 用于风湿痹痛、外伤出血、跌打损伤、闭合性骨折、皮肤皲裂。

【用法用量】 内服,煎汤,5~10g。外用适量,研末调敷。

【附注】 本品收载于《湖北省中药材质量标准》(2009 年版),该标准记载其药用部位为具柄冬青的干燥叶及嫩枝。

2. 一支箭

【别名】 瓶尔小草、矛盾草、花斑七。

【来源】 瓶尔小草科植物心叶瓶尔小草 *Ophioglossum reticulatum* L.、瓶尔小草 *Ophioglossum vulgatum* L. 的干燥或新鲜全草。夏、秋季采收,除去杂质,晒干或鲜用。

【原植物】 **心叶瓶尔小草** 草本。根茎短细,直立,有少数粗长的肉质根。叶通常单生,总叶柄长4~8cm,淡绿色,向基部为灰白色,营养叶片长3~4cm,宽约6~3.5cm,为卵形或卵圆形,先端圆或近于钝头,基部深心形,有短柄,边缘多少呈波状,草质,网状脉明显。孢子叶自营养叶柄的基部生出,长10~15cm,细长,孢子囊穗长3~3.5cm,纤细。

瓶尔小草 与心叶瓶尔小草有以下区别:营养叶卵状长圆形或狭卵形,长4~6cm,宽1.5~2.4cm,先端钝圆或急尖,基部急剧变狭并稍下延,无柄。

均生于林下。心叶瓶尔小草产湖北、贵州及江西、台湾、福建、四川、云南。瓶尔小草产湖北、贵州、重庆及四川、陕西南部、云南、台湾、西藏和长江下游各省。

【炮制】 取原药材,抢水洗净,沥干,切段,干燥。

【药性与功效】 微苦、微甘,寒。清热解毒,消肿止痛。

【应用经验】 用于心胃气痛、痧症腹痛、肺热咳嗽、肺痈、淋浊;外用治毒蛇咬伤(亦可内服)、“木蛇开口”(指头疔)、痈疖疔毒、带状疱疹。

【用法用量】 内服,煎汤,10~15g。外用适量,研末调敷,或鲜品捣敷。

【附注】 ①本品收载于《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003年版)。②同属植物狭叶瓶尔小草 *Ophioglossum thermale* Kom. 的全草在土家族地区一同药用,但资源较少。

3. 一枝黄花

【别名】 金柴胡、朝天一炷香、黄花一枝香。

【来源】 菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的干燥或新鲜全草。秋季花果盛期采收,除去泥沙,阴干或鲜用。

【原植物】 多年生草本,高 35 ~ 100cm。茎直立,通常细弱,单生或少数簇生,不分枝或中部以上有分枝。中部茎叶椭圆形、长椭圆形、卵形或宽披针形,长 2 ~ 5cm,宽 1 ~ 1.5(2)cm,下部楔形渐窄,有具翅的柄,仅中部以上边缘有细齿或全缘;向上叶渐小;下部叶与中部茎叶同形,有长 2 ~ 4cm 或更长的具翅的柄。全部叶质地较厚,叶两面、沿脉及叶缘有短柔毛或下面无毛。头状花序较小,长 6 ~ 8mm,宽 6 ~ 9mm,多数在茎上部排列成紧密或疏松的长 6 ~ 25cm 的总状花序或伞房圆锥花序,少有排列成复头状花序的。总苞片 4 ~ 6 层,披针形或披狭针形,顶端急尖或渐尖。舌状花舌片椭圆形,黄色。瘦果无毛,极少在顶端被稀疏柔毛。花果期 4—11 月。

生于海拔 500 ~ 2850m 的阔叶林缘、林下、灌丛中及山坡草地上。分布于湖北、湖南、贵州、重庆及陕西南部、安徽、江苏、浙江、江西、台湾、广东、广西、云南、四川等地。

【炮制】 取原药材,除去杂质,喷淋清水,切段,干燥。

【药性与功效】 辛、苦,凉;有小毒。疏风散热,止咳化痰,解毒消肿。

【应用经验】 用于感冒咳嗽、寒热往来、百日咳、黄疸型肝炎、咽喉肿痛、扁桃体炎、热泄、胃胀、小儿疳积、疮疖肿毒。

【用法用量】 内服,煎汤,6 ~ 15g,鲜品或单方加倍。外用鲜品适量,捣敷。

【附注】 ①本品收载于《湖南省中药材标准》(2009 年版)和《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003 年版)。②本品的常用别名“红柴胡”易与中药名红柴胡混淆,不应使用。本品在个别地方还有山马兰、黄花马兰、黄花草、铁柴胡等别名。

4. 七叶一枝花(重楼)

【别名】 白蚤休、蚤休、铁灯台、灯台七。

【来源】 百合科植物七叶一枝花 *Paris polyphylla* Sm. 或狭叶重楼 *Paris polyphylla* Sm. var. *stenophylla* Franch. 的干燥根茎。秋季采挖,除去须根,洗净,晒干。

【原植物】 **七叶一枝花** 多年生草本,植株高 35~100cm,无毛;根茎粗厚,直径达 1~2.5cm,外面棕褐色,密生多数环节和许多须根。茎通常带紫红色,基部有灰白色干膜质的鞘 1~3 枚。叶 5~10 枚,矩圆形、椭圆形或倒卵状披针形,长 7~15cm,宽 2.5~5cm,先端短尖或渐尖,基部圆形或宽楔形;叶柄长 2~6cm,带紫红色。花梗长 5~16(30)cm;外轮花被片绿色,(3)4~6 枚,狭卵状披针形,长 3~7cm;内轮花被片狭条形,通常比外轮长;雄蕊 8~12 枚,花药短,长 5~8mm,与花丝近等长或稍长,药隔突出部分长 0.5~2mm;子房近球形,具稜,顶端具一盘状花柱基,花柱粗短,具 4~5 分枝。蒴果紫色,直径 1.5~2.5cm,3~6 瓣裂开。种子多数,具鲜红色多浆汁的外种皮。花期 4—7 月,果期 8—11 月。

狭叶重楼 与七叶一枝花的主要区别:叶 8~13(22)枚轮生,披针形、倒披针形或条状披针形,有时略微弯曲呈镰刀状,长 5.5~19cm,通常宽 1.5~2.5cm,很少为 3~8mm,具短叶柄。

七叶一枝花生于海拔 1800~3200m 的林下。分布于湖北、贵州及云南、四川、西藏(东南部)。狭叶重楼生于海拔 1000~2700m 的林下或草丛阴湿处。分布于湖北、湖南、贵州、台湾及山西、陕西、甘肃、安徽和长江以南各省区。

【炮制】 除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干;或洗净,晒干,研末备用。

【药性与功效】 苦,微寒;有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

【应用经验】 用于疔疮痈肿、咽喉肿痛、中耳炎、乳痈、肠痈、肺癆、胃痛、蛇虫咬伤、跌打伤痛、惊风抽搐。

【用法用量】 内服,煎汤,3~15g;研末饭后内服,每次1.5~6g。外用适量,研末调敷。

【使用注意】 有小毒,内服不宜过量。

【附注】 ①本品以“重楼”为名收载于多版《中国药典》,但该品在土家族地区的基源与药典不完全相同。土家族将同属植物球药隔重楼 *Paris fargesii* Franch. 和华重楼 *Paris polyphylla* Sm. var. *chinensis* (Franch.) Hara 的干燥根茎也同等药用。②本品原植物七叶一枝花等为国家二级重点保护野生植物,故应使用栽培品。

5. 八月瓜

【别名】 八月炸、八月札、八月开口。

【来源】 木通科植物三叶木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.、白木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. ssp. *australis* (Diels) T. Shimizu [*Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd.]、木通 *Akebia quinata* (Houtt.) Decne. 的干燥果实。秋季果实成熟时采摘，晒干。

【原植物】 **三叶木通** 落叶木质藤本，茎、枝无毛。叶为三出复叶；小叶卵圆形、宽卵圆形或长卵形，长宽变化很大，顶端钝圆、微凹或具短尖，基部圆形或宽楔形，有时微呈心形，边缘浅裂或呈波状，侧脉通常 5~6 对；叶柄细瘦，长 6~8cm。花序总状，腋生，长约 8cm；花单性；雄花生于上部，雄蕊 6；雌花花被片紫红色，具 6 个退化雄蕊，心皮分离，3~12。果实肉质，长卵形，成熟后沿腹缝线开裂；种子多数，卵形，黑色。花期 4—6 月。果期 7—9 月。

白木通 与三叶木通的区别：小叶卵状长椭圆形或长椭圆形，全缘或近全缘；浆果黄褐色。

木通 与三叶木通的主要区别：叶为掌状复叶，小叶 5，倒卵形或椭圆形，全缘。

均生于海拔 250~1000m 的山坡灌丛或沟边。三叶木通分布于河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃和长江流域各省。白木通在长江流域广布，西南分布至云南，北部分布至河南、山西和陕西。木通广布于陕西及长江流域及其以南各省。

【药性与功效】 甘、辛，凉。疏肝理气，益肾利水。

【应用经验】 用于肝胃气痛、腰酸痛、白带、疝气、小便不利、湿热淋症。

【用法用量】 内服,煎汤或泡酒,10 ~ 15g。

【附注】 三叶木通、白木通或木通的干燥藤茎为中药木通,收载于《《中国药典》》(2015 年版)。具有利尿通淋、清心除烦、通经下乳的功效。用于淋证、水肿、心烦尿赤、口舌生疮、经闭乳少、湿热痹痛。用量 3 ~ 6g。

6. 八角枫

【别名】 白龙须(须根)、白荆条(支根)、九胡子。

【来源】 八角枫科植物瓜木 *Alangium platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms 或八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Harms 的干燥支根及须根。夏、秋季挖取直径约 8mm 以下的支根及须根,除去泥沙(忌水洗),晒干。

【原植物】 瓜木 落叶小乔木或灌木;树皮光滑,浅灰色;小枝绿色,有短柔毛。叶互生,纸质,近圆形,长 7~17cm,宽 6~14cm,常 3~5 裂,稀 7 裂,先端渐尖,基部近心形或宽楔形,幼时两面均有柔毛,后仅下面叶脉及脉腋有柔毛;主脉常 3~5 条。花 1~7 朵,组成腋生的聚伞花序,花萼 6~7 裂,花瓣白色或黄白色,芳香,条形,长 2.5~3.5cm;花丝微扁,长 7.5mm,密生短柔毛,花药黄色,长 1.4cm。核果卵形,长 9~12(15)mm,花萼宿存。花期 5—6 月,果期 7—9 月。

八角枫 与瓜木有以下区别:叶片卵形或圆形,基部心形,两侧偏斜,全缘或 2~3 裂;主脉 4~6 条。花 8~30 朵组成腋生 2 歧聚伞花序。

瓜木生于较肥沃、疏松的向阳山地。分布于辽宁、河北、山西、河南及长江流域、福建、台湾。八角枫生于阴湿的杂木林中。分布于长江流域及珠江流域各省区。

【炮制】 ①八角枫 取原药材,除去杂质,洗净,支根润透,须根稍润,切段或片,干燥。②酒八角枫 取八角枫段或片,用酒炒至外表呈黄色,即得。酒制增加散寒去湿功能。

【药性与功效】 辛,温;有毒。赶风除湿,舒筋活络,消肿止痛。

【应用经验】 用于风寒性疼痛、瘫痪、跌打损伤、四肢麻木、劳伤腰痛、鹤膝风(膝关节肿痛)、胃痛、阴疽。

【用法用量】 内服,煎汤或泡酒,须根 1.5 ~ 3g,支根 3 ~ 6g。

【使用注意】 孕妇、小儿、年老体弱者慎用。

【附注】 ①主根有大毒,不作药用。本品须根的别名为白龙须,易与来源于百合科的植物药“白龙须”相混淆,不应使用。②本品收载于《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003 年版)。本品也收载于《湖北省中药材质量标准》(2009 年版)及《湖南省中药材标准》(2009 年版),但基源均只有八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Harms 一种。③湖北省咸丰县中医院认为本品与米酒相反,有待研究。

7. 八角莲

【别名】 叶下花、八角金盘。

【来源】 小檗科植物八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng ex Ying 的干燥根茎及须根。全年均可采,秋末为佳。挖起后除去茎叶,洗净泥沙,晒干。

【原植物】 多年生草本。根茎粗壮、横生。茎直立,高 20 ~ 30cm,不分枝,无毛,淡绿色。茎生叶 1,有时 2,盾状,圆形,直径达 30cm,4 ~ 9 浅裂,裂片宽三角状卵圆形或卵状矩圆形,长 2.5 ~ 4cm,基部宽 5 ~ 7cm,顶端锐尖,上面无毛,下面疏生柔毛或无毛,边缘有针刺状细齿;叶柄长 10 ~ 15cm。花深红色,5 ~ 8 朵簇生于近叶柄顶部离叶基不远处,下垂,花梗细长,下弯,有毛或无毛;萼片 6,外面有疏长毛;花瓣 6,长 2cm;雄蕊 6;子房上位,1 室,柱头大,盾状。浆果椭圆形或卵形,种子多数。花期 3—6 月,果期 5—9 月。

生于阔叶林或竹林下阴湿处。分布于长江流域各省。

【炮制】 ①八角莲 取原药材,除去须根,洗净,润透,切厚片,干燥。②蒸制八角莲 取八角莲片,蒸半小时,晒干。③醋八角莲 取八角莲片,置锅内,边炒边洒醋,直至醋干,即得。醋制增强清热解毒、散结作用。

【药性与功效】 辛、苦,凉;有小毒。清热攻毒,化痰散结,消肿止痛,活血通络,抗癌。

【应用经验】 用于咽喉肿痛、肺热痰咳、跌打损伤、痹症、胃痛腹痛、猴儿疮(腮腺炎)、瘰癧、痈肿、蛇伤以及咽喉癌、食道癌等多种癌症。

【用法用量】 内服,煎汤,3 ~ 10g。外用适量,磨汁或浸醋、酒涂搽,研末调敷或鲜品捣敷。

【使用注意】 孕妇禁服,体质虚弱者慎服。

【附注】 ①本品收入《湖北省中药材质量标准》(2009 年版)、《湖南省中药材标准》(2009 年版)和《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003 年版)。同属植物六角莲 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woods. 的根茎在土家族地区也作八角莲药用。②本品的别名还有独角莲、一碗水,易与其他植物药名称或别名相混淆,不应使用。③本品原植物为国家二级重点保护野生植物,故应尽量少用。④同属植物贵州八角莲(乌云伞) *Dysosma majorensis* (Gagnep.) Ying[*Podophyllum majorense* Gagnep. ; *Dysosma lichuanensis* Cheng sp. nov. Ined.]的根茎在土家族地区称为“红八角莲”,其功效与本品类似。

8. 九头狮子草

【别名】 辣子七、青泽兰、心慌草。

【来源】 爵床科植物九头狮子草 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. 的干燥地上部分。夏、秋季采收,割取全草,除去杂质,晒干或鲜用。

【原植物】 多年生草本,高 20~50cm。根细长,须根黄白色。茎直立,或披散,四棱形,深绿色,节显著膨大。叶对生,纸质,具短柄,椭圆形或卵状披针形,长 3~7cm,宽 0.8~1.5cm,先端渐尖,基部渐窄,全缘。聚伞花序短,集生于茎梢的叶腋;每一花下有大小两片叶状苞相托,较花萼大;萼 5 裂,等大;花冠长约 2.5cm,淡红紫色,下部细长筒状,上部分裂为二唇,超出苞外,容易脱落;雄蕊 2,着生于花筒内;雌蕊 1,子房 2 室,花柱白色,柱头 2 裂。蒴果窄倒卵形,略被柔毛,成熟时纵裂,每室具 2 种子。花期 7—8 月。

生于山坡,林下、路旁、溪边等阴湿处。长江以南地区均有分布。

【炮制】 取原药材,洗净,切段,晒干。

【药性与功效】 辛、微苦,凉。散风清热,解毒消肿,定惊,化痰。

【应用经验】 用于头晕心悸、小儿惊风、感冒发热、咽喉肿痛、肺热咳喘、瘰癧、痰核、乳痈、痔疮、跌打损伤、无名肿痛。

【用法用量】 内服,煎汤,10~30g。外用鲜品适量,捣敷。

【附注】 本品收载于《湖北省中药材质量标准》(2009 年版)、《湖南省中药材标准》(2009 年版)和《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003 年版)。

9. 三叶青(雷胆子)

【别名】 石猴子。

【来源】 葡萄科植物三叶崖爬藤 *Tetrastigma hemsleyanum* Diels & Gilg 的干燥块根。全年可采挖,洗净,切片,干燥。

【原植物】 攀缘藤本;枝细弱,无毛;卷须不分枝。掌状复叶;小叶3,草质,侧生小叶基部偏斜,中间小叶稍大,卵状披针形,长3~7cm,顶端短渐尖或渐尖,边缘疏生小锯齿,无毛或变无毛;叶柄长2~3cm。聚伞花序腋生,花序梗比叶柄短;花小,黄绿色;花梗有短硬毛;花萼小;花盘明显,有齿;花瓣4,近卵形,顶端有极不明显的小角;柱头无柄,裂片4,星状开展。浆果球形,红褐色,成熟时黑色。花期6月,果期8—11月。

生于林中阴处,缠绕树上。分布于湖北、湖南及江西、浙江、福建、广东、四川。

【药性与功效】 微苦、辛,凉。清热解毒,化石通淋,止痉。

【应用经验】 用于高热惊风、流行性感、肝炎、肺癆、结石;外用治铜钱癣、痈疽疮毒、猴儿疮(腮腺炎)、蛇咬伤、狗咬伤、黄水疮、外伤出血。

【用法用量】 内服,煎汤,10~30g。外用适量,研末敷患处。

【附注】 ①本品收载于《湖南省中药材标准》(2009年版),药用部位除块根外还有全草。②本品的别名还有金钱吊葫芦,因易于与其他植物药名称相混淆,不应使用。

10. 三加皮

【别名】 刺三加、白筋、三加风、三叶五加。

【来源】 五加科植物白筋 *Eletherococcus trifolius* (L.) S. Y. Hu [*Acanthopanax trifolius* (L.) Merr.] 的干燥根皮。全年均可采挖根部,洗净,剥取根皮,晒干。

【原植物】 攀缘灌木,高1~7m。树皮灰白色;小枝有白色皮孔。茎枝、叶柄及叶主脉常有小钩刺,叶互生,有长柄,掌状复叶由3片小叶组成;小叶片长卵形或长椭圆形,长4~10cm,宽3~6.5cm,先端急尖或短渐尖,基部楔形或圆钝形,稍偏斜,边缘有疏钝粗齿或锯齿。伞形花序集成顶生总状花序或复伞形花序;花小,黄绿色,小花梗长短不齐;萼边缘有5齿,花瓣5,雄蕊5,子房下位,花柱2~3,基部合生至中部分离。果扁球形,熟时黑色。花期7—9月。

生于河边、村旁、山坡或林缘灌木丛中。分布于我国中部和南部省区。

【炮制】 取原药材,除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。

【药性与功效】 辛、苦,平。赶风除湿,散瘀消肿。

【应用经验】 用于跌打损伤、风湿痹痛、骨折、肺癰。

【用法用量】 内服,煎汤或浸酒,10~30g。外用鲜品适量,捣敷。

【附注】 白筋的干燥根或根皮以“刺三加”为名收载于《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003年版)。

11. 三百棒(飞龙掌血)

【别名】 见血飞。

【来源】 芸香科植物飞龙掌血 *Toddalia asiatica* (L.) Lam. 的干燥根或根皮。全年可采,挖取根,除去泥沙和杂质,晒干,或剥取根皮后晒干。

【原植物】 木质藤本,枝及分枝常下有弯的皮刺;小枝常被有褐锈色的短柔毛和白色圆形皮孔。叶为三小叶复叶,具柄;小叶无柄,纸质或近革质,倒卵形、椭圆形或倒卵状矩圆形,长3~9cm,宽1.5~3.5cm,边有细钝锯齿,齿缝处及叶片到处均有透明腺点。花单性,白色、青色或黄色;萼片同花瓣均为4~5;雄花常排成腋生的伞房状圆锥花序;雌花常排成聚伞状圆锥花序,花较少。核果近球形,橙黄色至朱红色,有深色腺点,果皮肉质,有3~5条微凸的肋纹;种子肾形,黑色,有光泽。全年四季开花结果,但多于夏季开花,果期多在秋冬季。

生于山林、路旁、灌丛或疏林中。分布于湖北、湖南、贵州及陕西、浙江、福建、台湾、广东、广西、云南、四川。

【炮制】 ①三百棒 取原药材,洗净,润透,切段,置通风处阴干。

②三百棒粉 取三百棒片块,粉碎成极细粉,外用。

【药性与功效】 辛、苦,温;有小毒。赶风止痛,散瘀止血,消肿解毒。

【应用经验】 用于风湿痹痛、关节红肿、腰膝疼痛、腹腕疼痛、肋间神经痛、跌打损伤、骨折、痛经、闭经、衄血、吐血、崩漏、疮痈肿毒等。

【用法用量】 内服,煎汤或泡酒,10~15g。外用适量,研末撒或调敷。

【使用注意】 孕妇禁服。

【附注】 ①本品为土家医用于伤科的要药,收载于《湖北省中药材

质量标准》(2009 年版)和《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003 年版)。上述标准均记载其药用部位为根皮,但据调查,土家医将根同等药用。本品又以“飞龙掌血”为名收载于《湖南省中药材标准》(2009 年版)。^②有的土家医认为,飞龙掌血的茎在治疗风湿疼痛、关节红肿等方面,具有与其根同等的疗效。^③白三百棒:土家族将芸香科植物蚬壳花椒 *Zanthoxylum dissitum* Hemsl. 的根皮或茎皮称为“白三百棒”,用于跌打损伤、劳伤身痛、风湿疼痛。

12. 三尖杉

【来源】 三尖杉科植物三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook. f. 的干燥枝叶。全年可采,除去杂质,晒干。

【原植物】 乔木,高达20m,胸径达40cm,树冠广圆形。树皮褐色或红褐色,裂成片状脱落;枝条较细长,稍下垂。叶排成两列,披针状条形,通常微弯,长(4)5~10(13)cm,宽3.5~4.5mm,上部渐窄,先端有渐尖的长尖头,基部楔形或宽楔形,上面深绿色,中脉隆起,下面气孔带白色,较绿色边带宽3~5倍,绿色中脉带明显或微明显。雄球花8~10聚生成头状,径约1cm,总花梗粗,通常长6~8mm,基部及总花梗上部有18~24枚苞片,每一雄球花有6~16枚雄蕊,花药3,花丝短;雌球花的胚珠3~8枚发育成种子,总梗长1.5~2cm。种子椭圆状卵形或近圆球形,长约2.5cm,假种皮成熟时紫色或红紫色,顶端有小尖头。花期4月,种子8—10月成熟。

生于海拔200~1000m(西南各省区可达2700~3000m)的阔叶树、针叶树混交林中。为我国特有树种,产东南、中南、西南及陕西南部、甘肃南部等地。

【炮制】 取原药材,除去杂质,喷淋清水,润透枝条,切段。

【药性与功效】 苦、涩,寒;有毒。清热凉血,败毒散结,抗肿瘤。

【应用经验】 用于目赤、风疹、疮疡、恶性淋巴瘤、白血病、肺癌、胃癌、上颌窦癌、子宫平滑肌肉瘤、食道癌、直肠癌等。

【用法用量】 内服,煎汤,30g。