

2011
通关锦囊

2011年

全国卫生专业技术资格考试辅导用书

护理学(师)考试

通关锦囊

下册



2011年最新版

主编 罗先武 余立平

内容特色

考点精炼：分析考试规律，浓缩历年考

锦囊点睛：复习有方法，记忆有技巧，“锦囊妙记”点睛之笔，让学习如虎添翼

试题巩固：典型考题再现考试重点，考点复习后巩固记忆

附赠服务

教学视频：附赠光盘集成90学时多媒体视频教学课程，重点内容立体呈现

在线模考：随书赠卡激活后，获试卷在线模考服务，即考即判卷，随时了解薄弱环节，体验网络学习的便捷与人性

 人民卫生出版社



全国卫生专业技术资格考试辅导用书



2011年

**护理学（师）考试
通关锦囊（下册）**

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

2011 年护理学(师)考试 通关锦囊(上、下册)/罗先武等主编. —北京:人民卫生出版社,2011. 2

ISBN 978-7-117-13880-2

I. ①2… II. ①罗… III. ①护理学-护士-资格考核-自学参考资料 IV. ①R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 260235 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

2011 年护理学(师)考试 通 关 锦 囊 (上、下册)

主 编: 罗先武 余立平

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京铭成印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 总印张: 69

总 字 数: 1723 千字

版 次: 2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-13880-2/R · 13881

总定价(含光盘): 400.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

目 录

下 册

模拟试卷一	889
基础知识	889
相关专业知识	908
专业知识	917
专业实践能力	926
模拟试卷二	937
基础知识	937
相关专业知识	945
专业知识	954
专业实践能力	964
模拟试卷三	974
基础知识	974
相关专业知识	982
专业知识	991
专业实践能力	1001
模拟试卷四	1011
基础知识	1011
相关专业知识	1019
专业知识	1028
专业实践能力	1038
答案及解析	1049

模拟试卷一

基础知识

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 1 型糖尿病发病的主要原因是
 - A. 糖摄入过多
 - B. 遗传因素
 - C. 胰高血糖素分泌过多
 - D. 自身免疫
 - E. 过度肥胖
2. 成人急性上呼吸道感染最常见的病因是
 - A. 肿瘤
 - B. 病毒感染
 - C. 理化因素
 - D. 变态反应
 - E. 吸烟
3. 交叉瘫的病变部位是
 - A. 大脑皮层
 - B. 脊髓腰段
 - C. 内囊
 - D. 脑干
 - E. 脊髓前角
4. 慢性肺源性心脏病最多见的病因是
 - A. 肺结核
 - B. 支气管哮喘
 - C. 支气管肺炎
 - D. 慢性阻塞性肺疾病
 - E. 脊柱侧弯
5. 下列可杀灭结核分枝杆菌的条件是
 - A. 放在阴湿处 2 小时
 - B. 烈日下暴晒 2 小时
 - C. 60℃ 水浸泡 5 分钟
 - D. 放在有风处 2 小时
 - E. 放在阴凉干燥处 2 小时
6. 引起慢性胃炎的主要细菌是
 - A. 链球菌
 - B. 铜绿假单胞菌
 - C. 大肠埃希菌
 - D. 幽门螺杆菌
 - E. 金黄色葡萄球菌
7. 系统性红斑狼疮发病的原因是
 - A. 劳累
 - B. 药物过敏
 - C. 自身免疫
 - D. 阳光照射
 - E. 性激素
8. 端坐呼吸是指
 - A. 多发生在夜间，睡眠中突然憋醒
 - B. 睡眠中憋醒，被迫站立位伴咳粉红色

- 泡沫痰
- C. 体力活动时发生呼吸困难,口含硝酸甘油可缓解
- D. 劳累或情绪激动时发生呼吸困难,休息可缓解
- E. 休息时患者感到呼吸困难,不能平卧,被迫取坐位或半卧位
9. 急性肾衰竭少尿期最危险的并发症是
- A. 出血倾向
- B. 高钾血症
- C. 代谢性酸中毒
- D. 低钠血症
- E. 低钾血症
10. 系统性红斑狼疮患者受损脏器发生率最高的是
- A. 脑
- B. 肾
- C. 心
- D. 肝
- E. 肺
11. 组成碳氧血红蛋白的两种物质是
- A. 一氧化碳与清蛋白
- D. 一氧化碳与球蛋白
- C. 二氧化碳与血红蛋白
- D. 一氧化碳与血红蛋白
- E. 二氧化碳与球蛋白
12. 消化性溃疡最重要的发病原因是
- A. 胃酸对胃黏膜的侵袭作用
- B. 幽门螺杆菌感染
- C. 胃蛋白酶的蛋白水解作用
- D. 过度精神紧张
- E. 遗传因素
13. 各类休克共同的病理生理改变是
- A. 酸碱平衡失调
- B. 有效循环血量锐减
- C. 外周组织缺血缺氧
- D. 组织细胞坏死
- E. 心排出量减少
14. 甲亢术前药物准备的目的是
- A. 降低基础代谢率
- B. 预防术后复发
- C. 预防甲状腺危象
- D. 减少术中出血
- E. 减少术后并发症
15. 挤压伤引起肾衰,其肾衰原因属于
- A. 肾前性
- B. 肾性
- C. 肾后性
- D. 肾前性及肾性
- E. 肾性及肾后性
16. 与原发性肝癌的发生关系最密切的是
- A. 急性胆囊炎
- B. 肝炎后肝硬化
- C. 酒精性肝硬化
- D. 血吸虫性肝硬化
- E. 肝脓肿
17. 引起腹外疝的2个主要原因是
- A. 腹水和便秘
- B. 腹壁强度低和腹内压增高
- C. 妊娠和体力劳动
- D. 外伤和腹壁缺损
- E. 腹股沟管和股管宽大
18. 下列可诱发肝性脑病的因素是
- A. 上消化道出血
- B. 低蛋白饮食
- C. 妊娠
- D. 药物导泻
- E. 保钾利尿剂
19. 最多见的腹外疝是
- A. 股疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 切口疝
- D. 脐疝
- E. 腹股沟直疝
20. 蛔虫性胆囊炎疼痛的特点是
- A. 阵发性绞痛

- B. 持续胀痛
C. 钻顶样剧痛
D. 刀割样锐痛
E. 钝痛或隐痛
21. 下列属于不稳定性骨折的是
A. 青枝骨折
B. 嵌插骨折
C. 横形骨折
D. 螺旋骨折
E. 裂缝骨折
22. 静脉补钾时,在 1000ml 液体中加入 10%氯化钾,一般不超过
A. 10ml
B. 15ml
C. 20ml
D. 30ml
E. 50ml
23. 小儿佝偻病的主要病因是
A. 营养不良
B. 缺乏维生素 D
C. 缺钙
D. 生长发育过快
E. 人工喂养
24. 下列属于小细胞低色素性贫血的是
A. 溶血性贫血
B. 缺铁性贫血
C. 再生障碍性贫血
D. 急性失血性贫血
E. 白血病
25. 足月儿生理性黄疸持续时间应小于
A. 3 天
B. 5 天
C. 7 天
D. 10 天
E. 14 天
26. 女性青春期开始的重要标志是
A. 音调变高
B. 月经来潮
C. 阴毛出现
D. 乳房发育
E. 骨盆变宽
27. 目前我国育龄妇女采用的主要避孕措施是
A. 安全期避孕
B. 宫内节育器
C. 短效口服避孕药
D. 速效避孕药
E. 阴茎套
28. 妊娠期高血压的好发因素不包括
A. 精神过度紧张
B. 年轻初产妇
C. 巨大儿
D. 贫血
E. 羊水过多
29. 宫缩乏力所致产程延长不会导致
A. 生殖道瘘
B. 产后感染
C. 胎盘植入
D. 产后出血
E. 尿潴留
30. 小儿营养性缺铁性贫血多见于
A. 胎儿期
B. 新生儿期
C. 婴幼儿期
D. 学龄前期
E. 学龄期
31. 烧伤后的体液渗出达到高峰的时间是
A. 4 小时
B. 6 小时
C. 8 小时
D. 12 小时
E. 24 小时
32. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是
A. 腹痛的程度
B. 腹腔内有无原发病灶

- C. 腹腔是否与外界相通
D. 有无腹膜刺激征
E. 病原菌种类
33. 心力衰竭最常见的诱发因素是
A. 呼吸道感染
B. 过度劳累
C. 精神紧张
D. 高盐饮食
E. 药物使用不当
34. 脑出血最常见的病因是
A. 脑血管畸形
B. 白血病
C. 脑外伤
D. 恶性贫血
E. 高血压
35. 妊娠期高血压疾病最基本的病理变化是
A. 胎盘绒毛退行性变化
B. 肾小管重吸收能力下降
C. 全身小动脉痉挛
D. DIC
E. 水钠潴留
36. 下列哪种原因可引起尿道球部损伤
A. 骨盆骨折
B. 会阴部骑跨伤
C. 下腹部撞击
D. 高处跌下
E. 腹部挤压
37. 原发性肾病综合征发生水肿的主要原因是
A. 低蛋白血症
B. 循环血容量不足
C. 高脂血症
D. 蛋白质合成障碍
E. 肾小管重吸收障碍
38. 小儿前囟晚闭最常见于
A. 重度脱水
B. 脑积水
C. 佝偻病
D. 小头畸形
E. 极度消瘦
39. 小儿头围与胸围几乎相等的月龄是
A. 4个月
B. 6个月
C. 8个月
D. 10个月
E. 12个月
40. 心脏复苏首选的药物是
A. 络贝林
B. 阿托品
C. 利多卡因
D. 碳酸氢钠
E. 肾上腺素
41. 肋骨骨折好发于
A. 1~3肋
B. 4~7肋
C. 8~9肋
D. 10~12肋
E. 位置不固定
42. 肺癌早期常见症状为
A. 刺激性干咳
B. 声音嘶哑
C. 颈静脉怒张
D. 胸腔积液
E. 上肢水肿
43. 食管癌的典型表现为
A. 哽咽感
B. 进行性吞咽困难
C. 声音嘶哑
D. 气管食管瘘
E. 消瘦
44. 我国急性胰腺炎最常见的病因是
A. 腹部外伤
B. 酒精中毒
C. 暴饮暴食
D. 胆道疾病

- E. 高脂血症
45. 高血压脑病指的是
- A. 脑小动脉严重痉挛致脑水肿
 - B. 血黏稠致脑血栓形成
 - C. 脑血管内压高而破裂
 - D. 脑肿瘤
 - E. 外来血栓堵塞脑动脉
46. 麻醉前使用阿托品的说法, 错误的是
- A. 可抑制呼吸道腺体的分泌
 - B. 常用剂量为 0.5mg
 - C. 可预防局麻药中毒
 - D. 心动过速者不宜应用
 - E. 术前半小时肌注
47. 女性外生殖器 不包括
- A. 阴阜
 - B. 阴蒂
 - C. 阴道
 - D. 小阴唇
 - E. 大阴唇
48. 常温下大脑缺血缺氧持续时间超过多少分钟可造成不可逆性损害
- A. 1~3 分钟
 - B. 4~6 分钟
 - C. 7~9 分钟
 - D. 10~12 分钟
 - E. 13~15 分钟
49. 麻疹的主要传播途径是
- A. 水源污染
 - B. 食物污染
 - C. 伤口分泌物
 - D. 产道恶露
 - E. 空气飞沫
50. 人体最重要的神经内分泌器官是
- A. 下丘脑
 - B. 腺垂体
 - C. 肾上腺
 - D. 甲状腺
 - E. 胰腺
51. 引起甲状腺功能亢进症的主要因素是
- A. 自身免疫
 - B. 理化因素
 - C. 手术创伤
 - D. 病毒感染
 - E. 遗传因素
52. 张力性气胸的成因是
- A. 形成了血气胸
 - B. 破裂口自动闭合
 - C. 肺大疱破裂出血
 - D. 破裂口呈单向活瓣
 - E. 破裂口与外界相通
53. 引起风湿性心脏瓣膜病的主要病原菌是
- A. 乙型溶血性链球菌
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 肺炎链球菌
 - D. 流感嗜血杆菌
 - E. 铜绿假单胞菌
54. 根据小儿运动功能的发育规律, 开始会爬的月龄是
- A. 3~4 个月
 - B. 5~6 个月
 - C. 6~7 个月
 - D. 8~9 个月
 - E. 10~12 个月
55. 支气管哮喘的发病机制是
- A. 支气管缺氧
 - B. 支气管感染
 - C. 免疫缺陷
 - D. 精神紧张
 - E. 气道变应性炎症
56. 下列属于肿瘤二级预防的是
- A. 保护环境
 - B. 早期治疗
 - C. 纠正不良饮食习惯
 - D. 加强放射防护
 - E. 康复训练

57. 维持子宫呈前倾的韧带是
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 骶结节韧带
E. 子宫骶骨韧带
58. 肛裂的好发部位是
A. 左侧
B. 右侧
C. 前正中线
D. 后正中线
E. 任何部位
59. 腹前壁腹膜出现炎症时的疼痛特点为
A. 多为阵发性疼痛
B. 局部疼痛定位准确
C. 对牵拉敏感, 常为钝痛
D. 可引起肩部放射痛
E. 可引起心率减慢、血压下降
60. 枕骨大孔疝时被压迫的脑组织是
A. 大脑颞叶沟回
B. 中脑
C. 脑桥
D. 大脑海马回
E. 小脑扁桃体
61. 胃癌晚期最常转移至
A. 脾
B. 脑
C. 肺
D. 肾
E. 肝
62. 细菌性肝脓肿最常见的致病菌是
A. 金黄色葡萄球菌、链球菌
B. 大肠埃希菌、链球菌
C. 链球菌、类杆菌属
D. 大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌
E. 金黄色葡萄球菌、类杆菌属
63. 下列属于卵巢良性肿瘤的是
A. 内胚窦瘤
B. 颗粒细胞瘤
C. 库肯勃瘤
D. 卵泡膜细胞瘤
E. 无性细胞瘤
64. 以下原因引起的急性尿潴留中, 属于非机械性梗阻引起的是
A. 前列腺增生
B. 不习惯卧床排尿
C. 尿道狭窄
D. 膀胱结石
E. 尿道结石
65. 挤压面部“危险三角区”的疖容易引起
A. 脑脓肿
B. 全身感染
C. 急性蜂窝织炎
D. 颅内感染
E. 菌血症
66. 最常见的头先露为
A. 面先露
B. 枕先露
C. 额先露
D. 顶先露
E. 前囟先露
67. 母乳中糖的主要类型是
A. 甲型乳糖
B. 葡萄糖
C. 乙型乳糖
D. 半乳糖
E. 果糖
68. 直肠肛管周围脓肿常继发于
A. 肛裂
B. 肛瘘
C. 血栓性外痔
D. 肛腺炎
E. 直肠息肉继发感染
69. 与类风湿关节炎的发生关系密切的抗体是
A. IgA

- B. IgB
C. IgD
D. IgE
E. IgM
70. 肝硬化患者侧支循环形成时最重要交通支是
A. 直肠下段、肛管交通支
B. 腹膜后交通支
C. 胃底、食管下段交通支
D. 脐旁静脉与腹壁上静脉交通支
E. 脐旁静脉与腹壁下静脉交通支
71. 继发性下肢静脉曲张的最常见原因是
A. 腹内压增高
B. 静脉壁薄弱
C. 静脉压力增高
D. 下肢浅静脉瓣膜发育不良
E. 下肢深静脉病变
72. 居我国产妇死亡原因首位的是
A. 妊娠合并心脏病
B. 妊娠期高血压疾病
C. 产后出血
D. 产褥感染
E. 羊水栓塞
73. 患者,女性,32岁。春季外出旅游后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作,诊断为支气管哮喘。引起该患者哮喘发作最可能的致敏原是
A. 花粉
B. 尘螨
C. 毛屑
D. 病毒感染
E. 细菌感染
74. 患儿,男,6个月。生后母乳喂养,未及时添加辅食。诊断为营养性巨幼红细胞性贫血,主要病因是
A. 铁摄入不足
B. 锌摄入不足
C. 食物中缺少维生素C
D. 维生素B₁₂及叶酸供给不足
E. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏
75. 患者,女性,28岁。与家人吵架后服敌敌畏100ml,出现呼吸困难,瞳孔缩小,视力模糊,肌肉颤动。其发病机制是
A. 乙酰胆碱失活
B. 肾上腺素过多
C. 胆碱酯酶失活
D. 去甲肾上腺素过多
E. 谷丙转氨酶过多
76. 患者,男性,45岁。左腰部被撞后左腰肿痛1小时入院。查体:血压70/50mmHg,腹部无压痛。可能的病因是
A. 肝破裂
B. 肠破裂
C. 脾破裂
D. 肾裂伤
E. 损伤性血胸
77. 患者,男性,22岁。因上腹痛、发热4小时入院,查体:右下腹固定性压痛,无腹肌紧张及反跳痛。应考虑为
A. 单纯性阑尾炎
B. 化脓性阑尾炎
C. 坏疽性阑尾炎
D. 穿孔性阑尾炎
E. 阑尾周围脓肿
78. 患者,女性,27岁。G₁P₁,自然分娩1男婴,体重3.5kg,胎盘娩出后半小时内阴道出血500ml,色红。查看胎盘完整,见有血管中断于胎膜边缘,其出血原因最可能是
A. 胎膜残留
B. 子宫收缩乏力
C. 胎盘剥离不全
D. 软产道损伤
E. 宫颈裂伤
79. 患者,女性,26岁。宫颈黏液分泌增多,

黏液变得稀薄,拉丝度长,引起此种变化的激素是

- A. 促性腺激素释放激素
- B. 绒毛膜促性腺激素
- C. 促卵泡素
- D. 雌激素
- E. 孕激素

80. 患者,女性,28岁。主诉停经50天,阴道不规则出血12天,左下腹痛1天,妇

科检查:后穹隆穿刺抽出不凝血4ml,尿妊娠试验(+),诊断为异位妊娠,其最常见的病因是

- A. 子宫肌炎
- B. 输卵管炎
- C. 子宫内膜炎
- D. 卵巢囊肿
- E. 宫颈炎

二、以下提供若干个案例,每个案例有若干个考题。请根据提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(81~83题共用题干)

患者,男性,48岁。因高热、皮肤出现小出血点、头晕乏力就诊。入院后诊断为再生障碍性贫血。血常规显示:Hb 80g/L, RBC 3×10^{12} /L, WBC 3×10^9 /L, PLT 70×10^9 /L。

81. 该病的主要病因是

- A. 铁缺乏
- B. 免疫因素
- C. 骨髓受抑制
- D. 维生素B₁₂缺乏
- E. 叶酸缺乏

82. 引起发热的原因是

- A. 营养不良
- B. 成熟粒细胞缺乏
- C. 缺氧
- D. 出血
- E. 新陈代谢旺盛

83. 本病急性型易引起死亡的原因是

- A. 贫血
- B. 肾衰
- C. 缺氧
- D. 感染
- E. 心衰

(84~85题共用题干)

患者,男性,26岁。于2年前患慢性肾

小球肾炎,近1年来出现颜面及眼睑水肿、贫血。入院后诊断为慢性肾衰竭(氮质血症期)。

84. 氮质血症的发生机制是

- A. 蛋白质摄入过多
- B. 组织消耗过多
- C. 血浓缩
- D. 肾小球滤过率降低
- E. 肾小球淤血

85. 患者出现皮肤瘙痒,其原因是

- A. 尿素刺激
- B. 肌酐增高
- C. 血钾增高
- D. 尿酸刺激
- E. 弥漫水肿

(86~87题共用题干)

患儿,男,2岁。因发热、头痛半天入院。查体:患儿精神差,有恶心、呕吐现象。脑脊液检查:压力高,外观混浊,WBC升高,以中性粒细胞为主,蛋白升高,糖和氯化物下降。

86. 入院时最有可能的诊断是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 病毒性脑膜炎
- C. 病毒性脑炎

D. 急性多发性神经根炎

E. 败血症

87. 上述疾病的主要致病菌是

A. 肺炎链球菌

B. 柯萨奇病毒

C. 结核分枝杆菌

D. 腮腺炎病毒

E. 肺炎支原体

(88~89 题共用题干)

患者,男性,42岁。酗酒后出现上腹部疼痛伴恶心呕吐,病后6小时来诊。查体:全腹肌紧张,压痛及反跳痛。血压80/50mmHg;腹腔穿刺抽出淡粉色液体,白细胞 $18.4 \times 10^9/L$ ($18400/mm^3$),血清淀粉酶

256U(温氏),诊断为急性胰腺炎。

88. 其发病因素是

A. 暴饮暴食

B. 胆道梗阻

C. 精神因素

D. 胆汁逆流

E. 甲状旁腺功能亢进

89. 其发病的解剖基础是

A. 胰管与胆总管的血液供应相互有关

B. 胰管与胆总管同属迷走神经支配

C. 副胰管存在

D. 胰管与胆总管存在共同通道及开口

E. 奥迪括约肌存在

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(90~93 题共用备选答案)

A. 粘连性肠梗阻

B. 肠扭转

C. 肠套叠

D. 蛔虫性肠梗阻

E. 麻痹性肠梗阻

90. 果酱样便见于

91. 饱食后剧烈运动易引起

92. 驱虫不当易引起

93. 最易发生绞窄的是

(94~95 题共用备选答案)

A. 以革兰阴性杆菌为主

B. 以葡萄球菌为主

C. 以表皮葡萄球菌为主

D. 以病毒为主

E. 以混合菌为主

94. 新生儿败血症的病原菌是

95. 宫内导致的新生儿感染性肺炎的病原菌是

(96~97 题共用备选答案)

A. 结膜反射

B. 吞咽反射

C. 腹壁反射

D. 拥抱反射

E. 平衡反射

96. 出生时存在以后逐渐消失的反射是

97. 出生时不存在以后逐渐出现的反射是

(98~100 题共用备选答案)

A. 不超过30分钟

B. 1~2小时

C. 2~3小时

D. 6~8小时

E. 11~12小时

98. 正常经产妇在分娩过程中,第一产程所需时间约

99. 从胎儿娩出到胎盘娩出

100. 正常初产妇在分娩过程中,第二产程所需时间约

相关专业知识

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 2 型糖尿病最基本的治疗措施是
 - A. 适当运动
 - B. 控制肥胖
 - C. 控制饮食
 - D. 注射胰岛素
 - E. 口服降糖药
2. 诊断早期肺癌简单有效的检查方法是
 - A. 纤维支气管镜检查
 - B. 痰液脱落细胞学检查
 - C. X 线检查
 - D. 淋巴结活组织检查
 - E. 胸腔积液癌细胞学检查
3. 早期肺癌首选的治疗是
 - A. 放射治疗
 - B. 化学疗法
 - C. 对症治疗
 - D. 手术治疗
 - E. 中医治疗
4. 手术治疗胃十二指肠溃疡的适应证不包括
 - A. 经常反酸
 - B. 并发大出血
 - C. 合并幽门梗阻
 - D. 急性穿孔
 - E. 癌变
5. 确诊肺结核最特异的方法是
 - A. CT 检查
 - B. X 线检查
 - C. 纤维支气管镜检查
 - D. 痰结核菌检查
 - E. 结核菌素试验
6. 闭合性多根多处骨折患者首要的急救措施是
 - A. 镇静、止痛
 - B. 吸氧
 - C. 胸腔闭式引流
 - D. 应用抗生素
 - E. 局部加压包扎固定
7. 控制轻度支气管哮喘症状的首选药是
 - A. 氨茶碱
 - B. 沙丁胺醇
 - C. 泼尼松
 - D. 色甘酸钠
 - E. 异丙基阿托品
8. 确诊肿瘤最可靠的检查是
 - A. B 超
 - B. X 线
 - C. 病理学检查
 - D. 内镜
 - E. 核素扫描
9. 提示肝癌的实验指标是
 - A. 乳酸脱氢酶
 - B. 丙氨酸氨基转移酶
 - C. 三酰甘油
 - D. 甲胎蛋白
 - E. 磷酸酶
10. 肛瘘切除术后，患者每日需行温水坐浴和换药，合理的安排是
 - A. 清晨先换药
 - B. 先温水坐浴
 - C. 先大便，再换药，后坐浴
 - D. 先大便，再坐浴，后换药

- E. 先坐浴,再换药,后大便
11. 心跳呼吸骤停患儿首要的抢救措施是
- A. 口对口人工呼吸
B. 胸外心脏按压
C. 清理呼吸道
D. 注射复苏药物
E. 电除颤
12. 早期判断心跳、呼吸骤停的主要依据是
- A. 心跳、呼吸停止
B. 瞳孔对光反射消失
C. 心电图呈一直线
D. 意识丧失伴大动脉搏动消失
E. 心音、脉搏消失,血压测不到
13. 皮肤有蜘蛛痣见于
- A. 肺炎
B. 再生障碍性贫血
C. 缺铁性贫血
D. 严重肝硬化
E. 肾盂肾炎
14. 治疗休克的基本措施是
- A. 治疗原发病
B. 补充血容量
C. 应用血管活性药物
D. 纠正代谢紊乱
E. 增强心功能
15. 对开放性损伤患者进行清创术,一般不得超过伤后的
- A. 1~2 小时
B. 2~4 小时
C. 4~6 小时
D. 6~8 小时
E. 8~12 小时
16. 正常情况下,产妇会阴侧切切口拆线的时间为产后
- A. 1~2 天
B. 2~3 天
C. 3~5 天
D. 5~6 天
- E. 7~9 天
17. 诊断胃癌的最有效方法是
- A. 纤维胃镜
B. 磁共振
C. 大便潜血试验
D. 胃液分析
E. 幽门螺杆菌检测
18. 卵巢良性肿瘤的治疗原则为
- A. 化学治疗
B. 放射治疗
C. 手术治疗
D. 中药治疗
E. 饮食治疗
19. 下列属于肾功能监测的指标是
- A. 血尿素氮
B. 黄疸指数
C. 中心静脉压
D. 凝血酶原时间
E. 3P 试验
20. 治疗破伤风的中心环节是
- A. 清除毒素来源
B. 中和游离毒素
C. 控制痉挛
D. 预防并发症
E. 加强营养
21. 治疗系统性红斑狼疮的首选药物是
- A. 氯丙嗪
B. 磷酸氯喹
C. 泼尼松
D. 胍苯达嗪
E. 普鲁卡因胺
22. 关于急腹症患者的处理措施,错误的是
- A. 禁饮食
B. 应用抗生素抗感染
C. 便秘者行低压灌肠
D. 禁用吗啡止痛
E. 及时纠正体液失衡
23. 风湿热的主要表现不包括

- A. 心脏炎
 - B. 环形红斑
 - C. 舞蹈病
 - D. 腹泻
 - E. 多发性关节炎
24. 对血液病的诊断,最有价值的实验室检查方法是
- A. CT
 - B. B型超声
 - C. X线检查
 - D. 骨髓检查
 - E. 肝功能检查
25. 洋地黄中毒的主要表现不包括
- A. 恶心、呕吐
 - B. 黄视或绿视
 - C. 水肿、蛋白尿
 - D. 视力模糊
 - E. 室性期前收缩
26. 肾结核患者手术前抗结核治疗一般不
少于
- A. 3天
 - B. 5天
 - C. 7天
 - D. 10天
 - E. 14天
27. 因胎盘胎膜残留致子宫复旧不全的产妇,首要的治疗措施是
- A. 应用宫缩剂
 - B. 应用抗生素
 - C. 切除子宫
 - D. 行刮宫术
 - E. 应用止血药
28. 对实体肿瘤最有效的治疗方法是
- A. 手术切除
 - B. 放射治疗
 - C. 化学治疗
 - D. 内分泌治疗
 - E. 中医治疗
29. 癫痫患者首选的检查是
- A. MRI
 - B. CT
 - C. B超
 - D. X线
 - E. 脑电图检查
30. 下列哪种流产在处理前应做凝血试验
- A. 稽留流产
 - B. 先兆流产
 - C. 完全流产
 - D. 习惯性流产
 - E. 不完全流产
31. 乳癌淋巴转移的最常见部位
- A. 腋窝
 - B. 锁骨下
 - C. 锁骨上
 - D. 胸骨旁
 - E. 肺
32. 逆行肾盂造影的禁忌证为
- A. 妊娠
 - B. 严重肾功能损害
 - C. 急性尿路感染
 - D. 血尿
 - E. 少尿无尿
33. 病毒性心肌炎患者急性期最重要的治疗是
- A. 抗心律失常
 - B. 绝对卧床休息
 - C. 静滴大剂量维生素C
 - D. 静滴复方丹参
 - E. 营养心肌
34. 治疗心绞痛作用最快、最有效的药物是
- A. 吗啡
 - B. 哌替啶
 - C. 硝酸甘油
 - D. 阿司匹林
 - E. 硝苯地平
35. 轻度溃疡性结肠炎药物治疗首选

- A. 口服抗生素
B. 柳氮磺胺吡啶
C. 乳酸杆菌制剂
D. 糖皮质激素
E. 硫唑嘌呤
36. 下列哪种药物可用于肝性脑病患者的镇静
A. 哌替啶
B. 水合氯醛
C. 地西泮
D. 吗啡
E. 副醛
37. 确诊急性胰腺炎最有意义的检查是
A. 甲胎蛋白
B. B超
C. 血淀粉酶
D. CT
E. 碱性磷酸酶
38. 目前诊断小肝癌的最佳方法是
A. AFP
B. B超
C. 肝穿刺活检
D. CT
E. X线肝血管造影
39. 因子宫收缩乏力引起的产后出血, 首选的止血措施为
A. 按摩子宫
B. 应用止血药
C. 无菌纱布条填塞宫腔
D. 结扎盆腔血管止血
E. 切除子宫
40. 妊娠期糖尿病的诊断标准正确的是
A. 葡萄糖耐量试验结果 1 项异常
B. 葡萄糖耐量试验结果 2 项异常
C. 1 次空腹血糖 $>5.8\text{mmol/L}$
D. 1 次空腹血糖 $>11.1\text{mmol/L}$
E. 尿糖阳性
41. 冠心病外科治疗必须进行的辅助检查是
A. 心脏 CT
B. 选择性冠状动脉造影
C. 心导管检查
D. 心脏彩色 B 超
E. 心血管造影
42. 输尿管结石绞痛发作时最重要的处理方法是
A. 大量饮水
B. 应用抗生素
C. 解痉止痛
D. 立即手术
E. 跳跃运动
43. 对慢性肾衰竭患者的饮食指导, 错误的是
A. 优质蛋白质饮食
B. 清淡易消化
C. 足够的维生素
D. 高磷低钙饮食
E. 高热量饮食
44. 腹膜炎患者手术的目的不包括
A. 充分引流
B. 探查和确定病因
C. 处理原发病灶
D. 彻底清理腹腔
E. 缓解疼痛
45. 重度甲亢的基础代谢率是
A. $+10\%$ 以下
B. $+10\% \sim +20\%$
C. $+20\% \sim +30\%$
D. $+30\% \sim +60\%$
E. $+60\%$ 以上
46. 手术患者手术区皮肤消毒范围为切口周围至少多少以内
A. 5cm
B. 10cm
C. 15cm
D. 20cm