

金匱玉函經



NLIC 2970657767

金匱玉函經卷第二

辨太陽病形證治下第四



問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛其脉寸口浮關上自沉爲結胃

問曰何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時小便不利陽脉浮關上細沉而緊爲藏結舌上白胎滑者爲難治

藏結者無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其

人反靜舌上胎滑者不可攻也

夫病發於陽而反下之熱入因作結胸發于陰而反下之因作痞結胸者下之早故令結胸

結胸者其項亦強如柔痙狀下之卽和宜大陷

胸圓

結胸證其脉浮大不可下下之卽死

結胸證悉具而躁者死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則

爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者其表未解也醫反下之動數變遲頭痛則眩胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊懣陽氣內陷心下因堅則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出其餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃

惡寒者頭痛未止其脈沉而緊

傷寒六七日結胸熱實其脈浮緊心下痛按之

如石堅大陷胸湯主之

針卦來寒蒸當與大柴

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱當與大柴胡湯但結胸無大熱此爲水結在胸脇頭微汗出大陷胸湯主之

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近大陷胸湯主之

小結胸者正在心下按之卽痛其脉浮滑小陷胸湯主之



太陽病二三日不能臥但欲起者心下必結其  
脉微弱者此本寒也而反下之利止者必結胸  
未止者四五日復重下之此挾熱利也

太陽病下之其脉促不結胸者此爲欲解其脉  
浮者必結胸其脉緊者必咽痛其脉弦者必兩  
脅拘急其脉細而數者頭痛未止其脉沉而緊  
者必欲嘔其脉沉而滑者挾熱利其脉浮而滑  
者必下血

病在陽當以汗解而反以水溼之若灌之其熱  
被劫不得去益煩皮上粟起意欲飲水反不渴  
服文蛤散若不差與五苓散若寒實結胸無熱  
證者與三物小白散

太陽與少陽併病頭項強痛或眩時如結胸心  
下痞而堅當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可  
發汗發汗卽譫語譫語則脉弦譫語五六日不  
止當刺期門

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱  
除而脉遲身涼胸脅下滿如結胸狀其人讖語  
此爲熱入血室當刺期門隨其虛實而取之汗  
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適  
斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發

作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讖語  
如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二



焦必當自愈

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此爲未解也柴胡桂枝乾姜湯主之

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便堅其脈細此爲陽微結必有表復

有裏沉亦爲病在裏汗出爲陽微假令純陰結  
不得有外證悉入在于裏此爲半在外半在裏  
脉雖沉緊不得爲少陰所以然者陰不得有汗  
今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不  
了了者得尿而解

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥  
下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖以下之  
不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下

滿而堅痛者此爲結胸大陷胸湯主之若但滿而不痛者此爲痞柴胡不復中與也半夏瀉心湯主之

太陽少陽併病而反下之結胸心下堅利復不止水漿不肯下其人必心煩

脉浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人藪藪

汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引脅下痛嘔  
卽短氣此爲表解裏未和十棗湯主之  
太陽病醫發其汗遂發熱惡寒復下之則心下  
痞表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒  
鍼因胸煩面色青黃膚瞶如此者爲難治今色

微黃手足溫者易愈

心下痞按之濡其脉關上自浮大黃黃連瀉心

湯主之



若心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之  
本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴  
而口燥煩小便不利者五苓散主之一方云忍  
之一日乃愈

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食  
臭脅下有水氣腹中雷鳴而利生姜瀉心湯主  
之

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不



化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不得安  
醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非  
結熱但胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心  
湯主之

傷寒服湯藥下利不止心下痞堅服瀉心湯已  
復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚  
理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯  
主之若不止者當利其小便

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞  
堅脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而  
成痿

傷寒汗出若吐若下解後心下痞堅噫氣不除  
者旋覆代赭石湯主之

太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止  
心下痞堅表裏不解者桂枝人參湯主之

大下以後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大

熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解

也不可攻痞當先解表解乃可攻其痞解表宜

桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

傷寒發熱汗出不解心下痞堅嘔吐下利者大

柴胡湯主之

病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞

堅氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐

之宜瓜蒂散

病者若脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰  
俠陰筋者此爲藏結死

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏  
俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數  
升者白虎加人參湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎  
湯渴欲飲水無表證者白虎湯主之