

全国卫生专业技术资格考试丛书

2011

儿科学主治医师考试 习题集

童笑梅 常艳美 主编

免费赠送40元
网上学习费用

- 专家题库，全面仿真考试
- 透析命题规律，提高应试技巧



北京大学医学出版社

2011 儿科学主治医师资格考试习题集

2011

儿科学主治医师资格考试 习题集

主编 王卫平 副主编 王卫平 王卫平



人民卫生出版社
北京

ISBN 978-7-117-13888-8

全国卫生专业技术资格考试丛书

儿科学主治医师考试习题集

主编 童笑梅 常艳美

编者 (以姓氏拼音为序)

鲍慧玲	常艳美	韩彤妍	李在玲
刘东明	鲁珊	朴梅花	汤亚南
童笑梅	王雪梅	魏玲	魏红玲
周薇			

北京大学医学出版社

Erkexue Zhuzhiyishi Kaoshi Xitiji

图书在版编目 (CIP) 数据

儿科学主治医师考试习题集/童笑梅, 常艳美主编.
—北京: 北京大学医学出版社, 2010. 10
ISBN 978-7-5659-0036-5

I. ①儿… II. ①童… ②常… III. ①儿科学—医药
卫生人员—资格考核—习题 IV. ①R72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 192236 号

儿科学主治医师考试习题集

主 编: 童笑梅 常艳美

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 曹 霞 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 19.5 字数: 496 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1-3000 册

标准书号: ISBN 978-7-5659-0036-5

定 价: 37.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版前言

从2001年开始，全国卫生专业技术资格考试正式实施，中、初级专业技术资格逐步实行以考代评。考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，北京大学医学出版社组织了北京大学医学部专家编写了本套《全国卫生专业技术资格考试丛书》。

《儿科学主治医师考试习题集》为本套丛书中的一本，定位于想要参加儿科学主治医师考试的考生。本书由北京大学医学部专家组根据2011年最新考试大纲精心编写，以题库的形式涵盖了大纲所要求的各个考点，重点突出，考题严谨，实战性强，对广大考生顺利通过考试有很好的辅导作用。

从2007年开始，儿科学主治医师考试实行人机对话考试。人机对话是借助计算机及网络技术对考试进行实施、管理的一种测试形式，考试题型均为客观选择题。其中，“专业知识”科目涉及的考试题型包括单选题，共100题；“专业实践能力”科目的考试则将全部采用一种新的题型——案例分析题，共12~15道，每道案例分析题至少3问，平均5~6问，每问的备选答案至少6个，最多12个。在本书的最后一个部分“综合案例分析题”中有对该类型考题的全真模拟，考生可认真学习。

虽然与传统笔试方式相比，人机对话的考试形式有很大的变化，但其测试目标仍然是考生的专业知识掌握情况和实际应用能力，而非考生的计算机知识或操作能力。对于考生而言，只要扎实地掌握大纲所要求的各个考点，必能顺利通过考试。

编者

题型介绍

全国卫生专业技术资格考试的试题均采用客观选择题形式，目前题型分为 A1/A2 型选择题，A3/A4 型选择题，B 型选择题和综合案例分析题。

一、A1/A2 型选择题

由一个题干和五个备选答案组成，题干在前，选项在后，选项 A、B、C、D、E 中只有一个是正确答案，其余均为干扰答案。干扰答案可以部分正确或者完全不正确，考生在回答本题型时需要对备选答案进行比较，找出最佳的或最恰当的备选答案，排除似是而非的答案。

例如：1 岁时小儿的体重约为出生体重的

- A. 2 倍
- B. 3 倍
- C. 4 倍

D. 5 倍

E. 6 倍

正确答案：B

二、A3/A4 型题

以叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景，提出 2~6 个相互独立的问题，问题可随病情的逐步发展增加部分新信息，每个问题只有一个正确答案，以考察临床综合能力。答题过程是不可逆的，即进入下一问后不能再返回修改所有前面的答案。

例如：(1~3 题共用题干)

12 个月男婴，腹泻呕吐 5 天，大便每天 10 余次，稀水样，呕吐每天 6~7 次，12 小时无尿。体检精神萎靡，呼吸深长，皮肤弹性差，四肢凉，发绀，脉细弱，血钠 125mmol/L，CO₂CP 10mmol/L。

1. 该患儿符合哪项诊断？

- A. 等渗性重度脱水，重度酸中毒
- B. 低渗性重度脱水，重度酸中毒
- C. 低渗性中度脱水，中度酸中毒
- D. 等渗性重度脱水，中度酸中毒
- E. 低渗性重度脱水，中度酸中毒

正确答案：E

2. 入院后补充累积损失，以哪种液体及液量最正确？

- A. 50~75ml/kg，1/2 张含钠液体
- B. 80~100ml/kg，2/3 张含钠液体
- C. 100~120ml/kg，1/2 张含钠液体
- D. 100~120ml/kg，2/3 张含钠液体
- E. 80~120ml/kg，1/2 张含钠液体

正确答案：D

3. 补液纠正后应注意哪些情况，除了下列哪个选项之外？

- A. 补充含钾液
- B. 补充钙剂
- C. 增加饮食
- D. 预防迁延性腹泻
- E. 补充维生素 D

正确答案：C

三、B型题

由2~3个题干和5个备选答案组成，选项在前，题干在后。一组题干共用上述5个备选答案，且每个题干对应一个正确的备选答案，备选答案可以重复选择或者不选。

例如：(1~5题共用题干)

- A. 麻疹疫苗
- B. 脊髓灰质炎疫苗
- C. 卡介苗
- D. 百白破混合疫苗
- E. 乙肝疫苗

- 1. 生后2个月内接种
- 2. 生后2个月到4个月接种
- 3. 3~6个月小儿接种
- 4. 8个月以上小儿接种
- 5. 初次出生时接种

正确答案：1. C 2. B 3. D 4. A 5. E

四、综合案例分析题

案例分析题是一种模拟临床情景的串型不定项选择题。试题由一个病例和多个问题组成，每道案例分析题至少3问，平均5~6问，每问的备选答案至少6个，最多12个，正确答案及错误答案的个数不定(≥1)。考生每选对一个正确答案给1个得分点，选错一个扣一个得分点，直到本题不得分。案例分析题的答题过程是不可逆的，即进入下一问后不能再返回修改所有前面的答案。

例如：

男孩9岁，低热，酱油色尿1个月。体检：巩膜黄染，贫血面容，肝脾不大，血红蛋白73g/L，血小板 $100 \times 10^9/L$ ，白细胞 $4.4 \times 10^9/L$ ，网织红细胞计数0.15，尿隐血阴性。

提问1：最可能的诊断是

- A. 急性早幼粒细胞白血病伴DIC
- B. 急性红白血病
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 缺铁性贫血
- E. 慢性感染性贫血
- F. 骨髓增生异常综合征

正确答案：C

提问2：为明确诊断应做哪项检查

- A. 血红蛋白电泳
- B. 骨髓检查
- C. Coombs试验
- D. 外周血涂片观察红细胞形态
- E. Ham试验

F. G-6-PD活性测定

正确答案：E

提问3：如需治疗，可做哪项治疗

- A. 洗涤红细胞悬液
- B. 输注全血
- C. 皮质激素短期应用
- D. 维生素E
- E. 雄激素
- F. 补铁剂

正确答案：ACDE

提问4：除以上治疗外还可进行的治疗为

- A. 同种异基因骨髓移植
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 干细胞移植
- E. 放血疗法
- F. 血浆置换

正确答案：AD

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 儿科基础和保健	(4)
第三章 症状与体征	(17)
第四章 新生儿与新生儿疾病	(32)
第五章 营养性疾病	(50)
第六章 消化系统疾病	(64)
第七章 呼吸系统疾病	(77)
第八章 循环系统疾病	(92)
第九章 造血系统疾病	(106)
第十章 泌尿系统疾病	(127)
第十一章 神经系统疾病	(149)
第十二章 心理及行为障碍	(164)
第十三章 风湿性疾病	(168)
第十四章 内分泌系统疾病	(182)
第十五章 遗传性和代谢性疾病	(201)
第十六章 小儿结核病	(213)
第十七章 感染性疾病	(226)
第十八章 免疫缺陷性疾病	(255)
第十九章 变态反应性疾病	(266)
第二十章 儿科急救	(272)
综合案例分析题	(284)

第一章 绪 论

一、A1/A2 型题

1. 婴儿期的年龄范围是指
 - A. 从出生到满 1 岁以前
 - B. 从满月到满 1 岁以前
 - C. 从出生后 7 天到满 1 岁以前
 - D. 从出生到满 2 岁以前
 - E. 从出生到满 1 岁半以前
2. 男孩一般青春期的年龄范围是指
 - A. 11~12 岁到 17~18 岁
 - B. 12~13 岁到 18~20 岁
 - C. 12~13 岁到 20~22 岁
 - D. 13~14 岁到 18~20 岁
 - E. 13~14 岁到 20~22 岁
3. 女孩一般青春期的年龄范围是指
 - A. 10~11 岁到 17~18 岁
 - B. 11~12 岁到 17~18 岁
 - C. 11~12 岁到 18~20 岁
 - D. 12~13 岁到 18~20 岁
 - E. 13~14 岁到 19~20 岁
4. 以下哪一阶段是小儿出生后生长发育最快的阶段
 - A. 新生儿期
 - B. 学龄前期
 - C. 青春期
 - D. 婴儿期
 - E. 学龄期
5. 从受精卵形成到小儿出生前称为
 - A. 胎儿期
 - B. 围生期
 - C. 新生儿期
 - D. 胚胎期
 - E. 妊娠晚期
6. 以下关于围生期的描述哪项是错误的
 - A. 包括妊娠早期
 - B. 包括妊娠晚期
 - C. 包括分娩过程
 - D. 包括新生儿早期
 - E. 是小儿生命最脆弱的时期
7. 以下哪项是正确的
 - A. 怀胎最初 12 周为胚胎期
 - B. 从产后脐带结扎到产后 1 个月内为新生儿期
 - C. 小儿生长发育最快的时期是幼儿期
 - D. 围生期是指胎龄满 20 周至产后 7 天
 - E. 人类胎儿期一般历时 280 天
8. Tanner 将青春期外生殖器和性征的发育分成
 - A. 5 期
 - B. 4 期
 - C. 3 期
 - D. 2 期
 - E. 以上都不是
9. 体格发育的第 2 个高峰期是在
 - A. 婴儿期
 - B. 幼儿期
 - C. 学龄前期
 - D. 新生儿期
 - E. 青春期
10. 新生儿期的特点是
 - A. 对外界环境适应能力强
 - B. 发病率低
 - C. 死亡率高
 - D. 体温维持较稳定
 - E. 以上都不是
11. 婴儿期的特点应除外
 - A. 生长发育速度最快
 - B. 易发生各种传染病
 - C. 平均每千克体重需要摄入较高的热量和营养, 尤其是蛋白质

- D. 易患营养不良及消化系统紊乱疾病
E. 易发生中毒或创伤等意外
12. 幼儿期的特点是
- 体格发育最快
 - 语言思维和应人、应物的能力增强
 - 识别危险的能力强
 - 自身免疫力增强, 传染病发生率低
 - 不易发生营养缺乏和消化紊乱
13. 婴儿期易发生营养不良和消化系统紊乱, 其主要的原因是
- 来自母体的抗体浓度下降
 - 自身的体液免疫功能尚未成熟
 - 各种维生素储备不足
 - 白细胞吞噬功能不足
 - 消化系统难以适应对大量食物的消化吸收
14. 青春期生长发育最大特点是
- 体格生长减慢
 - 生殖系统迅速发育并趋成熟
 - 内分泌调节稳定
 - 神经系统发育成熟
 - 淋巴系统发育高峰

二、A3/A4 型题

(15~17 题共用题干)

女婴, 其母孕 39⁺₅ 周时剖宫产, 出生体重 3 850g, 生后 48 小时。

15. 关于其年龄分期说法错误的是
- 新生儿早期
 - 新生儿期
 - 围生期
 - 婴儿期
 - 胚胎晚期
16. 有关此年龄阶段小儿特点错误的是
- 发病率高
 - 生长发育迅速
 - 对外界适应能力差
 - 生理调节能力强
 - 是小儿生命变化巨大的时期
17. 护理该小儿最重要的时期为

- 生后第 1 周
- 生后第 2 周
- 生后第 3 周
- 生后第 4 周
- 生后 28 天

三、B 型题

(18~21 题共用备选答案)

- 胎儿期
 - 新生儿期
 - 婴儿期
 - 幼儿期
 - 学龄前期
18. 从 1 周岁到满 3 周岁之前为
19. 从出生到满 28 天为
20. 从出生到满 1 周岁以前为
21. 从 3 周岁到 6~7 岁为

(22~25 题共用备选答案)

- 从形成受精卵到孕 12 周
 - 从出生到生后 7 天
 - 从胎龄满 28 周到婴儿出生
 - 从胎龄第 13 周到出生
 - 从胎龄满 28 周到生后 7 天
22. 围生期是指
23. 妊娠早期是指
24. 妊娠晚期是指
25. 新生儿早期是指

(26~30 题共用备选答案)

- 易患各种感染和传染性疾病
 - 易发生意外伤害事故
 - 发病率高, 死亡率也高
 - 除生殖系统外, 各系统器官外形已接近成人
 - 易出现神经内分泌调节不稳定
26. 新生儿期
27. 婴儿期
28. 学龄期
29. 青春期
30. 幼儿期

参 考 答 案**一、A1/A2 型题**

1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. A 7. E 8. A
9. E 10. C 11. E 12. B 13. E 14. B

二、A3/A4 型题

15. E 16. D 17. A

三、B 型题

18. D 19. B 20. C 21. E 22. E 23. A 24. C 25. B
26. C 27. A 28. D 29. E 30. B

第二章 儿科基础和保健

一、A1/A2 型题

1. 下述哪项关于小儿生长发育的说法是**错误**的
 - A. 生长发育是连续的过程，各器官发育不平衡
 - B. 各系统的发育遵循一定的规律
 - C. 生长发育存在个体差异
 - D. 不同年龄段生长速度不同
 - E. 淋巴系统的发育在学龄前期之前达高峰
2. 关于小儿骨骼发育**正确**的是
 - A. 前囟最晚闭合的年龄为 16 个月
 - B. 后囟一般闭合的年龄在生后 2 周
 - C. 颅缝一般闭合的年龄为 1 个月
 - D. 腕部骨化中心出现的年龄为 1 岁半
 - E. 上下部量相等的年龄为 12 岁
3. 关于小儿机体发育所遵循的规律**正确**的是
 - A. 是一个连续匀速的过程
 - B. 年龄越大发育越快
 - C. 婴儿期发育最快
 - D. 各系统发育快慢一致
 - E. 体格生长的个体差异随年龄增长而逐渐减小
4. 关于生长发育的一般规律**正确**的描述是
 - A. 由下到上
 - B. 由远到近
 - C. 先会用手指抓握，而后能用全掌抓握
 - D. 先会表达，后能理解
 - E. 先学会感觉事物，后发展到记忆
5. 1 岁时小儿的体重约为出生体重的
 - A. 2 倍
 - B. 3 倍
 - C. 4 倍
 - D. 5 倍
 - E. 6 倍
6. 2 岁至青春前期体重年增长值约为
 - A. 0.5kg
 - B. 0.8kg
 - C. 1kg
 - D. 2kg
 - E. 3kg
7. 关于小儿身高的描述，哪项是**错误**的
 - A. 身高是指头顶到足底的全身长度
 - B. 立位与卧位的测量值相差约 1~2cm
 - C. 身高包括头、脊柱和下肢等部分，各部分增长的速度不是一致的
 - D. 2 岁以后身高增长每年小于 7cm，为生长速度下降
 - E. 3 岁以下应仰卧位测量，称为身长
8. 下列哪项描述坐高是**错误**的
 - A. 头顶至耻骨联合下缘的距离
 - B. 其意义和上部量相同
 - C. 代表脊柱和头颅的发育
 - D. 3 岁以下称顶臀长
 - E. 随着年龄的增加所占身高的比例下降
9. 关于头围，哪项是**错误**的
 - A. 与颅脑的发育关系密切
 - B. 测量自眉弓上方最突出处经枕后结节绕头 1 周
 - C. 增长快提示脑发育好
 - D. 在 2 岁以内测量最有价值
 - E. 小于 X-2SD 常提示脑发育不良
10. 人体各系统中发育最早的系统是
 - A. 生殖系统
 - B. 淋巴系统
 - C. 消化系统
 - D. 呼吸系统
 - E. 神经系统
11. 人体各系统中发育最晚的系统是

- A. 生殖系统
B. 淋巴系统
C. 消化系统
D. 呼吸系统
E. 神经系统
12. 颅骨的发育中下述哪项是正确的
A. 面部骨骼发育较颅骨早
B. 后囟在出生后 2~3 个月时闭合
C. 前囟闭合时间最迟为生后 1 岁
D. 出生时前囟对边中点连线 1~2cm, 出生后应逐渐变小
E. 颅缝闭合时间为生后 3~4 周
13. 关于脊柱的发育, 下述哪项不正确
A. 3 个月左右抬头时出现颈椎前凸
B. 1 岁以内四肢增长快于脊柱
C. 6 个月后会坐时出现胸椎后凸
D. 开始行走时出现腰椎前凸
E. 脊椎 3 个自然弯曲至生后 6~7 岁被韧带固定
14. 关于小儿神经系统发育, 下述哪项是错误的
A. 神经纤维髓鞘化大约在 4 岁时才完成
B. 3~4 个月前小儿 Kerning 征可为阳性
C. 2 岁以下小儿 Barbinski 征可为阳性
D. 脊髓下端在胎儿时位于第 2 腰椎下缘, 4 岁时上移至第 1 腰椎
E. 新生儿和婴儿腹壁反射和提睾反射易引出
15. 牙齿的发育以下哪项是错误的
A. 最晚生后 12 个月出牙
B. 2 岁以内出牙数=月龄-6
C. 6 岁萌出第 1 磨牙
D. 一生有两副牙齿
E. 恒牙在骨化在婴儿期开始
16. 前囟的正确测量方法是
A. 对角顶连线
B. 对边中点连线
C. 邻边中点连线
D. 邻角顶连线
E. 周径长度
17. 正常小儿, 前囟闭合的年龄是
A. 6~8 周
B. 3~4 个月
C. 7~10 个月
D. 1~1.5 岁
E. 2~2.5 岁
18. 前囟检查在儿科很重要, 以下哪项是错误的
A. 测定前囟对角线长度
B. 出生时前囟对边中点连线长度约 1.5~2cm
C. 6 个月开始缩小
D. 1 岁半前闭合
E. 前囟饱满表示颅内压升高
19. 健康小儿的头围与胸围的关系中, 以下哪项是错误的
A. 出生时头围大于胸围
B. 2 岁时胸围等于头围
C. 出生时平均胸围 32cm
D. 头围与胸围的交叉时间反映了营养与胸廓的发育程度
E. 2 岁时头围 48cm, 胸围 50cm
20. 握持反射何时消失
A. 满月时
B. 1~2 个月
C. 3~4 个月
D. 8~10 个月
E. 10~12 个月
21. 正常新生儿平均出生身长是
A. 46 厘米
B. 47 厘米
C. 48 厘米
D. 49 厘米
E. 50 厘米
22. 生后第一年身长一般可增加
A. 20 厘米
B. 23 厘米
C. 25 厘米
D. 27 厘米

- E. 30 厘米
23. 2~12 岁平均每年身高增加
- A. 1~3 厘米
B. 3~5 厘米
C. 6~7 厘米
D. 7~9 厘米
E. 9~10 厘米
24. 女孩进入青春期平均较男孩约
- A. 早 2 年
B. 早 1 年
C. 相同年龄
D. 晚 1 年
E. 晚 2 年
25. 身体上、下部量相等的年龄是
- A. 10 岁
B. 11 岁
C. 12 岁
D. 13 岁
E. 14 岁
26. 正常人的指距值是
- A. 略小于身高值
B. 等于身高值
C. 略大于身高值
D. 明显小于身高值
E. 明显大于身高值
27. 1 岁小儿标准体重、身长是
- A. 7kg 65cm
B. 8kg 70cm
C. 10kg 75cm
D. 10kg 80cm
E. 11kg 85cm
28. 2 岁男孩标准体重、身长是
- A. 9kg 70cm
B. 10kg 80cm
C. 11kg 85cm
D. 12kg 87cm
E. 13kg 90cm
29. 5 岁小儿标准身高是
- A. 100cm
B. 105cm
C. 110cm
D. 115cm
E. 120cm
30. 有关下部量说法错误的是
- A. 自耻骨联合上缘至脚底的高度
B. 主要反映的是下肢长骨的生长
C. 儿童期占身高的百分比随年龄增长而增长
D. 青春期后身长的增长以下部量为主
E. 12 岁时约与上部量相等
31. 正常 1~6 岁小儿体重的正常范围是
- A. 体重 (kg) = 年龄 × 2 + 7
B. 同年龄、同性别平均体重 ± 2SD 范围内
C. 同年龄、同性别平均体重 ± 3SD 范围内
D. 同年龄、同性别平均体重 ± 1SD 范围内
E. 体重 (kg) = 年龄 × 2 + 8
32. 12 个月小儿标准头围是
- A. 34cm
B. 38cm
C. 42cm
D. 44cm
E. 46cm
33. 1 岁半小儿, 乳牙数应为
- A. 8~10 颗
B. 10~12 颗
C. 12~14 颗
D. 14~16 颗
E. 16~18 颗
34. 开始出第一颗恒牙的年龄是
- A. 5 岁左右
B. 6 岁左右
C. 7 岁左右
D. 8 岁左右
E. 9 岁左右
35. 乳牙出齐的最晚年龄是
- A. 1 岁
B. 1.5 岁

- C. 2岁
D. 2.5岁
E. 3岁
36. 3岁小儿,腕部骨化中心的数目约为
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
E. 6个
37. 下部量特别短见于
A. 营养不良
B. 垂体侏儒症
C. 生殖腺功能不全
D. 先天性甲状腺功能减低症
E. 佝偻病
38. 骨龄超前见于
A. 生长激素缺乏症
B. 甲状腺功能减退症
C. 肾小管酸中毒
D. 先天性肾上腺皮质增生症
E. 佝偻病
39. 下部量过长或指距远大于身长见于
A. 软骨发育不良
B. 垂体侏儒症
C. 生殖腺功能不全
D. 先天性甲状腺功能减低症
E. 佝偻病
40. 对于1岁半小儿,下列哪项描述是错误的
A. 会指自己的眼和手
B. 会弯腰拾东西
C. 能说自己的名字
D. 能表示大小便
E. 能说短歌谣
41. 婴儿期计划免疫,下列哪项是正确的
A. 2个月开始服脊髓灰质炎疫苗
B. 2~3个月接种卡介苗
C. 4~5个月注射麻疹疫苗
D. 6~8个月注射白百破疫苗
E. 8~10个月注射乙型脑炎疫苗
42. 我国卫生部规定,下列疫苗中婴儿期必须完成接种的是
A. 卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破、麻疹疫苗、乙肝疫苗
B. 卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破、麻疹疫苗、流脑疫苗
C. 卡介苗、腮腺炎疫苗、麻疹疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗
D. 卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破、乙肝疫苗、流感疫苗
E. 卡介苗、百白破、麻疹疫苗、甲肝疫苗、风疹疫苗
43. 按照类毒素、灭活疫苗、减毒活疫苗的顺序,正确排列的一组是
A. 白喉、破伤风、麻疹
B. 破伤风、麻疹、脊髓灰质炎
C. 白喉、乙脑、卡介苗
D. 破伤风、流脑、白喉
E. 百日咳、麻疹、流脑
44. 百白破的组成下列哪项是对的
A. 破伤风类毒素、白喉类毒素、百日咳杆菌菌液
B. 破伤风灭毒活疫苗、白喉类毒素、百日咳杆菌外毒素
C. 白喉杆菌菌液、破伤风类毒素、百日咳杆菌菌液
D. 白喉减毒活疫苗、破伤风减毒活疫苗、百日咳减毒活疫苗
E. 白喉减毒活疫苗、破伤风减毒活疫苗、百日咳杆菌毒素
45. 乙型肝炎疫苗接种的程序是
A. 出生24小时内,1月龄、6月龄
B. 1月龄、2月龄、6月龄
C. 1月龄、2月龄、3月龄
D. 出生24小时内,1月龄、2月龄
E. 1月龄、2月龄、5月龄
46. 脊髓灰质炎糖丸疫苗的正确服用方法为
A. 热水送服
B. 母乳送服
C. 可与食物一起服用

- D. 凉开水送服
E. 冷饮送服
47. 关于疫苗的接种方式不包括
- A. 口服
B. 肌肉注射
C. 静脉注射
D. 皮内注射
E. 皮下注射
48. 儿童保健应从何时做起
- A. 父母婚前做起
B. 妊娠期做起
C. 围生期做起
D. 新生儿期做起
E. 婴儿期做起
49. 围生期保健重点是
- A. 母乳喂养, 合理添加辅食
B. 进行生长发育系统监测
C. 完成基础计划免疫
D. 加强传染病防治, 预防意外
E. 产前诊断, 新生儿先天性代谢疾病筛查
50. 有关儿童保健哪项是对的
- A. 生后第一周的死亡率最低
B. 婴儿期需要有计划进行预防接种
C. 生后需足月后才进行预防接种
D. 婴儿死亡中有 1/2 发生在新生儿期
E. 幼儿期是性格形成的关键时期
51. 接种脊髓灰质炎三价混合疫苗, 下列哪项是不正确的
- A. 接种对象是 2 个月以上的正常小儿
B. 基础免疫需服用 3 次, 每次间隔一个月
C. 用热水将糖丸融化后服用
D. 4 岁时加强免疫一次
E. 接种后无特殊反应, 有时可有低热或轻度腹泻
52. 小儿血压的正常值 (mmHg) 应为
- A. 收缩压 = $80 + (\text{年龄} \times 2)$, 舒张压为收缩压的 2/3
B. 收缩压 = $80 + (\text{年龄} \times 2)$, 舒张压为收缩压的 1/2
C. 收缩压 = $70 + (\text{年龄} \times 2)$, 舒张压为收缩压的 2/3
D. 收缩压 = $70 + (\text{年龄} \times 2)$, 舒张压为收缩压的 1/2
E. 收缩压 = $90 + (\text{年龄} \times 2)$, 舒张压为收缩压的 1/2
53. 小儿药物治疗特点哪项是错误的
- A. 小儿对药物的反应因年龄而异
B. 小儿肝解毒功能不足
C. 小儿肾的排泄功能不足
D. 要考虑先天遗传因素
E. 药物在组织中的分布和成人一样
54. 中度脱水失水占体重
- A. 5% 以下
B. 5%~10%
C. 10%~15%
D. 15%~20%
E. >20%
55. 由 0.9% NaCl 60ml, 1.4% NaHCO₃ 10ml, 10% GS 140ml 配成的液体张力是
- A. 1/3 张
B. 1/2 张
C. 2/3 张
D. 等张
E. 1/4 张
56. 婴儿腹泻引起中度脱水, 当其性质不明时, 累积丢失量的补液可选用
- A. 1/4 张含钠溶液
B. 1/3 张含钠溶液
C. 2/3 张含钠溶液
D. 1/2 张含钠溶液
E. 4:3:2 溶液
57. 4:3:2 (2/3 张) 混合液的组成是
- A. 4 份 10% 葡萄糖, 3 份生理盐水, 2 份 1.4% 碳酸氢钠
B. 4 份 5% 葡萄糖, 3 份生理盐水, 2 份 5% 碳酸氢钠
C. 4 份生理盐水, 3 份 10% 葡萄糖, 2

- 份 5%碳酸氢钠
- D. 4 份生理盐水, 3 份 5%葡萄糖, 2 份 1.4%碳酸氢钠
- E. 4 份生理盐水, 3 份 5%葡萄糖, 2 份 11.2%碳酸氢钠
58. 应用口服补液时, 口服补液盐中所含葡萄糖的作用主要是
- A. 使口服液具有一定的渗透压
- B. 提供能量
- C. 增加小肠对钠、水的重吸收
- D. 利用渗透利尿作用排泄毒素
- E. 治疗酮症酸中毒
59. 纠正低钾血症, 下列原则哪项是错误的
- A. 见尿补钾
- B. 补钾浓度小于 0.3%
- C. 应适当补足钾盐
- D. 均应快速静脉补足钾盐
- E. 1 日补钾量应在 8 小时以上补入
60. 小儿腹泻易发生脱水的原因是
- A. 水代谢旺盛
- B. 血液中 IgM, IgA 较低
- C. 低丙种球蛋白血症
- D. 体表面积较大
- E. 消化酶较低
61. 下列哪项不是判断小儿脱水程度的指标
- A. 皮肤弹性
- B. 眼窝、前囟凹陷
- C. 末梢循环情况
- D. 血钠含量
- E. 尿量
62. 液体疗法中补充生理需要量使用的液体是
- A. 等张液体
- B. 1/2~2/3 张液体
- C. 1/5~1/4 张液体
- D. 无张力液体
- E. 高张液体
63. 下列哪种液体为 1/2 张液
- A. 2:1 含钠液
- B. 4:3:2 液
- C. 2:3:1 液
- D. 2:6:1 液
- E. 5%碳酸氢钠
64. 当补液纠正脱水与酸中毒时, 突然发生惊厥, 应首先考虑
- A. 低血糖
- B. 低血镁
- C. 低血钠
- D. 低血钙
- E. 碱中毒
65. 下列哪一种是不正确的小儿液体疗法
- A. 中度以下脱水可用口服补液
- B. 重度脱水需先快速扩容
- C. 维持补液阶段一般速度为 5ml/(kg·h)
- D. 营养不良伴腹泻患儿常用 1/3 张溶液, 速度宜稍快
- E. 轮状病毒肠炎引起的等渗性脱水, 常用 1/2 张溶液
66. 判断脱水性质的临床表现哪项是错误的
- A. 等渗性脱水常为轻、中度脱水表现
- B. 高渗性脱水出现口渴早且严重
- C. 低渗性脱水, 易出现血容量不足症状
- D. 高渗性脱水, 脱水症不明显
- E. 低渗性脱水, 皮肤黏膜极干燥
67. 除去下列哪一项以外, 均为低渗性脱水的特点
- A. 失钠大于失水
- B. 主要为细胞外液减少
- C. 黏膜干燥, 口渴剧烈
- D. 易出现休克表现
- E. 多发生于呕吐腹泻严重, 病程较长或营养不良儿
68. 低渗性脱水较高渗性脱水更易发生
- A. 休克
- B. 烦渴
- C. 高热
- D. 颅高压
- E. 惊厥
69. 静脉补钾, 哪项不正确
- A. 宜快、宜早