

张端和 马政旺 编著

新 编

耳鼻咽喉科实用试题集

XINBIAN ER BIYANHOUKE
SHIYONG SHITIJI

XINBIAN ER BIYANHOUKE
SHIYONG SHITIJI



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

新 编

耳鼻咽喉科实用试题集

张端和 马政旺 编著

暨南大学出版社
中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

新编耳鼻咽喉科实用试题集/张端和等编著. —广州:暨南大学出版社, 2002.8
ISBN 7-81079-146-X

I. 新… II. 张… III. 耳鼻咽喉科学—试题 IV. R76-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 048905 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学
电 话: 编辑部 (8620) 85228986 85226521 85226593
营销部 (8620) 85226712 85228291 85220602 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
邮 编: 510630
网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社照排中心
印 刷: 广东惠阳印刷厂

开 本: 787×1092 1/16
印 张: 9.25
字 数: 237 千
版 次: 2002 年 8 月第 1 版
印 次: 2002 年 8 月第 1 次
印 数: 1—5000 册

定 价: 30.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社营销部联系调换)

内 容 提 要

本书内容涵盖耳、鼻、咽、喉、气管、食管科等，集作者多年临床与教学经验于一体。书中内容注重贴近实际，覆盖面广，包括胚胎、解剖、生理、病理。题目简明扼要，易于理解，重点突出。答题内容丰富，富于挑战，激励思考。其评分标准客观，易于上机操作。在题目难度的选择上采用深入浅出、前后呼应的方法，适用于各层次医护人员学习、理解、记忆、掌握，使读者从精心选择的试题中获得有益的启示，丰富自身的专业理论和临床经验。

本书为医学院校师生及各科医师，尤其耳鼻咽喉科医师临床参考之首选。

作者简介

张端和 石河子医学院毕业，副主任医师。从事耳鼻咽喉科临床与教学 30 余年，发表论文 60 余篇。获科技进步成果奖 7 项，获国家专利 1 项，国家发明奖 1 项，获省级“优秀医学科技工作者”荣誉称号。

马政旺 副主任医师。从事耳鼻咽喉科临床 26 年，发表论文 30 余篇。获科技进步成果奖 4 项。

答 题 说 明

本多选题集分为 A 型题，B 型题，C 型题，K 型题四种。正确答案附在本书后。

A 型题：即单项选择题。每题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。其中只有一个正确答案；

B 型题：该题型为配伍选择题。A、B、C、D、E 五个备选答案在前，试题在后。试题共用以上五个备选答案，每题只能选出一个正确答案，若选两个或两个以上为错误。每个备选答案可被选用一次或一次以上，也可一次都不被选用；

C 型题：该题型为比较选择题。A、B、C、D 四个备选答案在前，试题在后。各试题共用这四个答案，每题只能选择一个正确答案；

K 型题：该题型为多项编码组合题。每试题下提供①、②、③、④共四个选用答案，又分为 A、B、C、D、E 五种答案：A 代表① + ② + ③；B 代表① + ③；C 代表② + ④；D 代表④；E 代表① + ② + ③ + ④。

目 录

第一部分 耳科多选题

A 型题 (1 ~ 299)	(1)
B 型题 (1 ~ 67)	(29)
C 型题 (1 ~ 20)	(32)
K 型题 (1 ~ 271)	(33)

第二部分 鼻科多选题

A 型题 (1 ~ 150)	(54)
B 型题 (1 ~ 71)	(68)
C 型题 (1 ~ 36)	(70)
K 型题 (1 ~ 99)	(72)

第三部分 咽科多选题

A 型题 (1 ~ 84)	(80)
B 型题 (1 ~ 47)	(88)
C 型题 (1 ~ 23)	(90)
K 型题 (1 ~ 52)	(91)

第四部分 喉科多选题

A 型题 (1 ~ 112)	(96)
B 型题 (1 ~ 39)	(106)
C 型题 (1 ~ 24)	(108)
K 型题 (1 ~ 46)	(109)

第五部分 气管、食管科多选题

一、气管科

A 型题 (1 ~ 60)	(113)
B 型题 (1 ~ 15)	(119)
C 型题 (1 ~ 19)	(120)
K 型题 (1 ~ 61)	(121)

二、食管科

A 型题 (1 ~ 30)	(126)
B 型题 (1 ~ 9)	(129)

C 型题 (1 ~ 10)		(129)
K 型题 (1 ~ 26)		(130)
多选题答案		(133)
参考文献		(141)

第一部分 耳科多选题

A 型题

该题型为单项选择题。每题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，其中只有一个正确答案，请将正确答案的代号填写在括号里。

1. 鼓膜来源于何组织 ()
 - A. 外胚层——上皮层
 - B. 中胚层——纤维层
 - C. 内胚层——黏膜层
 - D. 第一鳃沟与第一咽囊间
 - E. 以上都对
2. 膜迷路来于 ()
 - A. 外胚层
 - B. 中胚层
 - C. 内胚层
 - D. 外胚层和中胚层
 - E. 中胚层和内胚层
3. 颈静脉孔由下列哪项组织围绕而成 ()
 - A. 枕骨
 - B. 颞骨
 - C. 蝶骨
 - D. 内为枕骨外为颞骨
 - E. 内为蝶骨外为筛骨
4. 马克温氏三角区位于 ()
 - A. 骨性外耳道口的后上方
 - B. 鼓窦处
 - C. 外耳道的前方
 - D. 外耳道的后方
 - E. 骨性外耳道口的后下方
5. 鼓膜由外向内分哪三层 ()
 - A. 鳞状上皮层、肌层、内膜层
 - B. 鳞状上皮层、纤维层、黏膜层
 - C. 黏膜层、纤维层、鳞状上皮层
 - D. 黏膜层、纤维层、鳞状上皮层
 - E. 纤维层、肌层、内膜层
6. 椎动脉的来源是 ()
 - A. 颈总动脉
 - B. 颈内动脉
 - C. 锁骨下动脉
 - D. 颈外动脉
 - E. 胸主动脉
7. 耳廓的主要血供是 ()
 - A. 枕动脉与面前动脉
 - B. 鼓室静脉丛
 - C. 颌下动脉
 - D. 耳后动脉和颞浅动脉
 - E. 面动脉和舌下动脉
8. 鼓膜有效的振动面积是 ()
 - A. 55mm^2
 - B. 60mm^2
 - C. 35mm^2
 - D. 59mm^2
 - E. 75mm^2

9. 国人鼓膜的面积约为 ()
- 60 ~ 70mm²
 - 80 ~ 100mm²
 - 40 ~ 50mm²
 - 75 ~ 85mm²
 - 50 ~ 60mm²
10. 耳廓由第几鳃弓融合而成 ()
- 第 1
 - 第 1、2
 - 第 3
 - 第 2、3
 - 第 4
11. 鼓膜突出的标志是 ()
- 锤骨短突
 - 光锥
 - 脐部
 - 紧张部
 - 松弛部
12. 鼓膜的部分结构下列哪项是对的 ()
- 外层为皮肤层为外耳道皮肤的延续
 - 外层为鳞状上皮层结构
 - 中层为肌层
 - 内层为致密的鳞状上皮
 - 内层为放射状和环状纤维组织组成
13. 耳廓在胚胎第几周形成 ()
- 4 周
 - 6 周
 - 7 周
 - 8 周
 - 5 周
14. 鼓膜紧张部占鼓膜总面积的 ()
- 50%
 - 60%
 - 70%
 - 80%
 - 90%
15. 锤骨柄嵌于下列何组织间 ()
- 上皮层与黏膜层之间
 - 上皮层与纤维层之间
 - 纤维层
 - 纤维层与黏膜之间
 - 黏膜层
16. 鼓膜正常标志中哪项是错的 ()
- 松弛部
 - 紧张部
 - 锤骨短突
 - 鼓环
 - 光锥
17. 外耳道的长度是 ()
- 2.5 ~ 3.5cm
 - 2.0 ~ 3.0cm
 - 3.5 ~ 4.0cm
 - 4.0cm
 - 4.5cm
18. 外耳道骨部占外耳道全长的多少 ()
- 1/2
 - 1/3
 - 2/3
 - 3/4
 - 1/4
19. 耳道毛囊、皮脂腺和耵聍位于 ()
- 外耳道软骨部
 - 外耳道软骨部和骨部交界处
 - 外耳道骨部
 - 外耳道骨部深处
 - 外耳道骨部皮下组织
20. 砧骨是听小骨中最重的约为 ()
- 30 g
 - 10 g
 - 20 g
 - 15 g
 - 25 g

21. 镫骨的描述中哪项是错误的 ()
- A. 镫骨头
 - B. 镫骨颈
 - C. 镫骨底板
 - D. 镫骨柄
 - E. 镫骨后脚
22. 镫骨肌起于何处 ()
- A. 锥隆起内
 - B. 锥隆起外
 - C. 锥隆起上
 - D. 锥隆起下
 - E. 锥隆起后
23. 鼓膜的部分结构正确的是 ()
- A. 外层为皮肤层
 - B. 中层为放射状和环状纤维组织组成
 - C. 内层为皮肤层
 - D. 松弛部为纤维组织构成
 - E. 光锥在鼓膜的正后方
24. 听小骨中最长的是 ()
- A. 砧骨体
 - B. 锤骨体
 - C. 砧骨长突
 - D. 镫骨头
 - E. 锤骨柄
25. 听小骨的排列自外向内是 ()
- A. 砧骨、镫骨、锤骨
 - B. 锤骨、砧骨、镫骨
 - C. 锤骨、镫骨、砧骨
 - D. 镫骨、砧骨、锤骨
 - E. 镫骨、锤骨、砧骨
26. 镫骨与卵圆窗相连的部位是 ()
- A. 镫骨头
 - B. 镫骨底板
 - C. 镫骨颈
 - D. 镫骨前脚
 - E. 镫骨后脚
27. 咽鼓管开口于鼓室的部位是 ()
- A. 内壁
 - B. 外壁
 - C. 上壁
 - D. 下壁
 - E. 前壁
28. 咽鼓管的长度约为 ()
- A. 15 ~ 29cm
 - B. 20 ~ 30cm
 - C. 30 ~ 39cm
 - D. 40 ~ 48cm
 - E. 以上都不对
29. 镫骨的运动形式是 ()
- A. 内外摆动
 - B. 内外活动
 - C. 上下活动
 - D. 前后移动
 - E. 活塞式运动
30. 鼓隐窝没有容纳下列哪项组织 ()
- A. 锤骨头
 - B. 锤骨颈
 - C. 砧骨短突
 - D. 砧骨体
 - E. 锤骨短突
31. 咽鼓管两端的开口为何处 ()
- A. 一端在上鼓室一端在鼻咽部
 - B. 一端在中鼓室一端在鼻咽部
 - C. 一端在下鼓室一端在鼻咽部
 - D. 一端在后鼓室一端在鼻咽部
 - E. 以上都不对
32. 小儿咽鼓管的解剖特点是 ()
- A. 管腔短水平且粗
 - B. 管腔细而长且平
 - C. 鼓室口粗咽口细
 - D. 鼓室口高咽口低
 - E. 咽口扁平且垂

33. 成人咽鼓管咽部开口低于鼓室部开口多少毫米 ()
- 10 ~ 12mm
 - 13 ~ 15mm
 - 16 ~ 25mm
 - 19 ~ 30mm
 - 25 ~ 35mm
34. 幼儿咽鼓管长度约为成人的几分之几 ()
- 1/3
 - 2/3
 - 1/4
 - 3/4
 - 1/2
35. 鼓室内内容物不包括下列哪项 ()
- 听小骨
 - 肌肉
 - 韧带
 - 神经
 - 鼓膜
36. 有关锤骨韧带哪项是错的 ()
- 锤骨前韧带
 - 锤骨后韧带
 - 锤骨上韧带
 - 锤骨外侧韧带
 - 以上都不对
37. 鼓膜张肌收缩时将锤骨柄向何处牵引 ()
- 向外牵引
 - 向前牵引
 - 向后牵引
 - 向内牵引
 - 向后上牵引
38. 鼓室由下列哪些组织围成 ()
- 颞骨岩部、乳突及鼓部
 - 颞骨岩部、鳞部、鼓部及鼓膜
 - 鼓岬、面神经骨管、乳突
 - 鼓膜、鼓岬、面神经骨管
 - 脑板、窦脑膜角、鼓膜
39. 镫骨足板的面积是多少平方毫米 ()
- 1 × 3
 - 2 × 3
 - 1.5 × 2
 - 1.8 × 3
 - 3 × 1.4
40. 有关鼓室内壁结构下列哪项是错的 ()
- 鼓岬位于内壁中央为耳蜗的第一环
 - 卵圆窗在鼓岬后上方为镫骨底板封闭
 - 圆窗在鼓岬的后下方为第二鼓膜封闭
 - 卵圆窗后上方依次是面神经垂直部和后半规管
 - 匙突在鼓岬前上方鼓膜张肌肌腱绕过此处
41. 中耳与下列组织的关系是 ()
- 经咽鼓管与口相通
 - 与筛小房相通
 - 有前庭神经通过
 - 有一被镫骨底板封闭的蜗窗
 - 以上都不对
42. 正确的砧骨与镫骨关节连接是 ()
- 砧骨短突与镫骨头相连
 - 砧骨长突与镫骨头相连
 - 砧骨体与镫骨颈相连
 - 砧骨豆状突与镫骨头相连
 - 砧骨豆状突与镫骨颈相连

43. 鼓室分为三部, 没有下列哪项 ()
- A. 鼓隐窝
 - B. 中鼓室
 - C. 下鼓室
 - D. 前鼓室
 - E. 以上都对
44. 中耳的黏膜上皮来源于 ()
- A. 听小骨被覆黏膜的延续
 - B. 鼻腔黏膜的延续
 - C. 呼吸道黏膜上皮的延续
 - D. 口腔黏膜上皮的延续
 - E. 消化道黏膜上皮的延续
45. 鼓窦为下列何部的含气腔 ()
- A. 鼓室后上方的一个含气腔
 - B. 鼓室后方的一个含气腔
 - C. 鼓室后下方的一个含气腔
 - D. 鼓室内下方的一个含气腔
 - E. 鼓室前下方的一个含气腔
46. 有关乳突气房的说法下列哪项是错的 ()
- A. 婴儿出生时尚未发育
 - B. 大小多少因人而异
 - C. 经咽鼓管与中耳腔相通
 - D. 在乳突的前、上部者一般较大
 - E. 后界和乙状窦及小脑相邻
47. 下列何型乳突占多数 ()
- A. 气化型
 - B. 非气化型
 - C. 混合型
 - D. 板障型
 - E. 硬化型
48. 面神经经过鼓室的部位是 ()
- A. 上壁
 - B. 下壁
 - C. 后壁
 - D. 内壁
 - E. 内上壁与后壁
49. 鼓膜松弛部缺如的组织是 ()
- A. 肌层
 - B. 黏膜层
 - C. 皮肤层
 - D. 纤维层
 - E. 以上都错
50. 颞骨由下列哪些部位组成 ()
- A. 颞鳞部
 - B. 乳突部
 - C. 岩部
 - D. 鼓部和茎突
 - E. 以上都对
51. 耳廓的神经分布中没有下列哪项 ()
- A. 耳颞神经
 - B. 迷走神经
 - C. 鼓室神经丛
 - D. 面神经耳支
 - E. 耳大神经
52. 乳突气房的功能没有下列哪项 ()
- A. 减轻头颅重量
 - B. 保护内耳不受外界气候变化的影响
 - C. 保护内耳不受外界音响损伤
 - D. 提高声压
 - E. 有隔音和吸音作用
53. 前庭位于 ()
- A. 耳蜗和蜗窗之间
 - B. 耳蜗和半规管之间
 - C. 耳蜗和水平半规管之间
 - D. 耳蜗和淋巴囊之间
 - E. 上半规管和外半规管之间
54. 面神经不包括下列哪段 ()
- A. 迷路段
 - B. 耳蜗段
 - C. 垂直段
 - D. 水平段
 - E. 锥段

55. 中耳包括下列哪些 ()
- 鼓室
 - 鼓窦
 - 乳突
 - 咽鼓管
 - 以上都对
56. 内耳埋藏于 ()
- 颞骨岩部
 - 颞骨鳞部
 - 乳突部
 - 茎突部
 - 鼓部
57. 新生儿的骨迷路与成人相比 ()
- 稍大一些
 - 稍小一些
 - 大小一样
 - 大小不一样
 - 以上都错
58. 前庭直径约为 ()
- 3mm
 - 3.5mm
 - 4mm
 - 5mm
 - 5.5mm
59. 乳突开始发育的年龄是 ()
- 一周岁
 - 二周岁
 - 三周岁
 - 四周岁
 - 五周岁
60. 骨迷路长约 ()
- 10mm
 - 15mm
 - 20mm
 - 30mm
 - 35mm
61. 三个半规管有几个孔与前庭相通 ()
- 3 个
 - 4 个
 - 5 个
 - 6 个
 - 以上都错
62. 连接球囊、椭圆囊和内淋巴囊的淋巴管是 ()
- 蜗小管
 - 茎突小管
 - 前庭小管
 - 鼓索小管
 - 乳突孔
63. 中耳肌肉的主要作用是 ()
- 增加听力
 - 有保护耳蜗的作用
 - 控制中耳感染
 - 防止中耳炎症扩散
 - 以上都错
64. 膝状神经节发出的神经是 ()
- 岩浅小神经
 - 鼓索神经
 - 镫骨肌神经
 - 岩浅大神经
 - 鼓室丛神经
65. 面神经管裂孔有下列哪项通过 ()
- 内听动脉
 - 鼓索神经
 - 岩浅小神经
 - 岩浅大神经和脑膜中动脉的岩支
 - 岩浅大神经和鼓索神经
66. 内耳门位于颞骨岩部的位置是 ()
- 后面
 - 前面
 - 下面
 - 前缘
 - 以上都错

67. 颞骨岩部的前面形成颅中凹的哪个部位 ()
- 前部
 - 内侧
 - 外侧
 - 上面
 - 后部
68. 鼓索神经多由面神经的哪段发出 ()
- 垂直段
 - 鼓室段
 - 膝状段
 - 垂直段与鼓室段交界处
 - 以上都错
69. 耳蜗基底部有三个孔, 依次是 ()
- 前庭窗、蜗窗、耳蜗小管内口
 - 前庭窗、半规管总脚开口、蜗窗
 - 蜗窗、耳蜗小管内口、半规管单脚开口
 - 耳蜗小管开口、蜗窗、半规管总脚开口
 - 以上都错
70. 膜迷路不包括下列哪项 ()
- 椭圆囊
 - 球囊
 - 膜半规管
 - 蜗管
 - 内淋巴管
71. 膜半规管约占骨半规管腔隙的 ()
- 1/2
 - 1/3
 - 1/4
 - 1/5
 - 2/3
72. 耳蜗自绕几周 ()
- 2 周
 - 2 周半
 - 3 周
 - 3 周半
 - 4 周
73. 蜗管位于 ()
- 前庭阶与鼓阶之间
 - 前庭膜与基底膜之间
 - 鼓阶与基底膜之间
 - 盖膜与内螺旋沟之间
 - 以上都错
74. 螺旋器上有下列哪些组织 ()
- 内毛细胞
 - 外毛细胞
 - 盖膜
 - 螺旋器隧道
 - 以上都对
75. 光锥位于鼓膜的部位是 ()
- 前下方
 - 前上方
 - 后下方
 - 后上方
 - 中央
76. 膜迷路内含的液体是 ()
- 血浆
 - 外淋巴液
 - 内淋巴液
 - 血清
 - 以上都错
77. 骨迷路与膜迷路之间为 ()
- 脑积液
 - 内淋巴液
 - 渗出液
 - 外淋巴液
 - 以上都对
78. 柯替氏器的组成是 ()
- 前庭阶、鼓阶、盖膜
 - 鼓阶、毛细胞、盖膜
 - 支持细胞、毛细胞、盖膜
 - 毛细胞、前庭阶、支持细胞
 - 鼓阶、盖膜、支持细胞

79. 螺旋器上大约有多少个毛细胞 ()
- 5 500 个
 - 2 500 个
 - 6 000 个
 - 15 500 个
 - 4 000 个
80. 构成耳廓的主要组织是 ()
- 软骨组织覆以皮肤
 - 脂肪
 - 软骨
 - 纤维组织
 - 皮肤
81. 下列哪种组织不属外耳组织 ()
- 耳廓
 - 耳道
 - 耵聍腺
 - 砧骨
 - 鼓骨
82. 中耳乳突血供不包括下列哪项 ()
- 迷路动脉
 - 颈内动脉的颈鼓动脉
 - 耳后动脉的茎乳动脉
 - 咽升动脉
 - 脑膜中动脉的岩浅动脉
83. 人耳的听觉范围大约为 ()
- 2 000 ~ 25 000Hz
 - 100 ~ 15 000Hz
 - 500 ~ 8 000Hz
 - 20 ~ 20 000Hz
 - 1 000 ~ 25 000Hz
84. 位听神经在内耳道内分成哪些神经 ()
- 面神经、听神经
 - 听神经、前庭神经
 - 前庭神经、耳蜗神经
 - 耳蜗神经、迷走神经
 - 迷走神经、三叉神经
85. 前庭神经节哪端分成二支 ()
- 近端发出神经纤维分成上下二支
 - 远端发出神经纤维分成左右二支
 - 近端发出神经纤维分成左右二支
 - 远端发出神经纤维分成上下二支
 - 以上都错
86. 迷路动脉在内耳道内分为三支是 ()
- 前庭支、半规管支、蜗支
 - 前庭支、球囊支、前庭蜗支
 - 前庭支、前庭蜗支、蜗支
 - 前庭支、椭圆囊支、球囊支
 - 前庭支、螺旋板支、蜗支
87. 鼓索神经主管舌味觉的部位是 ()
- 舌中部
 - 舌前 2/3
 - 舌前 1/3
 - 舌后 2/3
 - 舌后部
88. 声波自鼓膜传至镫骨底板约可增加 ()
- 15dB
 - 20dB
 - 27dB
 - 36dB
 - 45dB
89. 人在运动或静止状态下保持平衡的因素是 ()
- 前庭
 - 视觉
 - 本体感觉
 - 依靠以上三者协调
 - 以上都错
90. 下列说法中哪项是错的 ()
- 耳石器系指椭圆囊与球囊
 - 内淋巴囊位于后颅窝的硬脑膜中
 - 前庭神经核每侧各有 4 个
 - 前庭膜上有外毛细胞
 - 内、外毛细胞约有 15 500 个

91. 前庭蜗神经离开颅脑的部位是 ()
- 圆孔
 - 茎乳孔
 - 中耳腔
 - 颈静脉孔
 - 非上述各处
92. 迷路的血供主要是 ()
- 脑膜前动脉的分支
 - 脑膜中动脉的分支
 - 内听动脉
 - 耳后动脉
 - 基底动脉
93. 声波传入内耳的途经是 ()
- 外耳—鼓膜—听骨链—椭圆囊
 - 外耳—鼓膜—听骨链—圆窗膜
 - 外耳—鼓膜—听骨链—前庭窗
 - 外耳—鼓膜—听骨链—腹壶嵴
 - 外耳—鼓膜—听骨链—球囊
94. 鼓室的体积约为 ()
- 1.5ml
 - 2ml
 - 2.5ml
 - 3ml
 - 3.5ml
95. 蜗窗的面积约为 ()
- 1.5mm^2
 - 3mm^2
 - 2mm^2
 - 2.5mm^2
 - 3.5mm^2
96. 乳突是下列哪块骨的一部分 ()
- 枕骨
 - 蝶骨
 - 筛骨
 - 颞骨
 - 以上都错
97. 蜗管是充满什么液体的管 ()
- 充满外淋巴液的盲管
 - 充满内淋巴液与前庭阶相通
 - 充满内淋巴液与鼓阶相通
 - 充满内淋巴的盲管
 - 以上都错
98. 基底膜的特点有 ()
- 近镫骨处窄, 近蜗孔处宽
 - 近镫骨处宽, 近蜗孔处窄
 - 近镫骨处窄, 近蜗孔处也窄
 - 基底膜中央处最宽
 - 以上都错
99. 关于毛细胞哪一项是错的 ()
- 外毛细胞位于基底膜的中部
 - 内毛细胞位于基底膜近蜗轴处
 - 外毛细胞阈值低
 - 内毛细胞阈值高
 - 外毛细胞位于基底膜蜗轴处
100. 人体维持平衡靠下列哪一项 ()
- 前庭、半规管、蜗管
 - 基底膜、视觉、听力
 - 本体、前庭、双下肢
 - 前庭、视觉、本体
 - 视觉、肢体、半规管
101. 前庭刺激反应没有下列哪一项 ()
- 初次刺激所引起的反应最大
 - 连续刺激反应下降
 - 刺激停止后反应可持续一短暂时期
 - 越刺激反应越强烈
 - 刺激后有短暂潜伏期才出现反应
102. 鼓膜完整, 听链中断, 听力约损失多少分贝 ()
- 15dB
 - 20dB
 - 40dB
 - 50dB
 - 60dB

103. 有关前庭功能下列哪一项是错的 ()
- 前庭功能丧失睁眼也难在水中平稳游泳
 - 盲人前庭功能正常仍能在水中保持平衡
 - 前庭功能发生障碍行动立即发生困难
 - 前庭功能丧失闭目书写字体不歪斜错乱
 - 前庭功能正常在室内闭目可走过去走过来
104. 前庭感受器不包括 ()
- 球囊
 - 椭圆囊
 - 半规管
 - 耳蜗
 - 以上都对
105. 听神经末梢感受器位于 ()
- 前庭阶
 - 鼓阶
 - 球囊壁上
 - 椭圆壁上
 - 基底膜上
106. 内、外淋巴液钾、钠离子含量正确的是 ()
- 外淋巴高钾高钠, 内淋巴低钾低钠
 - 内淋巴高钾高钠, 外淋巴低钾低钠
 - 外淋巴高钠低钾, 内淋巴高钾低钠
 - 内淋巴低钾高钠, 外淋巴高钾低钠
 - 以上都对
107. 目前世界规定的噪声危害标准为 ()
- 85 ~ 90dB
 - 80 ~ 85dB
 - 75 ~ 80dB
 - 70 ~ 75dB
 - 65 ~ 70dB
108. 大于多少分贝的声音可经颅骨直接传入内耳 ()
- 30
 - 40
 - 50
 - 60
 - 70
109. 穿孔占鼓膜面积的多少与听力下降的关系是 ()
- 20%者, 1 000Hz 听力减低约 20dB
 - 40%者, 1 000Hz 听力减低约 30dB
 - 100%者, 1 000Hz 听力减低约 45dB
 - 以上都对
 - 以上都错
110. 噪声性耳聋在多少 Hz 听力首先下降 ()
- 1 000
 - 1 500
 - 2 000
 - 3 000
 - 4 000
111. 外耳道凡病程较长的肉芽组织应进行 ()
- 全身和局部应用抗生素
 - 活体组织病理检查
 - 局部理疗
 - 乳突根治术
 - 放疗
112. 外耳道恶性肿瘤常有的特点是 ()
- 易于出血
 - 有肉芽或菜花样组织
 - 常伴疼痛
 - 常由中耳或腮腺扩展而来
 - 以上都是