

PIFUBING
SHIYONGZHONGYAOXUE

皮肤病 实用中医学

下册


王继生 主编

全书共分两编：

第一编绪论，简要介绍一般植物药学知识，以及
识药、采集、储藏、炮制、制剂、剂型等。

第二编各论，结合图解，阐述每种植物药的药
名、别名、科属、形态、分布、产地、成分、作用、
功能、应用、用法、用量及附方等。

河北大学出版社



PiFuBing ShiYong ZhongYaoXue

皮肤病实用中药学

下册

主编 / 王继生


编者 / 王宝君

刘浩源

王子晗

审校 / 张建英

河北大学出版社



目 录

下 册

652. 青黛	(569)	680. 细辛	(590)
653. 青天葵	(569)	681. 细叶七星剑	(592)
654. 青木香	(570)	682. 细叶刺针草	(592)
655. 青风藤	(571)	683. 细叶鼠曲草	(593)
656. 青羊参	(572)	684. 泽兰	(594)
657. 青刺尖	(572)	685. 泽泻	(594)
658. 青活麻	(573)	686. 泽漆	(595)
659. 青骨藤	(574)	687. 泽珍珠菜	(596)
660. 罗勒	(574)	688. 松香(附:松花粉、松针)	(597)
661. 罗布麻	(575)	689. 松萝	(599)
662. 罗汉松	(576)	690. 松蒿	(600)
663. 罗汉果	(577)	691. 枫杨	(601)
664. 罗伞树	(577)	692. 枫树	(602)
665. 虎杖	(578)	693. 枫寄生	(603)
666. 虎刺	(579)	694. 空心泡	(603)
667. 虎耳草	(580)	695. 空心莲子草	(604)
668. 虎尾兰	(581)	696. 空桶参	(605)
669. 虎掌草	(582)	697. 单根木	(606)
670. 鱼藤	(582)	698. 单叶铁线莲	(607)
671. 鱼胆草	(583)	699. 泡桐	(607)
672. 鱼眼草	(584)	700. 泡花树	(609)
673. 鱼腥草	(585)	701. 垂柳	(609)
674. 鱼鳖金星	(586)	702. 垂花香薷	(610)
675. 岩七	(587)	703. 夜来香	(611)
676. 岩陀	(588)	704. 夜香牛	(611)
677. 岩笋	(588)	705. 肿节风	(612)
678. 岩葱	(589)	706. 肿足蕨	(613)
679. 岩白菜	(589)	707. 油茶	(614)

708. 油桐	(614)
709. 茅莓	(615)
710. 茅膏菜	(616)
711. 枣	(617)
712. 苹	(618)
713. 构树	(619)
714. 知母	(619)
715. 肾蕨	(620)
716. 乳香	(621)
717. 鸢尾	(622)
718. 定草根	(623)
719. 宝盖草	(624)
720. 实葫芦	(624)
721. 屈头鸡	(625)
722. 拔毒散	(626)
723. 斩龙草	(626)
724. 板蓝根	(627)
725. 枇杷叶	(628)
726. 果上叶	(630)
727. 泥胡菜	(630)
728. 爬山虎	(631)
729. 玫瑰花	(632)
730. 肥皂荚	(632)
731. 肺形草	(633)
732. 苔水花	(634)
733. 苘麻子	(634)
734. 败酱草	(635)
735. 钓鱼竿	(637)
736. 闹羊花	(638)
737. 降龙草	(639)
738. 京大戟	(640)
739. 使君子	(641)
740. 刮筋板	(641)
741. 齿叶草	(642)
742. 软水黄连	(643)

九画

743. 南烛	(643)
---------------	---------

744. 南天竹	(644)
745. 南瓜子	(645)
746. 南牡蒿	(646)
747. 南蛇笏	(646)
748. 南蛇藤	(647)
749. 南酸枣	(648)
750. 南五味子	(649)
751. 草龙	(650)
752. 草玉梅	(650)
753. 草红藤	(651)
754. 草血竭	(652)
755. 草灵仙	(652)
756. 草牡丹	(653)
757. 草地黄芩	(654)
758. 草本水杨梅	(654)
759. 穿山龙	(655)
760. 穿心草	(656)
761. 穿心莲	(657)
762. 穿地龙	(658)
763. 穿破石	(659)
764. 树葱	(660)
765. 树刁	(661)
766. 树扁竹	(661)
767. 树萝卜	(662)
768. 香附	(663)
769. 香茅	(664)
770. 香青兰	(664)
771. 香茶菜	(665)
772. 厚朴	(666)
773. 厚叶子树	(668)
774. 厚皮树皮	(668)
775. 扁蕾	(669)
776. 扁竹根	(670)
777. 扁担藤	(670)
778. 柳杉	(671)
779. 柳叶菜	(671)
780. 柳穿鱼	(672)
781. 姜	(673)

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 782. 姜三七····· (674) | 820. 星星草····· (706) |
| 783. 枳壳····· (674) | 821. 歪头菜····· (708) |
| 784. 枳椇····· (676) | 822. 牵牛子····· (709) |
| 785. 枸骨····· (676) | 823. 痂子草····· (710) |
| 786. 枸杞子····· (677) | 824. 相思子····· (710) |
| 787. 荔枝····· (678) | 825. 祖师麻····· (711) |
| 788. 荔枝草····· (679) | 826. 禹白附····· (712) |
| 789. 独一味····· (680) | 827. 络石藤····· (713) |
| 790. 独行千里····· (681) | 828. 美人蕉····· (714) |
| 791. 珍珠梅····· (681) | 829. 茺苓草····· (715) |
| 792. 珍珠菜····· (682) | 830. 蚂蝗七····· (716) |
| 793. 盾果草····· (683) | 831. 贴骨散····· (716) |
| 794. 盾叶薯蓣····· (684) | 832. 除虫菊····· (717) |
| 795. 鸦葱····· (685) | 833. 骆驼蓬····· (718) |
| 796. 鸦胆子····· (685) | 834. 骨碎补····· (719) |
| 797. 秋枫····· (686) | 835. 急性子(附:凤仙花)····· (720) |
| 798. 秋鼠曲草····· (687) | 836. 狭叶荨麻····· (721) |
| 799. 毒芹····· (688) | 837. 显脉香茶菜····· (721) |
| 800. 毒根斑鸠菊····· (689) | |
| 801. 柚····· (689) | |
| 802. 梔子····· (690) | |
| 803. 侧柏····· (691) | |
| 804. 窃衣····· (692) | |
| 805. 结香····· (693) | |
| 806. 胆木····· (693) | |
| 807. 胡杨····· (694) | |
| 808. 茜草····· (695) | |
| 809. 茯苓····· (696) | |
| 810. 茵陈····· (697) | |
| 811. 荆芥····· (699) | |
| 812. 莢蓬····· (700) | |
| 813. 荞麦····· (700) | |
| 814. 韭菜····· (701) | |
| 815. 标杆花····· (702) | |
| 816. 匍伏堇····· (703) | |
| 817. 响铃豆····· (704) | |
| 818. 威灵仙····· (704) | |
| 819. 挖耳草····· (705) | |
| | 838. 铁仔····· (722) |
| | 839. 铁马鞭····· (723) |
| | 840. 铁包金····· (723) |
| | 841. 铁扫帚····· (724) |
| | 842. 铁苋菜····· (725) |
| | 843. 铁线草····· (726) |
| | 844. 铁罗伞····· (727) |
| | 845. 铁栏杆····· (728) |
| | 846. 铁扇子····· (728) |
| | 847. 铁海棠····· (729) |
| | 848. 铁破锣····· (729) |
| | 849. 铁棒锤····· (730) |
| | 850. 铁筷子····· (731) |
| | 851. 铁箍散····· (732) |
| | 852. 铁角凤尾草····· (732) |
| | 853. 鸭儿芹····· (733) |
| | 854. 鸭公青····· (734) |

十画

- | | | | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 855. 鸭跖草 | (734) | 893. 秦艽 | (766) |
| 856. 鸭嘴花 | (735) | 894. 党参 | (768) |
| 857. 鸭嘴癭 | (736) | 895. 凌霄 | (769) |
| 858. 鸭脚木 | (737) | 896. 圆柏 | (770) |
| 859. 鸭脚艾 | (738) | 897. 射干 | (771) |
| 860. 鸭脚黄连 | (738) | 898. 峨参 | (772) |
| 861. 臭椿 | (739) | 899. 拳参 | (772) |
| 862. 臭灵丹 | (740) | 900. 柞栎 | (773) |
| 863. 臭牡丹 | (741) | 901. 桔梗 | (774) |
| 864. 臭茉莉 | (742) | 902. 浮萍 | (775) |
| 865. 臭梧桐 | (742) | 903. 烟草 | (776) |
| 866. 臭黄荆 | (743) | 904. 苔菜 | (777) |
| 867. 海藻 | (744) | 905. 莪术 | (778) |
| 868. 海芋 | (745) | 906. 继木 | (779) |
| 869. 海南蒟 | (746) | 907. 桃仁(附:桃叶) | (780) |
| 870. 海桐皮 | (747) | 908. 夏枯草 | (782) |
| 871. 海桐树 | (747) | 909. 徐长卿 | (783) |
| 872. 海金沙 | (748) | 910. 扇子七 | (784) |
| 873. 倒爪草 | (749) | 911. 桑白皮 | (785) |
| 874. 倒吊笔 | (750) | 912. 桦树皮 | (786) |
| 875. 倒提壶 | (751) | 913. 浙贝母 | (787) |
| 876. 通草 | (752) | 914. 珠芽蓼 | (788) |
| 877. 通光散 | (752) | 915. 留兰香 | (788) |
| 878. 通城虎 | (753) | 916. 疳积草 | (789) |
| 879. 粉防己 | (754) | 917. 益母草 | (790) |
| 880. 粉苞苣 | (755) | 918. 盐肤木 | (790) |
| 881. 粉条儿菜 | (755) | 919. 破天菜 | (791) |
| 882. 核桃 | (756) | 920. 离根香 | (792) |
| 883. 核桃楸 | (757) | 921. 积雪草 | (793) |
| 884. 秤钩风 | (758) | 922. 索骨丹 | (794) |
| 885. 秤砣梨 | (759) | 923. 葇荬子 | (795) |
| 886. 莲子草 | (759) | 924. 透骨草 | (796) |
| 887. 莲生桂子花 | (760) | 925. 高良姜 | (797) |
| 888. 狼毒 | (761) | 926. 宽叶荨麻 | (798) |
| 889. 狼把草 | (761) | 927. 瓶尔小草 | (798) |
| 890. 柴胡 | (762) | 928. 绣球防风 | (799) |
| 891. 柴桂 | (764) | 929. 荷莲豆草 | (800) |
| 892. 秦皮 | (765) | | |

十一画

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 930. 黄芩 (800) | 965. 野亚麻 (830) |
| 931. 黄芪 (802) | 966. 野芝麻 (831) |
| 932. 黄连 (803) | 967. 野牡丹 (832) |
| 933. 黄枹 (805) | 968. 野花椒 (833) |
| 934. 黄柏 (805) | 969. 野苋菜 (833) |
| 935. 黄荆 (807) | 970. 野茄树 (834) |
| 936. 黄根 (808) | 971. 野荞麦 (835) |
| 937. 黄麻 (809) | 972. 野席草 (836) |
| 938. 黄葵 (810) | 973. 野漆树 (836) |
| 939. 黄精 (810) | 974. 野西瓜苗 (837) |
| 940. 黄三七 (812) | 975. 野苦蕒菜 (838) |
| 941. 黄山药 (813) | 976. 雪胆 (838) |
| 942. 黄水枝 (814) | 977. 雪药 (840) |
| 943. 黄水茄 (815) | 978. 雪莲花 (840) |
| 944. 黄花稔 (815) | 979. 雪上一支蒿 (841) |
| 945. 黄药子 (816) | 980. 猪苓 (842) |
| 946. 黄锁梅 (817) | 981. 猪仔笠 (843) |
| 947. 黄楝树 (818) | 982. 猪殃殃 (844) |
| 948. 黄瑞木 (818) | 983. 猪鬃草 (844) |
| 949. 黄蓬花 (819) | 984. 鹿药 (845) |
| 950. 黄蜀葵 (820) | 985. 鹿藿 (846) |
| 951. 黄零陵香 (820) | 986. 鹿角草 (846) |
| 952. 黄毛耳草 (821) | 987. 鹿蹄草 (847) |
| 953. 黄毛岩白菜 (822) | 988. 麻栎 (848) |
| 954. 蛇含 (822) | 989. 麻疯树 (849) |
| 955. 蛇莓 (823) | 990. 麻叶荨麻 (850) |
| 956. 蛇菰 (824) | 991. 接骨木 (850) |
| 957. 蛇王藤 (825) | 992. 接骨树 (851) |
| 958. 蛇见怕 (825) | 993. 犁头尖 (852) |
| 959. 蛇床子 (826) | 994. 犁头草 (852) |
| 960. 蛇根草 (827) | 995. 甜地丁 (853) |
| 961. 蛇眼草 (827) | 996. 甜果藤 (854) |
| 962. 蛇葡萄 (828) | 997. 菊花 (855) |
| 963. 野芋 (829) | 998. 菊叶三七 (856) |
| 964. 野菊 (829) | 999. 萝藦 (857) |
| | 1000. 萝芙木 (858) |
| | 1001. 银杏 (859) |
| | 1002. 银毛委陵菜 (860) |

1003. 菰	(861)	1038. 紫背菜	(892)
1004. 菱	(862)	1039. 紫荆皮	(893)
1005. 商陆	(863)	1040. 紫地榆	(894)
1006. 旋花	(864)	1041. 紫花地丁	(895)
1007. 球兰	(864)	1042. 紫背天葵	(897)
1008. 菝葜	(865)	1043. 黑汉条	(897)
1009. 草薢	(866)	1044. 黑老虎	(898)
1010. 梧桐	(867)	1045. 黑点草	(899)
1011. 假茶辣	(868)	1046. 黑面叶	(899)
1012. 寄马桩	(869)	1047. 黑藁本	(900)
1013. 常春藤	(869)	1048. 景天	(901)
1014. 排钱树	(870)	1049. 景天三七	(901)
1015. 救必应	(871)	1050. 葫芦	(903)
1016. 断肠草	(872)	1051. 葫芦茶	(903)
1017. 望江南	(873)	1052. 鹅脚板	(904)
1018. 梅花草	(874)	1053. 鹅不食草	(905)
1019. 淡竹叶	(874)	1054. 喜树	(906)
1020. 猕猴桃	(875)	1055. 椰子	(907)
1021. 猫眼草	(876)	1056. 寒莓	(908)
1022. 盘龙参	(877)	1057. 篇蓄	(909)
1023. 眼子菜	(878)	1058. 落葵	(910)
1024. 续随子	(878)	1059. 葎草	(910)
1025. 菟丝子	(879)	1060. 葛根	(911)
1026. 萎陵菜	(880)	1061. 葡萄	(913)
1027. 铜骨七	(881)	1062. 葱白	(913)
1028. 曼陀罗	(882)	1063. 菱叶	(914)
1029. 弹刀子菜	(884)	1064. 越橘	(915)

十二画

1030. 紫草	(884)	1065. 博落回	(916)
1031. 紫珠	(886)	1066. 揉白叶	(917)
1032. 紫薇	(888)	1067. 插田泡	(918)
1033. 紫玉簪	(889)	1068. 斑叶兰	(918)
1034. 紫茉莉	(889)	1069. 琴叶榕	(919)
1035. 紫金牛	(890)	1070. 番石榴	(920)
1036. 紫金龙	(891)	1071. 筋骨草	(921)
1037. 紫金沙	(892)	1072. 粪箕笃	(922)
		1073. 蛟龙木	(923)
		1074. 蛤蟆草	(923)
		1075. 酢浆草	(924)

1076. 隔山香 (925)
 1077. 掌裂秋海棠 (925)
 1078. 缘毛筋骨草 (926)
 1079. 裂叶秋海棠 (927)

十三画

1080. 蜈蚣七 (927)
 1081. 蜈蚣兰 (928)
 1082. 蜈蚣草 (929)
 1083. 蜈蚣藤 (929)
 1084. 蒲葵 (930)
 1085. 蒲黄 (931)
 1086. 蒲公英 (932)
 1087. 蜂斗菜 (933)
 1088. 蜂窝草 (934)
 1089. 蜂糖罐 (934)
 1090. 鼠李 (935)
 1091. 鼠曲草 (936)
 1092. 鼠牙半支 (937)
 1093. 滇杠柳 (938)
 1094. 滇苦菜 (938)
 1095. 雷丸 (939)
 1096. 雷公藤 (940)
 1097. 慈菇 (941)
 1098. 楸木 (942)
 1099. 瑞香 (942)
 1100. 蓍草 (943)
 1101. 蓖麻 (945)
 1102. 槐花(附:槐角) (946)
 1103. 墓头回 (947)
 1104. 溪黄草 (948)
 1105. 腹水草 (949)
 1106. 蓝布正 (950)
 1107. 蓬子菜 (951)
 1108. 锦灯笼 (951)
 1109. 雾水葛 (952)

十四画

1110. 酸模 (953)
 1111. 酸果藤 (954)
 1112. 酸枣仁 (955)
 1113. 酸梅筋 (955)
 1114. 榕树 (956)
 1115. 榧子 (957)
 1116. 漏芦 (958)
 1117. 腐卑 (959)
 1118. 葶菜 (960)
 1119. 辣蓼 (961)
 1120. 槟榔(附:大腹皮) (962)
 1121. 漆姑草 (964)
 1122. 管南香 (964)
 1123. 罂粟壳 (965)
 1124. 翠云草 (966)
 1125. 膀胱七 (967)
 1126. 蔓荆子 (967)
 1127. 蝇子草 (969)
 1128. 豨莶草 (969)
 1129. 蜘蛛抱蛋 (971)

十五画

1130. 樟 (972)
 1131. 樱桃 (973)
 1132. 蕨萁 (973)
 1133. 槲寄生 (974)
 1134. 横经席 (975)
 1135. 箭杆风 (976)
 1136. 蝴蝶藤 (976)
 1137. 醉鱼草 (977)
 1138. 飘带草 (978)
 1139. 栲叶花椒 (978)

十六画

1140. 薤菜 (979)
1141. 薄荷 (980)
1142. 薏苡 (981)
1143. 薯蓣 (982)
1144. 赧桐 (983)
1145. 燕麦草 (984)
1146. 磨盘草 (985)
1147. 螃蟹七 (985)

十七画

1148. 檀香 (986)
1149. 爵床 (987)
1150. 筋欐 (988)
1151. 繁缕 (989)
1152. 螺厝草 (990)
1153. 藏红花 (990)
1154. 藏报春花 (991)

十八画

1155. 瞿麦 (992)

1156. 藜芦 (993)
1157. 藤乌 (994)
1158. 藤黄连 (994)
1159. 蟛蜞菊 (995)
1160. 翻白草 (996)
1161. 鞭打绣球 (997)

十九画

1162. 藿香 (998)

二十画

1163. 魔芋 (999)
1164. 糯米团 (1000)

二十一画

1165. 露水草 (1001)

- 附 录 (1002)

- 参考文献 (1014)

652. 青 黛

别名:靛、靛花、靛沫、蓝靛。

科属:爵床科马蓝属植物 **马蓝** *Baphi-*
cacanthus cusia Bremek.、豆科木蓝属植物
木蓝 *Indigofera tinctoria* L.、蓼科蓼属植物
蓼蓝 *Polygonum tinctorium* Lour. 或十字
花科大青属植物 **菘蓝** *Isatis tinctoria* L. **草**
大青 *I. indigotica* Fort., 以茎叶经加工制得
的粉末或团块入药。

药材:为极细的深蓝色粉末或不规则多
孔性的团块。质轻而松,粉末易飞扬,可粘
手粘纸。有特殊草腥气,味微酸。将粉末投
入水中,可浮于水面,极少量下沉。将粉末
置纸上以火点燃,则生紫红色火焰。若隔铁
片烧之,则全部挥散。

产地:产于河北、江苏、安徽、江西、福
建、河南、四川、云南等省。

采集:夏、秋两季均可采收制作。将原
料植物的茎叶置木桶或大缸中(一次 200 斤
左右为宜),加入清水,浸约 2~3 天至叶腐
烂、茎脱皮时,将茎枝捞出,立即加入已除去
沙石的石灰适量(每 100 斤加石灰约 8~10
斤,注意石灰量不能过多或太少,否则泡沫
减少,影响青黛产量),充分搅拌,至浸液由
乌绿色转为深紫红色为度,捞起液面泡沫,
于烈日下晒干即得。

成分:含靛蓝(indigo)5%及靛玉红等。

作用:抑菌试验:本品乙醇浸液(0.5
克/毫升),体外对炭疽杆菌、志贺氏痢疾杆
菌、金黄色葡萄球菌等均有抑制作用。

性味:咸,寒。

功能:清热,凉血,解毒。

应用:热病发斑,小儿发热惊痫,咯血,
吐血,玫瑰糠疹、牛皮癣;外用治丹毒,黄水
疮,脓疱疮,湿疹,疖肿,腮腺炎、口舌生疮,
鼻衄、蛇咬伤等。

用量:1.5~3 克,冲入煎剂或做散剂
服;外用适量,涂敷患处。

附方:1. 腮腺炎:青黛 2 克,蒲公英、荆
芥各 9 克。水煎服,每日 1 剂。

2. 皮肤炎或阴囊湿疹,天疱疮:青黛、甘
草各 3 克,滑石 18 克。共研细粉,洗净患
处,适量外敷。每日 1~2 次。

3. 各种湿疹:用青黛软膏适量,外涂患
处,每日 1~2 次。

4. 手足皲裂:青黛 20 克,白及粉 50 克。
取白及、青黛细粉,用适量芝麻油调成油膏,
涂搽患处。

制剂:青黛软膏:取青黛 60 克、煅石膏
120 克、黄柏 60 克、滑石 30 克。研为细粉
混匀,另取凡士林 750 克,加热熔化后稍放
冷,加入细粉研匀即得。

653. 青 天 葵

别名:天葵、独脚天葵、猪鬃耳、磨地沙、
珍珠叶、半边伞、坠千斤、山米子、铁帽子、小
胖药、提心吊胆。

科属:兰科芋兰属植物 **毛唇芋兰** *Nerv-*
ilia fordii (Hance) Schlecht., 以全草或块茎
入药。

形态:多年生草本,高 10~30 厘米。

根:须根细长丛生,主根下有球形块茎,
块茎白色,径 5~20 毫米。

叶:基生,常为 1 片,少为 2 片;有长柄,
柄长 5~20 厘米,下部具管状、紫红色的抱茎
叶鞘 1~2 枚,叶片卵状,心形,长 5~10 厘
米,宽 8~12 厘米,膜质,先端急尖,边缘波
状,主脉多条弧形,小脉横出,交织成网状。

花:春、夏开淡绿色花,花葶从根状茎生
出,直立,高达 30 厘米,总状花序顶生,生花
10 多朵;花萼和花瓣等长,约 1 厘米,披针
形,花瓣较窄,唇瓣长约 8 毫米,宽 6 毫米,3
裂,中裂片横长圆形或半圆形,具褐色斑点,

内侧密生长柔毛。(图 653)




图 653 青天葵(毛唇芋兰)

分布:多生于干旱石灰岩山地疏林下,有时田边和肥沃地方也有生长。

产地:产于广东、广西、四川、云南等省区。

采集:全年可采,鲜用或晒干用。

性味:苦、甘,平。

功能:清肺止咳,健脾消积,镇静止痛,清热解毒,散瘀消肿。

应用:肺结核咳嗽咯血,支气管炎,小儿疳积,小儿肺炎,精神病,跌打肿痛,口腔炎,急性喉头炎,疮毒。

用量:3~6 克,外用适量,新鲜块茎捣烂敷患处。

附方:1. 小儿疳积,疝气痛:青天葵鲜块茎 6~12 克,炖猪瘦肉或鸡蛋吃。

2. 口腔炎、急性喉头炎:青天葵鲜全草 1 株,生嚼含。

654. 青木香

别名:土青木香、青藤香、蛇参根、独根。

科属:马兜铃科马兜铃属植物 马兜铃

Aristolochia debilis Sieb. et Zucc., 以根入药。果实及茎亦供药用,见马兜铃项下。

形态:多年生草质藤本,长达 2 米。

根:圆柱形,常弯曲,黄褐色,有香气。

茎:细弱,无毛,初直立,后缠绕他物上升,茎叶有臭气。

叶:互生,有长柄;叶片三角窄卵形,长 3~8 厘米,宽 2~4.5 厘米,中部以上渐窄,基部心形,两侧垂耳状。

花:夏季叶腋单生暗紫绿色花,花被管镰状弯曲,基部膨大如球,包围合蕊柱,中部收缩成管状,先端向一侧展开,成一卵状披针形,花被片;雄蕊 6,几无花丝,贴生于粗短的花柱体周围,花药 2 室;子房下位,6 室,花柱 6 枚,愈合成柱体。

果:蒴果,长圆形或球形,熟时从基部裂成 6 瓣。

种子:种子扁平三角形,有翅。(图 654)

分布:生于山坡、林缘、灌木丛中或田边、河岸的沙质土壤中;亦有栽培。

产地:我国长江以南各省区及河南、山东等地有分布。

采集:全年可采,以秋季为宜,挖出后洗净晒干。



图 654 青木香(马兜铃)

成分:根含马兜铃酸(aristolochic acid)、土青木香酸(debilic acid)、木兰碱(magnoflorine,)、尿囊素(allantoin)及挥发油,油中含马兜铃酮(aristolone)及异马兜铃酮(isoaristolone)等。据文献报导根尚含土青木香酮(debilone),熔点 135℃。

作用:抑菌:马兜铃果煎剂对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌和史氏痢疾杆菌均有不同程度的抑菌作用。

性味:辛、苦,寒。

功能:行气止痛,解毒消肿,降血压。

应用:胃痛,高血压病,风湿性关节炎,跌打损伤,咽喉肿痛,流行性腮腺炎;外用治牙痛,湿疹,毒蛇咬伤。

用量:3~9 克;外用适量。

附方:1. 胃痛:(1)青木香 30~60 克,白酒半斤,浸泡 4~7 日。每次服 5 毫升,每日 2~3 次。(2)青木香、刺梨根、樟树根皮各等量。共研细粉,压片,每片 0.5 克。每次 3~4 片,每日 3 次,温开水送服。

2. 高血压病:(1)青木香 30 克,加水 200 毫升,煎至 100 毫升,每日 1 剂,分 3 次口服;或用青木香粉 2~5 克,装入胶囊,分 3 次吞服。(2)青木香流浸膏,开始量每次 5~10 毫升,每日服 4 次,加单糖浆或橙皮糖浆矫味,血压下降后,渐减至每次 2~3 毫升,日服 3~2 次,二个月为一个疗程。(血压无改变或有明显恶心反应的应停药)。

制剂:青木香流浸膏:取青木香粉,加 80%乙醇浸渍,滤取浸液,蒸去乙醇至含乙醇 10%,使 1 毫升流浸膏相当生药 1 克。

655. 青 风 藤

别名:大风藤、吹风散、黑防己、排风藤、青防己。

科属:防己科防己属植物 青藤 *Sinomenium acutum* (Tbunb.) Rehd. et Wils., 以

藤茎入药。

形态:多年生落叶缠绕藤本,长可达 7 米。

根:块状。

茎:圆柱形,带木质,表面灰褐色,内面黄褐色,有放射状的髓部,枝绿色光亮有纵纹。

叶:互生,厚纸质或革质,具长柄;叶片卵圆形,长 6~12 厘米,宽 4~10 厘米,先端急尖或短尖,基部稍心形,全缘或 3~7 角状浅裂,上面绿色,下面灰白色,光滑无毛。

花:夏季开淡绿色小花,单性,雌雄异株,花序圆锥状;雄花花萼 4~6,花瓣 6,细小,雄蕊 9~12,分离;心皮 3,分离。

果:核果,扁球形,熟时蓝黑色。

种子:半月形。(图 655)




图 655 青风藤(青藤)

分布:生于山地灌木丛中。

产地:产于河南、陕西、江西、湖北、湖南和四川等省。

采集:春夏二季割取藤茎,晒干,切段后,晒干。

成分:根及藤木部含多种生物碱:青藤碱(即防己碱 sinomenine)、异青藤碱(isosinomenine)、青风藤碱(sinoacutine)、四氢表

小檗碱(sinactine)、双青藤碱(disinomenine)、青藤防己碱(acutumine)、N-去甲青藤防己碱(acutimidine)、地勿辛碱(diversine)、土杜拉宁碱(tuduranine)、含笑碱(即白兰花碱 michelalbine)、千金藤碱(stehanine)、木兰碱(magnoflorine)及微量的消旋-丁香树脂醇(dl-syringaresinol)、棕榈酸甲酯(methyl palmitate)。此外,尚含 β -谷甾醇、豆甾醇等。

成分:本品能抑制组胺,能显著减少皮肤中组胺的含量。

性味:苦、辛,温。

功能:祛风湿,通经络。

应用:风湿性关节炎,关节肿痛,肌肤麻木、瘙痒。

用量:6~9克。

656. 青羊参

别名:青阳参、闹狗药、牛尾参、小绿牛角藤。

科属:萝藦科牛皮消属植物 **青羊参** *Cynanchumotophyllum* Schneid., 以根入药。

形态:多年生缠绕草本,长2~5米。

根:单一或数条,圆柱形,肥大,外皮黄褐色,内面白色,折断有乳液。

茎:纤细坚韧,圆柱形,绿色。

叶:单叶对生,叶柄甚长;叶片三角状卵圆形,长3~6厘米,宽2.5~5厘米,先端渐尖,基部心形,全缘,脉上疏生短毛。

花:夏季开黄绿色小花,伞形花序腋生。

果:蓇葖果2,角状,成熟时沿一侧开裂。

种子:多数,一端有白长毛。(图656)

分布:生于山坡杂木林中或灌木丛中。

产地:产于云南省。

采集:秋季采挖,洗净,切片晒干。



图 656 青羊参

性味:甘、辛,温。有小毒。

功能:祛风降湿,解毒镇痉。

应用:风湿骨痛,风疹搔痒,癫痫,狂犬咬伤,毒蛇咬伤。

用量:3~9克,水煎或制成丸、散剂。

附注:1. 昆明地区用根作补肾之品,炖肉吃,可治头晕、耳鸣、心慌、腰痛等症。

2. 本品对家畜、家禽有毒,误食可致死。

657. 青刺尖

别名:炮筒果、牛奶捶、鸡蛋糕、梅花刺、枪子果、打枪果、阿那斯、狗奶子、蒙自扁核木。

科属:蔷薇科扁核木属植物 **扁核木** *Prinsepia utilis* Royle,以根、叶和果入药。

形态:常绿或落叶灌木,高1~2米。

枝:具棱,灰绿色,常有白色粉霜;小枝被黄褐色短柔毛,常为粗壮刺状。

叶:单叶互生;叶柄长约1厘米;叶片卵形至窄长椭圆形,长3~6厘米,宽2~3厘米,先端稍钝,基部宽楔形或近圆形,边缘有锯齿或全缘。

花:春季开白色花,总状花序顶生或腋

生；萼筒杯状，上部 5 裂；花瓣 5；雄蕊多数；心皮 1，子房上位。

果：核果，长倒卵形或椭圆形，暗紫红色，有粉霜，宿萼反折。（图 657）




图 657 青刺泵(扁核木)

分布：生于山坡溪边或灌木丛中。

产地：产于四川、贵州、云南等省。

采集：根全年可采，叶、果夏秋采。

性味：苦、辛，凉。

功能：根、叶：清热解毒，活血消肿；果：消食健胃。

应用：根、叶：淋巴腺炎，腮腺炎，乳腺炎，风湿性关节炎，痔疮，跌打损伤，月经不调，贫血，牙龈出血。果：消化不良。

用量：12~30 克。

附方：1. 跌打损伤：鲜青刺尖根 30~60 克，水煎服。外用鲜叶适量，捣烂敷伤处。

2. 刀枪伤：鲜青刺尖叶适量捣烂敷伤处。

3. 淋巴腺炎、腮腺炎、乳腺炎、疮、疖：青刺尖根 30 克。水煎服；外用鲜叶适量捣烂敷患处。

4. 风湿关节炎：青刺尖根 60 克，泡酒 1 斤，每次服 15~20 毫升，每日 2 次。

5. 月经不调，贫血、牙龈出血：鲜青刺尖

根 30~60 克。水煎服。

6. 牙痛：青刺尖嫩尖 15 克。水煎当茶饮。

658. 青活麻

别名：活麻、荨麻、火麻、老虎麻。

科属：荨麻科荨麻属植物 **粗根荨麻** *Urtica macrorrhiza* Hand.-Mazz.，以全草入药。

形态：多年生草本，高达 1 米以上。

根：根状茎粗壮；茎多数直立，圆四棱形，绿色或黄褐色，有短的分枝，疏生螫毛。

叶：单叶对生，叶柄长 1~6 厘米；叶片宽卵形或卵形，长 5~11 厘米，宽 2.5~5 厘米，先端短渐尖，基部截形或浅心形，边缘生粗牙齿，有时茎中部叶的大牙齿有少数小牙齿，下面沿脉疏生短毛，基出脉 5 条；每节有托叶 2，合生，窄卵形。

花：花序白绿色，腋生，长 5~12 厘米，分枝稀疏；花雌雄异株；雄花直径约 2 毫米，花被片 4，雄蕊 4。

果：瘦果，卵形而扁，长约 1.5 毫米，光滑。（图 658）



图 658 青活麻(粗根荨麻)

分布:生于半阴山坡、屋侧、沟边、草丛及林缘等处。

产地:产于云南及西藏等省区。

采集:6~9月采集,洗净,切段,晒干。

性味:苦、辛,温。

功能:祛风湿,解痉,解毒。

应用:风湿性关节炎,高血压,小儿惊风,产后抽风,荨麻疹,毒蛇咬伤。

用量:3~9克。

附注:同属植物 三角叶荨麻(花叶活麻) *Urtica triangularis* Hand.-Mazz., 其主要特征是根状茎较前者细,直立茎1~3,叶呈窄长三角形,长3~11厘米,宽1~3.5厘米;托叶4,窄披针形,早落。分布于四川、云南及西藏等省区。在西藏与青活麻同等入药。

659. 青 骨 藤

别名:瓦草、瓦草参、九大牛、滇白前、大牛夕(云南)。

科属:石竹科女娄菜属植物 四川粘毛女娄菜 *Melandrium Viscidum* (Bur. et Fr.) williams var. *szechuanense* (Williams) hand.-Maxx., 以根入药。

形态:多年生草本,高约50厘米。

根:圆锥形或纺锤状,肉质,常数个簇生,外皮浅褐色,内面黄白色。

茎:多数簇生,圆柱形,中空,质脆,节稍膨大,易在节处折断,有短柔毛或腺毛。

叶:单叶对生,无柄;叶片卵圆形,长2~3厘米,宽1~2厘米,先端渐尖,基部楔形或宽楔形,全缘,最下1~2对侧脉常靠近基底,呈三至五出状,两面均有乳突及短柔毛。

花:夏季开淡红色花,二歧聚伞花序顶生,花序上有腺毛;花萼长管状,有10脉,5浅裂;花瓣5,先端2裂。

果:蒴果,圆锥形,顶齿3裂,各齿常再2裂。

种子:多数,肾形,棕色。

分布:生于石灰岩及山野坡地草丛中。

产地:产于四川、贵州和云南等省。

采集:全年可采,洗净切片,晒干。

性味:苦、辛,凉。有小毒。

功能:镇痛,止血,清热,利尿。

应用:跌打损伤,风湿骨痛,胃腹疼痛,支气管炎,尿路感染;外用治外伤出血,疮疖肿毒。

用量:1.5~3克,研末吞服。外用适量,药粉撒敷伤口。

附方:产后宫缩痛,手术后痛:青骨藤根,晒干研粉,压片,每片重0.5克,每次服2~4片。一般服后15~30分钟显效,药效持续5~20多小时。

660. 罗 勒

别名:零陵香(华东)、九层塔、九重塔、香草、鸭香、省头草、矮糠、香佩兰(江苏)。

科属:唇形科罗勒属植物 罗勒 *Ocimum basilicum* L. var. *pilosum* (Willd.) Benth., 以全草入药。

形态:一年生草本,高20~70厘米,芳香。

茎:直立,四棱形,多分枝,常带紫色,密被柔毛。

叶:对生,具细柄,卵形或卵状披针形,长2~7厘米,宽1~4厘米,先端钝尖,基部楔形,边缘有疏锯齿或全缘,下面有腺点。

花:7~9月开花,轮伞花簇集成间断的顶生总状花序;花小,花萼管状,先端5裂,最上1片最大,圆菱形,其余4片较小,呈锐三角形,果时花萼下垂;花冠唇形,白色或略带紫红色,长约9毫米,上唇近等裂,下唇全缘;雄蕊4,稍突出于花冠筒外,花药2室靠

合;雌蕊 1,花柱顶端 2 裂,钻状,向两侧弯曲,挺出于雄蕊之上。

果:4 小坚果,长圆形,褐色,包围宿存花萼中。(图 660)



图 660 罗勒

分布:野生于阴湿处,也有栽培。

产地:产于江苏、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、广东、云南等省区;东北、华北有栽培。

栽培:喜温暖湿润气候,不耐寒,北方可在暖季栽培。种子繁殖,春季播种。

采集:夏、秋季采收全草,除去细根和杂质,切细晒干。栽培品当年可采。

成分:全草含挥发油 0.1%~0.12%,油中主要成分为茴香醚(即甲基胡椒酚或对烯丙基苯甲醚,estragole 或 methylchavicol)约含 55%,芳樟醇(沉香醇 linalool)约含 34%~40%。并含 1,8-桉叶素,以及少量乙酸沉香酯、丁香酚等。

性味:辛,温。

功能:发汗解表,祛风利湿,散瘀止痛。

应用:风寒感冒,头痛,胃腹胀满,消化不良,胃痛,肠炎腹泻,跌打肿痛,风湿关节痛;外用治蛇伤,湿疹,皮炎。

用量:9~15 克;外用适量,鲜品捣烂敷

或煎水洗患处。

附方:骨折:罗勒 2 份,朱砂根、杜仲藤(莢竹桃科)各 1.5 份,小蜡树 4 份,蔓胡颓子 1 份。共研为细末。取药末适量,加酒调成糊状,放入锅内蒸 10~15 分钟后,取药置于纱布上,骨折复位后敷患处,然后用小夹板固定,每日或隔日换药 1 次,直至有少量骨痂出现为止,一般换药 5~7 次即可。换药前先洗净患处,以免发生皮炎。

661. 罗布麻

别名:红麻、茶叶花、红柳子、野麻、羊肚拉角、泽漆麻。

科属:夹竹桃科茶叶花属植物 罗布麻 *Apocynum venetum* L.,以叶或全草入药。

形态:多年生草本,高 1~2 米,全株含有黏稠的白色乳汁。

根:主根粗壮,暗褐色。

茎:直立,节间长,无毛,枝条细长,向阳面通常为紫红色,茎皮强韧,为良好的野生纤维原料。

叶:对生,有短柄;叶片卵状披针形或长圆状披针形,先端圆钝,有短小棘尖,基部圆形,全缘,侧脉细密多在 10 对以上,下面稍有白粉。

花:夏秋开粉红色花,聚伞花序顶生,有微短毛;花萼及花冠均 5 裂;花冠窄钟形,直径约 8 毫米,内外均有短毛;雄蕊的 5 花药贴合成锥形体,先端锥尖。

果:蓇葖果,长角状,长可达 20 厘米,黄褐色带紫晕;种子多数,顶生一簇白色细长毛。(图 661)

分布:生于河滩、草滩、多石的山沟、山坡的沙质土、盐碱地及林缘湿地。

产地:产于东北、华北、西北及河南等地。

采集:开花前摘叶,晒干或阴干,亦有蒸炒揉制后用的;夏季割取全草,切段,晒干。