

福州市民間葯草

第四冊

福州市科學研究所
醫學研究所編

福州市科學技術委員會印

1962年9月2日

蘇州市民間新草

...

...

蘇州市民間新草

...

目 录

151	养心菜	<i>Sedum Kamschaticum</i>	(2)
152	醉魚草	<i>Buddleja Lindleyana</i>	(4)
153	金櫻子	<i>Rosa laevigata Michaux</i>	(6)
154	耬搖	<i>Astragalus sinicus</i>	(8)
155	菝葜	<i>Smilax china</i>	(10)
156	南五味子	<i>Kadsura peltigena Rehd</i>	(12)
157	紫金牛	<i>Ardisia japonica</i>	(14)
158	杜衡	<i>Asarum blumei</i>	(16)
159	胡颓子	<i>Elaeagnus pungens</i>	(18)
160	百两金	<i>Ardisia punctata</i>	(20)
161	赤地利	<i>Polygonum chinense</i>	(22)
162	胡枝子	<i>Lespedeza bicolor</i>	(24)
163	牛蒡草	<i>Arctium lappa</i>	(26)
164	牵牛花	<i>Pharbitis hederacea</i>	(28)
165	接骨木	<i>Sambucus racemosa</i>	(30)
166	木贼	<i>Equisetum hiemale</i>	(32)
167	茉莉花	<i>Jasminum sambac</i>	(34)
168	蟋蟀草	<i>Eleusine indica</i>	(33)
169	胡蘆茶	<i>Pteroloma triquetrum</i>	(38)
170	烏梅	<i>Prunus Mume Fraeparatus</i>	(40)
171	鈎吻	<i>Rhus toxiodendron</i>	(42)
172	吊竹梅	<i>Zebrina pseudula</i>	(44)
173	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i>	(46)
174	鴉胆子	<i>Brucea javauica</i>	(48)
175	藍桉	<i>Eucalyptus globulus</i>	(50)
176	鈎藤	<i>Uncaria Rhynohophylla</i>	(52)
177	芋麻	<i>Boehmeria nivea</i>	(54)
178	月季	<i>Rosa chinensis jacquin</i>	(56)
179	重楼	<i>Paris polyphylla</i>	(58)
180	腊梅	<i>Chimonanthus praecox</i>	(60)
181	小茴香	<i>Foeniculum vulgare</i>	(62)
182	通脱木	<i>Tetrapanax papyriferas</i>	(64)
183	腎蕨	<i>Nephrolepis cordifolia</i>	(66)
184	亨氏綫蕨	<i>Colysis henryi</i>	(68)
185	合掌消	<i>Cynanchum ampxicaule</i>	(70)
186	六棱菊	<i>Laygera alata</i>	(72)
187	白牡丹	<i>Plumbago zeylanica</i>	(74)
188	过路黄	<i>Lysimachia christinae</i>	(76)
189	龙眼	<i>Euphoria longan</i>	(78)
190	散血草	<i>Ajuga decumbens</i>	(80)
191	山麻子	<i>Helicteres augustifolia</i>	(82)
192	算盘子	<i>Glochidion puberum</i>	(84)
193	柘树	<i>Cudrania tricuspidata</i>	(86)
194	鹿啣草	<i>Pyrola rotundifolia</i>	(88)
195	土槿	<i>Evolvulus alsinoides</i>	(90)
196	樛木	<i>Aralia chinensis</i>	(92)
197	桑树	<i>Morus alba</i>	(94)
198	蘆薈	<i>Aloes Vera L.</i>	(96)
199	冬瓜	<i>Benincasa hispida cogu</i>	(98)
200	南瓜	<i>Cucurbita moschata Buch</i>	(100)

养 心 菜

Sedum Kamtschaticum Fiseh

〔异名〕：費菜 軟叶豆升草，安海豆升草、麒麟草(日本)养鷄草(貴阳)小种三七(貴阳)倒心黑豆、瓜只根

〔科属〕：景天科CRASSULACEAE

景 天 屬 *Sedm*, L

〔形态〕：为多年生草本，茎肉质，圓柱形，近根处略带褐色。叶互生，长椭圆形或倒卵形，近似匙形，边缘有微锯齿无絨毛，质厚多肉，呈草綠色。无枝梗。夏月茎梢抽枝开着黃色小花，各部分都为五数，排列成繖形如穗狀花序，經霜后叶茎自枯萎，至春初宿根逐漸萌芽成丛。

〔产地〕：野生山阴湿地，溪澗近水之处或栽培于庭園間

〔药用部分〕：全草

〔性味〕性凉味酸苦无毒，入心脾肝肾諸經

〔功用〕：养阴补血、安神定魄、增津液，宁心悸，活血止血、解毒消肿疗血热虛煩，吐血痰病，目眩头晕，肢节痠楚并貼刀伤等症。

〔主治及用法〕

1. 心律不整

①心悸：养心菜二两、蜜一两开水冲炖服。

②瘧病及心悸亢进：鮮养心菜二两，蜂蜜二两，猪心一个，用法：每次取猪心一个，去外部油脂，用干洁布擦淨猪心表面血液（保留内部血液）不加剖割。立置磁罐內，加养心菜二两团团塞住猪心周围，勿令倒置，入蜂蜜二两（或冰糖）冲开水浸沒猪心为度，放鍋內炖至熟，去养心菜，分两次食尽。（采自福鼎卫协会报导）

2. 眩暈：养心菜一两，雪球一两炖服

3. 吐血：1. 养心菜一两，豆升草（盆豆升）五錢，白糖一两煎服。2. 取鮮全草二两、洗淨、加水适量炖服。

4. 肺脓瘍：养心菜五錢，黄根刺（肺痈草）五錢，猪肺或冰糖炖服。

5. 子宫出血：养心菜叶14叶嚼烂开水送服

6. 打伤吐血：养心菜叶14叶搗烂生服

7. 跌打损伤：

①跌打接骨：养心菜，野葡萄根，酸浆草，先将前二味药搗烂，另将酸浆草煎水和勻敷伤处，用杉木皮包扎，如发热紅肿，加生大黃末相調即可。另用仙桃草五錢，煎水內服，酒引。（采自貴阳民間草药）

②鮮小种养心菜适量，搗烂加甜酒，外敷伤处。

③小种养心菜煨酒服，或全草水煎服。

④呕血暈厥：鮮养心菜之根一两五錢，紅糖五錢、黃酒二两，开水冲炖服、渣搗烂敷伤处

⑤刀伤火伤毒虫刺伤，全草搗烂，敷伤处。

8. 燙伤、烧伤、痛疮，养心菜嫩叶尖、适量搗烂敷之。

9. 小儿瘦瘠：养心菜、嫩叶尖七个，蒸肉吃。


10. 大腸出血：鮮养心菜一两炖酒吃。

11. 鷄骨折：小种养心菜搗烂敷之，有特效

12. 发疽：养心菜一两，土黃芪二两，淫聿蓂二两，天仙果三两，四味切片洗淨加紅糖一两，清水煎，分二次早晚服

外敷：紫花地丁，黃花地丁加冬蜜搗烂分敷至全愈。气血两亏者养心菜一两，黃芪仔二两何首烏一两，鬼針草二两，山葡萄一两內托排脓消肿定痛。

13. 气血衰弱，冻疮皸裂，养心菜五錢，天仙果二两連服2—3次，外用血見愁(干)二两重加生姜二片煎湯洗日二次。



151 养 心 菜

Sedum Kantschaticum Fisch

醉 魚 草

Buddleja Lindleyana Port

〔异名〕：賊仔帥鬧魚花（福州）波枝越（松政）痒見消，魚尾草，櫟木

〔科属〕：馬錢科LOGANIACEAE

醉 魚 草 屬 Buddleja, L.

〔形态〕：直立灌木，多分枝。叶对生，卵形至卵狀披針形，全緣或具稀疏鋸齒，先端漸尖，基部楔形，具叶柄，表面无毛，背面只有中肋及脉紋，上具粉末狀絨毛。花偏向一側，每2—3朵簇生，集成长穗花序，稍下垂；萼筒狀，五浅裂，有鱗片密生，萼裂中三角形卵狀；花冠筒狀、微弯曲，外面紫色，具有白花光亮細鱗片，內面具有白色細柔毛，頂端四裂；雄蕊四枚，着生在花筒內面近基部；雌蕊一枚，子房上位，柱长二裂。果为蒴果，长圓形，有鱗片，成熟时二瓣裂，基部有宿萼。种子稜形或三角狀方形，褐色。花期7—9月。收采期6—10月。

〔产地〕：郊野山上。

〔药用部分〕：全草。

〔性味〕：苦辛温有小毒，入足厥阴，手太阴，手足阳明經。

〔功用〕：散寒軟坚，行气活血，通行經絡，散結疗伤，杀魚类。

〔主治及用法〕：

1.筋骨痠痹（小儿麻痺症）：醉魚草全草一两，土牛膝三錢，石橄欖一两，威灵仙三錢，开水冲炖服。

2.痰飲成胸，遇寒便发：醉魚草花适量，晒干研末和米粉作粿常食。

3.久瘡成癖：第一方：醉魚草全草二两，山羊血五錢，龙眼干七粒，水煎，飯前服。

第二方：醉魚草花一两，大鯽魚一头，将花填鯽魚腹內煨熟去花食魚和汁

4.妇人月里風：第一方：醉魚草根三錢，瓜子金五錢，羊肉半斤，水酒各半炖服。

第二方（无力刺痛）：醉魚草全草二两，兔或鴨母一只，水酒各半炖服。

5.跌打損伤：

第一方：（新伤）：醉魚草二两炖好加酒适量冲服，（前后八卦骨伤均效）或用三两，紅糖一两，黃酒四两，开水一碗冲炖服。

第二方：醉魚草根五錢，泽兰三錢，复老碗一两煎服。

第三方：醉魚草二两，五花肉（不見天）二两，酒适量炖服。

第四方：旧伤成痼：醉魚草全草二两，大叶馬蹄金（紫背）五叶炖服

第五方：（新旧伤）：醉魚草根五錢，鋪地錦（过路蜈蚣）一两，复老碗一两，义酸草一两，旱蓮草一两，叶下紅一两，水酒各半炖服，渣拣去硬梗及根搗烂敷患处。

6.風伤痛：醉魚草根五錢，蛇蓉草一两，地棉根二錢，瘦肉四两，酒水各半炖服。

7.疑肩（臂举不高）：醉魚草头一两，七寸（猪脚）一只，水酒各半炖服。

8.鉤虫病：醉魚草全草六两，貫众六两，水煎分两次服。

9.疳积：用花三錢——五錢水煎服。

10.疥癩：醉魚草五錢，枫球七枚，薺菜三錢，煮鷄蛋食。

11.風濕凝結：鮮全草三两，地瓜酒半斤冲炖服

12.劳力身体疼痛：鮮全根二两，紅糖一两，黃酒四两冲开水炖服。



152 醉 魚 草

Buddleja Lindleyana Port

金 櫻

Rosa laevigata michaux

〔异名〕：草鞋刺、刺梨子、糖罐子、灯笼果、白玉带、野石榴、糖罌筋、黄茶瓶、脱骨丹、山鷄头子、山石榴、金錢子（閩北）。

〔科属〕：蔷薇科 ROSACEAE

薔 薇 屬 *Rosa*, L.,

〔形态〕：为常绿攀缘灌木。茎部新枝密布褐色细刺，刺端有红色腺点，老枝具粗壮倒钩刺。叶羽状复叶互生，通常有小叶3—7枚，托叶线状披针形，叶脉网状，于叶的下表面较明显。花白色，有柄，单生于新枝顶端，花托膨大成瓶状，有细刺、花萼5片，卵状披针形，或下部卵形，上部线形，花瓣5片，倒广卵形，雄蕊甚多，雌蕊线状，多数分离，生于花托内，被有绒毛；花托成熟时红色，肉质浆果状，梨形外有刚毛，内含多数瘦果，九、十月采集。

〔产地〕：溪边、山麓、路旁肥沃半阴地带。

〔药用部分〕：子、根、花、叶。

〔性味〕：酸澹微甘，性平无毒，入脾、肺、肾三经。

〔功用〕：澹精，止泻、疗下痢、止小便（邪热忌用）。根通经，退水肿，解郁痛，果固精斂端，止冷热痢，杀寸白虫。

〔主治及用法〕：

1. 胃痛：（1）金樱子根二重皮四两（一次量），煎服或捣汁用开水冲成500毫升当茶饮。（2）（胃脘痛、心气痛）：金樱子根4两，白银香根4两，苦楝子根4两，共为细末，每服一钱用开水冲服。
2. 瘡疾：金樱子根不拘多少，以酒水各半煎服，或研末制丸服。
3. 胆黄症（胆管炎）：金樱全草，每天用4—6两，煎水作茶饮。
4. 久痢不止：金樱子、罌粟壳，醋炒等分为末蜜丸芡实大每服5—7丸。
5. 妇女白带：金樱膏二两、芡实二两研末为丸，早晚用白鸡冠花一两煎汤送服，每次三钱（忌酒醋）或用根二两，冰糖一两，开水冲炖服。（亦治赤带）
6. 遺精：第一方：金樱根5—8钱酌加水煎成半碗饭前服。
第二方：金樱根2两、五味子三钱、精猪肉适量煮服。
第三方：鲜金樱子一两（去毛）、冰糖五钱，开水冲炖服。
第四方：金樱根5—8钱酌加水煎成半碗去渣、鸡蛋二只去壳炖热，早晚各服一次。
第五方：（梦遺）金樱子煎成胶冲酒服。或用子二十四粒，乌枣一四粒，冰糖五钱，开水冲炖服。
7. 小便不禁或多尿：取果（去净外刺和内核）适量，猪小肚1—2个，酌加水煎，分二次服。
8. 脾洩泻痢：取果1—2两、淮山2两酌加水煎，饭前服。
9. 脾痛：金樱根四两、猪赤肉，黄酒适量炖服。
10. 水肿：第一方：金樱根一两、野猴柿根一两加水三碗煎二碗分二次服，连服5天为一疗程。第二方：金樱合剂：金樱根一两、猴柿根一两、野花生草二两、六十办一两、八卦虎一两煎服。第三方：金樱子合剂：金樱子一斤，生姜一两加水三斤，煎至一斤过滤，加糖和酒适量，每天服2次，每次200毫升，三天为一疗程。
11. 痛肿：取金樱叶适量，捣烂入盐少许涂之。留头出脓。
12. 金疮出血：取金樱叶同桑叶、苧叶阴干研末敷之，能止血，愈合疮口。
13. 化骨硬：金樱根适量煎醋服。
14. 去寸白虫：金樱根皮炒用水煎服。
15. 梦洩遺精：金樱子24粒、乌枣14粒、冰糖5钱，开水冲炖服。
16. 黑須发：金樱花和鉄粉研匀拔白发，涂之即能生黑的。
17. 消渴（糖尿病）：金樱子三两、冬蜜一两、开水一碗冲炖服。
18. 子宮脫垂：（1）金樱子根1—2两煎湯頻服（用代补中益氣湯）。（2）有赤白带下取根浸紅酒七天炖桂丸肉服。（3）取鮮根4斤洗淨切碎，加水20斤，煎取8斤去渣，浓缩至4斤，再加酒4斤，糖适量临睡服4两。（4）納宮飲：金樱根二两，煨磁石三钱，制阳起石一钱半、桂皮一两、乌梅二钱，糖适量。制法：将金樱根、桂皮切片，乌梅捣烂，先煎取汁，另将阳起石碎后合阳起石共研末再与糖調药汁服，日服2剂，隔三日再服。
19. 妇女閉經：取根二两酒炒三次，紅酒4两，紅糖二两，煎取热湯泡鸡蛋二个服，或取根一两酒炒，清水煎加白糖三钱服（閩北）
20. 阴吊阴縮：金樱子根，磨酒服。（男病倒磨，女病順磨）开水磨服亦可（閩北）
21. 火烧烂：鲜金樱子煎液汁搽患处。



153 金 樱 子

Rosa laevigata michaux

翹 搖

Astragalus sinicus L.

〔异名〕：元蓼菜、漂搖草、搖車、翹車、野蚕豆、蓮花草、小巢菜、苕搖、紫云英、紅花菜、草沙苑、米布袋、螃蟹花（貴州）、灯籠花（貴州）。

〔科属〕 豆科LEGUMINOSAE

紫 云 英 屬 *Astragalus* L.

〔形态〕：为越年生草本，茎匍匐地面。叶为羽狀复叶，小叶全緣，近无柄，膜质，倒卵形或橢圓形，先端渾圓，或微凹入，表面平滑，背面略被稀疏的柔毛。春月抽出长花軸，翹然直立，頂端着以短总狀花序，繖形排列，单个腋生，花冠呈淡紫色，間或黃白色的蝶形花，旗瓣卵形，先端圓形基部楔形，实为三角狀莢果，果中有子似豌豆粒小，色为雄黃或綠色，熟时呈紅黑色。花期6—8月。

〔产地〕：田野荒地或播种田間。


〔药用部分〕：茎、叶

〔性味〕：辛平无毒，入手太阴經。

〔功用〕：破血止血、和胃生肌、止热痛、祛热瘡，亦可作綠肥及家畜飼料。

〔主治及用法〕：

1. 五种黃病：翹搖茎叶二两，搗汁温服。
2. 活血明目：a. 翹搖为末、甘草湯送下，每次二錢，日服两次。b. 全草适量煎水服。
3. 热瘡不止：翹搖一两、杵汁温服。
4. 外伤出血：翹搖叶适量搗烂敷患处。（刀伤出血）：叶一两，搗烂敷創口，（能止血除痛、消肿）。
5. 去热風，明耳目，利五脏：翹搖叶当菜常服。
6. 利尿治淋：全草适量水煎服。
7. 癬疥疥瘍：全叶搗蜜敷伤处。



154 翹 搖。

Artragalus rinicus L.

菝 葜

Smilax china Linn

〔异名〕：普貼、罌壳刺（福州）、馬棘兜、馬卡刺（光泽）、木蟹刺（周宁）、大鎂刺（漳浦）、馬杆棘、馬鞍兜、卡馬子儿刺、丐拋叶（将乐）。罌尾刺、戈革草、丁板刺。（福州）

〔科属〕：菝葜科 SMILACACEAE

菝 葜 屬 *Smilax* L.

〔形态〕：为攀緣灌木植物，根茎肥厚而长，有节多刺，黃褐色呈馬鞍狀。叶互生革质，圓形或橢圓形，先端微尖，全緣两面光滑无毛，叶柄基部有托叶，变成卷須两条，借以纏繞他物。初夏叶腋抽花梗，开繖形黃綠色細花，花后結紅色如豆大的漿果。四季均可采集。

〔产地〕生于山野。

〔药用部分〕根、叶。

〔性味〕：甘酸平温无毒，入手足阳明經。

〔功用〕：止渴疗痢，益气血，利小便，疗关节炎，霉毒痛風，瘰癧。

〔主治及用法〕：

1.赤白痢疾：取鮮根3—5两（干2—3两），白痢加紅糖，赤痢加冰糖一两，酌加水煎成半碗，飯前服，日两次。

2.疝气：（俗称寒氣墜腎）取鮮叶2—4两，公鷄1只（約斤余）酌加黃酒和水各半煎，分2—3次服。

3.小便淋瀝：取地下茎2—4两，酌加水煎分3次飯前服。

4.糖尿病：（俗称消渴）取叶風干，酌加水煎代茶常飲。

5.高血压，龙葵五錢、玉黍須三錢、菝葜五錢煎服。

6.痔疮：菝葜五錢煎服，外熏：菝葜5两煎后先熏后洗。


7.淋浊：鮮菝葜头四两，冰糖一两、开水一碗，冲炖飯前服。

8.腹内积聚（各种內結）：菝葜头一两尿浸二日后切片用酒炒加糖炖服。

9.脑頂痛：菝葜根一两、山豆根五錢，炖服。

10.子宮癌初起：菝葜根一两，猪血四两煎湯常服。外用：鮮根半斤醋二斤煎湯熏洗。

11.腰痛洩多：菝葜草根五錢，开水冲炖服。



155 爬 葵(普貼)

Smilax china Linn

南五味子

Kadsura peltigena Rehd Swils

〔异名〕：土木香（福州、龙岩、閩侯）、老蔞絲草（福州、閩侯）、牛卵鍾（清宁）。

〔科属〕：五味子科 SCHISANDRACEAE

南五味子屬 *Kadsura* Kaempf

〔形态〕为常綠蔓性木质藤本，全体无毛，小枝圓柱形，褐色或紫褐色，表面有时呈剝裂狀。叶质厚而軟革质表面平滑有光泽，矩圓形至矩圓狀倒披針形，或长橢圓形，先端漸尖，邊緣有稀疏的小齿牙，或偶为全緣，近基部通常全緣而呈楔狀；叶面深綠色，背面淡綠色，两面均平滑无毛；主脉在表面稍下凹，在背面則突起，側脉在下面不甚明显；叶柄帶綫形，基部不具托叶，六至七月間叶腋开淡黃白色的花，雌雄异株，单性，花梗細长而柔弱，花向下垂，雄花萼片与花瓣无甚区别，矩圓形至广倒卵形，黃色。果呈小球狀，附着于球形膨大的花托周围，成熟时呈紅色，果期 9—10 月間。

〔产地〕：自生山野。

〔药用部分〕：子、根、叶。

〔性味〕：子：苦微酸平，根：苦辛微温，叶：苦酸而澇。入足太阴，手足阳明經。

〔功用〕：化气温中，消痛解毒，对于痈疽及冷滯腹痛有效。

〔主治及用法〕：

1. 胃痛：

第一方：南五味子一两、白龙骨三两、銑子藤二两、公鷄一头（不下水去腸杂将上药納入鷄腹內）用黃酒二斤、开水二斤炖好空腹（早晨未开口时）服。忌芋（否則复发）

第二方：南五味子五錢、双金錢五錢、兔一头、酒水适量炖服。

第三方：南五味子（研粉）一錢，温酒冲服。（或取鮮根一两，开水一杯，冲炖服。）

第四方：南五味子五錢、黃淡根三錢、銑槁花五錢、老鼠烏五錢、酒水适量煎服（或炖鷄更效）。

第五方：南五味子五錢、土牛夕头五錢、荔枝根五錢、鷄蛋二粒、水酒各半煎，煎二次后鷄蛋同服。实痛：加紅根仔一两、虚痛加紅根仔一两、牛奶仔一两。（忌芋头愈久愈好）

第六方：南五味子五錢、鋪香三錢，煎液加 2% 酒精以防腐（为一次量）。

第七方：南五味子根二两、羊肉四两、老酒半斤冲炖服。

2. 痰嗽气喘（气管支炎）：南五味子五錢、金扁柏五錢、野花生五錢、馬鞭草三錢水煎服。

3. 冷滯腹痛：南五味子根一两和水煎成半碗温服日两次。

4. 伤痛：

第一方：新旧伤胸肋疼痛：南五味子一两、积雪草五錢、白龙骨一两，煎服。

第二方洗伤：南五味子五錢、杜远草一两、螺丕草五錢、义酸草五錢、馬鞭草五錢、复老碗五錢、肺風草五錢同酒或酸浸棉花洗伤部后以七寸金（一条香）干 1—2 錢同盐飴搗敷伤部。

第三方：內服：前八卦伤：南五味子三錢、白賊仔艸二两、酒炖服，后脊椎伤。南五味子三錢、白賊仔艸二两、骨碎补三錢、酒炖飯后服，服后臥患側睡。

5. 痈疮：（阴症未化脓）：南五味子一两、番薯烧一醉炖服，（上身飯后服，下身飯前服）外敷加白糲丸一粒搗敷。

6. 痈疽背疮：南五味子鮮叶适量（視疮大小）和冬蜜搗匀外敷。（疗毒用鮮叶二两搗蜜敷）。



156 南 五 味 子

Kadsura peltigena Rehd Swils

紫 金 牛

Ardisia japonica, Blume

〔异名〕：平地木、石青子、凉繖遮金珠、藪柑子、硃砂根、高脚凉傘草、茶果、小青、矮茶、金牛草、叶底紅、眞珠凉傘、紅珠砂。

〔科属〕：紫金牛科 MYRSIACEAE

硃 砂 根 屬 *Ardisia*, Swarty

〔形态〕：为山草类常綠小灌木，狀如多年生草本。叶互生长卵形如茶叶有锯齿，上綠下紫。夏月茎梢間开小花，有花梗，作合瓣花冠，带青白色，着以赤色的小点，常两花聚集而生。其果实小如珠形，成熟呈紅色，如丹朱或为白色，鮮美可愛，而經久不落。根微紫色，八月采根去心曝干，頗似巴戟。

〔产地〕：自生山野阴地。

〔药用部分〕：根、枝、叶。

〔性味〕：枝叶：辛平无毒，入手太阴經。根：苦凉无毒，入手少阴、厥阴經。

〔功用〕：枝叶升提行气，根破血解毒，疗膈气，去風痰，祛瘀止血。

〔主治及用法〕：

1. 子宮脫垂：紫金牛根四两，切碎后用开水300cc煎后濃縮为 225cc，用上清液同黃豆四两煎熬，加土黃酒少許炖服。每日一剂，連服 6 日为一疗程。外用八味散：五倍子一两、炒枳壳一錢、炒升麻五錢、牡蠣一两、雄黃五錢、明矾一两、儿茶二分、冰片三分，以上八味研末醮于棉花上塞入子宮頸口糜爛处，并以消毒紗布填塞阴道患部。

2. 打扑金疮，伤处浮肿：紫金皮散：紫金皮、南星、草烏、川烏、半夏、当归、黃柏、川芎、烏药、破故紙、白芷、刘寄奴、川牛夕、桑白皮、杜仲，研細末生姜、薄荷汁調敷（皮热加黃柏、生地各五錢。有疮口勿封，即于四边敷之。）

3. 肺病：肺癆吐血、久嗽：叶茎适量煎服。咳嗽出血：鮮草二两，冰糖五錢，开水冲炖早晚分服。

4. 疝气：疝气偏墜，全草适量搗汁冲酒服。

5. 肺癆久嗽咯血：紫金牛叶干者三錢，連心猪肺一具，洗淨用磁片挑开肺管，将叶塞入，麻綫縛好，将肺煮熟，先吃肺湯，然后去渣食肺（亦可以醬油蘸食）。吃完三肺，为一疗程，未愈再服。

6. 肺病咯血：紫金牛一两，紅枣适量炖服。

7. 睪丸炎：全草二两，冰糖五錢，开水冲炖服，渣搗烂敷患处。

8. 疝气痛肿：根一两，荔枝干十四粒，水酒各半煎服。



157 紫金牛

Ardisia japonica