

Atlas of Woody Plants in China

Distribution and Climate

Volume II

Edited by

Jingyun Fang

Zhiheng Wang

Zhiyao Tang



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

Atlas of Woody Plants in China

Distribution and Climate

Volume II



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

准确翔实的物种分布资料是宏观生态学、生物地理学以及保护生物学等学科的研究基础,也是农业、林业生产实践的重要基础。北美、欧洲和日本在 20 世纪七八十年代就出版了详细的动、植物物种分布图,为这些区域的生物地理学、宏观生态学研究以及生物多样性保护实践提供了不可缺少的基础资料。中国是全球 12 个“巨大生物多样性国家”之一,拥有超过 30 000 种维管植物,其中包括约 11 000 种木本植物、3200 种树木,物种数量远高于同处中高纬度的北美洲和欧洲。但中国目前还没有较为完善的植物分布图集。

本图集在忠实于标本记录的基础上,收集了我国目前已出版的全国、各省区和地方植物志、树木志,以及区域科学考察报告和学术论文中有关的木本植物分布资料,并在此基础上邀请全国各地 20 多位专家对现有资料进行修订和补充,最终编制了我国已知的全部 11 405 种木本植物的详尽分布图。图集中的物种名录采用了当前最新的分类系统,与国际标准一致。同时,图集还提供了物种的生活型以及物种分布区的 13 个气候和初级生产力指标,为生态学、生物地理学和保护生物学的基础研究和实践提供了重要的基础资料。

本图集是目前中国第一部具有完整木本植物名录、包含翔实分布信息和气候特征的专著,可作为生态学、植物学、地理学等相关学科的广大师生以及农林科技工作者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中国木本植物分布图集 = Atlas of Woody Plants in China: Distribution and Climate: 中、英文 / 方精云, 王志恒, 唐志尧编著. — 北京: 高等教育出版社, 2009.9

ISBN 978-7-04-026859-1

I. 中… II. ①方… ②王… ③唐… III. 木本植物—中国—图集
IV. S717.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 170374 号

策划编辑	林金安 王 莉	责任编辑	王 莉 刘思涵	封面设计	张志奇
版式设计	张志奇	责任排版	高 瑾 张志奇	责任印制	陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 涿州市星河印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16
印 张 41.5
字 数 1 300 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2009年10月第1版
印 次 2009年10月第1次印刷
定 价 580.00元(全4册)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 26859-001

Atlas of Woody Plants in China

Distribution and Climate

Edited by

Jingyun Fang

Zhiheng Wang

Zhiyao Tang

Other Contributors

Xiulian Chi, Zhaodi Guo, Yue Jiang, Lai Jiang, Jing Li, Liping Li, Xin Lin, Chang Liu, Jinglei Liu, Yining Liu, Xiujuan Qiao, Yanlin Ren, Zehao Shen, Kun Tan, Luying Tang, Jie Wang, Shaopeng Wang, Yetao Yan, Xinping Zhang, Yanming Zhang, Rui Zhou, Jiangling Zhu

Review Experts (Focal Areas)

Sizhao Fang (*Guizhou*), Ying Hai (*Xinjiang*), Shushen Lai (*Jiangxi*), Fazeng Li (*Shandong*), Guangzhao Li (*Guangxi*), Zhenyu Li (*Species checklist*), Cunzhu Liang (*Inner Mongolia and Ningxia*), Chudian Liu (*Fujian*), Anwar Mohammad (*Xinjiang*), Yi Ren (*Shaanxi*), Kun Sun (*Gansu*), Shizhou Sun (*North China and Tibet*), Zemin Wu (*Anhui*), Chengdong Xu (*Yunnan*), Qinzhou Yang (*Sichuan and Chongqing*), Huagu Ye (*Guangdong*), Yongzhong Ye (*Henan*), Xunlin Yu (*Hunan*), Zien Zhao (*Hubei*), Xingmin Zhou (*Qinghai*), Zhanjiang Zong (*Northeast China*)

中国木本植物分布图集

方精云 王志恒 唐志尧 编著

参与数据收集和数据库建立的人员（按姓氏拼音排序）

池秀莲、郭兆迪、江玥、姜来、李晶、李利平、林鑫、刘畅、刘晶磊、刘恽宁、乔秀娟、任艳林、沈泽昊、谭琨、汤璐瑛、汪洁、王少鹏、闫业涛、张新平、张延明、周睿、朱江玲

审校专家及负责区域（按姓氏拼音排序）

方嗣昭(贵州)、海鹰(新疆)、赖书绅(江西)、李法曾(山东)、李光照(广西)、李振宇(植物名录)、梁存柱(内蒙古、宁夏)、刘初钿(福建)、安尼瓦尔·买买提(新疆)、任毅(陕西)、孙坤(甘肃)、孙世洲(华北地区和西藏)、吴泽民(安徽)、徐成东(云南)、杨钦周(四川、重庆)、叶华谷(广东)、叶永忠(河南)、喻勋林(湖南)、赵子恩(湖北)、周兴民(青海)、宗占江(东北地区)

Biosketches of Editors | 作者简介



Jingyun Fang | 方精云

Dr. Jingyun Fang is a Cheung Kong Professor at Department of Ecology, Peking University. He obtained his PhD from Osaka City University (Japan) in 1989. His research interests cover vegetation ecology, biogeography of plants, carbon cycle and the application of remote sensing. He is an author of more than 230 publications including five books. He has received several awards including He-Liang-He-Li Science and Technology Progress Award, Cheung Kong Scholars Achievement Award, and National Natural Science Award of the State Council. He is a member of the Chinese Academy of Sciences and the Academy of Science for the Developing World (TWAS), and serves as the editorial board member for several journals including *Frontiers in Ecology and the Environment*, *Ecosystems*, *Global Environmental Change*, *Science China*, *Ecological Research*, *BMC Ecology* and others.

北京大学长江特聘教授、中科院院士，第三世界科学院院士。1989年获日本大阪市立大学生物学博士学位。主要从事植被生态学、生物多样性、生态系统碳循环等方面的科研和教学工作。共发表论文230余篇，出版专著5部。曾获首届国家杰出青年科学基金(1994)、教育部自然科学一等奖(2003)，国家自然科学二等奖(2004)，长江学者成就奖(2006)，何梁何利科学技术进步奖(2007)等奖项以及全国野外科技工作先进个人称号(2009)。是国内外多个专业杂志的编委或副主编，包括 *Frontiers in Ecology and the Environment*, *Ecosystems*, *Global Environmental Change*, *Science China*, *Ecological Research*, *BMC Ecology*。



Zhiheng Wang | 王志恒

Dr. Zhiheng Wang is a postdoc researcher in Institute of Environmental Sciences, University of Zurich, Switzerland. He got his PhD at Peking University in 2008, and has research interests in all issues of macroecology. He has been working on the Database of China's Woody Plants for the last six years. His recent focus is on macro-scale patterns of species richness, species range size, species body size, patterns in community structure, and the mechanistic causes of such patterns. His current research involves testing the influence of contemporary climate, evolutionary history, human activities, and spatial scale on species diversity patterns using the synthesis of climatic, phylogenetic, and anthropogenic data. He has published 20 papers, including a recent paper in the *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*.

目前在瑞士苏黎世大学环境科学研究所从事博士后研究。2008年毕业于北京大学，获理学博士学位。过去6年以来一直致力于“中国木本植物分布数据库”的建设。主要从事宏观生态学和全球变化生态学研究，内容包括物种多样性、物种分布区、个体大小和群落结构的大尺

度格局及其进化和气候的形成机制，以及气候变化对物种多样性的影响。发表论文 20 余篇，包括一篇美国科学院院刊论文。



Zhiyao Tang | 唐志尧

Dr. Zhiyao Tang is an associate professor at the Department of Ecology, Peking University. He got his PhD at Peking University in 2003. His research interests include plant community ecology, biodiversity patterns, climate-vegetation interaction, and application of remote sensing in ecology. He has authored more than 40 peer-reviewed articles and two books.

北京大学生态学系副教授。2003 年毕业于北京大学，获理学博士学位。主要从事植被植物群落生态学、生物多样性、植被气候关系以及生态遥感等方面的科研与教学工作。发表论文 40 余篇，专著 2 部。

Preface | 前言

China is one of the earth's 12 mega-biodiversity countries, and the most diverse country in the northern hemisphere. With more than 30,000 species of vascular plants, more than 1/3 of which are woody plants, the number of plant species in China is higher than in Europe and North America combined. However, a comprehensive atlas of the distribution of woody plants in China has not been yet available though atlases of the species distribution in many western countries were compiled several decades ago. For example, an atlas of the United States trees was published in the 1970s. The atlas of vascular plants in Japan with a vertical resolution of 50 m was compiled in the 1970s. A project for mapping distribution of vascular plants in Europe was launched in 1965, and 13 volumes of the atlas have been published to date. These atlases of plants are of both scientific and practical importance, and provide an indispensable database for understanding the patterns and mechanisms of species distribution, utilizing the biological resources, protecting biological diversity, implementing regional development planning, and predicting ecological responses of plants to global environmental changes.

Why has China lacked of such atlas? This might be primarily due to there being too many species and limited information on the distributions of those species. These make some people think that it is not right time to compile the national atlas for China's plants. However, I don't agree with this opinion. Nothing is perfect, especially for the information on species distribution. For example, in 1817, Alexander von Humboldt drew the first isothermal map based on temperature data from only 58 climatic stations globally, which became the basis for climatic division and physiogeographical study for decades. Japan has completed the atlas for all its vascular plants with a vertical resolution of 50 m in the 1970s with limited information on distribution of plants. Compared with these, China has accumulated copious data on plant distribution through the efforts of the several generations of botanists and ecologists over the past half century. These hard-earned data provide an essential base to systematically compile the atlas of China's plants. Therefore, in my opinion, now it is the time to compile the atlas of China's plants, which is an urgent need for the conservation and sustainable use of biological resources.

The idea of compiling the atlas of China's plants initially came into my mind in the mid-1980s when I was a PhD student in Japan. My dissertation was to examine the relationships between climate and vegetation in China and I strongly felt that China was lacking of the species distribution data. I was very impressed when I saw the detailed spatial explicit distribution maps of vascular plants in Japan, and made a copy of the maps of major species and brought them back to China. They are still kept on my bookshelf now. In

1996, I was touched again when I saw the atlas of the United States trees and European species in McGill University, Canada, where I was a visiting scholar. These two shocks made me long hope that we should have an atlas for China's plants in the near future. In 2003 as the first step of compiling an atlas for all the plants of China, we initiated a project to compile the *Atlas for All the China's Woody Plants*, although without specific funds, because distribution information is relatively rich and the checklist is well-documented for the woody plants in China. As the basic data of the atlas, we first started to construct "*Database of China's Woody Plants*". We documented the distribution sites for all the species based on specimen records and all the validated records documented in publications. After six years' efforts, this atlas which documents more than 11,000 woody species was eventually published.

In this atlas, we provide distribution maps for more than 11,000 species at the level of counties. We also documented information on climate, primary production and life forms for each species. This atlas contains information on both species and environmental variables, compared with the previous atlases published in other countries or regions.

As above mentioned, we launched this project without specific financial support. However, we have been lucky to have creative human resources and excellent students, who have been dedicated to the collection and compilation of these basic data, which is difficult to yield articles but is critically significant in scientific research and practical use. Here, I would like especially to mention two major contributors of this atlas, Dr. Zhiheng Wang and Dr. Zhiyao Tang, who took major responsibility to complete the atlas. Zhiheng was my PhD student whose PhD project was to examine patterns of China's woody plants and the mechanisms that shape those patterns. He joined my group in his senior year, and I asked him to postpone his defense for his PhD twice to complete the construction of the database of China's woody plants. For this reason, he stayed in my group as a PhD student for eight years. During this period he led a group of students to overcome many problems that data compilations posed and spent six years and finally completed the database, which makes publishing this atlas possible. Zhiyao donated uncounted hours of his time to collect data, check distribution records, collate species name, design maps, and so on. In addition, many staff and students contributed their time in data collection, data input and species name collation. To all of them, I am grateful.

The atlas was based on many sources of information, including a Chinese version (*Flora Reipublicae Popularis Sinicae*) and English version of "*Flora of China*", and "*Seed Plants of China*" edited by Zhengyi Wu, "*Higher Plants of China*" edited by Liguao Fu, and nu-

merous local flora and species surveying reports. The compilation of this atlas would be impossible without these basic, most essential works. Here, I am greatly indebted to all the authors for their efforts. I would also like to thank the botanists and field biologists who reviewed and corrected the distribution records of species. I want to acknowledge many students in the Department of Ecology, Peking University, who assisted this project by documenting distribution data. Mr. Jin'an Lin and Ms. Li Wang of Higher Education Press (China) spent lots of time editing, collating and publishing this atlas. I will like to express my many thanks for all these people. The compilation of this atlas was partly supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos: 40638039,

90711002, 30721140306, 40871030, 40501025, 49971002, 39970044, 39425003).

In spite of our best efforts, errors still remain in this atlas due to our limited knowledge and limited information on species distribution. Please contact us (Email: zytang@urban.pku.edu.cn) and send us your comments so that we can update the atlas in the near future.

Jingyun Fang
Professor of Plant Ecology
September, 2009

中国是世界上物种多样性特别丰富的国家之一，拥有维管植物约30 000余种，其中1/3以上是木本植物，比北美和欧洲的总和还要多。但中国至今尚没有全面记述这些物种地理分布的图集。这应该说是件十分缺憾的事。早在几十年前，西方国家就已经完成了物种分布图的编制工作。比如，美国于20世纪70年代完成了全美木本植物分布图的编制；日本在20世纪70年代出版了所有维管植物的分布图，物种垂直分布范围的精度达50 m；欧洲也于1965年开始了维管植物分布图的编制工作。这些分布图为揭示物种的分布规律、开发和利用生物资源、开展生物多样性保护、进行区域发展规划，以及预测气候变化的生态影响等提供了不可或缺的基本资料，其科学价值和实践意义是不言而喻的。

为什么中国缺乏这类分布图？物种多、物种分布资料不足又散布于各类文献中，造成了编制工作难度大，这可能是最主要的原因。此外，国内对编制物种分布图的保守认识也是一个重要的限制因素。

据我所知，国内一些人认为，我国物种分布资料不足，目前尚不具备编制植物分布图集的条件。但我不同意这种说法。科学技术的进步是无止境的，大自然的很多现象和规律是逐渐被认知的，否则人类文明就不会进步到今天。1817年洪堡依据全球仅有的58个气象站的气温资料，编制了世界首张全球等温线分布图，是气候分区和自然地理学研究的一个重要里程碑，成为相当长时期内开展相关研究的基石。又如，日本在30多年前就能出版垂直分布范围高达50 m精度的维管植物分布图，不能说他们当时已经掌握了所有物种准确的分布信息。因此，如果等物种分布资料齐全了才编制其分布图，那我们所待何时？事实上，经过广大植物学家、生态学家半个多世纪的努力，我国的物种分布资料已经有了相当深厚的积累，系统编制物种分布图的时机已经成熟，这也是时代发展的迫切要求。当然，随着知识的积累和认识水平的提高，这类分布图的信息需要进一步补充和完善。

编制中国植物分布图是我在学生时代就萌生的愿望。

早在20世纪80年代的中后期，我在日本读书，博士期间的研究课题就是关于中国植物分布与气候关系的研究，实感中国物种分布数据之缺乏。当我看到日本详尽的物种分布图时，那种欣喜若狂至今还记忆深刻，当时我就不加思索地把主要物种的分布图全都复印了下来，带回国内，至今还保存着。1996年，我去加拿大McGill大学做访问学者，看到美国和欧洲也有详尽的物种分布图，又一次受到触动。于是，就产生了将来我们也要编制中国植物分布图的想法。2003年，在没有专项经费支持的情况下，我们决定先编制分布资料较多、种名相对稳定的木本植物分布图，于是启动了“中国木本植物分布图的编制”自设课题。次年，作为编制物种分布图的基础工作，课题组开始了“中国木本植物分布数据库”的建设。历经6年的艰苦工作，这本多达2 000余页的图集终于与读者见面了。

本图集的特点是为11 405个物种提供县级分布信息；每个物种的分布信息在忠实于标本记录的基础上，最大限度地吸收了所有物种分布研究的成果；提供物种分布区的气候资料和分布区初级生产力的平均状况。此外，我们也提供了绝大多数物种的主要生活型信息。本图集的这些特点，既克服了西方国家仅提供物种分布信息的局限性，也满足了人们对分布区气候和物种生活型等基础信息的需求，使其更具实用性。

前面讲过，我们是在没有专项经费的条件下开始此项工作的。我们虽然没有专项经费，但有丰厚的人力资源，有非常优秀的同学，他们愿意献身于这类发表成果难、但有重要科学和应用价值的基础性数据的收集和整理工作。这里，我要特别提到本图集的两位主要作者：王志恒和唐志尧，他们是本图集的主要贡献者。王志恒当时是我的直博生，我给他的博士论文题目就是中国木本植物多样性的分布格局及其机制的研究。他自大三就进入我的研究组，直到博士毕业，一共呆了8年。为了完成数据库的建设，我两度让他推延博士毕业。他带领一批同学，克服物种多、

物种名称杂乱、物种分布信息零散不全等困难，历时6年，终于建成了“中国木本植物分布数据库”，使本图集的编制成为可能。另一名主要作者唐志尧，在物种分布数据收集、分布区和种名校核、分布图制作与设计、编辑和出版等方面，做了主要的工作。可以说，他们二位是本图集编制出版的主要贡献者。此外，很多老师和同学在数据收集和录入、种名校核等方面也做了大量繁杂的工作。

本图集凝聚了几代人的心血和汗水，它是在中英文版《中国植物志》、吴征镒先生主编的《中国植物分布数据库》所记载的物种名录、傅立国主编的《中国高等植物》以及众多地方植物志和调查报告中所记载的物种分布信息的基础上编制出版的。因此，我要特别感谢这些作者们，没有他们的工作，就没有本图集的出版。北京大学生态学系的多位同学参与了数据的收集、整理和校对，以及

分布图的制作等。数据库建成后邀请各地的有关专家对种名和分布区进行了校验和补充。高等教育出版社的林金安先生、王莉女士为本图集的制作、编辑和出版做了大量艰苦而有成效的工作。在此，对他们表示衷心的感谢。本图集在数据收集、整理和出版过程中，得到国家自然科学基金委的部分资助(编号：40638039, 90711002, 30721140306, 40871030, 40501025, 49971002, 39970044, 39425003)。

由于我们水平有限，以及现有资料的不足，本图集肯定存在一些纰漏，请读者们批评指正(请联系zytang@urban.pku.edu.cn)，以便在修订时改进。

方精云
2009年9月
于北京大学

1 科、属、种排列说明

本图集科、属、种排列顺序如下：科序按 *Flora of China* 系统排列；科内（属、种）按字母顺序排列。本图集分三册出版，并附种名索引一册。


2 气候指标表示方法及使用说明

本图集给出每个种分布区的 12 个气候变量和植被净生产力的均值和范围。这些指标的意义和计算见第 xxvi-xxvii 页说明。对于分布区小于 5 个县域的物种，我们仅列出各气候指标的均值。为节省空间，这些指标按以下顺序给出，并在各类气候指标（温度指标、水分指标和水热综合指标）之间间隔以“■”符号。另外，各指标都省去单位。顺序（含单位）如下：

年均温（℃）；最冷月均温（℃）；最热月均温（℃）；

年生生物温度（℃）；温暖指数（℃）；寒冷指数（℃）；潜在蒸散量（mm）■年降水（mm）；最暖季降水（mm）；最冷季降水（mm）■湿润指数；年实际蒸散量（mm）；植被净第一性生产力（ $\text{g} \cdot \text{a}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ ）

以穗花杉 [*Amentotaxus argotaenia* (Hance) Pilg, 红豆杉科 Taxaceae, 穗花杉属 *Amentotaxus*] 为例，用下面的示意图说明分布图及气候指标的含义。穗花杉在其分布区的气候指标（平均值和范围）如下：年均温为 18.0℃（范围为 9.3~22.9℃），最冷月均温 8.0℃（-1.7~15.2℃），最热月均温 26.8℃（19.6~29.8℃），年生生物温度 18.0℃（9.5~22.9℃），温暖指数 157.1℃（69.8~214.8℃），寒冷指数 0.7℃（0.0~18.0℃），潜在蒸散量 952 mm（603~1232 mm）■年降水 1530 mm（711~2435 mm），最暖季降水 605 mm（357~1428 mm），最冷季降水 150 mm（15~250 mm）■湿润指数 61.9（21.1~145.8），年实际蒸散量 947 mm（603~1232 mm），植被净第一性生产力 228.0 $\text{g} \cdot \text{a}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ （134.6~447.4 $\text{g} \cdot \text{a}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ ）。



Contents | 目录

1 Introduction to the Compilation of This Atlas 中国木本植物分布图编制说明	xxv
2 Characteristics of Distribution of Woody Plants in China 中国木本植物分布的基本特征	xxix
3 Climatic Variables and Their Distribution in China 气候指标的计算和分布图	xxxiii

Species Distribution and Climates 物种分布图和气候指标 1

Cyatheaceae 桫欏科			
<i>Alsophila</i> 桫欏属	2		
<i>Sphaeropteris</i> 白桫欏属	4		
Dicksoniaceae 蚌壳蕨科			
<i>Cibotium</i> 金毛狗属	4		
Blechnaceae 乌毛蕨科			
<i>Brainea</i> 苏铁蕨属	4		
<i>Diploblechnum</i> 扫把蕨属	4		
Cycadaceae 苏铁科			
<i>Cycas</i> 苏铁属	4		
Ginkgoaceae 银杏科			
<i>Ginkgo</i> 银杏属	7		
Pinaceae 松科			
<i>Abies</i> 冷杉属	7		
<i>Cathaya</i> 银杉属	12		
<i>Cedrus</i> 雪松属	12		
<i>Keteleeria</i> 油杉属	12		
<i>Larix</i> 落叶松属	13		
<i>Picea</i> 云杉属	15		
<i>Pinus</i> 松属	19		
<i>Pseudolarix</i> 金钱松属	25		
<i>Pseudotsuga</i> 黄杉属	25		
<i>Tsuga</i> 铁杉属	26		
Taxodiaceae 杉科			
<i>Cryptomeria</i> 柳杉属	27		
<i>Cunninghamia</i> 杉属	27		
<i>Glyptostrobus</i> 水松属	27		
<i>Metasequoia</i> 水杉属	27		
<i>Taiwania</i> 台湾杉属	28		
Cupressaceae 柏科			
<i>Calocedrus</i> 翠柏属	28		
<i>Chamaecyparis</i> 扁柏属	28		
<i>Cupressus</i> 柏属	28		
<i>Fokienia</i> 福建柏属	29		
<i>Juniperus</i> 刺柏属	30		
<i>Platycladus</i> 侧柏属	35		
<i>Thuja</i> 崖柏属	35		
Podocarpaceae 罗汉松科			
<i>Dacrycarpus</i> 鸡毛松属	35		
<i>Dacrydium</i> 陆均松属	35		
<i>Nageia</i> 竹柏属	35		
<i>Podocarpus</i> 罗汉松属	36		
Cephalotaxaceae 三尖杉科			
<i>Cephalotaxus</i> 粗榧属	38		
Taxaceae 红豆杉科			
<i>Amentotaxus</i> 穗花杉属	39		
<i>Pseudotaxus</i> 白豆杉属	39		
<i>Taxus</i> 红豆杉属	39		
<i>Torreya</i> 榧树属	40		
Ephedraceae 麻黄科			
<i>Ephedra</i> 麻黄属	41		
Gnetaceae 买麻藤科			
<i>Gnetum</i> 买麻藤属	44		
Piperaceae 胡椒科			
<i>Piper</i> 胡椒属	45		
Chloranthaceae 金粟兰科			
<i>Chloranthus</i> 金粟兰属	47		
<i>Hedysmum</i> 雪香兰属	48		
<i>Sarcandra</i> 草珊瑚属	48		
Salicaceae 杨柳科			
<i>Chosenia</i> 钻天柳属	48		
<i>Populus</i> 杨属	48		
<i>Salix</i> 柳属	63		
Myricaceae 杨梅科			
<i>Myrica</i> 杨梅属	118		
Juglandaceae 胡桃科			
<i>Annamocarya</i> 喙核桃属	119		
<i>Carya</i> 山核桃属	119		
<i>Cyclocarya</i> 青钱柳属	120		
<i>Engelhardia</i> 黄杞属	120		
<i>Juglans</i> 胡桃属	121		
<i>Platycarya</i> 化香树属	121		
<i>Pterocarya</i> 枫杨属	122		
Betulaceae 桦木科			
<i>Alnus</i> 桤木属	123		
<i>Betula</i> 桦木属	124		
<i>Carpinus</i> 鹅耳枥属	130		
<i>Corylus</i> 榛属	137		
<i>Ostrya</i> 铁木属	139		
<i>Ostryopsis</i> 虎榛子属	140		
Fagaceae 壳斗科			
<i>Castanea</i> 栗属	140		
<i>Castanopsis</i> 锥属	140		
<i>Cyclobalanopsis</i> 青冈属	150		
<i>Fagus</i> 水青冈属	162		
<i>Formanodendron</i> 三棱栎属	163		
<i>Lithocarpus</i> 石栎属	163		
<i>Quercus</i> 栎属	185		
Ulmaceae 榆科			
<i>Aphananthe</i> 糙叶树属	190		
<i>Celtis</i> 朴属	191		
<i>Gironniera</i> 白颜树属	193		
<i>Hemiptelea</i> 刺榆属	193		
<i>Pteroceltis</i> 青檀属	193		
<i>Trema</i> 山黄麻属	193		
<i>Ulmus</i> 榆属	195		
<i>Zelkova</i> 榉属	199		
Rhoipteleaceae 马尾树科			
<i>Rhoiptelea</i> 马尾树属	199		

Moraceae 桑科			
<i>Antiaris</i> 见血封喉属	200	<i>Taxillus</i> 钝果寄生属	250
<i>Artocarpus</i> 波罗密属	200	Viscaceae 槲寄生科	
<i>Broussonetia</i> 构属	202	<i>Arceuthobium</i> 油杉寄生属	253
<i>Ficus</i> 榕属	203	<i>Korthalsella</i> 栗寄生属	254
<i>Maclura</i> 柘属	222	<i>Viscum</i> 槲寄生属	254
<i>Malaisia</i> 牛筋藤属	223	Aristolochiaceae 马兜铃科	
<i>Morus</i> 桑属	223	<i>Aristolochia</i> 马兜铃属	256
<i>Streblus</i> 鹊肾树属	225	<i>Thottea</i> 阿柏麻属	259
Urticaceae 荨麻科		Polygonaceae 蓼科	
<i>Archiboehmeria</i> 舌柱麻属	226	<i>Atraphaxis</i> 针枝蓼属	259
<i>Boehmeria</i> 苕麻属	227	<i>Calligonum</i> 沙拐枣属	261
<i>Cypholophus</i> 瘤冠麻属	231	<i>Fagopyrum</i> 荞麦属	265
<i>Debregeasia</i> 水麻属	231	<i>Fallopia</i> 何首乌属	265
<i>Dendrocide</i> 火麻树属	232	<i>Parapteropyrum</i> 翅果蓼属	266
<i>Laportea</i> 艾麻属	233	<i>Polygonum</i> 蓼属	266
<i>Leucosyke</i> 四脉麻属	233	<i>Rumex</i> 酸模属	268
<i>Maoutia</i> 水丝麻属	233	Chenopodiaceae 藜科	
<i>Oreocnide</i> 紫麻属	233	<i>Atriplex</i> 滨藜属	268
<i>Pipturus</i> 落尾麻属	235	<i>Halostachys</i> 盐穗木属	268
<i>Poikilospermum</i> 锥头麻属	235	<i>Haloxylon</i> 琐琐属	268
<i>Pouzolzia</i> 雾水葛属	236	<i>Kalidium</i> 盐爪爪属	269
<i>Sarcochlamys</i> 肉被麻属	236	<i>Krascheninnikovia</i> 驼绒藜属	269
Proteaceae 山龙眼科		<i>Salsola</i> 猪毛菜属	270
<i>Helicia</i> 山龙眼属	236	<i>Suaeda</i> 碱蓬属	270
<i>Heliciopsis</i> 假山龙眼属	240	Amaranthaceae 苋科	
Oleaceae 铁青树科		<i>Deeringia</i> 浆果苋属	271
<i>Erythralum</i> 赤苍藤属	240	<i>Stilbanthus</i> 巨萼藤属	271
<i>Malania</i> 蒜头果属	241	Nyctaginaceae 紫茉莉科	
<i>Oxal</i> 铁青树属	241	<i>Bougainvillea</i> 叶子花属	271
<i>Schoepfia</i> 青皮木属	241	<i>Commicarpus</i> 黏腺果属	271
<i>Ximenia</i> 海檀木属	242	<i>Pisonia</i> 腺果藤属	272
Opiliaceae 山柚子科		Caryophyllaceae 石竹科	
<i>Cansjera</i> 山柑藤属	242	<i>Gymnocarpus</i> 裸果木属	272
<i>Champerea</i> 台湾山柚属	242	Eupteleaceae 领春木科	
<i>Lepionurus</i> 鳞尾木属	242	<i>Euptelea</i> 领春木属	272
<i>Opilia</i> 山柚子属	242	Trochodendraceae 昆栏树科	
<i>Urobotrya</i> 尾球木属	243	<i>Trochodendron</i> 昆栏树属	272
Santalaceae 檀香科		Tetracentraceae 水青树科	
<i>Buckleya</i> 米面蓊属	243	<i>Tetracentron</i> 水青树属	273
<i>Dendrotrophe</i> 寄生藤属	243	Cercidiphyllaceae 连香树科	
<i>Osyris</i> 沙针属	244	<i>Cercidiphyllum</i> 连香树属	273
<i>Pyralia</i> 檀梨属	244	Paeoniaceae 芍药科	
<i>Scleropyrum</i> 硬核属	244	<i>Paeonia</i> 芍药属	273
Loranthaceae 桑寄生科		Ranunculaceae 毛茛科	
<i>Dendrophthoe</i> 五蕊寄生属	245	<i>Clematis</i> 铁线莲属	274
<i>Elytranthe</i> 大苞鞘花属	245	<i>Naravelia</i> 锡兰莲属	296
<i>Helixanthera</i> 离瓣寄生属	245	Lardizabalaceae 木通科	
<i>Loranthus</i> 桑寄生属	246	<i>Akebia</i> 木通属	296
<i>Macrosolen</i> 鞘花属	247	<i>Archakebia</i> 长萼木通属	297
<i>Scurrula</i> 梨果寄生属	248	<i>Decaisnea</i> 猫儿子属	297
		<i>Holboellia</i> 八月瓜属	297
		<i>Sargentodoxa</i> 大血藤属	299
		<i>Sinofranchetia</i> 串果藤属	299
		<i>Stauntonia</i> 野木瓜属	299
		Menispermaceae 防己科	
		<i>Albertisia</i> 崖藤属	302
		<i>Arcangelisia</i> 古山龙属	302
		<i>Aspidocarya</i> 球果藤属	302
		<i>Cissampelos</i> 锡生藤属	303
		<i>Cocculus</i> 木防己属	303
		<i>Cyclea</i> 轮环藤属	303
		<i>Diplocisia</i> 秤钩风属	305
		<i>Eleutharrhena</i> 藤枣属	305
		<i>Fibraurea</i> 天仙藤属	305
		<i>Hypserpa</i> 夜花藤属	305
		<i>Pachygona</i> 粉绿藤属	305
		<i>Pericampylus</i> 细圆藤属	306
		<i>Pycnarrhena</i> 密花藤属	306
		<i>Sinomenium</i> 风龙属	306
		<i>Stephania</i> 千金藤属	306
		<i>Tinomiscium</i> 大叶藤属	307
		<i>Tinospora</i> 青牛胆属	307
		Illiciaceae 八角科	307
		<i>Illicium</i> 八角属	307
		Schisandraceae	
		<i>Kadsura</i> 南五味子属	312
		<i>Schisandra</i> 五味子属	313
		Magnoliaceae 木兰科	
		<i>Alcimandra</i> 长蕊木兰属	316
		<i>Houpoea</i> 厚朴属	317
		<i>Liranth</i> 长喙木兰属	317
		<i>Liriodendron</i> 鹅掌楸属	318
		<i>Manglietia</i> 木莲属	318
		<i>Michelia</i> 含笑属	323
		<i>Oyama</i> 天女花属	330
		<i>Pachylarnax</i> 厚壁木属	331
		<i>Parakmeria</i> 拟单性木兰属	331
		<i>Talauma</i> 盖裂木属	332
		<i>Woonyoungia</i> 焕镛木属	332
		<i>Yulania</i> 玉兰属	332
		Calycanthaceae 蜡梅科	
		<i>Calycanthus</i> 夏蜡梅属	335
		<i>Chimonanthus</i> 蜡梅属	335
		Myristicaceae 肉豆蔻科	
		<i>Horsfieldia</i> 风吹楠属	336
		<i>Knema</i> 红光树属	337
		<i>Myristica</i> 肉豆蔻属	338
		Lauraceae 樟科	
		<i>Actinodaphne</i> 黄肉楠属	338

<i>Alseodaphne</i> 油丹属	341	<i>Distyliopsis</i> 假蚊母树属	479	<i>Sorbus</i> 花楸属	614
<i>Beilschmiedia</i> 琼楠属	342	<i>Distylium</i> 蚊母树属	480	<i>Spiraea</i> 绣线菊属	627
<i>Caryodaphnopsis</i> 檬果樟属	349	<i>Eustigma</i> 秀柱花属	482	<i>Stephanandra</i> 野珠兰属	643
<i>Cinnamomum</i> 樟属	349	<i>Exbucklandia</i> 马蹄荷属	482	<i>Stranvaesia</i> 红果树属	643
<i>Cryptocarya</i> 厚壳桂属	357	<i>Fortunearia</i> 牛鼻栓属	483	Connaraceae 牛栓藤科	
<i>Dehaasia</i> 莲桂属	361	<i>Hamamelis</i> 金缕梅属	483	<i>Agelaea</i> 栗豆藤属	644
<i>Dodecadenia</i> 单花木姜子属	361	<i>Liquidambar</i> 枫香属	483	<i>Cnestis</i> 螫毛果属	645
<i>Endiandra</i> 土楠属	362	<i>Loropetalum</i> 檵木属	483	<i>Connarus</i> 牛栓藤属	645
<i>Iteadaphne</i> 香面叶属	362	<i>Mytilaria</i> 壳菜果属	484	<i>Ellipanthus</i> 单叶豆属	645
<i>Lindera</i> 山胡椒属	362	<i>Parrotia</i> 银缕梅属	484	<i>Rourea</i> 红叶藤属	645
<i>Litsea</i> 木姜子属	370	<i>Rhodoleia</i> 红花荷属	484	<i>Roureopsis</i> 朱果藤属	646
<i>Machilus</i> 润楠属	385	<i>Semiliquidambar</i> 半枫荷属	485	Fabaceae 豆科	
<i>Neocinnamomum</i> 新樟属	399	<i>Sinowilsonia</i> 山白树属	486	<i>Abrus</i> 相思子属	646
<i>Neolitsea</i> 新木姜子属	400	<i>Sycopsis</i> 水丝梨属	486	<i>Acacia</i> 金合欢属	646
<i>Nothaphoebe</i> 赛楠属	408	Eucommiaceae 杜仲科		<i>Acrocarpus</i> 顶果树属	649
<i>Parasassafras</i> 密花檫属	409	<i>Eucommia</i> 杜仲属	486	<i>Adenanthera</i> 海红豆属	649
<i>Phoebe</i> 楠木属	409	Rosaceae 蔷薇科		<i>Afgekia</i> 猪腰豆属	649
<i>Sassafras</i> 檫木属	415	<i>Amelanchier</i> 唐棣属	487	<i>Aganope</i> 双束鱼腾属	649
<i>Sinosassafras</i> 华檫木属	416	<i>Amygdalus</i> 桃属	487	<i>Albizia</i> 合欢属	650
<i>Syndiclis</i> 油果樟属	416	<i>Armeniaca</i> 杏属	489	<i>Alhagi</i> 骆驼刺属	652
Hernandiaceae 莲叶桐科		<i>Cerasus</i> 樱属	490	<i>Ammodendron</i> 银砂槐属	652
<i>Hernandia</i> 莲叶桐属	417	<i>Chaenomeles</i> 木瓜属	497	<i>Ammopiptanthus</i> 沙冬青属	652
<i>Illigera</i> 青藤属	417	<i>Chamaerhodos</i> 地蔷薇属	498	<i>Amorpha</i> 紫穗槐属	652
Capparaceae 山柑科		<i>Comarum</i> 沼委陵菜属	498	<i>Antheroporum</i> 肿荚豆属	652
<i>Borthwickia</i> 节蒴木属	420	<i>Cotoneaster</i> 栒子属	498	<i>Archidendron</i> 猴耳环属	653
<i>Capparis</i> 山柑属	420	<i>Crataegus</i> 山楂属	511	<i>Astragalus</i> 黄耆属	655
<i>Crateva</i> 鱼木属	425	<i>Dichotomanthes</i> 牛筋条属	514	<i>Bauhinia</i> 羊蹄甲属	656
<i>Stixis</i> 班果藤属	426	<i>Docynia</i> 柃栎属	515	<i>Bowringia</i> 藤槐属	665
Moringaceae 辣木科		<i>Dryas</i> 仙女木属	515	<i>Butea</i> 紫矿属	665
<i>Moringa</i> 辣木属	426	<i>Eriobotrya</i> 枇杷属	515	<i>Caesalpinia</i> 云实属	665
Bretschneideraceae 伯乐树科		<i>Exochorda</i> 白鹃梅属	517	<i>Cajanus</i> 木豆属	668
<i>Bretschneidera</i> 伯乐树属	426	<i>Kerria</i> 棣棠属	518	<i>Callerya</i> 崖豆藤属	668
Saxifragaceae 虎耳草科		<i>Laurocerasus</i> 桂樱属	518	<i>Calliandra</i> 朱缨花属	672
<i>Decumaria</i> 赤壁藤属	427	<i>Maddenia</i> 臭樱属	520	<i>Calophaca</i> 丽豆属	672
<i>Deutzia</i> 溲疏属	427	<i>Malus</i> 苹果属	521	<i>Campylotropis</i> 荻子梢属	672
<i>Dichroa</i> 常山属	435	<i>Neillia</i> 绣线梅属	526	<i>Caragana</i> 锦鸡儿属	677
<i>Hydrangea</i> 绣球花属	436	<i>Osteomeles</i> 小石积属	529	<i>Cassia</i> 决明属	690
<i>Itea</i> 鼠刺属	442	<i>Padus</i> 稠李属	530	<i>Cercis</i> 紫荆属	690
<i>Philadelphus</i> 山梅花属	445	<i>Photinia</i> 石楠属	532	<i>Chesneya</i> 雀儿豆属	691
<i>Pileostegia</i> 冠盖藤属	450	<i>Physocarpus</i> 风箱果属	541	<i>Chesniella</i> 旱雀豆属	691
<i>Platycrater</i> 蛛网萼属	450	<i>Potaninia</i> 绵刺属	541	<i>Cladrastis</i> 香槐属	692
<i>Polyosma</i> 多香木属	450	<i>Potentilla</i> 委陵菜属	541	<i>Clitoria</i> 蝶豆属	693
<i>Ribes</i> 茶藨子属	450	<i>Prinsepia</i> 扁核木属	543	<i>Codariocalyx</i> 舞草属	693
<i>Schizophragma</i> 钻地风属	462	<i>Prunus</i> 李属	543	<i>Colutea</i> 鱼鳔槐属	693
Pittosporaceae 海桐花科		<i>Pygeum</i> 臀形果属	544	<i>Corethrodedendron</i> 山竹子属	694
<i>Pittosporum</i> 海桐花属	464	<i>Pyracantha</i> 火棘属	545	<i>Craspedolobium</i> 巴豆藤属	695
Hamamelidaceae 金缕梅科		<i>Pyrus</i> 梨属	546	<i>Cytisus</i> 金雀花属	695
<i>Altingia</i> 蕈树属	474	<i>Rhaphiolepis</i> 石斑木属	549	<i>Dalbergia</i> 黄檀属	695
<i>Chunia</i> 山铜材属	475	<i>Rhodotypos</i> 鸡麻属	551	<i>Delonix</i> 凤凰木属	700
<i>Corylopsis</i> 蜡瓣花属	475	<i>Rosa</i> 蔷薇属	551	<i>Dendrolobium</i> 假木豆属	700
<i>Disanthus</i> 双花木属	479	<i>Rubus</i> 悬钩子属	570	<i>Derris</i> 鱼藤属	700
		<i>Sibiraea</i> 鲜卑花属	613	<i>Desmodium</i> 山蚂蝗属	703
		<i>Sorbaria</i> 珍珠梅属	613	<i>Dicerma</i> 两节豆属	707

<i>Dunbaria</i> 野扁豆属	707	<i>Tirpitzia</i> 青篱柴属	760	Malpighiaceae 金虎尾科	
<i>Dysolobium</i> 镰瓣豆属	708	Erythroxylaceae 古柯科		<i>Aspidopterys</i> 盾翅藤属	793
<i>Entada</i> 槁藤子属	708	<i>Erythroxylum</i> 古柯属	760	<i>Hiptage</i> 风筝果属	794
<i>Eremosparton</i> 无叶豆属	708	<i>Ixonanthes</i> 黏木属	760	<i>Ryssopterys</i> 翅实藤属	796
<i>Erythrina</i> 刺桐属	708	Zygophyllaceae 蒺藜科		<i>Tristellateia</i> 三星果属	796
<i>Erythrophleum</i> 格木属	709	<i>Tetraena</i> 四合木属	760	Polygalaceae 远志科	
<i>Euchresta</i> 山豆根属	709	<i>Zygophyllum</i> 霸王属	761	<i>Polygala</i> 远志属	796
<i>Flemingia</i> 千斤拔属	710	Rutaceae 芸香科		<i>Securidaca</i> 蝉翼藤属	799
<i>Fordia</i> 干花豆属	713	<i>Acronychia</i> 山油柑属	761	<i>Xanthophyllum</i> 黄叶树属	800
<i>Gleditsia</i> 皂荚属	714	<i>Aegle</i> 木橘属	761	Dichapetalaceae 毒鼠子科	
<i>Gymnocladus</i> 肥皂荚属	715	<i>Atalantia</i> 酒饼筋属	761	<i>Dichapetalum</i> 毒鼠子属	800
<i>Halimodendron</i> 铃铛刺属	715	<i>Citrus</i> 柑橘属	762	Euphorbiaceae 大戟科	
<i>Hylodesmum</i> 长柄山蚂蝗属	715	<i>Clausena</i> 黄皮属	764	<i>Acalypha</i> 铁苋菜属	801
<i>Indigofera</i> 木蓝属	716	<i>Glycosmis</i> 山小橘属	766	<i>Actephila</i> 喜光花属	802
<i>Lespedeza</i> 胡枝子属	728	<i>Luvunga</i> 三叶藤橘属	768	<i>Alchornea</i> 山麻杆属	802
<i>Leucaena</i> 银合欢属	731	<i>Maclurodendron</i> 贡甲属	768	<i>Aleurites</i> 石栗属	804
<i>Lysidice</i> 仪花属	731	<i>Melicope</i> 蜜茱萸属	769	<i>Antidesma</i> 五月茶属	804
<i>Maackia</i> 马鞍树属	731	<i>Micromelum</i> 小芸木属	770	<i>Aporosa</i> 银柴属	806
<i>Millettia</i> 鸡血藤属	732	<i>Murraya</i> 九里香属	770	<i>Baccaurea</i> 木奶果属	807
<i>Mimosa</i> 含羞草属	735	<i>Orixa</i> 臭常山属	772	<i>Balakata</i> 浆果乌桕属	807
<i>Mucuna</i> 蠶豆属	736	<i>Paramignya</i> 单叶藤橘属	772	<i>Baliospermum</i> 斑籽属	807
<i>Ohwia</i> 小槐花属	738	<i>Phellodendron</i> 黄檗属	772	<i>Bischofia</i> 秋枫属	807
<i>Ormocarpum</i> 链荚木属	738	<i>Skimmia</i> 茵芋属	772	<i>Blachia</i> 留萼木属	808
<i>Ormosia</i> 红豆属	738	<i>Tetradium</i> 四数花属	773	<i>Breynia</i> 黑面神属	808
<i>Oxytropis</i> 棘豆属	744	<i>Toddalia</i> 飞龙掌血属	774	<i>Bridelia</i> 土密树属	809
<i>Paraderris</i> 拟鱼藤属	745	<i>Zanthoxylum</i> 花椒属	774	<i>Cephalomappa</i> 肥牛木属	810
<i>Peltophorum</i> 盾柱木属	746	Simaroubaceae 苦木科		<i>Chaetocarpus</i> 刺果树属	810
<i>Phyllodium</i> 排钱草属	746	<i>Ailanthus</i> 臭椿属	783	<i>Cladogynos</i> 白大风属	810
<i>Piptanthus</i> 黄花木属	747	<i>Brucea</i> 鸦胆子属	784	<i>Claoxylon</i> 白桐树属	810
<i>Pithecellobium</i> 牛蹄豆属	747	<i>Harrisonia</i> 牛筋果属	784	<i>Cleidocarpon</i> 蝴蝶果属	811
<i>Pongamia</i> 水黄皮属	747	<i>Picrasma</i> 苦木属	784	<i>Cleidion</i> 棒柄花属	811
<i>Pterocarpus</i> 紫檀属	748	<i>Suriana</i> 海人树属	785	<i>Cleistanthus</i> 闭花木属	812
<i>Pterolobium</i> 老虎刺属	748	Burseraceae 橄榄科		<i>Cnesmone</i> 粗毛藤属	813
<i>Pueraria</i> 葛属	748	<i>Canarium</i> 橄榄属	785	<i>Croton</i> 巴豆属	813
<i>Rhynchosia</i> 鹿藿属	749	<i>Garuga</i> 白头树属	786	<i>Dalechampia</i> 黄蓉花属	817
<i>Robinia</i> 刺槐属	749	<i>Protium</i> 马蹄果属	787	<i>Deutzianthus</i> 东京桐属	817
<i>Salweenia</i> 冬麻豆属	749	Meliaceae 楝科		<i>Dimorphocalyx</i> 异萼木属	817
<i>Saraca</i> 无忧花属	749	<i>Aglaia</i> 米仔兰属	787	<i>Discocleidion</i> 丹麻杆属	818
<i>Sarcodum</i> 耀花豆属	750	<i>Aphanamixis</i> 山楝属	788	<i>Drypetes</i> 核果木属	818
<i>Senna</i> 番泻决明属	750	<i>Chisocheton</i> 溪桫属	788	<i>Endospermum</i> 黄桐属	820
<i>Sesbania</i> 田菁属	751	<i>Chukrasia</i> 麻楝属	788	<i>Epiprinus</i> 风轮桐属	820
<i>Sindora</i> 油楠属	751	<i>Cipadessa</i> 浆果楝属	789	<i>Erismanthus</i> 轴花属	820
<i>Smithia</i> 坡油甘属	751	<i>Dysoxylum</i> 桤木属	789	<i>Euphorbia</i> 大戟属	820
<i>Sophora</i> 苦参属	751	<i>Heynea</i> 鹧鸪花属	791	<i>Excoecaria</i> 海漆属	821
<i>Spatholobus</i> 密花豆属	755	<i>Melia</i> 楝属	791	<i>Falconeria</i> 异序乌桕属	822
<i>Sphaerophysa</i> 苦马豆属	757	<i>Munronia</i> 地黄连属	791	<i>Flueggea</i> 白饭树属	822
<i>Tadehagi</i> 葫芦茶属	757	<i>Reinwardtiadendron</i> 雷楝属	792	<i>Glochidion</i> 算盘子属	822
<i>Trifidacanthus</i> 三叉刺属	757	<i>Toona</i> 香椿属	792	<i>Hancea</i> 粗毛野桐属	827
<i>Ulex</i> 荆豆属	757	<i>Turraea</i> 杜楝属	792	<i>Homalanthus</i> 澳杨属	827
<i>Uraria</i> 狸尾豆属	757	<i>Walsura</i> 割舌树属	793	<i>Homonoia</i> 水杨柳属	827
<i>Wisteria</i> 紫藤属	759	<i>Xylocarpus</i> 木果楝属	793	<i>Jatropha</i> 麻风树属	827
<i>Zenia</i> 翅荚木属	759			<i>Koilocarpus</i> 白茶树属	827
Linaceae 亚麻科					
<i>Reinwardtia</i> 石海椒属	760				

<i>Lasiococca</i> 轮叶戟属	828	Celastraceae 卫矛科		<i>Boniodendron</i> 黄梨木属	964
<i>Leptopus</i> 雀舌木属	828	<i>Bhesa</i> 膝柄木属	903	<i>Delavaya</i> 茶条木属	964
<i>Macaranga</i> 血桐属	829	<i>Celastrus</i> 南蛇藤属	903	<i>Dimocarpus</i> 龙眼属	965
<i>Mallotus</i> 野桐属	830	<i>Euonymus</i> 卫矛属	907	<i>Dodonaea</i> 车桑子属	965
<i>Margaritaria</i> 蓝子木属	835	<i>Glyptopetalum</i> 沟瓣属	922	<i>Eurycorymbus</i> 伞花树属	965
<i>Megistostigma</i> 大柱藤属	835	<i>Gymnosporia</i> 裸实属	924	<i>Harpullia</i> 假山萝属	966
<i>Melanolepis</i> 黑鳞木属	836	<i>Loeseneriella</i> 翅子藤属	925	<i>Koelreuteria</i> 栾树属	966
<i>Microdesmis</i> 小盘木属	836	<i>Maytenus</i> 美登木属	926	<i>Lepisanthes</i> 鳞花木属	966
<i>Neoshirakia</i> 白木乌桕属	836	<i>Microtropis</i> 假卫矛属	927	<i>Mischocarpus</i> 柄果木属	967
<i>Ostodes</i> 叶轮木属	836	<i>Monimopetalum</i> 永瓣藤属	931	<i>Nephelium</i> 韶子属	967
<i>Phyllanthodendron</i> 珠子木属	837	<i>Pleurostylia</i> 盾柱属	931	<i>Paranephelium</i> 假韶子属	968
<i>Phyllanthus</i> 叶下珠属	838	<i>Pristimera</i> 扁蒴藤属	931	<i>Pavieasia</i> 檀栗属	968
<i>Putranjiva</i> 假黄杨属	842	<i>Salacia</i> 五层龙属	932	<i>Pometia</i> 番龙眼属	968
<i>Richeriella</i> 龙胆木属	843	<i>Tripterygium</i> 雷公藤属	934	<i>Sapindus</i> 无患子属	968
<i>Ricinus</i> 蓖麻属	843	Salvadoraceae 刺茉莉科		<i>Xanthoceras</i> 文冠果属	969
<i>Sauropus</i> 守宫木属	843	<i>Azima</i> 刺茉莉属	934	<i>Xerospermum</i> 干果木属	969
<i>Strophoblachia</i> 宿萼木属	844	Staphyleaceae 省沽油科		Sabiaceae 清风藤科	
<i>Sumbaviopsis</i> 白叶桐属	844	<i>Euscaphis</i> 野鸦椿属	934	<i>Meliosma</i> 泡花树属	970
<i>Suregada</i> 白树属	845	<i>Staphylea</i> 省沽油属	934	<i>Sabia</i> 清风藤属	975
<i>Trevis</i> 滑桃树属	845	<i>Turpinia</i> 山香圆属	935	Rhamnaceae 鼠李科	
<i>Triadica</i> 乌桕属	845	Icacinaeae 茶茱萸科		<i>Alphitonia</i> 麦珠子属	978
<i>Trigonostemon</i> 三宝木属	846	<i>Apodytes</i> 柴龙树属	937	<i>Berchemia</i> 勾儿茶属	978
<i>Vernicia</i> 油桐属	847	<i>Gomphandra</i> 须蕊木属	937	<i>Berchemiella</i> 小勾儿茶属	982
Daphniphyllaceae 交让木科		<i>Gonocaryum</i> 琼榄属	938	<i>Colubrina</i> 蛇藤属	983
<i>Daphniphyllum</i> 虎皮楠属	847	<i>Hosiea</i> 无须藤属	938	<i>Gouania</i> 咀签属	983
Buxaceae 黄杨科		<i>Iodes</i> 微花藤属	938	<i>Hovenia</i> 枳椇属	984
<i>Buxus</i> 黄杨属	849	<i>Mappianthus</i> 定心藤属	939	<i>Paliurus</i> 马甲子属	984
<i>Pachysandra</i> 板凳果属	853	<i>Natsiatopsis</i> 麻核藤属	939	<i>Rhamnella</i> 猫乳属	985
<i>Sarcococca</i> 野扇花属	853	<i>Natsiatum</i> 薄核藤属	939	<i>Rhamnus</i> 鼠李属	986
Coriariaceae 马桑科		<i>Nothapodytes</i> 南柴龙树属	939	<i>Sageretia</i> 雀梅藤属	997
<i>Coriaria</i> 马桑属	854	<i>Pittosporopsis</i> 假海桐属	940	<i>Scutia</i> 对刺藤属	1000
Anacardiaceae 漆树科		<i>Platea</i> 肖榄属	941	<i>Ventilago</i> 翼核果属	1000
<i>Buchanania</i> 山欏子属	855	<i>Pyrenacantha</i> 刺核藤属	941	<i>Ziziphus</i> 枣属	1002
<i>Choerospondias</i> 南酸枣属	855	Aceraceae 槭树科		Leeaceae 火筒树科	
<i>Cotinus</i> 黄栌属	856	<i>Acer</i> 槭属	941	<i>Leea</i> 火筒树属	1004
<i>Dobinea</i> 九子母属	856	<i>Dipteronia</i> 金钱槭属	960	Vitaceae 葡萄科	
<i>Dracontomelon</i> 人面子属	857	Dipentodontaceae 十齿花科		<i>Ampelocissus</i> 酸苁藤属	1005
<i>Drimycarpus</i> 辛果漆属	857	<i>Dipentodon</i> 十萼花属	960	<i>Ampelopsis</i> 蛇葡萄属	1006
<i>Lannea</i> 厚皮树属	857	<i>Perrottetia</i> 核子木属	960	<i>Cayratia</i> 乌荑莓属	1010
<i>Mangifera</i> 芒果属	858	Nitrariaceae 白刺科		<i>Cissus</i> 白粉藤属	1011
<i>Pegia</i> 藤漆属	858	<i>Nitraria</i> 白刺属	961	<i>Parthenocissus</i> 地锦属	1013
<i>Pistacia</i> 黄连木属	858	Tapisciaceae 瘦椒树科		<i>Tetrastigma</i> 崖爬藤属	1014
<i>Rhus</i> 盐肤木属	859	<i>Tapiscia</i> 瘦椒树属	962	<i>Vitis</i> 葡萄属	1020
<i>Semecarpus</i> 肉托果属	860	Hippocastanaceae 七叶树科		<i>Yua</i> 俞藤属	1026
<i>Spondias</i> 槟榔青属	861	<i>Aesculus</i> 七叶树属	962	Elaeocarpaceae 杜英科	
<i>Terminthia</i> 三叶漆属	861	<i>Handeliendendron</i> 掌叶木属	962	<i>Elaeocarpus</i> 杜英属	1027
<i>Toxicodendron</i> 漆树属	862	Sapindaceae 无患子科		<i>Sloanea</i> 猴欢喜属	1034
Aquifoliaceae 冬青科		<i>Allophylus</i> 异木患属	963	Tiliaceae 椴树科	
<i>Ilex</i> 冬青属	866	<i>Amesiodendron</i> 细子龙属	964	<i>Berrya</i> 六翅木属	1036
Plagiopteraceae 斜翼科		<i>Arytera</i> 滨木患属	964	<i>Burretiodendron</i> 柄翅果属	1036
<i>Plagiopteron</i> 斜翼属	903			<i>Colona</i> 一担柴属	1037
				<i>Craigia</i> 滇桐属	1037