



医学考试在线
www.ykpass.com

全国卫生专业技术资格考试

训练题集及考题汇编

对于短期内强化巩固知识和应对考试，
大量做题是十分必要的！

同步训练+强化训练+考题汇编，
一网打尽天下考题！

2011年
最新版

护理学专业 (中级)

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 组编

命题专家精编

题量充足，题型全

大纲，囊括所有考点

精准把握命题趋势，突出重点难点

体现科学训练方法，先易后难，步步为营

一气呵成，节时高效，事半功倍

切题率高，通过率高

用过都说好



新世界出版社
NEW WORLD PRESS

2011 年全国卫生专业技术资格考试
训练题集及考题汇编

护理学专业(中级)

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 组编

新世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编. 护理学专业. 中级/董沛主编. —北京:新世界出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 80228 - 849 - 2

I. 全… II. 董… III. 护理学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 006797 号

全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业(中级)

作 者: 全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会

责任编辑: 蒋 胜 张 敬

封面设计: 易 红

出版发行: 新世界出版社

版式设计: 何翠常

社 址: 北京市西城区百万庄大街 24 号(100037)

总编室电话: (010)68995424 (010)68326679(传真)

发行部电话: (010)68995968 (010)68998733(传真)

本社中文网址: www.nwp.com.cn

本社英文网址: www.newworld-press.com

医学培训网址: www.ykpass.com / www.zhihuiyixue.com

本社电子信箱: nwpcn@public.bta.net.cn

版权部电子信箱: rights@nwp.com.cn

版权部电话: +86(10)68996306

印 刷: 北京市京华印刷制版厂印刷

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 353 千字 印张: 29

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2010 年 8 月北京第 3 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80228 - 849 - 2

定 价: 60.00 元

新世界版图书, 版权所有, 侵权必究。

新世界版图书, 印装错误可随时退换。

前言

对很多考生来说,考试的确不是件容易事,一是考试涉及内容多,范围广,而且很多知识在日常工作中接触少或者根本就没来得及用上,时间一长,不通过全面系统的复习,要想随便应付过去是很难的;二是时间有限,从报名到考试也就那么几个月的时间,而且还有很多工作要做,不可能把全部时间都花在复习应考上,因此,如何利用有限时间科学高效地复习,也是摆在考生面前不容忽视的问题。

鉴于此,我们在全中国范围内遴选了一大批长期从事一线临床和教学工作以及培训经验丰富的高校老师团队,花费了大量时间和心血,精心研究大纲要求和考试出题规律,编写了一系列帮助考生有效应对考试的各种辅导用书,同时还配套了各种远程学习材料。该系列辅导用书充分体现了权威、全面、高效的复习应考要求,针对性极强,做到了大纲阐释精炼,条理性强,重点突出;同时以同步练习、强化训练和模拟测试的形式布置了大量包含历年真题在内的经典题目,尤其强调学与练紧密结合,科学地将整个复习分三个阶段展开:第一阶段全面出击,强调快速地把所有大纲要求知识点从头到尾系统地复习一遍,并且边复习边做同步练习题;第二阶段强化训练,通过大量做题,查漏补缺,消灭每一个知识死角;第三阶段考前冲刺,通过反复模拟测试,大幅提升考场答题能力。如此步步为营,何愁考试不通过?

该系列辅导用书自出版以来,经数次修订完善,畅销全国各地,得到了卫生部门和广大考生的高度评价,并成为推荐用书之一,是考生复习应考的必备用书。护理学专业(中级)资格考试系列辅导用书如下:

全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业(中级)

全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业(中级)

全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业(中级)

本书为《全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业(中级)》,全书分三部分编写,第一部分为同步训练,以大纲要求的单元为单位设题,重在基础训练;第二部分为强化训练,以篇为单位设题,重在强化掌握复习内容;第三部分为考题汇编,收录了历年考试题目,供复习参考。建议考生在对《全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业(中级)》全面系统复习之后,再循序渐进地做本书题目,进一步巩固和提高,最后于考前做《全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业(中级)》进行冲刺训练,熟悉试卷形式,提高答题速度和技巧,助你一举通过考试。

此外,为了满足越来越多考生习惯于网络学习的需求,特意配套打造了医学考试在线(www.ykpass.com)网络学习平台,强力推出了旨在帮助考生有效复习的网上视频教学、在线练习、模拟考场、学习答疑等,以及各类学习班、保过班,详情请登录医学考试在线查看。

由于书中涉及内容广泛,加之编者水平有限,不当之处在所难免,恳请各位专家和读者批评指正,以便再版时进一步修订完善。

祝考生朋友一考过关!

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会

2010年8月

题型说明

A₁ 型题

A₁ 型题为单句型最佳选择题，即每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A₂ 型题

A₂ 型题为病例摘要型最佳选择题，即每一道考题是以一个小案例出现的，其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A₃ 型题

A₃ 型题为病例组型最佳选择题，即以一个病例作为题干，在其下设 2~3 个与病例有关的问题，每个问题都是一个单句型最佳选择题，都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息，要根据病例回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。

A₄ 型题

A₄ 型题为病例串型最佳选择题，即以一个病例作为题干，在其下设 3~6 个与病例有关的问题，每个问题都是一个单句型最佳选择题，都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息，要按照题目呈现的先后顺序来回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。有时在试题中提供了与病例相关的辅助或假定信息，要根据该题提供的信息来回答问题，这些信息不一定与病例中的具体病人有关。

B₁ 型题

B₁ 型题为标准配伍题，即每组考题由 2~3 个问题组成，且共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第一篇 同步训练

第一部分	内科护理学	2
第二部分	外科护理学	91
第三部分	妇产科护理学	179
第四部分	儿科护理学	243
第五部分	社区护理学	292
第六部分	护理健康教育学	333
第七部分	医院感染护理学	346
第八部分	护理管理学	362
第九部分	医学伦理学	372

第二篇 考题汇编

第一部分	内科护理学	376
第二部分	外科护理学	401
第三部分	妇产科护理学	423
第四部分	儿科护理学	435
第五部分	护理健康教育学	447
第六部分	医院感染护理学	450

第一篇 同步训练

第一部分

内科护理学

第一单元 呼吸系统疾病病人的护理

【A₁/A₂ 型题】

1. 下列关于呼吸道的结构和功能的叙述错误的是
- A. 呼吸道以环状软骨为界分为上、下呼吸道
 - B. 上呼吸道的主要功能是对吸入气体进行加温、湿化和机械阻拦
 - C. 下呼吸道终止于终末细支气管
 - D. 气管于隆突处分为左、右主支气管
 - E. 黏液纤毛运载系统和咳嗽反射均为上呼吸道的重要防御机制

参考答案: E

2. 下列关于左、右主支气管的描述中错误的是
- A. 气管在隆突处分为左、右主支气管
 - B. 右主支气管较左主支气管粗、短、直
 - C. 进行气管插管时, 若插入过深时易误插入右主支气管
 - D. 异物易吸入左主支气管
 - E. 肺脓肿好发于右肺与右主支气管的结构特点有关

参考答案: D

3. 关于肺功能的描述中错误的是
- A. 肺的主要功能是进行肺通气和肺换气
 - B. 肺内气体交换主要在肺泡内通过气-血屏障进行
 - C. 浅而快的呼吸效率优于深而慢的呼吸效率
 - D. 呼吸膜面积是影响肺换气的重要因素之一
 - E. 肺通气/血流比值是影响肺换气的重要因素之一

参考答案: C

4. 下列关于肺血管的描述错误的是
- A. 肺有双重血流供应, 即肺循环和支气管循环
 - B. 肺循环是一个高压、高阻力循环系统
 - C. 各级支气管和肺的营养主要由支气管循环供应
 - D. 肺气体交换功能主要由肺循环执行
 - E. 肺动脉携带静脉血, 肺静脉输送动脉血

参考答案: B

5. 下列关于胸膜腔的描述错误的是
- A. 胸膜腔是一个潜在的开放腔隙
 - B. 胸膜腔内持续为负压
 - C. 吸气时胸膜腔内负压增大
 - D. 正常人胸膜腔内也有少量液体起润滑作用
 - E. 胸膜腔内压力是促进胸腔内静脉血和淋巴液回流的重要因素

参考答案: A

6. 临床最常见的造成急性上呼吸道感染的病原体是
- A. 细菌
 - B. 病毒
 - C. 衣原体
 - D. 支原体
 - E. 立克次体

参考答案: B

7. 下列关于急性上呼吸道感染的描述错误的是
- A. 成人普通感冒多由细菌感染引起
 - B. 普通感冒主要表现为咽干、喉痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞, 一般肺部无干、湿啰音
 - C. 急性细菌性扁桃体炎患者可有高热, 咽部明显充血, 扁桃体肿大、充血, 表面常有黄色点状渗出物

- D. 感冒患者如出现耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓等常提示并发中耳炎
E. 受凉、淋浴、过度疲劳常为急性上呼吸道感染的诱因

参考答案: A

8. 下列哪项是慢性支气管炎急性发作的最常见原因

- A. 吸烟 B. 感染
C. 大气污染 D. 气温下降
E. 过敏

参考答案: B

9. 支气管哮喘发作时常出现

- A. 进行性呼吸困难
B. 吸气性呼吸困难
C. 呼气性呼吸困难
D. 夜间阵发性呼吸困难
E. 混合性呼吸困难

参考答案: C

10. 引起细菌性咽-扁桃体炎最主要的致病菌为

- A. 葡萄球菌 B. 溶血性链球菌
C. 肺炎球菌 D. 肺炎杆菌
E. 大肠杆菌

参考答案: B

11. 治疗上呼吸道感染的措施, 下列哪项不妥

- A. 适当休息
B. 体温超过 39℃ 时物理降温
C. 呼吸道隔离, 防止交叉感染
D. 多饮水
E. 常规应用抗生素治疗

参考答案: E

12. 对于患有消化性溃疡的上呼吸道感染病人, 应禁用

- A. 感冒清热冲剂 B. 阿司匹林
C. 金刚烷胺 D. 氯苯那敏
E. 吗啡

参考答案: B

13. 慢性支气管炎最突出的症状是

- A. 长期反复咳嗽、咳痰
B. 反复发热
C. 咳大量脓痰
D. 反复咯血
E. 时有喘息

参考答案: A

14. 慢性支气管炎急性发作期病人的主要治疗是

- A. 吸氧 B. 控制感染
C. 解痉、平喘 D. 祛痰
E. 镇咳

参考答案: B

15. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿患者, 主要表现为在原有症状基础上又出现

- A. 反复感染、发热
B. 反复发绀
C. 咳多量脓痰
D. 逐渐加重的呼吸困难
E. 剧烈咳嗽

参考答案: D

16. 下列关于排痰的措施, 不妥的是

- A. 多饮水以利于痰液稀释
B. 痰多且无力咳痰者应以祛痰为主
C. 咳嗽反射减弱或消失的病人应给予机械吸痰
D. 为了增加病人的耐受能力, 体位引流应在餐后半小时内进行
E. 勤翻身拍背可促进排痰

参考答案: D

17. 下列哪项是 COPD 诊断及病情严重程度评价的客观指标

- A. 肺功能检查 B. 胸部 X 线检查
C. 胸部 CT D. 动脉血气分析
E. 血常规

参考答案: A

18. 肺气肿的主要症状是

- A. 突然出现的呼吸困难
B. 夜间阵发性呼吸困难

- C. 逐渐加重的呼吸困难, 尤以活动后为著
D. 发绀
E. 心悸

参考答案: C

19. 慢性支气管炎最常见的并发症是

- A. 支气管扩张 B. 阻塞性肺气肿
C. 肺脓肿 D. 慢性呼吸衰竭
E. 支气管肺炎

参考答案: B

20. 慢性阻塞性肺气肿最重要的慢性并发症是

- A. 肺结核 B. 自发性气胸
C. 肺不张 D. 慢性肺源性心脏病
E. 肺炎

参考答案: D

21. 慢性阻塞性肺气肿病人最常见的酸碱失衡是

- A. 代谢性酸中毒 B. 呼吸性酸中毒
C. 代谢性碱中毒 D. 呼吸性碱中毒
E. 其他

参考答案: B

22. 呼气性呼吸困难最常见的病因是

- A. 气管异物
B. 大支气管肿瘤
C. 大片肺组织实变
D. 大量胸腔积液
E. 小支气管痉挛

参考答案: E

23. 少量咯血, 尤其是持续痰中带血, 常提示

- A. 支气管哮喘 B. 慢性支气管炎
C. 肺气肿 D. 肺癌
E. 心脏病

参考答案: D

24. 支气管扩张及肺脓肿病人痰液的典型特征是

- A. 只有少量黏痰 B. 草绿色
C. 红棕色胶冻状 D. 灰黑色
E. 痰液静置后分层现象

参考答案: E

25. 大咯血病人发生窒息时, 首要的护理措施是

- A. 维持气道通畅 B. 输血
C. 吸氧 D. 安慰病人
E. 补液

参考答案: A

26. 对于痰液过多且无力咳痰者, 为防止窒息, 护士在翻身前首先应

- A. 给病人吸氧
B. 给病人吸痰
C. 指导病人有效咳嗽
D. 给病人雾化吸入
E. 缓慢移动病人

参考答案: B

27. 病人出现下列哪种情况时常提示有厌氧菌感染

- A. 大量脓痰
B. 咳出痰液有恶臭
C. 痰中带血
D. 有持续存在的湿性啰音
E. 咳嗽伴有高热

参考答案: B

28. 支气管哮喘长期反复发作, 最常见的并发症是

- A. 肺结核 B. 肺癌
C. 阻塞性肺气肿 D. 上呼吸道感染
E. 呼吸衰竭

参考答案: C

29. 哮喘的典型症状是

- A. 反复发作的吸气性呼吸困难
B. 反复发作的呼气性呼吸困难
C. 一过性混合性呼吸困难
D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰
E. 逐渐加重的呼吸困难

参考答案: B

30. 对年老、体弱的慢性阻塞性肺气肿患者的治疗不恰当的是

- A. 急性发作期以抗感染为主
B. 痰液黏稠者可雾化吸入
C. 剧烈咳嗽者可用强镇咳剂缓解痛苦

- D. 病情缓解期可作全身锻炼和呼吸肌锻炼
E. 应给予高蛋白、高维生素饮食

参考答案: C

31. 进行腹式呼吸锻炼时, 下列动作中应予以纠正的是
A. 吸气时腹部用力挺出
B. 呼气时腹部尽力收缩
C. 深吸快呼
D. 鼻吸口呼
E. 深吸慢呼

参考答案: C

32. 关于支气管哮喘的临床表现特征, 下列哪项不妥
A. 典型发作属呼气性呼吸困难
B. 为发作性疾病, 可自行或用药缓解
C. 发作时伴哮鸣音
D. 常在午间发作或加重
E. 每次发作可历时数小时至数天

参考答案: D

33. β_2 受体激动剂治疗哮喘时首选的给药方式为
A. 口服
B. 吸入
C. 肌内注射
D. 静脉滴入
E. 直肠给药

参考答案: B

34. 当前防治哮喘最有效的抗炎药物是
A. β_2 受体激动剂
B. 糖皮质激素
C. 抗胆碱能药物
D. 茶碱类
E. 肥大细胞膜稳定剂

参考答案: B

35. 下列关于氨茶碱的应用描述不正确的是
A. 是中效支气管舒张剂
B. 常用给药途径为肌内注射
C. 静脉注射应使用葡萄糖液稀释后慢推
D. 速度过快可引起心律失常、头晕、血压下降
E. 浓度过高可引起心脏骤停

参考答案: B

36. 下列最适用于慢性支气管炎缓解期的治疗措施是
A. 口服抗生素预防感染
B. 应用平喘药物
C. 间断吸氧
D. 增强体质, 进行缩唇腹式呼吸
E. 使用祛痰药物

参考答案: D

37. 治疗肺炎球菌肺炎, 停用抗生素的指标一般是
A. 体温降至正常后 3 天
B. 咳嗽、咳痰症状完全消失
C. 听诊湿啰音完全消失
D. 血白细胞计数恢复正常
E. X 线示炎症阴影完全消失

参考答案: A

38. 治疗肺炎球菌肺炎首选的药物为
A. 头孢菌素
B. 林可霉素
C. 链霉素
D. 庆大霉素
E. 青霉素

参考答案: E

39. 下列关于肺脓肿的描述, 错误的是
A. 吸入性肺脓肿的好发部位与支气管解剖、重力作用有关
B. 典型临床表现为高热、咳嗽, 脓肿破溃后可咳出大量脓痰或脓臭味
C. 吸入性肺脓肿最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌, 而血源性肺脓肿则为厌氧菌
D. 抗菌和痰液引流是关键治疗
E. 肺脓肿病人反复感染、大咯血者应考虑手术治疗

参考答案: C

40. 除使用抗生素外, 肺脓肿治疗的另一关键措施是
A. 卧床休息
B. 补充营养
C. 呼吸功能训练
D. 痰液引流
E. 手术治疗

参考答案: D

41. 最有助于诊断肺脓肿的症状是

- A. 畏寒、高热
- B. 呼吸困难
- C. 咳嗽、咯血
- D. 咳大量脓臭痰
- E. 剧烈胸痛

参考答案: D

42. 结核病最主要的传播途径是

- A. 飞沫
- B. 尘埃
- C. 食物和水
- D. 皮肤接触
- E. 毛巾或餐具

参考答案: A

43. 肺功能检查中哪项是评价气流受限的敏感指标

- A. 第一秒用力呼气容积占用力肺活量的比值 (FEV_1/FVC)
- B. 第一秒用力呼气容积占预计值的百分比 ($FEV_1\%$)
- C. 肺活量 (VC)
- D. 功能残气量 (FRC)
- E. 肺总量

参考答案: A

44. 下列关于机械吸引, 错误的是

- A. 适用于意识不清或排便困难者
- B. 可经口、鼻或人工气道进行负压吸引
- C. 每次吸引时间不超过 15 分钟
- D. 两次抽吸间隔时间大于 3 分钟
- E. 吸痰前、后应提高吸入氧浓度

参考答案: C

45. 下列关于气道湿化的描述错误的是

- A. 适用于痰液黏稠、不易咳出的病人
- B. 温度不可过高, 一般在 $35 \sim 37^{\circ}\text{C}$
- C. 应尽可能延长湿化时间, 以达到良好的湿化效果
- D. 湿化装置应定期消毒
- E. 湿化后应帮助病人及时排痰

参考答案: C

46. 下列关于哮喘的临床表现错误的是

- A. 为呼气性呼吸困难
- B. 呈发作性
- C. 用支气管舒张药或自行缓解

D. 在夜间及凌晨发作或加重

E. 发作时均伴有哮鸣音

参考答案: E

47. 支气管哮喘发作伴窦性心动过速, 下列哪项治疗是错误的

- A. 鼻导管吸氧
- B. 普萘洛尔口服
- C. 沙丁胺醇吸入
- D. 异丙托溴胺吸入
- E. 地塞米松静脉注射

参考答案: B

48. 慢性肺心病机制中, 导致肺动脉高压形成的最主要因素是

- A. 缺氧
- B. 毛细血管网损毁或闭塞
- C. 水钠潴留, 血容量增多
- D. 继发性红细胞增多, 血液黏稠度增加
- E. 肺小动脉炎

参考答案: A

49. 肺心病心力衰竭可出现以下常见症状和体征, 除了

- A. 水肿
- B. 尿少
- C. 颈静脉充盈
- D. 咳粉红色泡沫痰
- E. 肝肿大及压痛

参考答案: D

50. 下列哪种血气分析变化属于 I 型呼吸衰竭

- A. $\text{PaO}_2 65\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 40\text{mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 55\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 45\text{mmHg}$
- C. $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 60\text{mmHg}$
- D. $\text{PaO}_2 85\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 55\text{mmHg}$
- E. $\text{PaO}_2 75\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 30\text{mmHg}$

参考答案: B

51. 夜班护士发现一个支气管扩张症病人咯血约 200ml 后突然中断, 呼吸极度困难, 喉部有痰鸣音, 表情恐怖, 两手乱抓, 首先要做的是

- A. 立即通知医师
- B. 立即气管插管
- C. 清除呼吸道积血
- D. 给予氧气吸入
- E. 应用呼吸兴奋剂

参考答案: C

52. 应用体位引流时, 护士应该根据受侵的部位安置病人体位。引流左上肺叶尖段时, 应指示病人

- A. 向左侧卧位, 在枕上稍向前方
- B. 仰卧, 枕垫放在髋部下
- C. 向右侧卧位, 枕垫放在髋部下, 头部充分伸展
- D. 坐在椅子上, 靠向右侧
- E. 坐在椅子上, 背靠枕垫

参考答案: D

53. 王女士, 26 岁, 患支气管扩张症 10 年, 间断咳嗽、咳脓痰, 痰量 40ml/d, 下列哪项治疗措施错误

- A. 长期应用抗生素
- B. 体位引流
- C. 免疫治疗
- D. 体育锻炼
- E. 生理盐水雾化吸入

参考答案: A

54. 李先生, 41 岁, 反复咳脓痰伴间断少量咯血 20 年, 大咯血 3 天来诊。体检: 右下肺可闻及固定湿啰音, 有杵状指。胸片示右下肺纹理增粗, 可见卷发影。诊断首先考虑

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性肺脓肿
- D. 慢性支气管炎
- E. 肺气肿

参考答案: B

55. 某肺炎患者, 71 岁, 体质较弱, 虽经抗感染及一般对症治疗, 但没有明显好转, 为防止病情恶化, 应特别注意观察

- A. 体温变化
- B. 血压变化
- C. 呼吸系统症状变化
- D. 肺部体征变化
- E. 血液白细胞变化

参考答案: B

56. 女性, 40 岁, 诊断哮喘 5 年, 近来每当给爱犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作, 护士为其进行健康教育时应指出其可能的过敏原是

- A. 花粉
- B. 尘螨

- C. 狗毛
- D. 病毒感染
- E. 细菌感染

参考答案: C

57. 女性, 68 岁, 有慢性咳嗽史 15 年, 今日感冒后病情加重, 夜间咳嗽频繁, 痰量多。查体: 神清, 口唇轻度发绀, 桶状胸, 双肺叩诊过清音, 呼吸音低。动脉血气分析: $\text{PaO}_2 85\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 45\text{mmHg}$ 。经治疗后病情缓解, 此病人在家休息时最重要的措施是

- A. 做腹式呼吸, 加强膈肌运动
- B. 避免吸入有害气体
- C. 保持室内清洁无尘
- D. 长期家庭氧疗
- E. 长期服用抗生素以预防感染

参考答案: A

58. 一老年患者以肺气肿、Ⅱ型呼吸衰竭收入院, 入院第一天晚上, 因咳嗽、痰多、呼吸困难, 并对医院环境不适应而不能入睡, 不正确的护理措施是

- A. 给镇咳和镇静药, 帮助入睡
- B. 减少夜间操作, 保证病人睡眠
- C. 给低流量持续吸氧
- D. 减少白天睡眠时间和次数
- E. 和病人一同制定白天活动计划

参考答案: A

59. 王女士因肺结核在家疗养, 但痰中有结核菌, 最简便有效的处理痰的方法是

- A. 煮沸
- B. 深埋
- C. 焚烧
- D. 酒精浸泡
- E. 消毒灵浸泡

参考答案: C

60. 男性, 40 岁, 因寒战、高热、咳嗽、胸痛, 来院急诊。胸透右上肺有云絮状阴影。查痰肺炎球菌 (+)。该病人血象最可能的改变是

- A. 嗜酸性粒细胞增加
- B. 淋巴细胞增加
- C. 中性粒细胞增加
- D. 大单核细胞增加
- E. 嗜碱性粒细胞增加

参考答案: C

61. 男性, 60岁, 诊断慢性支气管炎并发肺气肿10余年, 近1周来咳嗽加剧, 咳黄黏痰, 有明显呼吸困难, 发绀明显, 护士为病人进行氧疗时, 以下给氧方式正确的是
- A. 鼻导管间断给氧 5L/min 以上
 - B. 鼻导管持续给氧 1L/min
 - C. 30% 酒精湿化给氧
 - D. 持续面罩给氧 4L/min
 - E. 鼻导管间歇给氧 1L/min

参考答案: B

62. 某人原有慢性阻塞性肺疾病, 呼吸困难, 发绀, 近日咳嗽加剧, 突然发生右侧胸痛, 约30分钟后呼吸困难突然加剧, 患侧胸壁叩诊呈鼓音, 听诊呼吸音消失。该变化是
- A. 自发性气胸
 - B. 肋间神经痛
 - C. 膈下脓肿
 - D. 腹水
 - E. 肋骨骨折

参考答案: A

63. 王女士, 29岁, 患支气管扩张症10年, 咳嗽, 咳脓性痰, 痰量 50ml/d, 下列处理不当的是
- A. 体位引流
 - B. 加强营养
 - C. 长期应用抗生素
 - D. 给予祛痰剂
 - E. 给予雾化吸入

参考答案: C

64. 男性, 68岁, 因近日咳嗽、咳痰、气促明显, 后又出现神志不清、发绀而入院。既往有肺气肿病史。动脉血气分析 pH 7.31, PaO₂ 52mmHg, PaCO₂ 61mmHg。该病人目前最可能出现的是
- A. 肺心病
 - B. 肺炎
 - C. 左心衰竭
 - D. 呼吸衰竭
 - E. 肺癌

参考答案: D

65. 女性, 25岁, 近2个月来轻度咳嗽, 咳白色黏痰, 内带血丝; 午后低热, 面颊潮红, 疲乏无力, 常有心悸、盗汗, 较前消瘦。经X线摄片检查, 发现右上肺第2肋部位有云雾状阴影, 无透光区。痰菌3次检验阴性。下列哪项护理措施不必要
- A. 住院隔离治疗
 - B. 给予高热量、高维生素、高蛋白饮食
 - C. 按医嘱给予抗结核药物治疗, 观察药物不良反应
 - D. 室内开窗通风
 - E. 做好保健指导

参考答案: A

66. 男性, 35岁, 平素体健。4天前淋雨, 2天前突然高热 40℃, 伴寒战, 咳铁锈色痰伴呼吸困难, 胸片示右下肺大片密度均匀的实变影。该患者最可能的诊断是
- A. 结核性胸膜炎
 - B. 大肠杆菌肺炎
 - C. 支原体肺炎
 - D. 肺炎球菌肺炎
 - E. 军团菌肺炎

参考答案: D

67. 女性, 15岁, 学生。发热 37.5℃, 伴干咳4天来诊。冷凝集试验 1:64。胸片示左下肺片状影。治疗首选的抗生素为
- A. 青霉素
 - B. 红霉素
 - C. 阿米卡星
 - D. 头孢唑啉
 - E. 氯霉素

参考答案: B

68. 赵女士, 36岁, 低热、乏力、盗汗2个月, 一周来症状加重伴咳嗽、咳痰。胸片示左肺上叶尖段片状模糊影伴空洞形成。体检: 左锁骨上咳嗽后闻及湿啰音。以下最有意义的检查是
- A. 末梢血细胞计数
 - B. 痰抗酸染色
 - C. 肺功能检查
 - D. 纤维支气管镜检查
 - E. 血气分析

参考答案: B

69. 女性, 72 岁, 间断咳嗽、咳痰 20 年, 活动后气短 4 年, 加重 1 周入院。查体: 神清, 双肺散在湿啰音, HR 120 次/分, 律齐。肝肋下 3cm, 双下肢水肿。血常规示 WBC $12 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 80%。对该患者最重要的治疗措施是

- A. 给利尿剂, 消除水肿
- B. 给呼吸兴奋剂, 改善呼吸功能
- C. 止咳、祛痰
- D. 积极抗感染
- E. 给支气管扩张剂

参考答案: D

【A₃/A₄ 型题】

(1~2 题共用题干)

男性, 28 岁, 自感低热、乏力、食欲不振, 有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现, 就医诊断为浸润型肺结核, 收入院抗结核治疗。

1. 入院后应采用的隔离种类为

- A. 严密隔离
- B. 消化道隔离
- C. 保护性隔离
- D. 接触性隔离
- E. 呼吸道隔离

参考答案: E

2. 关于疾病防治及护理措施, 不妥的是

- A. 病人痰液用 20% 漂白粉溶液搅拌, 静置 2 小时后倒掉
- B. 护士在病室里不密切接触病人时, 可不戴口罩
- C. 病室每日用紫外线照射进行空气消毒
- D. 病室通向走廊的窗子需关闭
- E. 给予异烟肼、链霉素治疗

参考答案: B

(3~5 题共用题干)

患者, 男性, 70 岁, 有慢性阻塞性肺气肿病史。咳嗽、咳脓痰伴气急加重 2 周, 今晨神志恍惚。体检: 嗜睡, 口唇发绀, 两肺湿啰音, 心率 116 次/分, 血压 185/105mmHg。

3. 最可能的诊断是

- A. 急性左心衰竭
- B. 脑血管意外
- C. 右心衰竭
- D. 呼吸衰竭
- E. 高血压危象

参考答案: D

4. 为明确诊断还需作哪项检查

- A. CT
- B. 心电图
- C. 动脉血气分析
- D. 脑电图
- E. 肾动脉造影

参考答案: C

5. 此时最主要的治疗在于

- A. 用降压药
- B. 使用抗生素
- C. 去除诱因
- D. 纠正缺氧和二氧化碳潴留
- E. 用利尿剂

参考答案: D

(6~9 题共用题干)

女性, 28 岁, 咳嗽 2 个月, 干咳为主, 有午后低热, 月经不规律。胸片示右上肺淡片状阴影。为进行诊断, 进行了 PPD 试验。

6. 关于 PPD 结果的判断, 下列哪项是正确的

- A. 硬结直径 $\leq 5\text{mm}$ 为阳性
- B. 硬结直径 $\geq 5\text{mm}$ 为阳性
- C. 硬结直径 $\leq 10\text{mm}$ 为阳性
- D. 硬结直径 $\geq 10\text{mm}$ 为阳性
- E. 局部有水泡为阳性

参考答案: D

7. 患者今上午突然咯鲜血 400ml, 该患者目前危及生命的护理问题是

- A. 气体交换受损
- B. 营养失调
- C. 知识缺乏
- D. 潜在并发症: 窒息
- E. 潜在并发症: 休克

参考答案: D

8. 首要的抢救措施为

- A. 高流量吸氧
- B. 输血
- C. 清理呼吸道, 保持呼吸道通畅
- D. 给予镇静药
- E. 使用止血药物

参考答案: C

9. 一般情况下,大咯血时首选的药物是

- A. 可待因
- B. 普萘洛尔
- C. 酚磺乙胺(止血敏)
- D. 垂体后叶素
- E. 6-氨基己酸

参考答案: D

(10~12题共用题干)

男性,70岁,近日因咳嗽、咳黄脓痰且不易咳出就诊,体温36.8℃,胸部听诊可闻及湿性啰音,X线胸片示右侧肺有絮状阴影,既往慢性支气管炎病史10余年。

10. 该病人目前最主要的护理诊断是

- A. 气体交换受损
- B. 清理呼吸道无效
- C. 体温过高
- D. 营养失调
- E. 体液过多

参考答案: B

11. 护士对该病人进行护理时,下列措施不妥的是

- A. 指导病人有效咳嗽
- B. 生理盐水雾化吸入湿化气道
- C. 予以机械吸痰
- D. 督促每日饮水1500ml以上
- E. 咳嗽时给予胸部叩击

参考答案: C

12. 病人咳嗽时,护士应给予纠正的动作是

- A. 病人取坐位,两腿上置一枕头顶住腹部
- B. 咳嗽前多做深呼吸数次
- C. 深吸一口气,屏气数秒后再用力咳出
- D. 病人为了省力每次连续轻咳数次
- E. 排痰后用清水漱口

参考答案: D

(13~14题共用题干)

某支气管哮喘患者发作时,强迫端坐位,发绀明显,大汗淋漓,不能讲话,于一阵剧咳后突感一侧胸痛,气急加剧,检查发现疼痛侧胸部叩诊呈鼓音,听诊呼吸音消失。

13. 该患者发生了

- A. 阻塞性肺气肿
- B. 自发性气胸
- C. 左心衰竭
- D. 右心衰竭
- E. 肺不张

参考答案: B

14. 对该患者的下列处理措施中,首要的是

- A. 立即排气减压,以解除气急,使肺复张
- B. 使用糖皮质激素
- C. 静点氨茶碱
- D. 开放静脉通道
- E. 给予高浓度吸氧

参考答案: A

(15~17题共用题干)

女性,20岁,近1个半月来干咳伴有低热,自觉乏力。听诊右上锁骨下区有固定的湿性啰音,怀疑其患肺结核。

15. 为进一步确诊,最重要的检查是

- A. 胸部CT检查
- B. 纤维支气管镜检查
- C. 支气管碘油造影
- D. 痰菌检查
- E. 痰细胞学检查

参考答案: D

16. 如病人已确诊,下列护理措施中哪项不妥

- A. 给高热量、高维生素、高蛋白饮食
- B. 室内空气新鲜,阳光充足
- C. 向病人做有关疾病知识的宣教
- D. 及时做好消毒隔离
- E. 鼓励病人多做体育锻炼,增强抗病能力

参考答案: E

17. 病人在治疗过程中,判断结核化疗效果,最重要的指标是

- A. PPD转阴
- B. 体温恢复正常,体重增加
- C. ESR恢复正常
- D. 痰结核菌转阴
- E. 病灶吸收好转

参考答案: D

(18~20 题共用题干)

女性, 53 岁, 胸闷气急 3 周, 胸片示右侧大量胸腔积液, 胸穿抽出血性胸水 1000ml。

18. 最可能的病因为

- A. 结核性胸膜炎
- B. 癌性胸腔积液
- C. 肺炎伴胸腔积液
- D. 自发性液气胸
- E. 漏出性胸腔积液

参考答案: B

19. 为进一步证实病因, 最佳的检查方法是

- A. 胸部 CT
- B. 胸部超声波检查
- C. 胸水常规检查
- D. 胸水脱落细胞检查
- E. 痰细胞学检查

参考答案: D

20. 胸腔穿刺抽液时, 病人出现头晕、出汗、面色苍白、四肢发凉, 应立即

- A. 减慢抽液速度
- B. 停止抽液, 平卧观察血压
- C. 胸穿抽气
- D. 高浓度吸氧
- E. 皮下注射 1% 肾上腺素

参考答案: B

(21~23 题共用题干)

女性, 78 岁, 慢性咳嗽、咳痰 20 余年, 近 5 年来活动后气急, 1 周前感冒后痰多, 气急加剧。近 2 天嗜睡。化验: WBC $18.6 \times 10^9/L$, 中性 0.9, 动脉血 pH 7.29, PaCO₂ 80mmHg, PaO₂ 48mmHg。

21. 该病人目前的诊断为

- A. I 型呼吸衰竭
- B. II 型呼吸衰竭
- C. 呼吸窘迫综合征
- D. 支气管哮喘急性发作
- E. 脑血管意外

参考答案: B

22. 如病人出现头痛、头胀、神志恍惚、躁狂、谵语等, 应考虑

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 肺性脑病
- C. 窒息先兆
- D. 休克早期
- E. 脑疝出现

参考答案: B

23. 若经药物治疗无效, 患者自主呼吸停止, 应立即给予

- A. 气管切开
- B. 经口气管插管
- C. 无创机械通气
- D. 高浓度吸氧
- E. 体外心脏按压

参考答案: B

(24~27 题共用题干)

女性, 35 岁, 咳嗽 1 周, 近 2 日咯血数次, 每次咯血量不等, 最多一次达 300ml, 体检左侧肺上部呼吸音减弱, 病人精神紧张。

24. 该病人目前最主要的护理诊断是

- A. 气体交换受损
- B. 清理呼吸道无效
- C. 有窒息的危险
- D. 体液过多
- E. 焦虑

参考答案: C

25. 该病人突然出现咯血不畅, 表情恐怖, 张口瞪目, 两手乱抓, 大汗淋漓, 进而意识突然丧失, 护士应首先考虑病人发生了

- A. 休克
- B. 窒息
- C. 左心衰竭
- D. 呼吸衰竭
- E. 哮喘发作

参考答案: B

26. 这时护士应首先采取的措施为

- A. 立即给予病人头高足低位
- B. 迅速用负压机械吸出血块
- C. 判断病人意识障碍程度
- D. 给予高流量吸氧
- E. 遵医嘱给予呼吸兴奋剂

参考答案: B