

古今圖書集成

中國學術類編

藝術典

三

(七)



藝 術 典 三

各 部 部 名 上 所 冠 數 字 係 在 本 典 之 原 部 次
各 部 部 名 下 所 附 數 字 係 在 本 典 統 編 頁 次 之 起 頁

一〇 醫 部

- | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| 24 背脊門二〇九二 | 25 腎腹門二二三七 | 26 腰門二〇二 | 27 四肢門二三三 |
| 28 前陰門二三三四 | 29 後陰門二四〇七 | | |
| 30 皮門二四五一 | 31 肉門二四六三 | | |
| 32 筋門二四七七 | 33 骨髓門二四九四 | | |
| 34 風門二五〇四 | 35 痹門二五八六 | | |
| 36 寒門二六二三 | 37 暑門二六三八 | 40 火門二六九〇 | |
| 38 濕門二六六〇 | 39 燥門二六八一 | | |
| 41 痰門二七一三 | 42 欬嗽門二七五七 | 45 霍亂門二九〇〇 | |
| 43 嘔吐門二八一四 | 44 泄瀉門二八五一 | 48 淋濁遺精門三〇〇五 | |
| 46 滯下門二九二二 | 47 大小便門二九六九 | | |
| 49 血門三〇三九 | 50 汗門三〇八 | | |
| 51 渴門三一二六 | 52 哮喘門三一五六 | | |
| 53 痘門三一七九 | 54 瘡門三二〇三 | 57 痢門三二九七 | |
| 55 厥門三二四七 | 56 癰狂門三二七二 | | |

古今圖書集成

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百九十五卷目錄

醫部彙考一百七十五

背脊門一

黃帝素問論背脊門一

重經經筋論背脊門一

張機金匱要略論背脊門一

華佗中藏經論背脊門一

孫思邈千金方論背脊門一

寶漢書論背脊門一

楊登父直指方論背脊門一

劉完素六書論背脊門一

張從政儒門事親論背脊門一

李杲十書論背脊門一

朱震亨心法論背脊門一

戴思恭治要論背脊門一

樓英醫學綱目論背脊門一

李挺醫學入門論背脊門一

薛己醫案論背脊門一

張三辨醫學通論六要論背脊門一

附錄六書論背脊門一

藝術典第一百九十五卷

醫部彙考一百七十五

背脊門一

黃帝素問

金匱真言論

背脊為陽中之陽心也背脊為陽中之陰肺也

心為陽臟位處上焦以陽居陽故為陽中之陽

肺為陰臟位處上焦以陰居陽故為陽中之陰

陰陽別論

二陽一陰發病主驚眩背脊痛者名曰風厥

一陽一陰者陽明厥陰之為病也背脊為陽厥陰

主脊陽肝木故引背脊痛也

脈要精微論

背脊者胃中之腑背脊曲則隨胃而腹矣

胃中而食在背脊故背脊為胃之腑

玉機真藏論

冬脈太過則令人解休脊腰痛而少氣不欲言其不

及則令人心懸如病飢飢中清脊中痛小腹滿小便

變

逆野為生氣之原而主兩腋太過則氣外泄而兩根

本及傷故為無精少氣生陽之氣不足故脊中痛

心主言而發原於腎腰氣傷故不欲言也其不及

則心腎水火之氣不能交濟故令人心懸如病飢

飢中清脊之妙當兩腎之為腎之生陽不足故於

中冷也腎合膀胱腎盛而兩腋化故小便變而

少腹滿也

脊厥不及則令人背脊痛引背下則兩脅壯滿

脊主之陽生於腎水之陰陰氣虛寒以致生陽

不足故背脊痛引背也背脊乃肝腎之部分生氣虛

而不能外達故逆滿於中也

秋脈太過則令人逆氣而背脊痛也

肺主身之氣太過於外而為背脊痛

之會在於背脊也

臟氣法時論

心病者胃中痛胃支滿脅下痛背脊肩膊痛兩臂

內痛

手足少陰心脈起心中上挾咽出背下循膈內下

肘中循臂內後廉手少陽小腸脈上手臂循膈內

出肩解繞肩膊二經氣實故有是痛背支滿者少

陰之支絡滿於膈下也

肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝臍臑足

皆痛

夫肺主氣而發原於腎腎為本肺為末母子之

經氣相通是以足少陰之脈其直者從腎上貫膈

入肺中橫喉喉挾舌本病則氣逆故喘欬也肺會

在肩背氣逆於上則肩背痛而汗出逆於下則尻

陰股膝皆痛也

血氣形志篇

欲知背脊先度其兩乳間中折之更以他繩度去牛

已即以兩乳相柱也乃舉以度其背脊其一兩居上

脊脊大椎兩兩在下當其下兩脊之會也

此論取五俞之法五臟之俞皆在於背脊者背

之腑也故先量其兩乳而後定其背脊之會當以草

就雖項背腰尻屬諸骨痛小指不用

太陽是動則病拘攣項痛目眩視不明如拔眼似折

者則養筋故是主筋所生之病則為痔瘡提肛

腎足少陰之脈貫脊絡於腰

督脈之別名曰長強脊上項當肩髀左右實則脊

經筋篇

足太陽之前其內者著於脊其病下引兩脅痛脊內

痛

足少陰之筋循脊內夾脊上至項結於枕骨其足太

陽之筋合

骨度篇

項髮以下至背脊長二寸半背脊以下至尾骶二十

一節長三尺上節長一寸四分分之二一脊分在下故

上七節至背脊脊九寸八分分之七

此背脊之骨度也項髮以下至背脊者自項後

之髮際至背脊之大椎計長二寸五分背脊骨

也自背脊之大椎循脊骨以下至尾骶計二十一

管氣循脊下尻又脊三焦注膽出脅又循脊入氣

逆行篇

瘰癧如作先反復因而痔瘡

脊痛者寒氣束於地中也脊骨也易曰艮其背

艮其止而不動乃坤土之高阜者

厥病篇

厥心痛與背相控

背為陽心為陽中之太陽故與背相控而痛心

與背相應也

五經津液別篇

陰陽不和則使流注而下流於陰經液皆減而下

過度則虛虛故腰脊痛而輕瘦

陰陽不和者少陰陽明之不和也陰陽之氣

不和則液與精不合成虛虛於背外而下流於陰

流過度則背虛而腰脊痛矣

好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背厚者肺端正

背偏球者肺偏傾也

焦惟也在脊背骨節之交督脈之所循也大杆

在第二椎旁之兩旁同五臟之脈而先言大杆者

乃項後大骨之端督脈循於脊骨之第一椎也

衛氣篇

足少陰之本在內踝下上三寸中標在背脊與舌下

兩腋也足厥陰之本在行間上五寸所標在背脊也

足太陽之本在中封前上四寸之中標在背脊與舌

本也手足少陰之本在腕骨之端標在背脊也

氣在肩者止之臂與背脊氣在腹者止之背脊

玉板篇

咽血胃滿引背腰小而疾逆也

咽血胃滿引背腰小而疾逆於心結也

五音五味篇

衛脈任脈皆起於地中上循背脊

寒熱病篇

五臟身有五部伏見一層一脾者脾也背三五臟之

陰四項五此五部有難者死

夫在外者皮膚為陽筋骨為陰陰陽所發在於

皮肉筋骨之間此言五臟各有五部而一部之陰

陽不和即謂滯而為難矣伏見腎之術也陽者脾

之部也背者脾之會也五臟命者謂五椎之心會

也項者肝之會也本經曰難疽之發不從天下不

從地出積穀之所生也故五部之有難疽者乃五

臟漸積之毒毒外顯於血氣之不和而為難疽故

五部有此者死

漢張機金匱要略

背脊

背脊

背脊

背脊

背脊

背脊

背脊

胃脘之痛喘息欲噎喉背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數苦裏白白酒湯主之

胃脘不得臥心痛微背者苦薑白半夏湯主之心痛微背背痛微心烏頭赤石脂湯主之

心中寒者其人苦病心如噉蒜狀刺者心痛微背背痛微心驚如蠶注其脈浮者自吐乃愈

膈上病痰滿喘欬吐衄則寒熱背痛腰疼目位自出其人振振身劇刺必有伏飲

華佗中藏經
痛屬厥府虛寒
心脈微急心中痛引腰背痛不下食微大則痛引背者

肺太過則令人氣逆胃滿背痛虛則肩背痛上焦寒則不入食吐酸水背引痛陰乾津不納也

唐孫思邈千金方
強屬膀胱實熱
右手足中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦泡

轉不得小便頭眩痛煩滿背脊強名曰膀胱實熱也

發背
凡服金石人皆須勞役四體無令自安如其不爾者多有發動亦不得遂從恣意取暖極已通情必須遠

欲以取寒凍雖當時不寒於後在身受多有所益終無發動之慮耳

宋黃連柳塘聖藥
發背
發背之生積毒癰腫正氣虛海密停機元氣虛弱經

久重如發弓矢外小內大內托則生敗毒則難治法

以參芪為主一定之論百世不易凡癰發於背廣一尺深可一寸雖腫至骨不穿腰不死此證六氣七情

或因飲食而感其毒積於脾肚之間用藥先清脾肚中之毒內外夾攻斯無慮矣

魚脊瘡者臍中積冷氣虛寒故虛熱得傳經絡脊骨之間發動不拘何處初生如疽癰破時黃水流生白泡似魚脊若不速治肉爛膿流命亦難保先服神功治命湯天用歸芪調榮湯或參芪內托散外用解毒酒風散擦之或用金絲膏貼之洗用指歸煎湯或用地骨皮煎湯尤妙

兩頭發
此證兩頭小者四邊散攻乃因飲酒體虛之所致也而氣食相調合陰虛而成之氣虛而散所以開口而

闕急服內消藥亦宜補陽也治法與發背同前

方加減服之
腎俞之發屬陰人難知因受暑濕并怒氣飲熱酒而得之傷於內腎之間流毒在腎急用解內腎之毒

內外攻之若醫緩慢者雖生美切戒怒氣行房精或一犯決不可治治法同發背癰疽而補腎加黃藥知母沒藥廣膠

對心發
對心發此證難治者心者君主之官神明出焉恬憺虛無病安從來心有憊鬱諸病生焉發於手足者皆由於心火故發於心平此證難治於背脊與心相對乃

對心發因心火盛而熱氣會生於此處其毒愈盛急用疏導心火之藥解之用意調處若合兵法方有生

機必須戒性若一怒不能生矣發於心之側者亦可治宜黃連解毒湯連心散散毒丸九日服之

散走流注發
此證發於背脾之間者氣血不調經絡不運復感六氣七情故毒氣乘風而走是也乃因風盛而生熱之毒熱極氣虛因熱之極而走於四肢急宜通風

定熱則氣自然而息若元氣虛初發者速以艾灸七壯四圍數案內服二十四味流氣散無不愈者若流注於手足腿者死無疑矣

連珠發
此疾若陰囊赤腫小便不通小腹脹痛此疽因色惡過度及醉飽房事以傷腎水得此疾者必致成中令

入口乾身發寒熱白節皆疹治以十奇散酒煎散或患處好肉四邊紅腫其色如火用磁針去惡血即用罐下清調乳香末敷之時時用芭蕉根汁潤之以助藥功

蜂窩發
此疾若肉色青黃色中大陷四圍硬肉赤紫色氣毒氣傷於脾真可發出即生不發出即死此毒因香藥之味溫牀厚被醉飽房事以致五臟積毒不流積而為癰則心神恍惚夜夢不安小便頻數大便滯泄此疾中於左脅即九疔宜內托十宜散連服癰毒丸九日連五服應將透便服排膿內補十宜散即內托散加水穿山甲仍貼金絲膏

竟體發
此毒發於背脊之間因暑熱之時空心受其穢氣以

人身圖書身尺

我胃氣仍收則我喘逆如若不治毒氣入內則難生
我急服乳香托裏散再服五香通暢散毒丸外貼
金絲膏內服忍冬酒一日二服

運子發

此症較於右脾中惡其毒氣入心大要用藥散之
數團藥點散住不令攻心如在中道遇背脊腫不可
救也酒者可藥諸痛症皆屬於心以心生血而行
氣主痛諸痛皆有收藥就上下打大針三四針馬妙
用前化毒清腫散千金內托散多加黃芪理心散續
藥九時刻不可缺

上中下三搭手

此毒受在肝臟六腑毒熱變惡氣毒傷於脾經結聚
成毒此是惡證也當用驅疽發背癰疽等藥治之爾
藥亦恐時過忍冬酒續藥丸

上中下三發背

上發背受在兩道經主傷於肺肝心經驚鬱結聚惡
氣傷肝毒出背脊此乃惡毒理也先用敗毒流氣散
大用護心托裏散後用內托流氣散治之
中發背受在神室靈道經正心毒心氣湧出不能歸
肝氣血腫在背脊中損於肝經此乃惡證當用煎藥治
宜敗毒流氣散

下發背乃受肝經

下發背乃受肝經經絡凝滯於五臟傷於三經此是
三經之證也先用敗毒流氣散後用人參內托散外
用團藥敷之

續發注

所謂發注者何來六氣七情所感痰不能流行結於
背脾伏於經絡之間而背脊為明堂月深日久結成癰

裏內通於臟腑外隔於皮毛宜早治之其形其狀或
至或如米袋或如石外用團藥敷之裏人參內托散
四五十劑元氣充足方可用下行劑下大便復舊敷
升而愈

三串毒

此症生於背之上下其形雖一而中皮好但內肉
潰爛初起紅色亦不大痛日漸腫痛比之來六氣
七情所感更重所發通於脾肺或年者男婦
性度治驗而亦思此者想平居坐臥濕地而染也
無外濕得生者飲食日減面黃肌瘦難生表治法
與背脊增痛同

背脊惡毒發背

此症下發發背因飲飽酒行房勞傷肝受濕而
得也陽發於外可治發背發背於背脊處癰者為
惡難治若老少婦人性氣溫和飲食無節又無六情
惱懷而亦思此者乃受地之濕氣或暑月以冷水沐
浴而發脾經於左胸之間初發可用艾火灸之惡
服連行湯汗之即散治法與背脊增痛丸甚宜服
之

血癰流注

此症多生青紫形重之人有此疾者好食滯炒菜燒
餅食之類其重者如雞子形如雞子只腫不紅
內中經絡之間流注背脊之內傷身癰瘡百節疼痛
用內托散加水瓜白芍通經再服乳香護心散黃藥
丸外用團藥敷之不可遲也凡用藥以意清思切勿
執方對證

對癰毒

癰疽生於腰背之間發於背脊作腐爛又名對癰又
名腰背主心流入腎囊二十日可死其候赤白也若
不死者黃紫也又發諸惡兒也時則內腎疼痛為
渴者為無一全多服藥底內托散加却時黃藥丸多
以滋腎水

發背

凡發熱則刺之發熱大者若不發熱皆毒也其有陰
證於五臟內發者却又沉痾無熱
癰疽發背陰證頭平向內沉痾不痛身及處不
熱宜服黃藥酒以排膿內痛散如味不換金正氣散
為佐藥以米醋煎藥酒因為毒熱毒面能發起可黃
食之如更不起發可用穿山甲頭切片煎炸炒生
人牙散各二錢半石為末分兩貼用梓桂膏貼麻黃
煎酒調服外取煎汁和麵厚塗患處
發背陰疽內宜服仙方活命飲散方毒命散仙傳化
毒湯藥血散狗寶丸安樂能奪命丹外用四虎散敷
之

發背癰瘡發背癰瘡皆為五發至險其證皆令
人頭痛惡心寒熱急拘攣宜五香散五香湯
究其病源有風有氣有食有痰有毒有勞損風則多痺
氣則多痛食則發熱熱毒則堅硬勞損則癰瘡風
氣宜二錢湯藥宜一香散藥毒勞損一香散
金刺先煮六錢

發背惡毒

風為病者或為腰背疼痛
風熱氣逆痛滑脈弱有強痛

夫得此之候邪無非必許強身體拘急太陽證并
強脈浮無汗

一陰一陽病發於背者必名爲風濕蓋胃土肝
木爲水柱土風濕濕不制腎水故令上逆

腎風背痛不逆者
寒氣入經絡留凝氣不流通心背相引而痛

氣痛
元張荷政保門事說

背脊

背脊初發便可用散用丸王炳政大作料料下喉痛
一二上以針針於腫處亂刺出血如此者三其
者百會中皆出血後以陽起石散傳之不可便服

內托散內托散治背脊腫痛以背脊陽更以熱
投熱黑乃上投之如赤心或赤口未合陰邪未散
風痺時作可服內托散以時風邪耳

氣鬱作痛

脈脊云風寒中出背脊痛中風小便數而欠者風熱
乘肺使肺氣鬱甚也當溫風熱通氣風濕主之
肩背痛不可屈伸者風氣鬱而不行以風藥散
之

氣鬱

氣鬱者如木大背脊痛有異候觸破之即微展
四肢背脊則引引背脊痛數日之後漸覺頭痛
壯熱惡寒中風字按脈浮滑計出微日不漢仰之
則流面赤者中風也又有初生其狀無頭晚間
四肢背脊痛者中風也數日反光微者甚則

亦令人發熱惡寒諸疾痛者謂之發背雖也此證
惟瘦最重其初生皆由滋味與厚衣衣服厚暖則表
易格寒滋陰過多則五臟生熱熱積於內則血脈不
流而氣凝滯而氣伏鬱熱傳於血血聚則肉潰成
瘡潰則爲癰實則爲癰深則爲疽亦有因服金石
發熱而患此疾者亦有牛生不服金石藥而亦患此
疾者蓋由上祖曾服餌者其奇氣流傳于孫此病初
生認是癰則宜速療之若氣者人則服五香連翹
湯湯瀉湯若年紀未五十壯實者可服五利大黃
湯化毒丸取通利驅邪一二行常通上用追毒散之
類貼溫藥膏劑更調湯湯瀉湯淋淋之如此調治
以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心慎
勿惱怒觸著至膿成敗宜服五香湯及內托散散
扶脊湯當歸托裏散之類湯不止者服竹葉黃湯
乳香散勿爲大熱服大黃研碎苦寒之藥若因服利
藥而利不止死矣若婦中惡肉未退壓水不快者即
用追毒之藥或銀子貼之上用鹿角以酢熬爲糊
貼之惡肉退去好肉漸生即用搜風散散散之類
推之若瘡毒未盡慎勿早上生肌之藥復得平復必
再發其間調理大節隨時制宜在醫者思慎耳

冷痛

背心一片當爲冰冷此疾之所爲善治瘡者不治瘡
而治氣氣順則一身之津液亦能無而散矣
凡人每日背上一條如線而寒起疾也宜用下之
背脊腫痛宜養木後復痛

背脊

背脊痛先發爲癰氣血鬱積於肉爲癰故其痛多在癰
之始作時也癰潰之後膿退肌腐必漸減而反痛
者此爲虛宜補亦有癰氣所屬宜和解風寒濕者宜
溫散
感勞瘦弱榮衛不固患虛重者如質石不可用香燥
疏泄之藥宜背氣丸托裏散
明教思恭經治要訣

背脊

有服金石以助欲至精氣既衰藥毒傷盛金石與肺
同類肺通於背所以多成發背之疾又有用題爲醫
亦治發背蓋題之湯氣皆聚於上腠所以以上藥可入
藥也若瘡發於陰而又未可用附桂諸藥刺外疾內
寒宜五香湯
患背脊人及諸毒已潰後血去過多津液少者宜換
肌散毒初發頭疼體痛生寒乍熱惡寒外邪宜香蘇
飲加川芎白芷防風當歸陳皮之類
搜風解毒酒

惡寒驚飲

背脊宜是或飲背脊不下有惡飲其人背脊寒令
如冰臥於九土之
疼痛屬肺
背脊痛屬肺分野經云西風生於秋病在肺肺在背
背脊故其痛在背脊又云秋肺太過風病在外則
令人逆氣發熱惡寒是也
逆氣屬火
氣云歲火太過凡病肺熱又云少陰司天熱淫所
勝肺病背脊痛故中風又云歲金不及其病內含腐

發背 外科在穴毛治以藥刺是也

發背

海藏治發背用命月者耳方一則用大黃柱一

則用香耳如有內外之別也

前用香命丹一藥表裏不同何以然乃膏之變眼

而清地也 品氣感則害人皮肉筋脈浮而清所

以有血之發之黃也

夫人生最可愛者身也其種有五

一曰陽毒因風熱而有或惡熱清渴或先患傷寒

餘有陽毒痲瘋皆發於背脊骨之圖不問惟數相

從兩夾脊起上頸下背脊熱如炊之狀赤或紅

如焰毒毒輕成痂後不止止後痛不除毒愈數日之

間復平如舊將開膿治此是內攻肉陷不可療

二曰陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不

快倍倍而痛而應前心心忪怔忡頭目昏重寒熱如

瘧五七日後始發引攻腫開膿收內積有膿深沉

遲緩未透急以補氣湯藥內托外以抽膿藥貼之

宜急見膿無憂也平志末期

三曰有人多服金石燒煉之藥毒氣流滯成發背者

初起如丹疹之狀發熱發熱如湯火灼而色如朱心

煩煩躁者高者令其毒難起起即刺人新勝於陰陽

二者若赤有解金石藥毒湯散治其內也頗有根

底分明亦須尋方安

四曰人有思慮過度發背者此非近得之乃臟腑

久積氣機失食之便難或多食酒肉冷熱積滯

鮮微熱小門胸房室不寒意當風取快脾氣

虛不能受寒發背攻背兩夾脊不問惟初起起膿

如小彈子復大如拳堅如石痛過四肢拘急口苦舌

乾腹急大小便澀十數日後膿面手足虛腫及破

過泄如利內急痛者是其脾也其方腫引急用收

發火清膿湯藥內實外泄膿水不可放致遲則皮

肉腐壞傷骨痛漸成痼疾因而不破內敗死矣

五曰人有背山脈氣發背者先在臍前年月遠

氣血虛損衰弱初起腫色青黑如靴皮頑痛深附

骨骨微腫按之木石引手加深方覺似有痛處至五

七日毒氣浮淺腫痛忽變青白有如拳打之狀寒戰

似瘧及有風候脈動口偏手足厥逆脈黑腫小自多

而復此內有邪氣相搏毒氣破出清血三五升方有黃

膿白汁相和替其度不寬不慢亦急膿痛本不住

直至已退熱存方是宜急追膿與毒氣外出無害

有發背雖有發背疽如毒氣動猛而發如火焚茅易

於敗壞初發即可知毒未大二三兩日漸赤引腫如

手掌面大五七日如飽面大即易為攻破熱赤引如

火燒之狀浮面漸潰開內發腫如炊之狀外爛

皮肉如削主藥煎汁多而腫不退攻亦不止發逆

飲食不下嘔吐氣急浮腫開者尤宜發膿托毒湯

藥用之必念此陽證也

其間有只如蠶而大者此非不大緣毒氣深沉內

毒毒氣近膿也此必內攻近人臍前却外入四肢先

攻頭而虛手後攻手面大攻兩足面腫名曰毒氣散

入四肢其人狂嘔氣脫眼睛黑小十指腫黑乾焦不

治此陰證也

凡腫疽初發腫高者而毒氣却淺此乃六腑不和

邪毒其證屬陽勢盛而易治若初發如粟粒甚則

如豆許與肉俱平或作赤色紅黃疼痛時微勿抓

破此乃五臟不調為疽其證屬陰陰毒氣內蓄已深

勢難緩而難治

如發一粒如麻豆大身微便熱生疽腫痛大熱痛

此為發於外邪大如釜而之百可自落此陽證也

或身熱不熱自覺痛生疽處亦不熱數日後漸大

不痛不痛低陷而膿爛此為發於內疽神仙聖藥之

何此陰證也

初患腫三日內發者生八日內膿成針塔導引者生

未膿慎勞力者生慎忌食者生慎怒者生慎睡猛

瘡者生患瘡者生不發者生

待膿自出不導引者死未內攻而針塔用藥導引者

生內攻後膿引針塔者死膿熱痛方盛已前瘡者

生如過此後已內攻者死膿成後不出不導引但得

藥者死如赤白痢氣急者已內攻腎毒無益必死

瘡不救十得五生疽不瘡十全死輕腫痛者必死

不遇良方者死瘡候不依法者必死惡氣志意用性

遇情者死

凡瘡背及瘡疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱

或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上

者其非腫熱者即用緊急收赤神藥圍正不令開

中心即用抽膿藥毒散貼之忌令散毒外透內服排

膿毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺

內移其膿汁膿大水泄急托其內補縫破穴膿汁

不多再須排膿即後復痛不令再腫須止膿消

患人自覺輕便即是順矣也最忌飲酒飲食其熱毒

方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻

心令口乾煩渴但以心氣藥內補脾厥即止矣內補

脾藥之屬排膿助胃利之屬

特痘發背起心氣及心包絡者若痛二十日不

大死十日可制其回赤黑膿者不治

特痘發背及肝府不六二十日死八日可制其色

紅赤內隱起如瘰者死

陰陽二氣疽癰腫或大或小不常腫熱大十

日可制導引出膿不極深淺多少發渴膿十日外

不見膿不治

瘰癧發背兩邊大瘰上其色者八日可制有膿在

肥腸中九日死

李振醫學入門

寒熱促債

背心常一片冰冷者惡飲也導痰湯合蘇子降氣湯

服之

背腰有陰有陽傷寒少陰發背惡寒者口中和陽弱

證背惡寒者口中乾燥此寒熱之辨也

背熱腐肺肺上焦故熱應於背

中溫背傷傷足舉成廢甘遂一錢入猪腰子內服食

之上下高即愈

發背證論

脊腫發熱疼痛已赤作渴脈滑數有力先服活命飲

後用托裏消毒散後腫不熱微赤色顯作渴脈數無

力腎虛也托裏散少食者六君子湯加薑黃熟地

者四物湯加參朮或腎氣丸惡寒四逆漸大者陽氣

虛也單人參湯十全大補湯小便頻數八味丸初起

食少者桂枝湯酌加蔥白湯中益氣湯救之今俗事

用養命丹一珍食藥於因於因飲食毒及肥人則可

若瘦人及因毒火者反復發作渴致毒攻血惡毒氣

不行泄瀉起一服之則可凡舉腫氣血毒者易治

漫腫膿托裏不應者乃毒氣血死在旬日或已發

出而不潰潰者須急用托裏藥食補脾胃不應死在

二旬若已潰而不紅活者用托裏散即參芪肉桂

及補脾之藥却不能生肌者口腫大而不收乃脾

崩也死在月餘去毒內托發汗毒從內透通經和解

毒者未潰托裏消毒已潰托裏生肌

背疽腫勝脫背脫所主惡五臟皆係於背或食厚

味或驚恐房勞以致木枯火炎發背血熱黃瘦外邪

與毒相引腫處發生生在下背上方因飲食厚毒

廣一尺深一寸雖潰在內不穿腹不死導治脾肚中

之毒內服散心散外用藥藥雖不穿心大要服散

之若過背背腫者不可救

導子發

導子發生於右胸中外如導房內有子孔發其毒奔

入心大其用托裏散即平連背腫背散散之不令攻

心漸消可治過背腫者尤

汗之即散

蜂窩發

蜂窩發正當背心形如蜂窩有孔在上者不宜發為

反腫宜托裏散加菊花生肌定痛防毒攻心雖治因

心火未發散也

對心發

對心發腫心火盛而熱氣注於此其毒壯盛

走毒最速應早心火之藥解之

流注發

散走流注發毒氣風熱而走急宜速風定痛治之

則氣自息若流注於手肘腫者必死無藥

毒形發

此證頭尾尖因邊散大如龜之形因飲食所至而

氣食相合陰虛而成之氣虛而散者所以胃口

開惡服托裏散

毒已發

精要曰經云諸毒皆發於心火前發又諸毒

多生於丹石房勞之人凡人生四十以上生發背等

瘡宜安心早治此證如虎入里而無毒必至毒入

宜先用內托散次用藥毒皆發更以藥竹湯法或

應發發并明灸足三里以發其毒毒之所發其

氣必虛而不去其毒乃實故雖未潰膿腐等

一毒熱藥斷不可用藥已潰膿腐脫斷一毒冷藥

亦不可用宜用藥散之藥其毒孔若發後

腐膿沉實洪散宜用大黃等藥以發其毒後用老

青萬金散膏藥九連毒之類連用之

按前證若然毒毒於內大便結結氣氣者宜用

大黃等藥其毒毒若然毒毒於外氣氣者宜用

藥者宜用甘溫之劑培其本毒若不潰膿不作膿

者雖未潰仍須通毒若毒已潰而膿不盡膿不止者

仍宜清毒之劑治之若毒毒而元氣者尤宜其

病後而元氣虛者先治其本或病後元氣虛者

古今圖書集成

熱虛火上炎中傳惡證若非加減八味丸滋腎水以制心火補中益氣以生化源欲其生難矣醫元子云大寒而喜熱之不熱是無火也當助其心火然而甚熱之不寒是無水也當益其腎水大寒之不寒實其無水熱之不熱實其無火熱之不寒實其心虛寒之不久實水之少竊謂無火者常用八味丸以益其心無水者常用六味丸以滋其腎

又按附復用冬切去一而合上風濕復切合之若舉痛甚其邪在表者最宜用此法宜熱投毒以通其滯若痛發渴大便燥結其邪在裏者須佐以內疏黃連通利利便以洩其毒在經絡者當助以托裏藥湯以調氣血斯善

分別三因

陳無擇云醫者該三因而有之論曰雖症舉經不問虛實寒熱皆由氣變而成經亦云氣宿於經絡與血俱運而不行凝結為癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃內因暑濕思有所鬱而成也身有熱被風冷掃之血脈凝滯不行熱氣凝結而成亦有陰虛陽氣凝結化為熱熱成則肉腐為膿者此亦外因寒熱風濕所傳而成也又服丹石及受毒酒濕淋厚被所致又盡力房室至精氣節所致者此乃因不內外所傳而成也故知三因備也

黃連湯論

腎胃屬脾脈脾經凡陰虛火盛或醇酒厚味或營房勞或丹石熱毒皆能致之若脈赤痛甚風洪數

而有力者熱毒之證也為易治若漫腫微痛色黯作渴脈雖洪數而無力者陰虛之證也為難治若不腫不痛或漫腫微痛脈微細者陽氣虛甚也尤為難治

若脾經作痛熱作渴飲食如常此形氣病氣俱有餘也先用仙方活命飲後用托裏消毒散解之頭痛拘急乃去毒丸服人參散毒散一二劑如腫痛用金銀花散或梅花酒神效托裏散

若痛腫硬脈沉以清涼飲仙方活命飲苦參丸腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲使便脈沉實者內疏黃連湯或清涼飲大便已利欲得作膿用仙方活命飲托裏散腫毒丸外用神異膏

漫腫微痛或色不赤飲食少思此形氣病氣俱不足也用托裏散補之

不伴膿或膿不成下瀉陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪

膿出而反痛或膿清稀氣血俱虛也八珍湯總其形寒或不收斂陽氣虛也十全大補湯腫熱內熱或不收斂陰氣虛也四物加參木

食少懶倦或不收斂胃氣虛也六君加炮薑食少懶倦或不收斂脾氣虛也補中益氣湯加茯苓半夏

肉赤而不斂血熱也四物加山梔連翹肉白而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥木香小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸腫高痛腫脈浮者邪在表也托之

痔瘡瘰癧或咽乾火在上也宜瀉之

腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之腫痛欲冷發熱腫者火也宜清之

不作膿或不潰及不飲者陽氣虛也宜補之

瘡肉不腐或瘡毒不脫者陽氣虛也宜助陽氣

腫多或潰者血俱虛也宜健脾

右關脈弱而肌肉生虛者宜健脾胃

若初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊也仙方活命飲口乾熱飲發熱微痛此元氣內虛也托裏消毒飲飲食少思飲腫痛急閉膿成六君

子湯如未愈加桂枝其有死者乃邪氣盛氣虛而不能發出也在於旬餘之間見之

若已發出用托裏消毒散不腐潰用托裏散如不愈急溫補脾胃其有死者乃真氣虛而不能腐潰也在於二旬之間見之

若已腐潰用托裏散以生肌如不愈急溫補脾胃其有死者乃真氣虛而不能收斂也在於月餘間見之

此三證雖不見於經籍予嘗治而歷驗者

昔治發背初起未成服先用金匱或援生膏貼患處數點以散其大勢更服仙方活命飲如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三劑如外皮腐動用超流解毒散洗之每日用金匱膏塗患處

有瘡口用紙作墊紙用針引之腐肉墜者去之若肉腐動用猪膽湯洗如膿腐痛飲食如常瘡肉自腐用消毒藥與托裏相兼服之仍用金匱膏塗瘡若肉已腐好肉即去之如膿不稠不稀微作

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第一百九十六卷目錄

醫部全錄一百七十六

背脊門一

王肯堂治背脊痛

陳寶以外科正宗

陳昌醫門法律

陳士傑石室秘錄

方一

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

背脊痛

熱乘其肺使肺氣管長也當以風熱以通氣防風濕

主之然則其熱氣不足而日背痛小便遺失者

當以人參黃芪之屬補肺氣之虛不可知也

天柱骨對心對肺

或問背脊痛有發日上下三發俱在脊中痛者

於肝為對心發下發者傷於腎為對肺發皆由積熱

忍氣所致初如粟米或麻或痒或拘急或痛或大

痛切發便宜隔雲灸之或汗下或下或元氣其虛實施

治隨發發在上者不可用水通濕導虛下元乾也

老弱者尤宜然三發背總要之地與他處不同尤

所發發微有痛痒宜速治之活命飲加羌活紫金丹

勝金丹會丹通壯實者一粒金丹八陣散等

之老弱者黃芪木香散十全大補湯托之

陰陽道

或問背脊上麻木不常時腫時痛忽忽便生寒作熱

何如口此名陰陽疽由七情內乘陰陽不和也此選

必去海神清脈定者可治活命飲加羌活或勝金丹

會丹丹選用皆選服飲食不進者死十日得黃白

瘻者可治數日無瘻者死

食疽

或問背脊麻木拘急不痛十數處肉紫已如拳痛

何如口此名食疽七日內熱熱口噤者此惡服活

飲加羌活活命金丹會丹丹得汗可治無汗不消

神清脈和可治神昏脈微或代者更服腫不消

宜服食開散微丸

食疽始發者如黍數十處如拳打之狀發癢癢如

此者十四日死十日可引連引連即愈

滿天星

或問背脊疽頭小四邊微何如口此名兩頭發又名

滿天星一名廣綿背因惡毒熱所致活命飲加羌

活命金丹勝金丹壯實者八陣散一粒金丹下之隨

此者十四日死十日可引連引連即愈

滿天星

或問背脊疽頭小四邊微何如口此名兩頭發又名

滿天星一名廣綿背因惡毒熱所致活命飲加羌

活命金丹勝金丹壯實者八陣散一粒金丹下之隨

高紅潤者生低陷黑暗者死

老眼潰

或問背脊之肉三兩處發疽何如口此名老眼潰一

名遊走血腫難由惡氣積熱所致多發於足少陽足

厥陰二經宜順氣清熱之劑服黃連解毒湯活命飲

加黃連梔子及服勝金丹壯實者一粒金丹下之老

弱者黃芪木香散內補十宣散選用七日不見腫

陷及眼亂者死

立體發

或問背脊上生疽肉色不變麻木微痒頑如牛領之皮

二三尺許何如口此名黃腫發亦名板眼發由濕毒

時受風濕或濕氣及情熱積聚所致宜活命飲加羌

活或黃連解毒湯勝金丹局金散選用壯實者八陣

散一粒金丹下之七日內未成膿宜隔雲灸灸而

發神清脈和者可治矣而不起服眼神昏脈微或促

或代者死服汗丹汗者生無汗者死服補劑紅潤

起發如痛者生形如不食乾枯黑陷者死

酒毒發

或問背脊心而痛麻木不常緊聚如彈如拳堅硬如

石痛發五內通身拘急何如口此名酒毒發由酒

飽勞傷氣滯厚味所致宜服黃連解毒湯加羌活乾

葛或神效消毒散內疏黃連湯紫金錠勝金丹選用

古今圖書集成

博物彙編醫部全錄一百九十六卷醫部

第四三八冊之三

神昏脈亂大渴狂言有妨飲食者死二便閉結者死
有因寒裏而內陷者用托裏溫中湯

黃瓜羹

或問黃瓜羹生用黃瓜二寸長尺許狀如黃瓜肉色不變
何如曰此名黃瓜羹一名黃瓜羹引心四股藥水
是也此證多不可治之症如金月法命飲如
光黃瓜胡及白子神仙起死生選用脈微自汗滑
諸者死平準脈色石黃瓜散主之服薑黃茶丸

藥煎

或問第九種虛勞之症而無頭寒熱大作何如曰
此名虛勞即中樞也蓋太陽器由兩腎積熱所致壯
實者忌服一和全月或八陣散上之活命飲加柴胡
羌活黃全水酒各半道服老弱者黃茶木香散內補
土黃散十全大補湯選用色赤起甘酒潤澤者可治色
黑低陷惡心眩暈大便滑泄小便如淋諸證者死

丹毒發疽

或問丹上細細無數注注一二尺如湯火傷煩躁多
渴何如曰此丹毒發疽也因服丹石剛劑所致紅潤
者生紫黯者死惡證少者宜服黃連清毒散金丹
國老黃連散多神丹脈脈脈脈脈脈者死

蜂窩瘡

或問背患疽狀如蜂房十日而平塌熱痛楚甚
飲食少迎風脈淋然何如曰此蜂窠瘡也其脈微而
足四肢厥冷為不足乃通服托氣之劑又暴起而然
用活命飲加參芪歸木兼以烏藥青皮木香開與紫
金丹服之起好膿潰服十全大補湯

陳寶功外科正宗

腎背陽虛散

瘰癧不論上中下惟在陰陽二證推背背背有正真
瘰癧高低兩樣者純陽初起必身熱更覺身熱有
微寒頂如生牛高突起腫似海可服有瘰癧七日之間
多身痛二七之期漸消漸動息自食知味一便調
勻無渴乾乾消腫消腫精神爽健生新氣血完五善
自然瘰癧並至七惡全無半點干癢便通腫消自
肌黃新肉已生紅乾乾黃皮自脫白漫連一身多爽
快五臟盡和數此藥純陽陽陽陽陽百人百可保平安

陰虛散

純陰初起不知瘰癧未之形死瘰癧不紅不腫不知
痛少無少瘰癧防七朝之後身熱瘰癧根平大背
漫連頂不高今根不活色不充今腐不積軟陷無膿
空結聚脈得散大細飛越飲食不餐身熱乾黃滿止
許意忙忙瘰癧上生本如脫甲孔中結子似含芳膿多
臭發身腫便舉動倉皇顯不長堪形成紫黑面色反
青黃得神皆憤多肝經言語無人自發揚口乾舌苦
強痰喘喘定身亡此屬純陰陰俱不治百人百可到東郭

半陰半陽瘰癧

陰陽之證兩相交生死同食事可招救瘰癧瘰癧赤
腫半背半背半平高脈來跳數多無力飲食難養不
易消腫而不消因脾弱而後不飲為瘰癧大便多瀉
小便數上身上有汗下身無汗五善瘰癧有七惡未全透
口渴喜渴腸腹膨滿身熱飲食不安心煩不穩瘰癧
亂怕背極疲方瘰癧方為瘰癧瘰癧可謂心真
造化命前聖半連之任是神仙半平瘰癧生定莫逃

續補背瘰癧法

瘰癧已潰流膿時冬夏宜用棉布四五層貼貼背藥外
再用棉布方八十四角用蛇皮細帶行以安益綳上
以帶索在前背綳帶上底使背中暖氣不洩於於
腐潰洗瘰癧預備一罐更預備一罐內暖氣烘烘
背門法律

惡疾

少陰病得之二三日口中和其背惡寒者用灸及附
子湯外內陽攻之法口中和而不得其無寒
證可知其背為背惡寒背陽上行之地他處不寒
獨背背寒其為陽虛陰邪上漫可知故於外內溫
兩法並施必求陰消陽復而後已不知者謂傷寒
一二日外證且輕何及張皇若此証滿仲景止以一
二日即斷陽虛陰虛之證傷寒病處治此見微即
著也若待至三四日勢必極難難不可救矣

作痛

心痛背痛背痛微心乃陰寒之氣厥逆而上干者慎
格於背背經脈之通至通痛難其氣血者其難昇
此而用氣分藥則其病必危仲景用烏
頭赤石脂丸以獨散其氣一氣平以溫散其陰邪
然恐背背既散之氣難安而即於溫藥中即用乾
薑之泥赤石脂之泥以填塞散氣所橫衝之滿隨得
背之氣自於背背之氣自於背背各不相犯其患
通降此煉石補天之精藥也今人知有溫氣補氣行
氣散氣諸法矣亦知有背背氣散之實令背背
陰陽二氣並行不悖者哉

瘰癧

石室錄錄

五入司事良方

腎骨痛者乃腎水衰耗不能上潤於腰則腰中之
 膀胱與動行故痛此等證非一二劑可以見
 功非久服補藥之藥以生陰非大服補陰之藥以生
 水水足則功方明黃芪熟地各一兩山茱萸黃門
 冬各四錢花五錢一分白朮五錢防風五分茯苓三
 錢附一分水煎服此方補氣而有黃芪白朮補水
 則有熟地山茱萸去濕則有茯苓去風則有防風引經
 則有附子而又以生腎水之母自然全旺生
 水足則腰中之路不乾不乾則腰全愈可知又
 何痛之在是哉不痛矣又何肯不直哉此方不
 能奏功於旦夕必須多服久服乃效
 如人患背疼者人以爲心病而非心也乃腎氣之氣
 化不行故上阻滯而作痛注當清其膀胱之火片痛
 自止蓋膀胱乃腎之腑腎虛膀胱亦虛矣乃河車
 之路膀胱爲通運而行所以背骨作楚耳方用熟地
 一兩肉桂三分車前子酒洗各三錢薏仁茯苓炙黃
 各五錢水煎服二劑膀胱之水道一通而背脊之疼
 亦愈矣蓋熟地乃補腎之聖劑腎足而膀胱之氣亦
 足凡又有腰疼者車前子仁以潤其水肉桂又引入
 諸藥直達膀胱以通其氣自然化行而水灌水灌而
 火散上行之氣無有不除此病之所以立效也
 腰疼出症
 一、有背脊疼者其痛甚劇 結聚出此一條長二
 寸者 此證乃腎水不足而腰中虛必先用補
 其而久服補藥久服補藥久有一寸許一條者即立
 在脊上字乃用刀切破破其皮而後貼出其人爲
 肥者乃用人參一兩小兒用星沙一錢帶子一錢治

之經脈生肌散其患處而愈
 人有背脊疼者一經出於手少陰此乃腎中有風得勝
 氣吹之乃竟散而現現方用熟地山茱萸各三兩
 杜仲一兩白朮五錢防己一錢薏仁三錢二劑服
 生肌散
 又有方用薏仁三錢研成細末用紅棗三枚搗成
 爲丸如彈子大火燒之棗衣上則脫死而愈今亦能
 背方也其不可思議矣其原下能散其毒去風出則
 經自合矣
 方一
 背脊痛白濁湯 治下月
 治背脊痛 薏仁一兩 離白半斤 白酒七升
 右三味同煮取二升分溫服
 背脊痛白牛黃湯
 治背脊痛不得臥心煩微背者
 背脊痛一兩 離白三兩切 半夏洗半升
 白酒一斗
 右四味同煮取四升溫服一升日三服
 烏頭赤石脂丸
 治心驚微背脊痛微心者
 烏頭 赤石脂各一兩一分 烏頭一分炮
 附子半兩炮一分 乾薑一兩一分
 右五味末之薏仁如梧子大先食服一九日三服
 不知加服
 通氣散
 治風熱肩背痛

防風 藥本 羌活 獨活各八分 黃連炒沙
 黃連薑汁炒各一錢
 右咬喉水煎服服加人參
 通氣散 治風熱
 治肩背痛
 柴胡 川升麻 黃芪各一錢 防風 羌活
 陳皮 人參 甘草各五分 白豆蔻仁二分
 黃蘗一分 藥本 黃皮各三分
 右水煎溫服食後氣香宜厚而白濁氣煩者
 勿服
 丁香五九丸
 治肩背痛
 南星每箇切作十數塊同半夏先用水浸三日每日
 易水大用白礬二三兩研碎入水內再浸三日洗淨
 焙乾 半夏切各二兩 乾薑炮 白朮 薑黃
 白茯苓各一兩 木香 丁香俱不見火 黃皮
 陳文去白各半兩
 右爲末用神麝一兩大藥二兩同研末打細
 丸如梧子大每服五十九加至七十九不約時
 溫熱水送下
 加減當歸飲子
 治肩背酸痛
 當歸 防風 柴胡 生地黃 大黃各一兩半
 白芍藥 黃芩 人參各一兩 甘草一兩三錢
 滑石六兩 黃連五錢
 右每服六錢七錢水煎
 又方

博物彙編醫部典第一百九十六卷醫部 背脊門

第四三八篇 之三二篇

治背痛

薑黃四兩 甘草炙 羌活 白朮各一兩

右每服一兩水煎

散背散

治背脊疼痛而悶

芎藭一兩六銖 烏頭 細辛 附子 羌活

獨活 桂心各五兩

右七味治下障布蓋微火炙令燥以麝香上取盡乃止俟生冷如膏法

下氣湯

治胃脘背間滿上氣喘急

杏仁四七枚 大腹 檳榔各二十七枚

右二味咬破以童子小便三升煎取一升半分其服宜忌與腎經合服之便靈

檳榔湯

主破胃背急氣音聲嘶

極大檳榔四枚 極小檳榔八枚

右一柴二品咬破以小兒尿一升半煮取一升去滓分三服藥與五痢未定

又方

治膀胱實熱背腰痛

櫻子仁 茯苓 知母各三兩 漢竹葉

生地黃切各一升 蜜五合 石膏八兩

右七味咬破以水七升煮取三升去滓下蜜煮二沸分三服鎮利和老弱三兩

藥是香 治下痢

治婦人背脊上寒或夏月怕脫衣及婦人產後

被風冷手足冷痛至背又治腰痛

生薑半斤取自然汁 明膠三兩 乳香 沒藥各

一錢半共入薑汁內

右於鍋內煎化移在湯內以柳條攪至成膏又入用椒末少許再攪勻用皮紙攤貼患處以

雞皮烘乾貼之候五七日脫下或起小瘡不妨

三合湯

治背心一點痛

烏藥順氣散 合二陳湯 香薷散 加羌活

芒水

右水煎服

治寒濕相合腰痛背脊骨節痛膝痛

白朮四兩 羌活 升麻 獨活 柴胡 薑本

白朮各五分 黃蘗三分 紅花少許

右剉先以薑木用水二碗煎至一碗去滓入薑蘗

於薑木湯內再煎至半去滓服

白散子

治腰背候取下毒無大用清涼膏貼之

白附子 大香附子各半兩 半夏一分蜜製

黑牽牛二兩半生半炒令熟 大甘遂一分以大香

炒候黃若赤已不用須細慢火炒之

右為末盡思人虛實或減每服二錢以薑酒調下

酒飲溫酒一兩後所苦感則漸為度教利三五

行痛出惡物即連大用香藥貼之候惡者一壓一

錢愈更按度

清涼膏

治發背等先用白散子服之天用此藥貼之

當歸二兩 香白芷 木脂半兩 白芨 芍藥

黃藥 白薇各一兩 乳香別研 白膠香別研

膩粉各少許 白芷五兩

右用清麻油十兩煎六味候紫黑色入人槐柳

枝各七寸再煎少頃又去之入黃丹五兩煎成入

乳香等重攪入離子內貯之用如膏貼便

瘡癤湯

一切發背等藥用此洗之能消腫去毒凡毒

有口愈用之

香白芷 黃芩 赤芍藥 露蜂房小孔多者佳

當歸 羌活 生草 地骨皮

先將雄雞前脰一隻以水四碗煮藥去脂取汁登

去面上油煎取清汁加煎藥酒三四碗取汁將散

藥或軟痛藥湯徐徐洗之須要避風并人口中

無

透膿散

癰疽發背不用開刀服之一日夜自潰出一頭

破口裏出了膿者

右將一枚燒作灰用酒調服切不可用兩枚三枚

若服一枚只一頭或服多頭

又方

治發背癰疽惡毒

人參 黃芩 當歸 白朮各五錢 獨活一錢半

右剉水煎入竹葉薑汁和勻服之如欲煎膏加參

芪等藥各四兩

煎膏如膏貼便光活