

全国卫生专业技术资格（职称）考试

题集

外科主治医师

魏保生 主编

手到病除

——迈向医生的最高境界

中国人口出版社

全国卫生专业技术资格(职称)考试题集

外科主治医师

魏保生 主编

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国卫生专业技术资格(职称)考试题集·外科主治
医师/魏保生主编. —北京:中国人口出版社,2006. 1

ISBN 7-80202-271-1

I. 全… II. 魏… III. 外科学-医药卫生人员-
资格考核-外科主治医师 IV. R4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 006787 号



全国卫生专业技术资格(职称)考试题集 外科主治医师
魏保生 主编

出版发行 中国人口出版社
印 刷 潮河印业有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 35.75
字 数 1224 千字
版 次 2006 年 2 月第 1 版
印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷
印 数 1~3 000 册
书 号 ISBN 7-80202-271-1/R · 513
定 价 69.00 元

社 长 陶庆军
电子信箱 chinapphouse@163.net
电 话 (010)83519390
传 真 (010)83519401
地 址 北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮 编 100054

编 委 会

主 编：魏保生

副主编：张 娟

编委会：白秀萍 李 卉 魏立强

魏保生 张 娟 张利萍

高幼帛 刘 纶

前　　言

事业成功、职称晋级是作为医生的你的主旋律,特别是不得不考的职称或者资格考试是你必须面临的问题。那么如何在最短的时间通过它?我们认为下面的三“式”三“点”是你高效速成的“灵丹妙药”:

第一,“地毯式”搜索考点;

第二,“闪电式”速记考点;

第三,“题库式”活用考点。

具体的讲就是:第一,“地毯式”搜索考点——了解考试和熟悉考试大纲、考试范围和考试规律。要把考试的内容当作宝贝,做到知己知彼,百战不殆;特别需要强调的是卫生专业技术资格考试题型。

A1型题:以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

A2型题:以下每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

A3(A4)型题:以下提供了若干个病例,每个病例下设若干个考题。请根据病例所提供的信息,在每道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

B型题:以下提供了若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

X型题:以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第二,“闪电式”速记考点——知道了考试范围和内容,剩下的时间就是变复杂为简单,变枯燥为乐趣,把考试当作一场游戏,不单单把考试当成纯粹的考试。

第三,“题库式”活用考点——只有通过大量有针对性的练习,在真题中寻找蛛丝马迹,练习中巩固提高,你才能更好的应对考试,最后让命题者黔驴技穷。

我们这套《全国卫生专业技术资格(职称)考试指南》系列就是为了达到这样的目的而精心为你准备的,本套丛书包括:

外科主治医师

1. 全国卫生专业技术资格(职称)考试指南 护士
2. 全国卫生专业技术资格(职称)考试指南 护师
3. 全国卫生专业技术资格(职称)考试指南 内科主治医师
4. 全国卫生专业技术资格(职称)考试指南 外科主治医师
5. 全国卫生专业技术资格(职称)考试指南和题集 妇产科主治医师
6. 全国卫生专业技术资格(职称)考试题集 护士
7. 全国卫生专业技术资格(职称)考试题集 护师
8. 全国卫生专业技术资格(职称)考试题集 内科主治医师
9. 全国卫生专业技术资格(职称)考试题集 外科主治医师

指南的结构和特点是：

纵观全局——大纲要求：纲举目张列出考试大纲要求，使你对所考知识心中有数，有的放矢。

过关必读——扫荡考点：最适合的形式(图表)表现考点并作出标记，从而强记和巧记。

灵丹妙药——速记考点：有趣有效的速记方法使考点不再零散、死板难记，你将事半功倍，激发兴趣而变被动应考为主动复习。

题集的结构和特点是：

纵观全局——大纲要求：纲举目张列出考试大纲要求，使你对所考知识心中有数，有的放矢。

如临考场——真题扫描：把历年的考试真题，归结到相应的章节，符合记忆的“正反馈”。

淋漓尽致——“杀”尽考点：首创“题干式”记忆法，是目前实际题目最多的一本题库，节省你宝贵的时间。

与“题”共舞——题库覆盖：是目前选择题配有解释最多的一本。通过补充习题来覆盖真题没有涉及的考点，从而以不变应万变。查漏补缺，一网打尽。

总之，本套丛书是医学知识、考试、记忆方法的完美演绎，通过符合考试和记忆的结构和独创的方法，可以帮助忙碌的你成功过关，来留点时间给家人。因为拯救病人的时候，我们自己也应该潇洒地生活，你说对吗？

魏保生

2006年1月


目 录


第一篇 基础外科	1
第二篇 普通外科	56
第三篇 骨外科	175
第四篇 胸心外科	272
第五篇 泌尿外科	313
第六篇 神经外科	365
第七篇 烧伤外科	418
第八篇 整形外科	463
第九篇 小儿外科	514

第一篇 基础外科

纵观全局——大纲要求

- 一、水、电解质代谢和酸碱平衡
 - 1. 概述
 - (1)体液的量、分布及组成
 - (2)体液的代谢
 - (3)体液平衡的调节
 - (4)水电解质平衡失调的防治原则
 - (5)水过多(水中毒或稀释性低血钠)
 - 2. 水和钠代谢紊乱
 - 3. 钾的异常
 - (1)低钾血症
 - (2)高钾血症
 - 4. 酸碱平衡紊乱
 - (1)体液酸碱平衡的维持
 - (2)血气分析的各种指标
 - (3)4种常见的酸碱平衡失调
 - 5. 水、电解质代谢和酸碱平衡失调的防治原则
 - (1)外科病人生理需要量
 - (2)平衡失调时的纠正办法
- 二、外科输血
 - 1. 输血的适应证
 - 2. 输血反应与并发症及其防治
 - 3. 成分输血
 - 4. 自身输血
 - (1)定义
 - (2)分类
 - (3)病理生理
 - (4)临床表现
 - (5)诊断与监测
- 三、外科休克
 - 1. 概论
 - (1)失血性休克的治疗方法
 - (2)损伤性休克的治疗方法
 - 2. 低血容量性休克
 - (1)临床表现
 - (2)治疗原则
 - 3. 感染性休克
 - (1)临床表现
 - (2)治疗原则





十三、常见体表肿物

1. 色素痣
2. 血管瘤
3. 皮肤囊肿
4. 纤维瘤、神经纤维瘤和神经纤维瘤病
5. 脂肪瘤
6. 淋巴管瘤
7. 恶性黑色素瘤
8. 皮肤癌

十四、现代外科诊疗技术

1. 选择性血管造影
2. 介入治疗
3. 内镜外科
4. 超声诊断和介入超声学
5. 核素诊断
6. 电子计算机 X 线断层扫描(CT)

如临考场——真题扫描

1. 阿托品作为麻醉前用药的主要作用是

- A. 抑制呼吸道分泌
- B. 镇静
- C. 记忆丧失
- D. 降低基础代谢率
- E. 增加心率

答案:A

2. 膀胱癌最常见的临床表现是

- A. 排尿困难
- B. 尿中有腐肉样物排出
- C. 无痛性血尿
- D. 尿频
- E. 尿流中断

答案:C

3. 成人的颅内压正常值为

- A. 80~180mmH₂O
- B. >200mmH₂O
- C. 60~100mmH₂O
- D. 120mmH₂O
- E. <150mmH₂O

答案:A

4. 大面积烧伤病人按照补液公式计算输液量的时间是

- A. 从开始静脉输液时算起
- B. 从受伤时算起
- C. 从就诊时算起
- D. 从接受正规治疗时算起
- E. 从进入监护病房时算起

答案:B

5. 低渗性缺水重度缺钠时,血清 Na⁺低于

- A. 140mmol/L
- B. 135mmol/L
- C. 130mmol/L
- D. 125mmol/L
- E. 120mmol/L

答案:E

6. 低血容量性休克时使用血管收缩剂的不良反应是

- A. 血压骤升,可引起脑血管意外
- B. 诱发心律失常及室颤
- C. 进一步减少组织器官的灌注
- D. 减少心脑组织血液灌注量
- E. 使有效循环血量减少

答案:C

7. 对老年复发性腹股沟疝,最好的手术方法是

- A. Bassini 法
- B. 内环修补法
- C. McVay 法
- D. Ferguson 法
- E. 单纯疝囊高位结扎术

答案:C

8. 恶性黑色素瘤,下列哪项说法不正确

- A. 黑色素瘤多数是在色素病变基础上发生的
- B. 正常皮肤也可以发生黑色素瘤
- C. 黑色素瘤主要经血液转移至肺、骨等器官
- D. 最佳治疗方案是外科手术切除
- E. 黑色素瘤可以有家族史

答案:C; 黑色素瘤主要经淋巴道播散,如原发灶周围的“卫星结节”,腋窝、颈部和腹股沟等处的淋巴

结。

9. 恶性肿瘤的诊断,最重要的依据是

- A. 病程短,发展快
- B. 肿块质硬、固定
- C. 血清酶学及免疫学检查
- D. X线、放射性核素或超声波检查
- E. 病理学检查

答案:E

10. 化脓性海绵状静脉窦炎的临床表现中,下列哪项是错误的

- A. 患侧眼球及周围进行性红肿和硬结
- B. 局部疼痛、压痛
- C. 寒战、高热
- D. 头痛或昏迷
- E. 对侧肢体瘫痪

答案:E

11. 患儿,男,9个月,体重10kg,间歇性哭闹20小时,有规律性,伴呕吐,排果酱样便2次,查体腹部触及包块。最可能的诊断是

- A. 细菌性痢疾
- B. 蛔虫性肠梗阻
- C. 肠道肿瘤
- D. 肠套叠
- E. 过敏性紫癜

答案:D

12. 急性化脓性腹膜炎的体征中,下列哪项是错误的

- A. 腹式呼吸减弱
- B. 腹壁静脉曲张
- C. 腹肌紧张
- D. 全腹压痛及反跳痛
- E. 肠鸣音减弱或消失

答案:B

13. 急性阑尾炎最常见的症状是

- A. 肠功能紊乱
- B. 发热
- C. 腹痛
- D. 腰痛
- E. 呕吐

答案:C

14. 挤压综合征主要是指伤后出现

- A. 呼吸困难
- B. 休克
- C. 昏迷
- D. 肾功能衰竭
- E. 心力衰竭

答案:D

15. 继发性腹膜炎的腹痛特点是

- A. 阵发性全腹痛
- B. 逐渐加重的阵发性腹痛
- C. 持续全腹痛,原发部位显著
- D. 高热后全腹痛
- E. 疼痛与进食有关

答案:C

16. 交通性睾丸鞘膜积液,哪项是正确的

- A. 平卧后鞘膜积液会逐渐缩小
- B. 站立后透光试验仍阴性
- C. 单纯抽液治疗可获得良好疗效
- D. 精索鞘膜积液同时伴有睾丸鞘膜积液称之为交通性鞘膜积液
- E. 单纯鞘膜翻转术也可获得满意的治疗效果

答案:A

17. 经典的皮片移植植物不包括下列哪些成分

- A. 表皮
- B. 真皮浅层
- C. 真皮深层
- D. 少部分皮下脂肪
- E. 皮肤附属器

答案:D

18. 男,11岁,右肱骨中段斜形骨折移位,采用手法复位及小夹板外固定。下列并发症中哪项最易发生

- A. 肱动脉损伤
- B. 桡神经损伤及前臂缺血性肌挛缩
- C. 骨折不愈合
- D. 肱骨远端缺血性骨坏死
- E. 骨质疏松症

答案:B

19. 男,13岁,脐周痛12小时,伴恶心无呕吐,转移至右下腹4小时。查体:体温38℃,右下腹明显压痛、反跳痛。白细胞计数为 $18 \times 10^9/L$ 。首选治疗为

- A. 给予抗生素,继续观察
- B. 给予镇痛剂
- C. 物理降温
- D. 急诊手术
- E. 口服肠道抗生素

答案:D

20. 男,25岁,左足癣处红肿伴脓性分泌物5天,2天前开始左小腿出现3条红线,有压痛,最可能的诊断为

- A. 急性浅静脉炎

- B. 气性坏疽
C. 急性管状淋巴管炎
D. 急性网状淋巴管炎
E. 急性蜂窝织炎

答案:C

21. 男,28岁,主因发现全身多发肿物来就诊,肿物分布于胸、腹壁及双上肢,偶有疼痛,无发热;查肿物位于皮下,与皮肤无粘连,圆形,质稍硬,活动,大小不一,大者可有分叶。诊断考虑为

- A. 皮脂腺囊肿
B. 神经纤维瘤病
C. 脂肪瘤
D. 血管瘤
E. 交界痣

答案:C

22. 男,32岁,自高空坠落,腹痛腹胀1小时。查体:血压60/40mmHg,脉率130次/分,腹腔穿刺液呈血性,应

- A. 先给升压药纠正血压
B. 立即输血
C. 纠正休克,全身情况好转后,剖腹探查术
D. 在积极抗休克的同时行剖腹探查术
E. 立即行剖腹探查术

答案:D

23. 男,35岁,上腹部被撞击2小时,感觉右上腹及背部疼痛,呕吐物为血性,X线检查示腹膜后积气。应考虑诊断为

- A. 肝破裂
B. 胆囊破裂
C. 十二指肠损伤
D. 右半结肠损伤
E. 右肾挫伤

答案:C

24. 男,38岁,阑尾切除术后5天,体温38.5℃,伤口红肿,有波动感。首先应如何处理

- A. 大剂量抗生素治疗
B. 拆除切口缝线,敞开伤口
C. B超检查
D. 物理治疗
E. 继续观察

答案:B

25. 男,40岁,跑步后出现右腰疼痛1天,尿呈淡洗肉水样,首先应行下列哪项检查

- A. 血常规和肾功能检查
B. 肝功能和肾功能检查

- C. CT和磁共振检查
D. 尿常规检查和泌尿系X线平片
E. 24小时尿钙分析

答案:D

26. 男,40岁,前胸部被撞伤,X线检查可见左第九、十肋骨骨折,2天后突发休克,最可能的原因是

- A. 气胸
B. 肝破裂
C. 脾破裂
D. 胃破裂
E. 结肠破裂

答案:C

27. 男,43岁,右上腹疼痛不适,无畏寒、发热、黄疸,B超检查时右肝有一直径3.5cm占位病变,AFP 1000IU/L,最有效的治疗方法是

- A. 手术切除
B. 化疗
C. 放疗
D. 免疫治疗
E. 肝移植

答案:A

28. 男,46岁,颈部外伤36小时,颈项痛,四肢瘫,未排大便,腹胀,高热40.5℃,双肺(-),颈椎X线片示颈6椎体骨折。发烧的主要原因是

- A. 泌尿系感染
B. 肠梗阻
C. 肺炎
D. 自主神经紊乱
E. 脓疮

答案:D

29. 男,55岁,因上消化道大出血入院,入院后立即输血3000ml,病人突然出现全身抽搐。查体:血压130/80mmHg,瞳孔等大、等圆,对光反射正常,神经系统检查无异常。化验:血清钾4.0mmol/L,血清钠145mmol/L,动脉血pH7.4。最可能的诊断是

- A. 高钾血症
B. 高钠血症
C. 低钙血症
D. 变态反应(过敏反应)
E. 酸中毒

答案:C

30. 男,56岁,右腹股沟疝修补术后第5天,卧床,既往有脑血栓病史,体温38℃;右下肢皮温升高,自股部以下较左下肢明显增粗,无明显触痛。最可



能的诊断是

- A. 切口感染
- B. 右下肢深静脉血栓
- C. 右下肢蜂窝织炎
- D. 右下肢丹毒
- E. 右股动脉栓塞

答案:B

31. 男,60岁,慢性胆囊炎,胆囊结石,拟行手术治疗,曾患心肌梗死,手术治疗至少应在心肌梗死后

- A. 1周以后
- B. 2周以后
- C. 4周以后
- D. 12周以后
- E. 24周以后

答案:E

32. 男,60岁,呕血6小时,约1000ml。查体:血压70/50mmHg,脉搏128次/分,呼吸35次/分,经抗休克治疗后,病人中心静脉压升高,血压反而较前降低,考虑原因为

- A. 心功能衰竭
- B. 肾功能衰竭
- C. 补液不足
- D. 补液过多
- E. 升压药物无效

答案:A

33. 男,60岁,左侧腹部隐痛2个月,大便次数增多,5~6次/日,有黏液及脓血。查体:左腹部似可触及包块,有轻压痛。最有诊断意义的检查是

- A. 血CEA(癌胚抗原)检查
- B. B超检查
- C. 乙状结肠镜检查
- D. 全消化道造影
- E. 血常规十大便隐血

答案:C

34. 男,62岁,发现左腹股沟可复性肿物5年。查体:左腹股沟韧带上方可见半圆形肿物,左外环口不大,考虑诊断为

- A. 左腹股沟斜疝
- B. 左腹股沟直疝
- C. 左腹股沟股疝
- D. 左腹股沟脂肪瘤
- E. 左腹股沟淋巴结肿大

答案:B

35. 男,65岁,低热、咳嗽并痰中带血丝3个月。胸片显示左肺上叶不张,少量胸膜腔积液。为明确病

理诊断,进一步检查应首选

- A. 纵隔镜检查
- B. 剖胸探查
- C. 胸腔镜检查
- D. 支气管镜检查
- E. 经胸壁穿刺活组织检查

答案:D

36. 男,70岁,乙状结肠癌根治术后2天,剧烈咳嗽后切口全层哆开,最佳处理为

- A. 立即回纳内脏,以后择期修复
- B. 麻醉下逐层缝合切口
- C. 麻醉下用不锈钢丝全层缝合切口
- D. 用干净治疗巾覆盖内脏,伤口情况稳定后再择期修复
- E. 用抗生素覆盖创面

答案:C

37. 脑对冲伤最容易发生的部位是

- A. 小脑
- B. 脑干
- C. 额叶
- D. 顶叶
- E. 枕叶

答案:C

38. 脑震荡最有诊断价值的表现是

- A. 伤后昏迷时间未超过30分钟
- B. 头痛、头晕和呕吐等症状剧烈
- C. 近事遗忘
- D. 伤后有短时生命体征变化
- E. CT检查未见异常

答案:C

39. 女,17岁,腰痛半年伴低热,近日发现左股外侧肿胀,皮肤破溃并不断有脓液渗出。查体:体瘦,腰部明显叩痛,左股外侧可见皮肤窦道,压迫腰部有脓液溢出。病变原发部位很可能在

- A. 腰椎体
- B. 颈椎
- C. 骶尾部
- D. 腹腔
- E. 股管内

答案:A

40. 女,20岁,甲状腺次全切除术后,饮水时出现呛咳,无声音嘶哑,初步诊断是

- A. 喉返神经损伤
- B. 交感神经损伤
- C. 气管损伤

D. 食管损伤

E. 喉上神经损伤

答案:E

41. 女,25岁,发现颈前肿物2个月,无任何不适。查体:颈前正中线甲状软骨上方可触及圆形结节,囊性感,随吞咽和伸舌活动,无压痛,考虑诊断为
 A. 甲状腺腺瘤
 B. 囊状淋巴管瘤
 C. 颈下皮样囊肿
 D. 甲状舌管囊肿
 E. 胸腺咽管囊肿

答案:D

42. 女,25岁,发现右背部肿物2年,无疼痛。查体:
 背部皮下肿物直径2.5cm,质软,与皮肤粘连,中央部位有一黑点,考虑为
 A. 脂肪瘤
 B. 皮肤癌
 C. 皮脂腺囊肿
 D. 痰
 E. 肿大淋巴结

答案:C

43. 女,35岁,外伤后患肢垂腕垂掌指关节畸形,各指、掌指关节不能伸直,手背桡侧皮肤感觉麻木,考虑哪条神经损伤
 A. 尺神经
 B. 桡神经
 C. 正中神经
 D. 腋神经
 E. 肌皮神经

答案:B

44. 女,38岁,右上腹痛,寒战、高热,呕血约200ml。
 查体:皮肤、巩膜黄染,肝肋下1cm,触痛明显,
 Murphy征(+),最可能的诊断是
 A. 食管静脉曲张破裂大出血
 B. 胃癌出血
 C. 胆道出血
 D. 胃息肉出血
 E. 十二指肠溃疡出血

答案:C

45. 女,40岁,1小时前跌伤右腕部。查体:右腕关节肿胀,呈“餐叉”样畸形,压痛并活动受限。可能的诊断为
 A. 右腕手舟骨骨折
 B. Smith骨折
 C. 桡神经损伤

D. Colles骨折

E. 右腕关节脱位

答案:D

46. 女,40岁,教师,右下肢静脉迂曲扩张15年,长时间站立有酸胀感,近2年右小腿胫前皮肤颜色加深,可凹性水肿,Trendelenburg试验(+),Perthes试验(-),诊断可能是
 A. 单纯性下肢静脉曲张
 B. 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全
 C. 下肢深静脉血栓形成
 D. 动静脉瘘
 E. 血栓性浅静脉炎

答案:A

47. 女,49岁,反复发作右上腹疼痛半年,多为餐后发生,并向右肩部放射。检查:肥胖,血压110/80mmHg,心率90次/分,右上腹轻度压痛,无腹肌紧张。此病人最可能的诊断是
 A. 高位急性阑尾炎
 B. 胆囊息肉
 C. 十二指肠溃疡
 D. 急性胃炎
 E. 慢性胆囊炎胆石症

答案:E

48. 女,50岁,发现右乳外上象限肿块3个月,约3cm×2.5cm大小,同侧腋窝触及肿大、质硬淋巴结,全身情况良好,为确诊肿块性质最好采用
 A. 红外线摄影
 B. 钼靶X线摄影
 C. B超检查
 D. 切除活检
 E. 切取活检

答案:D

49. 女,50岁,左拇指痛3天,屈伸活动有弹响。查体:第一掌指关节掌侧可及圆形结节,直径0.3cm,压痛,随患指屈伸移动,疼痛加重。诊断为
 A. 第一掌骨头病理性骨折
 B. 左拇指屈肌腱狭窄性腱鞘炎
 C. 腱鞘囊肿
 D. 类风湿性关节炎
 E. 拇深屈肌腱断裂

答案:B

50. 女,60岁,因结肠癌入院。实验室检查:血红蛋白60g/L。为纠正贫血术前输血200ml,病人皮肤出现红斑伴瘙痒,应采取的治疗措施是

A. 口服阿司匹林

B. 暂停输血和使用抗组胺药

C. 利尿

D. 碱化尿液

E. 吸氧

答案:B

51. 女,65岁,因突发上腹痛3天,全腹痛1天就诊。
查体:血压80/50mmHg,脉搏108次/分,全腹压痛、反跳痛。血淀粉酶升高,白细胞 $20\times 10^9/L$ 。

考虑休克、急性胰腺炎。休克的原因是

A. 失血性休克

B. 神经源性休克

C. 心源性休克

D. 过敏性休克

E. 感染性休克

答案:E

52. 皮肤鳞状细胞癌和基底细胞癌不同之处,以下哪项是正确的
A. 基底细胞癌较鳞状细胞癌多见
B. 基底细胞癌恶性程度较鳞状细胞癌高
C. 基底细胞癌以血行转移为主,鳞状细胞癌以淋巴转移为主
D. 基底细胞癌对放射线很敏感,鳞状细胞癌中度敏感
E. 基底细胞癌女性多见,鳞状细胞癌男性多见

答案:D

53. 皮质醇症临床表现,哪一项不常出现
A. 向心性肥胖
B. 高血压
C. 病理性骨折
D. 糖尿病
E. 低钙抽搐

答案:E

54. 器官冷缺血是指下列哪一种温度下的缺血
A. 0°C
B. 2°C
C. 4°C
D. 6°C
E. 8°C

答案:C

55. 嵌顿疝与绞窄疝的主要鉴别要点是
A. 疝块有否压痛
B. 疝块不能回纳的时间长短
C. 疝块是否增大
D. 有无肠梗阻表现

E. 疝内容物有无血循环障碍

答案:E

56. 清创的原则中,下列各项中错误的是

A. 清除伤口内异物

B. 切除失去活力组织

C. 彻底止血

D. 根据情况缝合伤口

E. 必须放置引流

答案:E

57. 确诊脓胸依赖于

A. 胸部CT检查

B. 胸膜腔穿刺抽液检查

C. 胸部X线检查

D. 胸部超声波检查

E. 纤维支气管镜检查

答案:B

58. 上消化道出血最常见的原因是

A. 门静脉高压症

B. 出血性胃炎

C. 胃癌

D. 胃十二指肠溃疡

E. 胆道感染出血

答案:D

59. 肾移植术后发生急性排斥反应的临床表现不包括

A. 血压升高

B. 移植肾部位有压痛

C. 血色素升高

D. 体温升高

E. 全身肌肉酸痛

答案:C;肾移植术后的急性排斥反应包括寒战、高热,移植肾部位有压痛,体温升高,全身肌肉酸痛,血肌酐和尿素氮升高。不包括血色素升高。

60. 术前常规禁食的主要目的是

A. 避免胃膨胀而妨碍手术

B. 防止麻醉期间呕吐导致误吸

C. 防止术后腹胀

D. 防止术后肠麻痹

E. 防止术后便秘

答案:B

61. 锁骨骨折复位固定后拆除外固定的时间一般为

A. 3~5天

B. 1~2周

C. 3~4周

D. 6~8周

E. 8周以上



答案:C

62. 体外循环下心脏直视手术所用心脏停搏液的主要成分是下述哪种物质
 A. 高葡萄糖
 B. 高三磷酸腺苷
 C. 高钾
 D. 高葡萄糖+胰岛素
 E. 高磷酸肌酸

答案:C

63. 围手术期预防性使用抗生素的最佳时间为
 A. 手术前2天开始
 B. 手术开始前1小时
 C. 手术开始时
 D. 手术中发生污染时
 E. 手术结束时

答案:B

64. 我国大肠癌最多发的部位在
 A. 盲肠
 B. 升结肠
 C. 横结肠
 D. 降结肠
 E. 直肠

答案:E

65. 下述哪项不是单纯性甲状腺肿手术指征的依据
 A. 有明显压迫症状
 B. 胸骨后甲状腺
 C. 继发甲亢
 D. 病史较长者
 E. 疑有恶变者

答案:D

66. 下述哪项不是优先抢救的急症
 A. 心跳骤停
 B. 大出血
 C. 休克
 D. 前臂骨折
 E. 腹部内脏脱出

答案:D

67. 下述哪项不提示黑痣恶变
 A. 迅速长大,色素突然加深
 B. 发生溃疡、出血
 C. 局部生长有毛发
 D. 周围出现卫星状小瘤或色素环
 E. 周围有淋巴结肿大

答案:C

68. 下述哪项对鉴别良性与恶性骨肿瘤无意义

A. 有无全身症状

- B. 有无局部皮肤静脉怒张,温度增高**
C. 是否可扪及肿块
D. X线摄片上病变边界是否清楚,是否有明显的骨膜反应
E. 碱性磷酸酶是否升高

答案:C

69. 下述哪一项不是机械通气治疗的适应证
 A. 心肺复苏后期治疗
 B. 通气功能不全或衰竭
 C. 换气功能衰竭
 D. 呼吸肌功能失调或丧失
 E. 术后恢复期病人

答案:E

70. 下肢丹毒反复发作可导致
 A. 浅静脉炎
 B. 局部脓肿
 C. 败血症
 D. 橡皮肿
 E. 血栓闭塞性脉管炎

答案:D

71. 下肢静脉曲张,行Perthes试验是为了检查
 A. 大隐静脉瓣膜功能
 B. 小隐静脉瓣膜功能
 C. 交通支静脉瓣膜功能
 D. 大隐静脉瓣膜功能
 E. 深静脉有无阻塞

答案:E

72. 消化道穿孔的临床特点中不包括哪一项
 A. 突然剧烈腹痛,呕吐
 B. 必有胃十二指肠溃疡病史
 C. 板样腹,压痛,反跳痛,肌紧张
 D. 肠鸣音减弱或消失
 E. 多数患者立位X线检查可见膈下游离气体

答案:B

73. 休克经处理后,临幊上微循环改善的最重要指标是
 A. 血压回升
 B. 尿量增多
 C. 肢端温度上升
 D. 皮肤颜色较红
 E. 神志恢复清楚

答案:B

74. 休克时,5~10分钟快速静滴等渗盐水250ml后,如血压升高而中心静脉压不变则提示