

古今圖書集成

中国学术类编

艺术典
四
(十二)

藝術典四

一〇醫部〔四〕

各部部长上所冠数字係在本典之原部次
各部部长下所附数字係在本典統編頁次之起頁

- | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 58 瘟疫門三三〇九 | 59 癰瘻門三三三五 | 60 虛勞門三三四一 | 61 腫脹門三三九七 |
| 62 噎膈反胃門三四四一 | 63 飲食門三四六八 | 64 積聚門三四九一 | |
| 65 驚悸怔忡健忘門三五一九 | 66 情志門三五四三 | 67 煩躁門三五五六 | |
| 68 嗜臥門三五五六 | 69 不得臥門三五六九 | | |
| 70 聲音門三五七八 | 71 呃門三五八九 | 72 噫氣門三六〇〇 | |
| 73 懊憹門三六〇三 | 74 懈惰門三六〇四 | 75 太息門三六〇八 | |
| 76 中蠱門三六一〇 | 77 中毒門三六一五 | 78 中惡門三六二四 | |
| 80 諸嘔門三六三七 | 81 五絕門三六三九 | 82 怪病門三六四〇 | 79 卒中暴死門三六三一 |
| 84 頤養補益門三六五三 | 85 種子門三六八六 | | 83 諸蟲門三六四四 |
| 86 傷寒門三七〇五 | | | |
| 87 癰疽疔毒門三九五二 | 88 附骨流注門四〇六三 | 89 遊風丹毒斑疹門四〇七六 | |
| 90 癰瘍瘰癧風門四〇八六 | 91 浸淫疥癬門四〇九 | 92 反花天泡楊梅門四二二 | |
| 93 癰疽疔毒門四二二 | 94 熱瘡癰疽門四二四七 | | |
| 95 湯火灸凍瘡門四二五〇 | 96 跌打金刃竹木破傷門四二五七 | 97 蟲獸傷門四二九五 | |
| 98 婦人經脈門四二〇四 | 99 婦人子嗣門四二四〇 | | |
| 100 婦人胎前門四二五四 | 101 婦人臨產門四三〇〇 | 102 婦人產後門四三二二 | |
| 103 婦人崩漏門四三八七 | 104 婦人帶下門四四一一 | 105 婦人諸乳疾門四四三四 | |
| 106 婦人前陰諸疾門四四四七 | 107 婦人夢與鬼交門四四五八 | 108 婦人交媾門四四六〇 | |

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第三百八十八卷目錄

醫部全錄三百六十八

外科附骨流注門

黃帝重傷經

孫思邈千金方

寶漢齋醫集

朱震亨心法

濟世之外科精義

李樞醫學入門

薛己醫按

王肯堂醫林集要

陳實功外科正宗

張介賓醫全書

方氏醫集

二馬醫集

七傷內傷

九子

犀方

鍼灸

醫案

醫部全錄三百六十八

外科附骨流注門

黃帝重傷經

孫思邈千金方

發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰腫得皆不愈治三十日死矣

此足少陰之毒也其狀不甚變而癰腫得皆不愈治三十日死矣

不外發故皮膚不其變為癰毒之狀也

唐孫思邈千金方

附骨疽

凡附骨疽者以其無破口而附骨成膿故名附骨疽

喜者大節解中丈夫產者喜者解中亦兒亦著脊

大人慈若者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便

覺皮肉漸急洪腫如肥狀是也小兒緩手近便大喘

呼即是肢節有痛候也大人緩者先覺肌烘烘然經

日便覺痛癢不腫小兒四肢不能動搖亦如不腫狀

看肢節解中若有風烘烘然不知是附骨疽也痛身

或腫不至潰膿皆有實跡大人亦有不別呼為賊風

風腫不知是疽也凡人身體忽熱當風取涼風入骨

解中風熱相搏便成附骨疽其候喉乾口重惡寒耳

鳴又秋夏露臥為冷所折風熱伏結而作此疾發者

熱多風少緩者風多熱少未知取風何故而有此

疾由其血盛肌嫩為風折之即使凝結故也凡初得

附骨疽者須急服瀉瀉下之傳小豆散得消可服

五香連翹湯

有久癰餘瘡敗為瘡疽者在腰脛間者生瘡中水瘡

瘡要壞不經年成骨疽亦名附骨疽其骨四邊

堅硬中央膿血汁出白臭不盡汁清好肉肉皆成膿

亦有碎骨出者可溫赤龍皮湯夏月日日洗冬月四

日一洗膏肉多可傳白而毒散去毒肉可三日得

之止復長得來結尿散得止取結尿乾灰作末如

粉致瘡中令滿白汁出吮去隨更得之瘡止若更青

肉復若白而毒散如前法去膿更取平復凡骨疽

百瘡不瘳者可搽上日三次夜便瘳如瘳

不瘳而復發骨從孔中出者名為骨疽取先死局

雖一雙去肉取骨熱熱如炭取三家牛骨木刮取

屑三家飯各一兩皆燒成灰合綠礬中碎骨當出

散片瘳

宋寶漢齋醫集全書

流注經治

血漬流注證多生青紫形重之人有此疾者好食煎

炒炙燥熱之類其疽大者如雞卵形重者如拳李

只腫不紅內申經絡之間流注骨節之內偏身痠疼

百節疼痛用內托散加木瓜白芍連翹再服乳香瀉

心散黃芩丸外敷藥當以意消息切勿執方也

小腸流注證受在心經伏熱結聚成毒也常用敗毒

流氣飲再服清心流氣飲治之

冷濕流注證此毒或因足痒抓破有傷湯火風氣

或因寒濕流注於足腫生瘡形如牛眼四時紫黑

已常出臭水先用三棱針刺周圍出血出盡後用金

絲膏貼之呼出水毒水肉肉後以紫金膏貼瘡已紅

活再合隔紙膏貼之

無毒流注證因毒不常飲食失節氣上停食或因

博物彙編醫部全錄第三百六十八卷醫部外科附骨流注門

醫部全錄三百六十八卷醫部外科附骨流注門

負重努力傷其經路宜服調毒流氣飲內托千金散
黃春九護心丹此證乃乘虛感風濕熱相結而成初
生一二漸至於及二三五十者或偏體皆生先發
汗以解風濕天用參其之刺補之圖藥並汁能調大
服內托千金散大加參其其雨加著水津焉

附骨瘡治

夫附骨瘡者即貼骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊
而病則一此證之發因感暑身熱風入於骨節與
熱相搏復遇冷濕所折或居勢太過兩足下水成坐
臥濕者大骨節間其受寒邪致風熱伏結遇附骨
成疽者大骨節間其受暑邪致風熱伏結遇附骨
日便覺皮肉生熱洪決如肥狀其發者一點腫疼漸
覺長大行步艱難以致骨肉不相親若失治令身成
膿不潰至死身變青腫但痛按之至骨久則結膿則
成癰癰其附骨疽久而即膿結以此為異若治附
骨疽係感風中之則肉深腫多凡偏枯痺曲之生乃
附骨疽之漸也四肢困倦乍寒乍熱小便赤大便澀
無汗須用紫絲斷艾風仙草煎湯熱飲之使腠理開
發以布拭乾再用乾棉履之燒乳香湯之如虛性腫
服人參膏略加附子以助其氣復以艾火攻之萬無
不愈者

附骨疽

環跳穴痛防生附骨疽以香木佐黃蘗之辛行以青
皮冬加桂枝夏加黃芩離虛加杜牛膝以生甘草為
使大料煎入生薑汁食前飲之痛甚者恐十數貼發
不動少加麻黃一二貼又不動恐成癰地或

坎以火煨紅沃以小便赤體坐其中以席圍下能使
熱氣蒸騰理開氣血暢而愈
附骨癰熱在血分之極初發時以青皮甘草治之破
後當養血
瘡毒之外科補義

附骨瘡

夫附骨瘡者以其毒氣深沉附著於骨也此疾與賊
風相類而不同人不能辨治之誤矣蓋附骨瘡者夏
秋風氣為冷折之風熱伏結附骨成疽賊風之候由
風邪之氣得於骨節故其痛深骨節遇寒則痛甚附
骨疽痛而不能轉動按之應骨皮肉微熱洪洪如肥
狀者是也其賊風皮骨不甚熱而索索然寒時復汗
出常欲熱熨痛處即得少寬其附骨疽初時但痛無
時乍寒乍熱而無汗者經久不消陰生陽聚化為
熱而潰也賊風不治久而變為癰曲偏枯所以不同
也蓋是賊風則服越婢治風之劑即得差矣認是附
骨疽當宜服瀉瀉瀉或五香連翹散瀉下之大用內
消升麻湯及瀉瀉瀉之之類雖不能消亦得淨法
及有續疽石疽其附骨疽亦相類而異者蓋續疽石
疽皆寒氣所作深伏於骨髓之間有膿與皮肉相似
若疹面堅硬如石故謂之石疽疽其勢緩慢積日
不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名曰續疽此二者
其治初發便宜補虛托裏溫熱之劑以消其火其
調治臨病制宜故不復具載

附骨疽

賊風因風邪得於骨髓故其痛亦微骨過寒則甚外
明李樞醫學入門

謹恐寒有汗痛處常欲熱熨失治變為癰曲偏枯宜
越婢湯主之
續疽石疽皆寒氣伏於骨髓但續疽其痛極慘已紫
黯久則皮肉俱爛石疽腫與皮肉相似疹面堅硬如
石二者初起便宜溫熱托裏補虛大乃隨證調治
外感因風以風冷寒濕深者初起痛不能轉寒熱
無汗經久寒熱為熱便疑者瀉瀉飲于主之有不敢
下者須分經內托汗散在足胛者內托羌活湯陽內
近膝股腹腫木硬者內托羌活湯陽外側者內托酒
煎湯左風外側瀉瀉開行步作痛以手按至骨大
痛者黃連消毒散通用損散散散散

附骨瘡

內傷厚味及勞役與酒後寒涼浴水邪入脾經環跳
穴左右積聚血搏成宜青草蒼藤湯微汗服此不
愈恐疽將成者急掘地坑用火燒紅沃以小便令患
者赤體坐其上以被席圍抱下飲使熱氣蒸騰理
開氣血暢而愈
內傷生冷飲食寒涼藥物血凝於內飲食如常活命
飲食少體倦者六君子湯加香薷香如因勞役傷
食石惡體腫者補中益氣湯
內傷鬱怒腫痛如鍾者宜散漫先用活命飲大用八
物湯加柴胡牡丹皮山梔
內傷勞役兩腿腫痛熱食少此濕熱下注也補中
益氣湯加半夏茯苓芍藥
內傷房室兩腎腫硬二便不通者腎氣丸料加車前
子牛膝服服藥用十全大補湯有寒熱者逍遙散
抑者附疽初起宜黃皮甘草節一陳煎服以行其氣
或受濕患處若腫已成即用火針使毒不得內潰等

附骨瘡

附骨瘡者即貼骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊
而病則一此證之發因感暑身熱風入於骨節與
熱相搏復遇冷濕所折或居勢太過兩足下水成坐
臥濕者大骨節間其受寒邪致風熱伏結遇附骨
成疽者大骨節間其受暑邪致風熱伏結遇附骨
日便覺皮肉生熱洪決如肥狀其發者一點腫疼漸
覺長大行步艱難以致骨肉不相親若失治令身成
膿不潰至死身變青腫但痛按之至骨久則結膿則
成癰癰其附骨疽久而即膿結以此為異若治附
骨疽係感風中之則肉深腫多凡偏枯痺曲之生乃
附骨疽之漸也四肢困倦乍寒乍熱小便赤大便澀
無汗須用紫絲斷艾風仙草煎湯熱飲之使腠理開
發以布拭乾再用乾棉履之燒乳香湯之如虛性腫
服人參膏略加附子以助其氣復以艾火攻之萬無
不愈者

生用亦無妨且不痛又易做口

附骨疽腫痛尤甚者用蜂房蛇退頭髮灰各等分爲末每三錢酒調服或神應膏爲丸每十粒每三十九粒隨下外仍貼之已潰者用平肌散或狗頭骨燒煙膏之類服之亦如

腫上一切瘰癧瘡用錫子黃煅過爲末乾掃如燥痛加黃丹少許桐油調敷凡癰疽生伏兔穴者不治

流注

流者行也注者住也或結塊或流腫皆因寒有痰火或外感風寒邪氣流行至其凝注之處而發或內傷鬱結以致痰火凝發或內傷房室虛虛陽氣凝滯遊於肉理而或內傷勞役飲食搏動而發或跌撲閃挫一時氣凝血凝而或成癰後惡露未盡復成感傷凝注而生四肢或臂展臂關節之處初起宜速製法實者十六味流氣散敗毒散痰痛便毒者古牛精丸虛者一陳四物湯托裏益氣湯不換金正氣散六君子湯加茸補中益氣湯加水香根較通用令其自潰自消若潰久不斂者疑有表邪只托裏爲主十全大補湯人參養榮湯補中益氣湯托裏抑毒湯托裏益氣湯八味丸更在豆豉餅或珀珀膏貼散毒邪補接脾氣服成以火針破之內有膿管以藥練膿之若通用藥涼者不治

薛已醫按

附骨疽

附骨疽有因陰風寒深襲於骨者有因形氣損傷不能起者有因耗元之劑虧損元氣不能發出者有因外敷藥集血凝結於內者凡此皆宜發覺患處

解散毒氣補接脾氣值補脾胃爲主若飲食如常先用仙方活命飲解毒散散鬱滯用六君子補托藥氣若體倦食少但用前湯補接脾氣散毒不得解正若

腫已成即針之使毒不得內凝生用針亦無妨如用針針亦不痛且使易斂其痛甚能解毒生用針意製法能助脾氣行滯滯此雖不見於方書余常用之大效其功不能盡述惟氣血虛脫者不認

流注

暴起所致皆屬不利者調氣爲主抑鬱所致而不痛者宜調經補氣血腫硬作痛者行氣抑血腫而不斂者益氣血爲主傷寒發熱邪未盡者而解之脾氣虛濕熱凝滯肉理而然健脾除濕爲主內脾氣凝滯爲患者和氣血調經移邪所製衛骨痛或運勢痛宜溫經絡養血氣

流注之證多因鬱結或暴怒或脾氣虛濕氣凝於肉理或脾虛不運邪邪客於經絡或濕痰或閃仆或產後餘血流注關節或傷寒餘邪未盡爲患皆因氣不足邪得乘之故氣凝血聚爲患也此證或生於四肢關節或生於臂展臂關節或結塊或漫腫或痛或不痛皆宜用散散法及益氣養榮湯因其元氣則未成者自消已成者自潰可全愈也若不補氣血及節飲食積起居戒七情而專用藥涼散伐者俱不治若

久而不斂痛者宜豆豉餅或附子餅灸之以散散邪接補脾氣或外用珀珀膏貼之若內有膿管或生瘡肉而不斂者用針頭散毒之自斂斂于尤效

蓋注之證或因飲食勞傷脾胃損傷或因房勞陰虛

陽氣虛寒或因鬱結不能散於肉理或因脾理不舒

外邪客之或暑濕傷肝或鬱結傷脾或濕痰流注或跌撲血滯或成癰後惡露不盡或氣凝滯而成或生於四肢關節或生於臂展臂關節或結塊或漫腫或作痛皆元氣虧損所致悉宜散散及用益氣養榮湯因其元氣則未成者自消已成者自潰若久而不斂在

以豆豉餅或珀珀膏貼散毒邪補接脾氣若內有膿管而不斂者用針頭散毒之經云形傷氣傷傷風又曰風氣毒則虛邪氣盛則實若不補氣血而飲食積

起居戒七情而專用藥涼散伐其不死者幸耳

王聖醫林藥要

附骨疽

附骨疽乃流注之敗證也如用涼藥則內傷其脾外冰其血脾主肌肉脾氣受傷飲食必減肌肉不生血

馬脈絡血受冰則氣血不旺而愈滯宜用理脾健則血自生而氣自運行矣又有白虎瘰癧戶留連則非成展轉數處冷毒朽骨出盡自愈若附骨腐者可痊正骨腐則爲終身廢疾矣有瘡自手足足或頭面腫起或癰瘡痛上至頸項骨節去處如癰瘡其此風濕濕氣之證也宜以加減小續命湯及獨活寄生湯治之

有兩膝腫痛起成至運動骨節疼痛者此風濕痹又有兩膝腫痛起成至運動骨節疼痛者此風濕痹又有結核在項腋或兩乳旁或兩腋腋肉處名曰痰癭屬牛脾也又有小兒痘後失道致結核於項項臂臂背之處亦冷證也俱宜熱藥散結

古今圖書集成

已潰膿腐潰腐成身腫便乾腫脹不熱者吉
潰後元氣易復飲食易進內肉易實膿水易乾者吉
初起身發寒熱腫脹色白肢體重強疼痛附骨者險
已成身動不便通腫漫腫不熱不紅不作膿者為險
已潰膿水清稀氣腫脹臭腐痛不消形體日削者死
潰後脾胃虛弱飲食無味口渴不止特白皮枯者死

治法

初起發熱惡寒身腫拘急腫脹痛脈浮緊者宜散
之已成腫脹膿腐皮色不壞上下通腫者宜散寒溫
惡痞寒熱作膿色白光亮按之如泥不起者宜健脾
滋濕身體無熱惡寒脈遲而沉腫脹不熱者宜養血
溫經治胃中三陰脈洪而數腫脹欲脫口乾便燥者
宜下之已潰膿水清稀飲食減少形體消瘦者宜補
中健脾胃潰後腫痛不減膿水不止成熱不退者宜
溫中養氣血愈後筋骨強曲伸不便者宜滋養氣
血通利關節

最宜全書 臣 臣 臣 臣

附骨疽治

附骨疽一證近俗呼為貼骨癰凡疽毒最深而結聚
於骨髓者皆謂之附骨疽然尤惟兩股間肉厚處
乃多此證蓋此證之因有勞傷筋骨而發損其脈者
有持酒力房而因燥其陰者有憂思鬱結而面經其
氣者有風邪寒濕而浸滲其經者凡入於骨髓穴處
無故酸痛久而不愈者便是此證之兆速當因證調
治不可遲也蓋其初起不過少陽經一點滯運而
不散則以漸而聚聚則腫則潰至其延漫則三陰
三陽無不達及而全腫俱潰然此證無非元氣大虧

不能運行故致留滯不脫而後致決裂誠危證也若
潰後腫和雖見困弱之甚只以大補氣血為主皆可
保全若潰後脈反洪壯而煩燥不寧發熱口渴則必
不可治至若治此之法凡以勞傷筋骨而致者宜大
營煎大防風湯治之若酒色傷陰者宜八味丸六
味丸或右歸丸兼大防風湯主之若憂思鬱結氣
者宜痛科流氣飲或五香連胡湯兼大防風湯主之
若風寒外襲者宜五積散兼大防風湯主之大概此
證初起即宜用大營煎溫補氣血或兼仙方活命飲
通行毒氣有火者宜連用連胡湯尾前以解散其毒
仍宜連用隔蒜灸或豆豉餅導頭灸之以速散其毒
最為捷法其有濕熱痰飲等證當並求復法以治之
庶免大害也若環跳久痛不已或見腎股微腫度其
已成勢不能散只宜連用托補專固根本使其速起
連潰則根本既實雖因亦無大害必且易潰易斂而
易愈也若脈見滑數按之軟熱膿已成也速宜針之
無使久留以防深入之患其有不明利害苟圖目前
或用針代消散再傷元氣或用寒涼散藥以遏其毒
氣必致日延日甚而元氣日敗則一潰不可收拾矣
考諸方書俱未詳及此證故悉其所因并附治案

方

毒科流氣飲

治陰發流注惡氣結堆核腫硬作痛或胃弱痞
悶或風寒濕毒得於經絡或血不和結成腫塊肉
色不變或漫腫木悶無頭或陰發乳岩等證未成
速散已成連潰散膿自出惡肉自去非常之驗
桔梗 人參 當歸 桂 甘草 黃芪 鹽水炒
厚朴 薑製 紫蘇 白芍藥 烏藥 防風
枳殼 檳榔 南木香 川芎 白芷

右凡蓋煎服
疼痛加乳香沒藥
瘡乾加知母貝母
瘡不乾加妙皂角刺
流注加羌活獨活
氣滯加香附
胃虛加陳皮此乃行氣散血之劑若服之過度則
氣血虛耗何以為藥學者知之
敗毒流氣飲

治流注初發堆核硬痛不可忍用此疎邪流氣
羌活 獨活 青木香 赤芍藥 當歸 紫蘇
陳皮 香附 白芷 三稜 蓬莪朮 枳殼
川芎 桔梗 柴胡 半夏薑製 赤茯苓
甘草

右生薑煎服熱加黃黃本虛加人參黃芪
方脈流氣飲
治陰發流注堆核及鬱結腫聚結塊或走注疼痛
或心胃痞悶胃脘脹痛嘔吐不食上氣喘急咳嗽

或心胃痞悶胃脘脹痛嘔吐不食上氣喘急咳嗽

寒濕或面目四肢浮腫大小便秘者

紫蘇 青皮 白芍藥 黃芩 白茯苓 烏藥
桔梗炒 半夏薑製 黃芩炒 川芎 枳實炒
陳皮 防風 南木香 大腹皮 甘草 檳榔
枳殼

右生薑煎服

流注加羌活獨活白芷梢

小便不通加水通梔子

洋麻加猪苓海瀉

氣滯加香附

血滯加肉桂

嘔吐加藿香

寒濕加夏枯草此方行氣耗氣之劑不通二三劑止之不可多服

去毒散

治馬瘡粉結者此藥退熱解毒亦效

吉面消 山豆 雞屎干 雞屎根 水子子

通山龍 金銀花 大葉 白根子 紫金藤

九牛天竹 臭木待根 連叉大青 落雞瓜藤

右水煎服

九金六馬散

治馬瘡流注馬瘡馬面馬腿馬癰瘡腫乳癰

骨癰便毒風濕風核等症者

鐵馬鞭 白馬骨 地馬精 紫金藤 馬蹄藤

金星草 金銀花 金銀花 馬蹄一 紫金皮

山紅花根 金銀花根 金銀花 由馬豆

雞屎干 毛裏金紋 水滾子 穿山蜈蚣

右水煎入酒和服

散血消核湯

治前證

紫金皮 大龍根 山蘇木 溪根根 山馬豆

雞屎干 赤牛藤 馬蹄金 馬蹄藤 鐵馬鞭

白馬骨 馬蹄香 穿山蜈蚣

右水煎入酒和服

二萬散

治前證

馬蹄金 鐵馬鞭 雞屎根

右水煎入少酒和服

立效散

治前證

水滾子根 淡茶陳根 晚祥西根

右水煎入酒和服或合六馬散亦效

浸酒方

治馬瘡創人此藥速創

老公騎根 毛裏金紋根 狗骨子根 大葉毛吹

曲

右浸酒服不可煎

續骨散

治接骨證

天燈心 紫背草 赤牛藤 山蘇木 狗狗藤

馬蹄香 馬蹄金 紫金皮 天花粉 白馬骨

鐵馬鞭 臭木待根 酒罐子根

右酒水各半煎服

輕脚散

治鎖腳證

天燈心 紫背草 赤牛藤 狗狗藤 山蘇木

酒罐根 白馬骨 馬蹄金 鐵馬鞭 穿山蜈蚣

石酒水各半煎服

喘急散

治喘急證

馬蹄金 馬蹄藤 白馬骨 紫金皮 狗狗藤

鐵馬鞭 酒罐根 馬蹄香 天燈心 山蘇木

赤牛藤 地馬精 紫金藤 水子子 雞屎干

臭木待根 穿山蜈蚣

右酒水各半煎服

獨君散

治過脊證

紫金皮 天燈心 酒罐根 馬蹄香 馬蹄金

紫背草 狗骨根 地馬精 山蘇木 白馬骨

鐵馬鞭 臭木待根

右生地黃酒入各半煎服

調氣散

治殺著證

溪楓根 白田和 赤牛藤 白馬骨 雞屎根

馬蹄藤 馬蹄香 地馬精根 穿山蜈蚣

馬蹄金 金銀香

右酒水各半煎服

退制散

治馬瘡漏身創人轉動不便

地馬精根 白馬骨 鐵馬鞭 頭形花根

雞屎干 許死子 馬蹄金 山蘇根 狗骨根

治附骨癰及一切瘡毒

當歸半兩 山柰半兩 木鼈子一枚去殼
甘草一兩 右為細末每服三錢神酒調服

治附骨疽

漏蘆湯 漏蘆去重 升麻 連翹 麻黃去根節各一兩
防己 木香 白朮 沉香各半兩 大黃剉炒一兩半

右剉碎每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至七分入芒硝一錢攪勻去滓空心溫服取利三行未利再服

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者 蒼朮去皮 當歸 黑香牛 草烏頭炮各一兩 右為細末許細為丸如小豆大每服三十九空心醉酒下

買衆湯

治附骨癰生股上伏肉間淋瀝 買衆 地骨皮 穀精草 枇杷葉拭去毛刷炙 刺芥去梗 葛根去白升各一兩 右搗碎以水三升煮取二升和滓麻沸調布絹搗之

密陀僧散

杏仁去皮尖及雙仁者二七枚 自然剉碎 密陀僧各半兩 右用苦竹筒一枚入藥在內紙封筒口慢火煨候

筒黃色取出研極細者趁大小用藥以新滾水調勻用雞翎掃塗癰上甚者不過一二日效

聖九子 治風寒凝於經絡腫痛或牙痛或打撲跌墜筋骨疼痛瘀血不散或成癰毒及風濕四肢疼痛或手足攣縮行步不前升麻升麻人血風勞損

百草霜 芍藥各一兩 當歸 白朮各四錢 赤小豆 白朮各一兩六錢 骨碎補培八錢 川烏炮二錢 南星炮三錢 牛膝炮六錢

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九鹽酒或酒下風火喉乾燒起一盤溫酒下孕婦勿服

聖方 瘰癧穴痛防生附骨癰以香木佐黃蘗之辛行以膏皮冬月加杜松夏月加荷子黃冬體虛者加土牛膝以生甘草為使大材煎入生薑汁帶練食前飲之病甚者忌木藥桂枝十數貼發不動少加麻黃一兩貼又不動者忌癰癰成矣急微地成坑以火煨紅沃以小便赤澀坐其上以板磨磨抱下體便熱氣蒸騰理開血氣暢而愈

久癰瘡敗壞成骨疽以龍骨末粉蜜四面厚二分以

膏者瘰癧中二易取出如髮盡愈方用大蝦蟆一枚自死者取一塊雞子大猪脂一片取一二味內脂中煎略治盡下冷冷內鹽一合攪和煎藥用

又方糊皮變末鉄鼠方寸匕 又方新剉鼠皮如錢半貼臍上即癰用已潰者取脊上脂貼之

附骨疽癰疽七枚同大寒藥數枚 附骨瘰癧久不愈者日不已其瘰癧瘰癧中用蝦蟆一箇煎取一雞子大猪油四兩煎枯去滓特凝如膏先以桑根皮為頭煎淨洗以紙煨乾骨末搗四邊以前膏貼之

續年骨疽一握 治出者數枚煎取汁上作瓶生煎魚膏之頃時即凝北足洗傳聖藥

骨疽癰疽山黑色頭魚一箇去腸入白鹽令滿禁足以水一盞石磨內裏至乾焦為末搗細調稀少痛勿怪

附骨疽瘰癧頭骨瘰癧日黑一

香附餅治癰癰流注癰塊或風寒凝於經絡結癰或痛用香附為末酒和量大小飯餅煎思以熱藥斗製之未成者內治已成未潰者煎出煎宜用製汁作餅

博物編錄卷第三百八十八卷醫部 外科附骨疽門

第四五三篇 之三十一

鍼灸

千金方曰附骨疽發背後一寸隨年壯立瘰

醫案

李榮十書曰清津十世年七十改寒濕地氣二月間得附骨瘰於左腿外側足少陽之分少侵足陽明分闊六七寸長一尺小兒堅硬漫腫不辨肉色皮薄深以指按至骨大痛又行步作痛通胡鼠腦子各一錢半連綿肉桂各一錢黃芪歸精各一錢黃芩甘草各五分升麻七分清前那少時以早壓之藥下咽疼痛立止二日後柔軟而腫消矣

買德茂男十歲四月天氣大熱於左足大脛近膝處內足厥陰肝之經少侵足太陰脾之經分出附骨疽不辨肉色漫腫皮薄木硬病勢甚大其脈在三部細弦按之洪緩略有力用黃芪二錢柴胡梢生地各一錢連綿一錢二分肉桂土瓜根各三分黃芩一分歸尾七分半酒水煎空心服一劑愈
朱慶亭心法曰朱紹八官右腰腫生附骨瘰癧草藥酒多生腐發熱變無力子用人參黃連茯苓各一錢苦葶子四十九粒分一貼入竹瀝熱飲而愈
衛生寶鑑曰至元壬午有王伯政者年五十七右臂

膊腫上至肩下至手指已變皮膚腐六脉沉細而微脈虛俱寒醫藥無效和親之曰此乃附骨瘰癧發已遲以婦針起之膿潰拭去日再開之加吃逆不絕查和與丁香柿蒂湯兩服稍緩待日吃逆尤甚自利膈腹冷痛腹瀉飲食減少時發昏憤於左乳下黑盡處灸之二十七壯又處以乾薑附子木香沉香茴香羌活散藥咬咀一兩半飲與服或者曰諸痛瘰癧皆屬心火又當尋見之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內將日脈細皮寒洩利前後飲食不入此謂五成逆逆者胃中虛極也諸痛瘰癧皆屬心火是定也此香內外用反逆當除時從患非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲食漸進勢逆氣色止和又與五香湯數服月餘平復噫乎常者衆人之見知覺者大人之至知常而不知變細事因而取敗者亦多矣凡醫乎守常知變豈可同日而語哉

薛已醫按曰大尹都成處患附骨疽項內痛如錯外色不變勢不可消清其未用寒劑祇因痛傷胃氣而不思飲食用六君子湯治之飲食少進更以十全大補二十餘劑而瘰癧成封去仍以大補湯倍用參芪歸木加麥門五味逆志且母數劑瘰癧漸止而瘰亦愈按二證蓋因濕熱滯於內理氣不能運化其始治宜黃厚土和氣血隔諸炎而疽自消矣
李戶部孟卿振晚六患附骨疽後諸小瘡迭履敗毒之劑更用寒涼藥數之因極極利之藥藥大泄方知爲難也請予治診其脈右關浮大此胃氣已傷故瘡口開張肉皆下陷閉之不熱按云瘡內更覺微冷自

意必成漏矣遂以豆豉餅灸之飲以六君子湯加薑香砂仁炮薑散劑胃氣漸醒飲食漸進患處腐肌肉漸生再以十全大補湯而愈

王時章室產後腰間腫痛兩腿尤甚此由瘀血滯於經絡而然也不早治必作骨疽遂與桃仁湯二劑稍愈更以沒藥丸數服而疹亦有惡血未盡膈腹刺痛或流注於四肢或注於內疼痛如錐或兩股腫痛此由冷熱不調或思慮動作氣所流注四肢或肢內痛宜沒藥丸治之亦有經血不行流注四肢或肢內痛如錐或因水濕所滯經水不行而腫痛者宜當歸丸治之凡惡血停滯爲患匪輕治之稍緩則流注而爲骨疽多致不救

一婦人患附骨瘰久而不愈致腰腿細軟厥脈遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡瘰癧之後脈遲遲緩者易愈以其有胃氣故也蘇家細而沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未容也若滑粗散者難療以其正氣虛而邪氣實也一男子腰中患此發而不潰其氣止能起髮不能培養爲瘰也投大補藥數劑而潰又數劑瘰癧出尚清乃服參芪歸木膏斤餘藥少稠數斤瘰癧爛肉噴生大凡瘰癧結氣血爲主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之救忌攻伐之劑亦有瘰癧反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脈大而脈急多屬真氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘰瘰癧高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻毒成虛

提承亂投或清火或解毒逐致嘔吐發熱飲食不進其勢甚危然後懇求相救遂以參芪內托散大加炮薑數劑而嘔止食進其腫軟熱如其膿成即爲針之針處出膿不多復以九味異功煎與之遂得大潰且膿出膿潰者五六處而腿肉盡去止則皮骨矣潰後復嘔惡熱不食遂以十全大補湯及九味異功煎相間與之然後熱漸退食漸進稍有生色然足筋短縮但可監膝仰臥左右挽緊毫不能動則極痛自分已成廢物此後凡用十全大補湯八十餘劑人舉三斤而腿肉漸生筋舒如故後成一精壯男子此全得救本之功也

一男子陳姓者年近三旬素不節慾忽見環跳腰痛月餘不愈予曰此最可畏恐生癰毒之患彼不信又謀之一庸醫反誣其語曰此等胡說真可笑也筋骨之痛亦常事耳不過風熱使然何言癰毒遂用散風清火等藥至半年後果見微腫復來求治予曰速用托補以救根本尚不遲也彼又不信而謀之獨醫曰豈有腫毒未潰而速可溫補耶復用清火清毒之劑及其大潰而危再延余則謂諸脈俱敗方信予言而痛悔前失已無及矣

一齊梁子某姓者年未三旬素以酒色爲事亦患此遲早令服藥輒効不從及其腫而膿成令速針之亦畏痛不從而偏聽庸流數以苦寒解毒之藥不知膿既已成尤不可解但有愈久愈深直待自潰而元氣盡去不可收拾矣

古今圖書集成

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第三百八十九卷目錄

醫部全錄三百六十九

外科遊風丹毒瘰癧門

黃帝素問至真要大論

孫思邈千金方

實漢卿醫方全書

成無已明理論

劉元素六書全書

張潔古活法機要

朱肱心法

嚴思慈醫治要訣

李梴醫學入門

薛己醫按

陳實功外科正宗

張介賓景岳全書

方廣生醫方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方



醫部全錄第三百八十九卷

醫部全錄三百六十九

外科游風丹毒瘰癧門

黃帝素問

至真要大論

少陽司天客勝則丹疹外發及為丹瘰

丹疹即遊疹因火熱而發於外丹瘰即赤游瘰

於外而欲游於內也

唐孫思邈千金方

丹毒

丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手

掌甚者遍身有瘡有腫無定色有白丹者肉中腫起

癰而腫痛微腫如吹狀癰疹起也有難冠丹者赤

色而起大者如連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟如

雞冠肌理也一名朱黃丹有水丹者由濕熱而起遇

水濕搏之結丹兒兒黃赤色如有水在皮中喜著肢

及陰處此雖小疾不治令人致死

瘰癧

素問云風邪客於風中則肌膚氣發散又按瘰癧

皮膚外發腫理理毛注氣衰行則為瘰也所以風

氣瘰癧皆由於此

瘰癧者起如蚊蚋咬痕煩癢

極者重者壅起接之連手起又有白瘰者亦如此赤

瘰熱時即發冷即止白瘰天陰冷即發白瘰宜蠶絲

石汁拭之或煮薤白和少酒以浴之良或煮石楠汁

拭之良餘一切如治丹方俗呼為風屎亦名風尸

丹毒

朱實漢卿醫方全書

內丹者從腎下至腰下腫發赤色名曰內丹如早覺

可治至腰便不可治其病多大小便不通有不通三

日而飛身身青黑色而死用救急丹酢磨傳內丹處

更服連綿散毒散

游丹者即遍身丹毒也初發兩手背腫微上下悉痛

若經一宿一宿腫氣遍身入心內者即死初覺急治

之宜服五香連綿湯水香流氣飲以金絲散數之宜

用治治之法治之

小兒患赤游丹皆從母胎中受熱故皮膚病遊

走不定從腹起於四肢收者輕四肢收於腹者重急

治得生小兒赤游丹因熱然所致即胎毒也或母懷

胎之時好食辛熱毒物沐浴熱湯冬天炭火以致熱

氣入胎暗熱無度或生下火烘衣被或火烘牀褥以

致熱毒內外交攻半歲上下無有不發者初起身體

發熱熱火視之其色紅赤啼哭不止其光遊走不定

發於四肢者生發於腰腹者死惡用破針針去其紫

血自下而上則毒血流下不可逆起急用乳香末藥

子清調勻塗之惡時用芭蕉根汁塗之內服珠砂化

毒丹生黃調下再用紫金錠水磨汁下

又有十種丹毒一乘蠶丹從頭項起起滿發紅腫頸

