

古今圖書集成

博物彙編

藝術典

中華書局
巴蜀書社

博物彙編 藝術典

古今圖書集成

中華書局 已卯書社

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十卷目錄

醫部彙考二百十

後陰門四

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百三十卷

醫部彙考二百十

後陰門四

單方

大腸脫肛烏龍尾同鼠屎燒烟於桶內坐上熏之數

次即不脫烏龍尾即梁上塵也

風熱脫肛鐵粉研同白蠟末傳上按入

虛冷脫肛石灰炒熱故帛裹坐冷即易之

大腸脫肛磁石半兩火煨酢泮七次為末每空心米

飲服一錢

又方用磁石末麝糊調塗額上入後洗去

大腸脫肛苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之以木

賊末傳之

痔痢脫肛冷水調黃連末塗之

大腸脫肛蛇牀子甘草各一兩為末每服一錢白湯

下日三服并以此蛇牀末傳之

老小脫肛香附子荆芥穗等分為末每服一匙水

大槐煎十數沸淋洗之

下血脫肛白雞冠花防風等分為末糊丸梧子大空

心米飲每服七十九

又方白雞冠花炒櫻櫚灰羌活一兩為末每服二錢

米飲下

肛門腫痛生卒根搗爛坐之良方

脫肛不收卒根搗爛煎湯熏洗之

大腸脫肛木賊燒存性為末摻之按入即止一方加

龍骨

脫肛不收荏苒子炒研傳之

大腸脫肛曼陀羅子連殼一對煨斗于十六箇同剉

水煎三五沸入砂鍋少許洗之

大腸脫肛生苦薏搗汁溫服之以猪肉汁洗手按之

令暖自入

久痢脫肛女萎切一升燒熏之

大腸脫肛下木便頭連皮子切炒茶荳茶等分為末

每服二錢米飲下亦治夢遺名鎖陽丹

脫肛不收蒲黃和猪脂傳日三五度

大腸脫肛用紫浮萍為末乾貼之

脫肛不收生韭一斤切以酥拌炒熱綿裹作二包更

互熨之以入為度

大腸脫肛生萊菔搗實臍中束覺有痛即除

諸瘡痔漏久不結痂用生薑連皮切大片塗白藥末

炙焦研細貼之勿動

痔漏脫肛胡荽子一升粟糠一升乳香少許以小口

瓶燒烟熏之

凡大人小兒脫肛每天冷及吃冷食即暴痢不止肛

則下脫久療不瘥者春間收紫莖花二斤曝乾為散

加絨毛末七兩相和研細塗肛上納入即使人噤冷

水於面上即吸入腸中每日一塗藥噴面不過六七

度即瘥又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日

再漸加至二方寸匕以瘥為度若五歲以下小兒即

以半杏子許和酒服之忌生冷陳倉米

殺道生痔荏苒葉搗爛裹納之下部日三次

脫肛瀉血不止用桑黃一兩熟附子一兩為末煉蜜

九梧子大每米飲下二十九

大腸脫肛久積虛冷以鼈頭炙研米飲服方寸匕日

二服仍以米油調塗腸頭上托入

大腸脫肛蟻螻蟻燒存性為末入冰片研勻搽肛上托

之即入

痔漏脫肛每日空心嚼川椒一錢凉水送下二三次

即收

大腸脫肛脫下三五寸者用大田螺二三枚將井水

養三四日去泥用雞爪黃連研細末入腸內待化成

水以濃茶洗淨肛門將雞翎蘸掃之以軟帛托上自

然不再復發也

腸頭挺出蟬蛻皮一片瓶內燒烟熏之并傳之

陽證脫肛以荊芥生薑煎湯洗之用地龍蟻如錢樣

者去土一兩研細三錢為末油調傳之

大腸脫肛狗涎抹之自上

大腸脫肛蝸牛殼去土研末羊脂鑄化調塗送入即

愈

大腸脫肛炙麻鞋底頻按入仍以故麻鞋底隨頭各

一枚燒研傳之按入即不出也

脫肛不收貼水荷葉焙研酒服二錢仍以荷葉盛末

坐之良方

大腸脫肛蟬皮一斤燒磁石煨五錢桂心五錢爲末
每服二錢米飲下元方

脫肛痔疾五倍子半斤燒烟熏之或水煮極爛盛坐
桶上熏之待溫以手輕托上內服參茸升麻藥方

又方用五倍子百草霜等分爲末酢熬成膏鵝翎掃
傳上即入下

瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩密陀僧半兩爲
末蒸餅丸梧子大每米飲下二十九

下痢脫肛槐斗子燒存性研末猪脂和傳方

又方槐斗殼燒存性研末猪脂和并煎汁洗之

大腸脫肛不蛙皂角五挺搥碎水浸取汁二升浸之
自收上收後以湯盪其膿肚上下令皂角氣行則不
再作仍以皂角去皮酥炙爲末棗肉和丸米飲下三
十九方

大腸脫肛黃皮桑樹葉三升水煎帶溫服貯之方

坐板瘡疥絲瓜皮焙乾爲末燒酒調搽之方

脫肛不收五花梅葉陰乾爲末每服二錢米飲調下
衆塗腸頭方

大腸久積虛冷每因大便脫肛用蝸牛一兩燒灰猪
脂和傳立縮

又方治上證及痢後脫肛用乾蝸牛一百枚炒研每
用一錢以飛過赤汁磁石末五錢水一盞煎半盡調
服日三

泄瀉脫肛已久者黑聖散主之大蜘蛛一箇乾葉兩
重包紮定燒存性入黃丹少許爲末先以白礬葱椒
煎湯洗拭乾以前藥末置軟帛上托入收之甚是有

效也

鷓鴣爪炙入麝香煎酥爲末酒一盞服之治痔漏有
驗方

肛門腫痛欲作痔瘡急取屠刀磨水服之甚效方

腎生濕瘡日以新磚坐之能去濕氣方

痔瘡腫痛鉛白霜白片隨各半字酒調塗之隨手見
效方

外痔腫痛黃丹滑石等分爲末新汲水調日五上之
漏瘡不合童尿製爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補
藥方

痔漏腫痛無名異炭火煨紅米酢淬七次爲細末以
溫水洗瘡綿裹筋頭填末入瘡口數次愈方

痔瘡有蟲并漏古礞石灰川烏炮等分爲末燒飯丸
梧子大每服二三十九食前酒或米飲下方

痔瘡熱腫用鴨嘴青磨礬煨研蜜水調傳可以消脫
方方

一切漏瘡有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許
於紙捻上插入使去惡管漏多勿齊上最妙方

一切漏瘡故布裏鹽燒赤爲末每服一錢方

痔瘡漏瘡白礬青鹽各四兩爲末猪尿脬一箇盛之
陰乾每服五錢空心溫水下方

冷瘡成漏明礬半生牛熟熟者生肉生者追膿五靈
脂水飛各五分爲末以皮紙裁條墜和末作小捻子
香油捏濕於末上拖過剪作大小捻安入漏內早安
午換候膿出盡後有些少血出方得乾水住藥自然
生肉痊好

外痔腫痛白頭翁草一名野丈人以根搗塗之逐血

止痛

雞冠痔疾黃連末傳之加赤小豆末尤良方

痔病祕結用此寬腸黃連根殼等分爲末米糊丸梧
子大每服五十九空心米飲下方

脫肛取東壁土湯泡先熏後洗亦治小兒脫肛

痔瘡疼腫不可忍胡黃連末鵝膽汁調搽之方

下部漏瘡苦參煎湯日日洗之方

痔瘡腫痛不可忍蛇牀子煎湯熏洗方

痔漏出血香白芷爲末每服二錢米飲下并煎湯熏
洗神效方

痔瘡腫痛先以皂角烟熏之後以鵝膽汁調白芷末
塗之即消方

痔瘡腫痛金末水調塗之即消方

痔漏腫痛荆芥煮湯日日洗之方

野雞痔病先以槐柳湯洗過以艾灸上七壯取效方

酒痔便血青蒿用葉不用莖用莖不用葉爲末黃前
冷水煮後酒水調服方

痔疾下血益母草葉搗汁飲之方

五痔肛腫久不愈變成漏瘡用雞冠花鳳眼草各一
兩水二碗煎湯頻洗方

腸痔下血多年不止用水賊枳殼各二兩乾薑一兩
大黃二錢半並於饒內炒黑存性爲末每粟米飲服
二錢甚效也方

痔瘡腫痛連綿煎湯藥洗後以刀上飛過線穿入痔
香貼之方

痔瘡腫痛用竹搗汁服一升一二服未盡再服亦取
汁和麪作餅食日三次

內痔不出草烏為末津調貼肛門內痔即翻出乃用
枯痔藥點之

下部腫痛痔瘡血旁生孔發癢七枚五月五日
收者新牛黃半兩肥羊血一兩炒黃同搗成膏丸蓮
子大炙熱綿裹納肛中半日即大便中蟲出三四度
永盡

般道赤痛或痔如蟲咬發絲子炒黃黑為末雞子白
和塗之

肛門痔瘡用木龜仁三枚砂盆搗如泥入百沸湯一
碗乘熱先薰後洗日用三次仍塗少許

又方用木龜仁帶酒者雄雞各五箇乳細作七丸梳
覆過處勿令乾每以一九唾化開貼痔上其痛即止
一夜一丸自消也

痔瘡腫痛以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病中良

五痔下血桂枝子燒存性米飲服二錢有功

痔瘡有蟲黑日牽牛各一兩炒為末以豬肉四兩切
碎炒熟煎末食盡以白米飲三匙壓之取下白蟲為
效

又方白牽牛頭末四兩浸藥一錢為細末欲服藥時
先日勿夜飲大早空心將豬肉四兩炙切片蘸末細
細嚼食取下膿血為效量人加減用忌酒色油膩三
日

漏痔水淫乃腎虛也牽牛末二錢半入切開豬腎中

竹葉包定煨熟空心食溫酒送下借腎入腎一縱一
橫兩得其便惡水既泄不復淋瀝

一切漏疾王瓜根搗傳之燥則易

腸風痔漏用草薢實去土等分末每服三錢溫
酒空心服之

痔瘡腫痛咸靈仙三兩水一斗煎湯先薰後洗冷再
溫之

瘡久成漏忍冬草浸酒日日常飲之

瘡血內漏蒲黃末二兩每服方寸匕水調下服盡止

腸痔出血蒲黃末方寸匕水服之日三服

痔瘡腫痛虎耳草陰乾燒烟桶中熏之

痔瘡出血雀林草一大握水二升煮一升服日三天
見效

痔瘡風腫作痛胡麻子煎湯洗之即消

一切漏瘡鹽麪和鹽燒研傳之

下血成痔稻葉燒灰淋汁熱洗三五度

腸痔有血小豆二升苦酒五升煮熱日乾再浸至苦
酒盡乃止為末酒服一錢日三服

凡肛門凸出取故屋東壁上土一升研末以長皂莢
挹末粉之仍炙皂莢更互敷之

痔瘡作痛用盆盛沸湯以器蓋之留一孔用洗淨韭
菜一把泡湯中乘熱坐孔上先薰後洗數次自然脫
體也

腸痔有血葱白三斤煮湯薰洗立妙

痔瘡腫痛芥菜搗餅頻坐之

五痔作痛胡荽子炒為末每服二錢空心溫酒下數
服見效或水煮取汁冷服半升日二

肛門腫痛馬齒莧菜三葉酸草等分煎湯薰洗一日
二次有效

痔瘡初起馬齒莧不拘鮮乾煮熱急食之以湯薰洗
一月內外其孔閉即愈矣

痔瘡腫痛魚膽草一握煎湯薰洗仍以草挹痔即愈
又方魚膽草煎湯薰洗後以枯礬入片腦少許傳之
痔瘡腫痛苦登盧苦實煎湯先薰後洗乃貼熊膽
密陀僧膠膠片腦末良

肛門酒痔絲瓜燒存性研末酒服二錢

痔漏脫肛絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢為末以
猪膽雞子清及香油和調貼之收上乃止

五痔下血桑耳作葉空心煎食三日一作待孔卒痛
如鳥啄狀取大小豆各一升合搗作兩葉蒸之及熱
更互坐之即癒

腸痔下血用槐樹上木耳為末飲服方寸匕日三服

五痔下血杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾汁煎
減半同米煮粥食之

腸痔出血桃葉一斛梓納小口器中坐蒸之有蟲自
出

五痔作痛桃根木煎汁浸洗之當有蟲出

又方用桃皮并葉梓爛水漬令漚去查盛盆中漬之
蟲自出

翻花痔瘡木瓜為末以鯽魚身上涎調貼之以紙護
住

痔瘡腫痛隔年曬乾棧子桶內燒烟熏之神效
痔瘡腫痛把葉蜜炙烏梅肉焙為末先以烏梅湯洗貼之

痔瘡出血棧子粉糯米各一升炒黃滾水調作果子取出蒸熟食之不過四五次效

腸風血痔熱多者尤佳樹葉微炙研末一錢米飲調服未止再服

蟻蝨漏瘡疥癩燒存性研以米泔別浸樹葉取汁洗瘡後乃納灰少許於瘡中

蟲痔裏急檳榔為末每日空心以白湯調服二錢漏瘡惡穢大腹皮煎湯洗之

痔漏脫肛每日空心嚼川椒一錢涼水送下三五次即收

痔漏腫痛根目一撮碾細空心水服三錢如神

腸痔下血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒赤以酒沃之搗吳茱萸二升入坑裏坐有孔板蓋之冷乃下不過三四度愈

久近痔漏三十年者三服除根用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半當歸五錢為末每空心酒服二錢忌熱物五日見效

漏瘡膿血白乳香二錢牡蠣粉一錢為末雪糕丸麻子大每薑湯服三十九

血痔腸風血痢未傳之內外痔瘡片腦一二分薑汁化搽之

大腸脫肛絲桑蟲燒研和猪脂塗之立縮

痔漏腸風臟毒下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火為末米糊丸如梧子大每服七十

九米飲下
又方蜜棧子生用甘草炙為末每服二錢水煎服之

痔瘡腫痛諸蘆草根煎湯先熏後洗
內外痔瘡用槐角子一斗搗汁曬稠取地脂為末同前九梧子大每米飲服十九兼作槐子湯下或以苦參末代地脂亦可

外痔長寸用槐花煎湯頻洗併服之數日自縮
腸風痔疾用槐葉一斤蒸熟曬乾研末煎飲代茶久服明目

痔瘡有蟲作痒或如膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當有蟲出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中

漏瘡腫痛柳根紅紫煎水日洗
一方用楊柳條罐內燒烟熏之出水即效

痔瘡腫痛楮葉半斤搗爛敷之
痔瘡腫痛楮殼煨熟熨之七枚立定

又方枳殼末入瓶中水煎百沸先熏後洗
痔漏水煮棘根汁洗之

痔漏出水用蛻螂一枚陰乾入冰片少許為細末紙熱蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出即愈

又方用蛻螂焙乾研末先以蒜湯洗過貼之
痔瘡腫痛紫荊皮五錢新水食前調服

一切漏瘡不拘蜂蟻鼠瘻蛻螂燒末酢和傳
痔瘡用二十年鐵線袋取袋口燒灰水服

年久痔漏田龜二三箇煮取肉入苧苧常食累驗此疾大忌精醉等熱物

痔漏脫肛虎膠骨節以蜜二兩炙赤搗末蒸餅九梧子大每侵晨溫酒下二十九取效

肛門凸出虎骨燒末水服方寸匕日三服
鷓鴣巢柴燒研飲服方寸匕一日三服治積年漏下不斷困篤者一月取效

十年痔瘡熊膽塗之神效一切方不及也
腸風痔瘡熊膽半兩入片腦少許研和猪膽汁塗之

坐板瘡疥生之麻細嚼敷之
漏瘡不合以紙粘臘猪脂納瘡中日五夜三

臘毒下血新槐花炒研酒服三錢日三服或用槐白皮煎湯服

痔漏疼痛用田螺一箇入片腦一分在內取水搽之仍先以冬瓜湯洗淨

臘毒下血苦楝子炒黃為末蜜丸梧子大米飲每吞十九至二十九

又方馬齒莧湯洗淨搗活螺螄敷上其病即愈
痔漏神方赤白茯苓去皮沒藥各二兩破故紙四兩石臼搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出

木龍蒸熟曬乾為末酒糊丸梧子大每酒服二十九漸加至五十九

腸風痔瘡下血年深日近者如聖散用臘月野狸一枚蟠在罐內炒大棗半斤甘草四兩猪牙皂莢二兩同入罐內蓋定瓦上穿一孔鹽泥固濟煅令乾作一地坑以十字瓦支住罐子用炭五斤煅至黑烟盡甯烟出取出濕土一宿為末每服二錢鹽湯下

又方以狸肉作羹其骨燒灰酒服

痔瘡疼痛用赤足蜈蚣焙為末入片腦少許唾調傳之

又方用蜈蚣三四條香油煮一二沸浸之再入五倍子末二三錢瓶收密封如遇痛不可忍點上油即時痛止大效

痔瘡初起痛痒不止用紙襪烘熱熨之冷又易易痔漏痔瘡經魚鱗二三片綿裹如聚形納入坐之其痛即止

腸風血痔用活鮑魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬末二錢以櫻包紙裹煨存性研末每服二錢米飲下每日二服

腸痔下血鱈魚作鱗以蒜羹食之忌冷毒物內痔出血鱈魚食即止其性涼也

風痔腫痛發歇不定者是也白礬二兩洗剉炒黃為末烏梅肉和九梧桐子大每瓶蜜湯空心下五丸妙

痔漏下血蠶紙半張梳內燒灰酒服自除

肛門鼠痔蜘蛛絲纏之即落

諸痔發痒用全蠍不拘多少燒烟熏之即效秘法也

痔瘡腫痛香當門子印城鹽等分塗之不過三次

痢類脫肛黑色堅硬用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入和硝少許洗軟用真麻油點火滴於上以枯蟬龍

骨少許為末搽肛頭上以芭蕉葉托入

諸痔疼痛青蛙丸用青色蛙長脚者一箇燒存性為末雪糕和丸如梧子大每空心先吃飯二匙次以枳殼湯下十五丸

蟲使腎肝肚盡腸穿用青蛙一枚雞骨一分燒灰吹入數用大效

痔漏有蟲用狗肉煮汁空服能引蟲也

又方用熟犬肉蘸鹽汁空心食七日效

痔瘡下血不止者用飯月砂慢火炒黃為末每服二錢入乳香五分空心溫酒下日三服

痔瘡腫痛用蠟牛浸油塗之或燒研傳之

腸風痔疾用蠟皮及骨燒灰米飲空心服二錢甚者入紅雞冠花白礬為末和之

腸痔有血賴肝燒末木服一錢

脫肛不收舊根石橘皮各一握酒一盞煎七分溫服

花上粉主治諸蟲瘻惡痔疾納之

腸痔氣痔出血血用穿山甲燒存性一兩肉豆蔻三枚為末每米飲服二錢甚者加蟬皮灰一兩中病即止

鼠痔成瘻腫痛用穿山甲尾尖處一兩炙存性醋甲酥炙一兩麝香五分為末每服一錢與茶湯服取效

諸漏有膿蛇蛇灰水和傳上即蟲出

痔瘡腫痛蛇蛇脂研香油調塗立效

一切冷漏白死蛇取骨為末封之大痛以杏仁膏摩之即止

大腸氣痔作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調服日二次

五痔下血蟬皮三指大雄黃如蝦大熟艾一錢穿地作坑調和取便熏之口中有烟氣為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度未痊勿犯風冷藥膳將養切忌雞魚猪生冷二十日後補之

腸痔有蟲蟬皮燒末生油和塗

痔瘡成漏膿水不止用羊羔兒膏鹽泥固濟煨過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘻口三日外必令愈

下部漏痔大蜂房燒存性研搗之乾則以真菜子油調

五痔及腸風脫肛五倍子白礬各五錢為末順流水丸如梧子大米飲下七丸

漏血不止水蛭炒為末酒服一錢日二服惡血消即愈

殺道生瘡久不愈用雞膽脂燒存性為末乾貼之如神

肛門生瘡蓋肛門主肺肺熱即肛寒腫痛生瘡白蜜一升猪膽汁一枚相和微火煎令可丸九三寸長作挺塗油納下部臥令後重須臾通洩

痔瘡出水用牛膽膽各一枚賦粉五十文磨香二十文以三味和勻入牛膽中懸四十九日取出為丸如大麥大以紙燃送入瘻內有惡物流出為驗

鼠乳痔疾牛角鯉燒灰酒服方寸匕

五三六三七

博物彙編醫術典第二百三十卷醫部 後陰門

脫肛五倍子末三錢白礬一塊同煎湯先煎後洗又取末搽肛托入

諸痔腫痛蠶繭內入男子指甲令滿外用童子頂髮繭裏燒存性研末蜜調傳之仍日日吞牛膽製過槐子其效甚速

九漏有蟲乾人屎乾牛屎隔綿貼之蟲聞其氣即出若痒則易之蟲盡乃止

蟲食肛爛見五臟者即死以猪脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥

內外痔瘡片臘一二分葱汁化搽之

一切漏疾白馬通汁每服一升良

治血痔用地榆皮為細末每服二錢食前米飲調下日三服

痔漏脫肛生鐵一斤水一斗煮取五升日再洗

治痔以白芷煮白芍作線快手緊繫痔上微疼不妨其痔自落

鹹毒下血車前草連根一握生薑一小塊新水研碎取汁候血欲下時腰間必覺重便服一盞血即止甚

者不過再服

痔漏蝕肛門熱艾一團雄黃少許同燒灰以竹筒納下部引烟熏之

血痔取雞冠花不拘多少濃煎湯空心服一盞

腸風血痔及脫肛木賊槐花及桑耳水煎脫肛為末

搽肛托上

五痔及腸風賊毒槐花炒水煎服或同荊芥側柏葉

為末米飲下二三錢名曰槐花散

五痔及腸風賊毒槐實剉為末米飲下一錢或密丸

服亦佳

槐木上耳治諸痔及腸風賊毒取耳為末米飲下一錢日三

五痔及腸風下血痔漏桑耳二兩梗米三合煮粥空心食之

桑樹木上寄生治腸風痔漏如神取葉乾為末水酒米飲任下一錢或為丸服亦佳

馬蘭根治痔漏取根研細傳上片時看肉平去藥稍遲恐肉反出以煨甘石煨牡蠣粉末塞之

血痔腸風賊毒取槐根白皮人參等分為末空心米飲下二錢佳

腸痔及痔漏取有子蜂房焙乾為末麝香和九梧子大空心酒下二三十九

五痔漏瘡取鯢魚治如食法煮熟入椒鹽醬調和食之

血痔腸風賊毒取槐根白皮切酒浸蜜炒為末桑肉和丸酒下三五十九

酒痔下血取蘿蔔二十枚留葉寸許及根入罐內水煮極爛以薑鹽酢醃空心食之立止

肛門脫出取胡荽切一升燒熟之即入又酢煮服之亦效

肛門熱腫取青葱葉剉取涎對停入蜜調勻先以藥水洗後敷痔上其冷如冰

治瘰癧取冬瓜藤濃煎湯熏洗即愈

痔漏取啄木鳥燒為末納孔中不過二三度瘥

諸痔臘月牛脾一具熟食之勿與鹽醬未瘥再吃五痔痔漏腸風脫肛一切痔病取蠟皮燒為末米飲

下一錢空心服

痔漏瘰癧炙和麝香雄黃為丸服或為末酒下二錢十服見效

五痔痔瘰癧甲不拘多少燒為末米飲下二錢名曰猪甲散

血痔腸風漏血取野猪肉二斤切著五味炙熟空心食之作藥亦得又取外野連皮燒作末米飲空心下即止

痔漏陰蝕爛瘡取鰾風燒為灰空心米飲下二錢又取油塗之妙

痔漏溫蠶瘰癧一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死出即愈或灌肛內亦下蟲及惡物

大腸熱腫木龍子五倍子研末蜜水調敷

塞漏孔方如痔漏有瘻用赤石脂白石脂枯白蠟黃丹腦子同為末塞之或飯和擦條插入

痔漏秘方用煉蜜半盞入熊膽一分再煉入水成珠不散將猪鬃綿裹成捻子將蜜塗在捻子上仍用片腦熊膽各半分研細搽在捻子上插入漏眼內底至盡頭則止如服多醫得一箇又醫一箇不可一齊

上藥如見外皮潰爛用黃蠟黃丹麻油煎膏貼瘡上縛緊一七日效

取朽骨久疽及痔漏烏骨雞脛骨以上等雜黃實之鹽泥固濟火煅通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙捻送入孔中瘻內更用膏藥貼之

痔漏用蠶魚腸以五味炙熟貼之良久蟲出即去之

三次盡出

痔瘡有蟲蟻蛭生搗為丸塞肛門中引蟲出盡末差便毒用木藤子大黃苦葦桃仁草龍膽石咬咀濃煎露星月一宿侵早溫服立愈

又方白蠟蟹槐花為末酒調服一方加酒大黃痔漏反花瀉血者用孤手足一副陰乾穿山甲蟬皮各三兩黃明膠白附子五靈脂烏頭川芎蔞乳香各二兩剉細入砂鍋內固濟候乾炭火煨紅為末入木香末一兩以芫荽煎酒調下一錢日三服屢效

治濕腫方取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以水一升半合和先得平旦空腹服之仍削生薑二枚如蘭大以椒葉苦桃葉數重裹訖於爐灰中燒令極熱內下部中食頃若溫盛者三日一作頻服無有不瘥

治蟲蝕下部方胡粉雄黃二味各等分為末著穀道中亦治小兒濕瘡

治傷寒熱病多睡變成濕腫四肢煩疼不得食方羊桃十斤切搗以熱暖湯三斗淹浸之日正午時入中坐一炊久不過二度瘥

下部蟲蝕病人齒無色唇上白喜睡憤憤不知痛痒處或下痢乃下部生蟲食肛也桃仁十五枚苦酒二升鹽一合煮六合服之

下部濕瘡桃白皮煮取濃汁如稀湯入熊膽少許以綿蘸藥納入下部瘡上

藏毒下血烏犀散用淡豉十文大蒜二枚煨同搗丸梧子大煎香茶湯服十二九日二服安乃止末絕根本無所忌

治腸脫肛出轉廣不可入方生苦葦根為粉以猪脂膏溫塗隨手抑按自得縮入

治積冷利脫肛方枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄蜜塗炙令暖熨之冷更易取縮入止

痔漏脫肛果核和諸藥熏之

藏毒欲作未作之時服之立消牙皂七片炭火煨黃色去皮陰地上去火毒為末酒下

痔漏秘方用牡蠣二兩煨過入地它坑埋之去火氣為末若濕乾搽若乾以津調搽痔上

痔漏鯽魚一箇去腸入白礬令滿合之於瓦上燒過為末以雞羽掃藥敷之立效

諸痔用蟪蛄五枚搗碎水銀一錢麝香冰片各五釐用銀簪蘸汁滴患上

痔漏用團魚一枚扯出頭殺之取血即將團魚頭燒灰為末血為丸如粟核大諒痔大小為之入內漏孔不合用石楠葉煎湯放在桶內熏洗待湯通手就將漏洗淨後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內用水屑燃之待白烟出為度取出研末用津液蘸牙末點入漏孔處出黃水為效黃牛牙齒須預製備用

痔貼藥之後恐毒水未盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至七分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

治下部生蟲者桃皮煎如餵取內下部口中有瘡含之千金

股陰瘰癧無名異二錢麝香一字研酒半盤午後空腹服立效

治大孔蟲痒方蒸大棗搗膏以水銀捻和長三寸綿裹內大孔中明日蟲皆出也然水銀損腸胃宜慎之

痔漏用青荷葉燒灰為末空心酒下三錢

又方用金銀藤并花為末每日酒下三錢

五痔及腸痔下血蠶魚作脂和薑食之又和五味作羹食之亦佳

五痔及血痔鯽魚作脂和薑酢芥醬食之又作羹飽食良

熏痔方用大雄雞宰去血在湯鍋內燂去毛取出雞將此燂毛垢湯燒之二沸傾在淨桶內蓋定俟少溫將陽物放桶上坐緊熏之候湯溫洗痔淨拭乾隨將蜈蚣一條碾末艾二錢和捻成條放馬桶內坐熏之其痔焦熟尤妙新生者一兩天得愈久生者五次得愈加蜈蚣并艾熏後隨服益氣清臟湯秦芫蒼水湯調治之

洗痔方馬蘭頭一斤皮硝四兩煎滾坐熏候湯溫洗之

又方牛膝搗爛煎洗之

又方水紅花子打碎煎湯洗之

又方魚腥草煎湯洗之

又方白地菰煎湯洗之

下部生瘡已決洞者牡丹末湯服方寸匕日三服

鯨魚同米粉煮羹食調中收痔

治男女脫肛用五倍子刺芥小便濃煎洗之

治腸風并脫肛及有血用蛇牀子不拘多少炒為末貼大腸脫垂處立收甚妙

治諸般痔脫肛以死蛇一條如指大濕者用掘地坑燒之將有孔板蓋坑上坐熏烟絕為愈

大腸脫肛權皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末傅之

腸頭出用皂角煎水用蠅蚶一箇入蜜浸去蠅蚶將蜜調土硃傳上即入

治穀道赤痛熬杏仁杵作膏傅之良愈

患五種痔水研山豆根服

治痔瘡用半新馬桶一箇入新磚一箇放桶底上再用新磚一箇燒紅於磚上用全蠟兩三枚燒烟患人坐桶上熏之三次即愈

穿腸痔漏極痛魚鱗搗如泥貼之其痛即止

痔瘡便血用活鯽魚一箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去用椶皮二兩洗淨寸截先將椶一兩鋪在瓦

罐內次安魚上面却將椶一兩蓋之罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐大小開一地坑先安小磚一片後坐

罐子四面用炭火七斤燒煨候烟絕取罐於淨地以瓦盆合定淨土壅勿令透氣經一宿出火毒取藥細

研每服一錢食前用米飲調下忌動風之物

治痔瘡痛不可忍者木綿花煎湯旋入研硝乘熱熏

之候溫浸之單用硝水極妙

又方用槐花艾葉荊芥枳殼水煎入白礬末打勻熏

洗

腸風痔漏有蟲如絲黑頭取去除根羅麥半升牙皂

角一寸共為末入猪腰子一雙內米泔煮空心食之

少頃肚痛上攻蟲皆隨出作地坑埋之薄粥補之

治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末水服方

寸匕或丸桐子大服之立效

洗痔方輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯熏待溫

洗痔方輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯熏待溫

却用手洗拭乾重者加大青葉梗乾者一半同煎痔瘡用灰其葉根濃煎湯先熏後洗

又方取河水頻洗用蝸牛塗之

一方治痔用雄雞膽片臍和勻貼之

肛門邊腫硬痛瘡用白礬三分碎研用熱童便二盞化開洗痔上一日三次洗之

治痔痛不可忍以枸杞根杵爛煎湯熏洗痛立止

肉痔腫痛朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用猪膽汁

同研如泥每日旋丸棗大納入肛門過一夜隨大便

去之內服烏梅黃連二味丸藥

痔瘡腫痛孩兒茶磨香為末唾津調傅

脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片臍一分為末人

乳搽肛門上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡

漏瘡腫痛猪膽七箇綿蘸脂十箇清水和勻搽七次

即可

吐血痔血向東葉荷根一把搗汁三升服之

藏毒下血黃連為末獨頭蒜煨研和九梧子大每空

心陳米飲下四十九

酒痔下血黃連酒浸炙熟為末酒糊丸梧子大每服

三四十九白湯下一方用自然蘇汁焙炒

腦毒赤白地錦草洗暴為末米飲服一錢立止

地柏主腦毒下血與黃芪等分為末米飲每服二錢

蜀人甚神此方

鍼灸

靈樞曰熱病頭痛顫顫目瘳脈痛善衄厥熱病也取

之以第三鍼視有餘不足寒熱痔

甲乙經曰痔痛攢竹主之

痔會陰主之凡痔與陰相通者死陰中諸病前後相

引痛不得大小便皆主之

痔皆蝕商丘主之

痔纂痛飛揚委中及承扶主之

痔纂痛承筋主之

脫肛下利氣衝主之

千金方曰飛揚主痔纂傷痛

絕骨主瘻馬刀瘻腫

天突章門天池支溝主漏

商丘復溜主痔血泄後重

勞宮主熱痔

承筋承扶委中陽谷主痔痛腫下腫

久冷五痔灸脊中百壯

五痔便血失尿灸回氣百壯穴在脊翳骨上

病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨百壯又灸龜尾七壯龜尾即

後窮骨是也

瘡瘍全書曰腦毒初起微腫即用濕蚯蚓糞捻成餅

如錢厚放患上艾壯如半粒豆大者燒之微熱即去

再換餅燒之再易如前法以十四壯為期外用冰香

散搽之

虛人脫肛夫冬至前天道嚴寒其氣極沉極降之際

况人身小天地天在上人居中地居下豈不相應乎

治之不能即奏功也隔生後日長一線陽漸長陰漸消矣宜用灸法治之無不效者病人亦要戒氣少勞爲上策擇晴明和暖吉日在不通風淨暖室中坐臥取頂上旋毛中百會穴以膏一七捺上艾灸三壯隨服升元大補湯其肛漸收矣蓋百會爲一身之樞紐大能升提下陷之氣故能奏功若冬至前不可灸灸之何益次日再灸尾骶骨又灸臍中隨年壯此法亦用之其效諸痔漏亦治之

丹溪心法曰凡痔瘡先取頭垢捏成餅子安痔頭上其上又安大蒜一片以艾灸之

又痔痛以附子末津唾和作餅子如錢大安漏上以艾灸令微熱乾則易以新餅再灸明日又灸直至肉平爲效

醫學綱目曰脫肛取大腸俞百會長強肩井合谷氣衝

針灸痔瘡取足太陽經云足太陽之脈所生病者痔瘡視盛虛熱寒陷下取之蓋後世取承山穴者是也其二輪督脈而不見其取法程云督脈生病瘰癧痔瘡後世取長強穴是也

痔漏下血裏急後重或痒或疼二白在掌後橫紋上四寸手厥陰脈兩穴相並一穴在兩筋中一穴在大筋外針入三分瀉兩吸

又法取長強一十大痛方到穴瀉三吸如灸可七壯雖久不愈者亦效

又法取承山二寸半補一呼如灸可七壯古今醫統曰命門一穴脊在中與臍相對灸七壯治五種痔病

又法長強一穴在尾骶上隨年壯灸之治五痔便血最效

又法治痔疾大如黃瓜貫於腸頭發則便仆以荆芥湯洗之次以艾灸其上三五壯若覺一道熱氣入腸中大瀉鮮紅血凝一時許痛後其疾乃愈

又法治痔初起痛痒不止以舊布鞋底烘烘頻熨之痛痒處冷則再烘熨其痛痒立止

脫肛灸長強穴三壯愈臍中隨年壯百會一穴在頂中灸三壯治小兒脫肛

導引

古今醫統曰痔漏乃氣血下墜衝突爲痔既不能坐又不能行立惟導引之法可愈矣其法高枕偃臥息心調氣氣定其腫自收

又法兩手抱足頭不動足向口受氣衆節氣散來去三七欲得捉左右側身各急挽腰不動去四肢腰上下氣血凝滯髓內冷血冷筋急痔漏腫痛

又法兩足相踏向陰踞急蹙將兩手捧膝頭兩向急勢捧之二十七竟身側兩向取勢二十七前後勢腰七去心勞痔病

又法踞坐合兩膝張兩足不息兩通治五痔

又法一足踏地一足屈膝兩手抱懷鼻下急挽向身極勢左右換易四七去痔五勞三里氣不下

保生秘要曰痔瘡導引法於尾閭骶骨間長強穴上招六十四度擦亦如數兼用吸提呵法自爾安樂

運動坐定息均注念存脊吸提咽濁九口再凝良背法運尾閭運癢百偏復升腰俞運二十七數逐日行功不問自去患根

痔漏導引法依患處念推而散之復兩手抱兩膝吹而吸之

又法吹而散之各六偏旋轉其皮膚患處想火燒之次升湧泉水入肺經推而散之

良背法靜坐片時將萬慮掃除凝神定志於本穴之中背之腔子裏平心元虛處初從口念太乙收苦而漸歸於心歸於背存無守有念茲在茲有復冥於無神自虛而靈矣

醫案

痔瘡全書曰一人患痔每日食海螺蛸半升因鹹以苦茶漱口納及一斗又能清心寡慾痔即消矣痔乃臟火屬陽海螺蛸乃性寒味鹹屬陰寒能敵火鹹能軟堅茶又苦涼之味殆有理也

儒門事親曰趙君王常病痔服眼草刺蟬皮槐根狸首之類皆用之以或以乾薑作末塗指肉炙食之大便燥結不利且腫後數日因病黃予治今大瀉瀉數次不言痔作麻先生偶記而書之君王自識載人之後痔更不發耳

丹溪心法曰許孺人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或紫血大便疼與黑神散又多食肉大飽此濕熱在大腸所爲以柳杏仁麻仁槐角各七錢枳實皂角仁各五錢蒼朮歸尾生地各三錢大黃炒一錢分六貼內三樣仁另研煎服而愈

醫學綱目曰一女子脫肛以糯米濃煎汁洗肛將痔燒紅沃酢青布鋪其上令溫和坐布上肛自吸入唐岐州王文顯充西路安撫司判官乘驛入駱谷有

痔疾因此大作其狀如胡瓜貫腸頭熱如湯灰火至驛僮仆主驛吏云此病予曾思來須灸即瘥用柳枝濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳去

薛氏醫案曰一人不慎酒色患痔瘡腫肛門墜痛下血便燥脈洪大而滑以當歸補李仁湯加桃仁四劑少愈更以四物湯加紅花桃仁條芩槐花數劑而愈

一人素有痔勞役便脫肛腫痛出水氣下陷也用補中益氣湯加茯苓芍藥十餘劑中氣復而愈後復脫作痛誤服大黃九腹鳴惡食幾危余用前湯加炮薑芍藥漸愈後去薑加熟地五味三十餘劑而愈

一人脾胃素弱或因勞或入房肛門即下腫痛甚用補中益氣湯加麥冬五味兼六味丸而愈後因過飲下墜腫痛誤用降火消毒虛證蜂起余用前湯加炮薑木香一劑再用前湯并加減八味丸兩月而安

一男子患痔大便燥結焮痛作渴脈數按之則實以秦艽蒼朮湯二劑少愈更以四物湯加芩連槐花枳殼四劑而愈

一人患痔成漏每登廁則痛以秦艽防風湯加條芩枳殼四劑而愈以四物加升麻芩連利防不復作

一男子患痔漏每登廁則肛門下脫作痛良久方收以秦艽防風湯數劑少愈乃去大黃加黃芪川芎芍藥而痛止更以補中益氣湯二十餘劑後再不脫

一婦人患痔腫焮痛甚以四物湯加芩連紅花桃仁牡丹皮四劑少止又數劑而愈

黃連治之即愈後因大勞痔瘡痛經水不止脈洪大按之無力此勞傷血氣火動而然也用八珍湯加芩連蒲黃二劑而止後去蒲黃芩連加地骨皮數劑而安丹溪云婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脈血氣俱虛故也二脈為經之海血氣之行外循經絡內營臟腑若氣血調適經下依時若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜大補氣血之藥調養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自正矣

一男子有痔漏每登廁肛脫良久方上診其脈細而微用補中益氣湯三十餘劑遂不再作丹溪云脫肛屬氣熱氣虛血熱血虛

一男子痔漏口乾發熱喜膿不消稀脈來遲緩以豆豉餅灸及服八珍湯加麥門冬五味子枳柴胡地骨皮三月餘而愈後因不慎房勞復潰膿清脈大請辭不治果及河間云因病致虛則為輕蓋病勢尚淺元氣未虛也至病初愈而勞復或飲食勞倦或房勞七情六慾陽痿陰弱加致羸損此因虛致損則為重病勢已過元氣已索故也

一男子痔瘡腫痛便血尤甚脈洪且瀉經云因而飽食筋脈橫解腸胃為痔蓋風氣過於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精而成斯疾遂與黃連當歸黃芪生地黃防風枳殼白芷柴胡槐花地榆甘草治之漸愈次以黃連丸而瘥又養生便血數年百藥不應面

色痿黃眼花頭眩亦以黃連丸治之而平曹銓因飲法酒肛門腫痛便閉脈實服利防敗毒散不應予用黃連內疏湯而愈

一男子患痔脈浮鼓午後發熱作痛以八珍湯加黃芪柴胡地骨皮治之稍可彼欲速效用劫藥蝕之痛甚絕食而歿夫瘡之潰斂氣血使然也脈浮鼓日痛此氣血虛也丹溪云瘡口不合用大劑參芪米歸芎補之外以附子餅灸之更以補藥作膏貼之

一男子年踰四十有痔漏大便不實服五苓散愈加泄瀉飲食少思予謂非濕毒乃腸胃虛也當以理中湯治之彼不為然仍服五苓散愈甚復請予乃以理中湯及二神丸月餘而平

李達因痔瘡怯弱以補中益氣湯少加芩連枳殼治之稍愈後因怒加甚時仲冬脈得洪大予謂脈不應時此乃腎水不足火來乘之藥不能治果發於火旺之月常見患痔者腎脈不足俱難治

劉商有痔肛門脫出此濕熱下注真氣不能升舉診其脈果虛遂以四君子湯加黃芪芍藥蒼朮黃蘗升麻柴胡服之更以五倍子煎湯薰洗彼以為錢乃用砒霜等毒藥蝕之而歿夫劫藥特治其末且能代真元鮮不害人慎之慎之

徐生因痔氣血虛飲食不甘小便不禁夜或遺精此氣虛兼濕熱而然非瘡故也以補中益氣湯加山茱萸山藥五味子兼還少丹治之而愈

一男子患痔漏膿出大便諸藥不應診其脈頗實令用猪腰子一箇切開入黑牽牛末五分線紮以荷葉包煨熟空心細嚼溫鹽酒送下數服頓退更以托裏藥而愈

一男子患痔漏口乾胃脈弱此氣不足津液短少不能上潤而然以黃芪六一湯七味白朮散治之或

曰諸痛瘡皆屬心火逆服苦寒之藥大便不禁而殞夫諸痛瘡皆屬心火言其常也始熱熱寒則反常矣可泥此而不察乎

一男子腎癰腐潰肌肉不生用藥數之四治反硬乎診之脈滑而弱此氣血虛不能榮於患處故敷涼藥反硬乃氣血受寒凝結而非毒也用大補藥而愈

一男子腎癰腫硬作痛尺脈浮緊按之無力以內托羌活湯一劑痛止以金銀花散四劑腫潰而愈

一男子腎癰腫硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命飲二劑痛止腫消以托裏消毒散加黃蘗蒼朮羌活拈頭腫潰而愈

一男子腎癰作腫而痛以仙方活命飲二劑痛止更以托裏消毒散腫潰而愈

一男子腎癰不作腫飲食少思先用六君子湯加荷歸黃芪飲食漸進更以托裏消毒散腫潰而愈

一男子遺而膿清不斂以豆豉餅灸之更飲十全大補湯兩月餘而痊凡瘡不作膿或不潰或潰而不斂皆氣血之虛也若膿清稀尤其虛甚也

一男子腎癰膿水不止肌肉漸瘦飲食少思胃脈微弦以六君子湯加蒼朮當歸數劑飲食遂進以十全大補湯及豆豉餅灸之兩月餘而斂

一弱人腎癰膿成不潰以十全大補湯數劑始托起乃針之又二十餘劑而愈夫腎居僻位氣血罕到老弱人患之尤宜補其氣血庶可保全

一男子腎癰膿色不變脈滑數而無力此腎癰也膿將成尚在內予欲治以托裏藥待發出而用針彼欲內消服攻伐藥愈虛復求治仍投前藥托出針之以

大補藥而愈凡瘡毒氣已結不起者但可補其血氣使膿速成而針去不可論內消之法膿成又當辨其生熟淺深而針之若大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也按之即復起者有膿也按之不復起者無膿也若腫高而突者發於血脈腫下而堅者發於筋骨肉色不相變者發於骨髓也

巡撫陳和峯脾胃不健服消導之劑左腿股及腎患腫此脾氣虛而下注非瘡毒也當用補中益氣倍加白朮彼惑於衆論云白朮能潰膿乃專以散腫消毒為主而腫益甚體益倦余用白朮一味煎飲而消

傷者楊啓元左腎患癰數貼涼藥腫微內股服連翹消毒散左腿皆痛余以為足三陰虛損用補中益氣湯以補脾肺用六味丸加五味子以補肝腎股內消而腎間潰又用十全大補湯而瘡口斂

一儒者腎癰腫痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦腫痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未復也與補中益氣湯頓用葱熨法兩月而愈

一男子腎癰漫腫而色不變脈滑數而無力膿將成矣余用托裏而欲針彼畏針而欲內消誤用攻伐之劑頓加惡寒發熱自汗等證余用十全大補湯數劑腫起色赤仍外針內補而愈

吳輔之父患腎癰內潰腫脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君子湯加荷歸參芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈

一人年三十歲如屋漏雀啄腎癰腫硬色天膿水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損而藥復傷也

余用六君子加歸芪附于一錢二劑腫潰色赤又減附子五分數劑元氣復而瘡愈

一男子腎癰腫痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散四十餘劑而斂

平湖袁上舍患痔外敷寒涼內服消毒攻潰於腎臟水清稀脈洪大而數寒熱作渴余解不治後果殞此足三陰虧損之證失滋化源以致真氣益虛邪氣愈甚矣不死何候

進士周希輔素有疝痔勞則小腹作痛莖出白津痔亦腫痛若飲食勞倦起居失宜則發寒內熱肢體疲倦服十全大補湯諸證並退彼欲去病根乃用攻病生肌之藥肌體骨立余用益氣湯地黃丸元氣漸復但自強調攝不能全愈

寓意草曰舊鄰治父母張受先先生久患穿腸痔漏氣血大為所耗有薦以吾鄉黃生善數割者先生神其術一切內治之藥並取決焉不肯昌雅重先生文章道德之身甘居流海時會令門人往候脈息私商善後之策大意謂先生久困漏厄一旦平成精氣內榮自可百年無患然新造之區尚未堅固則有浸淫之虞臟氣久虛腸胃易泄則有轉注之虞清氣久陷既服甘溫升舉矣然漏下已多陰血暗耗恐毗於陽水穀易混既用養臟厚腸矣然潤滑過多脾氣易瀉恐毗於陰且漏孔原通精孔精稍溢出勢必旁溢則奈精當如象虎厚味最足滋脾味精不節勢必走泄則生陰無取傷陰蓋人身脾氣每喜燥而惡濕先生漏孔已先敗漏下行者無路可出必轉滲於脾濕固

倍之是宜補脾之陽勿傷脾之陰以復健運之常而收和平之益云云及至要中應召往診指下輕取鼓動有力重按若覺微細是陽未見不足陰則大傷矣先生每進補陰之藥則夜臥甚寧腸辟亦稀以致癆醫妄引槐角地榆治腸風下血之法治之亦不覺其悞其實漏病乃精氣之病蓋精氣之時氣留則精止氣動則精泄大凡強力入房者氣每衝激而出故精隨之橫決四射不盡盡孔道而注多溢於精管之外久久漸成漏管今漏管雖去而肉中之空隙則存填竅補陰非此等藥力所能勝也不肖姑不言其非但於藥方中去槐角地榆等而加鹿角霜一味所謂惟藥最能潤下不有以砥之則腸中之水更凝聚可虞耶然此特微露一斑耳癆醫不解已沮為不可用因思吾邪一治漏者潰管生肌外更有二神方先以九藥半斤服之令人陽道癢俟管中肉滿管外緻密後以九藥半斤服之令人陽道復與雖宜於少未必宜於老然用意亦大奇矣不肖提欲填補竅隙而黃生沮之豈未聞此人此法乎

外科正宗曰一男子患痔六年每遇酒色勞役痔則發腫堅硬痛苦十餘日方得稍可彼欲斷其根以枯痔散上至七日外其痔漸黑外有裂縫至十六日痔枯脫落孔若雞心以生肌散逐日用之內服養血健脾藥而愈

一男子痔患瘰癧腫痛大便結燥脈數有力以內疏黃連湯二服便行痛止又以四物湯加芩連枳殼天花粉數劑而腫消更以歸連丸一料而不復發

一男子患痔凡遇勞苦發腫作痛以枳殼湯熏洗內服防風秦艽湯數服腫痛頓減令彼常洗前湯每月五六次內與六味地黃丸加黃蘗知母服之不發

一男子好飲多慾內痔虛墜下血以四物湯加芩連升麻葛根數服虛墜乃止又以當歸歸李仁湯二劑痔腫亦消更服歸連丸九月餘便血亦止又月餘兼節酒色不發

一男子患痔十餘年頭已穿潰未及通腸每發痛苦以三品一條槍插至七日痔變黑色痔邊漸裂縫至十五日脫落以鳳雛膏搽至半月口斂而平

一男子怯弱內痔便血面色萎黃自服涼血止血藥不應診之脾脈虛而無力此中氣不能統血以補中益氣湯十餘服精神頓倍便血亦少又以加味四君子湯兼前湯間服月餘不發大抵此證所致之由不同當究其因治之如元氣有餘形黑氣盛先養而後紫血更兼脈實有力者此屬有餘法當涼血止血藥應自效至若形體瘦弱面色萎黃先鮮血而後養更兼脈虛無力者此屬不足豈可反用涼藥止之致傷脾胃此證若不溫中健脾升舉中氣其血不得歸原故藥難效傷其根本也

一男子患痔癰四五日生疼痛至晚作寒六脈浮而帶數以人參敗毒散二劑寒熱頓退疼痛稍止彼值公務相關欲出乃用針點入患頂五六分流去紫血用蠟酥條插入膏蓋以活血散瘀湯二服次日流出紫血隨便可行更服托裏藥五六服而安

一男子患痔癰六七日瘰癧發熱口乾便燥以托裏消毒散加花粉大黃二服便通渴止仍用前湯加黃

針山甲數服而膿潰又以十全大補湯半月而斂

一男子患痔癰堅硬不潰此先寒涼之過也以十全大補湯加皂針蒼朮丹皮四劑堅硬漸軟又以透膜散二服膿熱針之以前湯倍參芪歸朮月餘而斂

一男子暑月患痔癰自為內毒外用老鴉草搗爛敷之每日續飲涼水十餘碗如此三日痔毒內陷患上平塌冰冷口噤不言六脈沉細如絲靜不可治至夜而死

一人冬月患痔癰外用四黃散涼水調傳內服敗毒涼藥毒亦內陷煩躁口乾鼻掀氣急患上平塌原頭存一空孔無水無膿予曰痔毒已陷定不可治復請別醫俱曰無事予曰痔居小腹之後肌肉頑厚毒既到此必須內托為膿潰後最易收斂今已內外寒涼毒既內入豈能再出衆醫強投內消解毒定躁除煩之藥終至不應半月而死

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第二百三十一卷目錄

醫部全錄二百十一

皮門

黃帝素問全書 卷之六 六節 經脈論 五節 經脈論

大論 至要 大論 四節 經脈論 五節 經脈論

靈樞經 卷之五 五節 經脈論 六節 經脈論

難經 卷之九 九節 經脈論 十節 經脈論

扁鵲難經 卷之八 八節 經脈論 九節 經脈論

張機金匱要略 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

王叔和脈訣 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

孫思邈千金方 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

朱肱活人書 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

劉完素六書 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

辛果十書 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

朱震亨心法 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

虞搏醫學正傳 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

戴思恭證治要訣 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

樓英醫學綱目 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

龔信古今醫鑑 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

張三錫醫學準繩 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

徐春甫古今醫統 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

王肯堂證治準繩 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

陳士鐸石室秘錄 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

方氏醫法 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

吳氏醫法 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

黃帝素問全書 卷之六 六節 經脈論 五節 經脈論

大論 至要 大論 四節 經脈論 五節 經脈論

靈樞經 卷之五 五節 經脈論 六節 經脈論

難經 卷之九 九節 經脈論 十節 經脈論

扁鵲難經 卷之八 八節 經脈論 九節 經脈論

張機金匱要略 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

王叔和脈訣 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

孫思邈千金方 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

朱肱活人書 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

劉完素六書 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

辛果十書 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

朱震亨心法 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

虞搏醫學正傳 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

戴思恭證治要訣 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

樓英醫學綱目 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

龔信古今醫鑑 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

張三錫醫學準繩 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

徐春甫古今醫統 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

王肯堂證治準繩 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

陳士鐸石室秘錄 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

方氏醫法 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

吳氏醫法 卷之六 六節 經脈論 七節 經脈論

毛拔 肺之合皮也其榮毛也其主心也多食苦則皮槁而

五臟生成篇 肺之合皮也其榮毛也其主心也多食苦則皮槁而

毛拔 肺之合皮也其榮毛也其主心也多食苦則皮槁而

肺主氣氣主表故合於皮傷寒論曰寸口脈緩而遲緩則肺氣長其聲商毛髮長毛附於皮氣長則毛榮多食苦是火味太過而傷肺則皮槁而毛落矣

診要經終論 太陰終者腹脹閉不得息善噦善嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

足太陰脈入腹屬脾故為腹脹手太陰脈上膈屬肺而主呼吸故為不得息腹滿則升降難不得息則氣道滯故為噦為嘔嘔則氣逆於上故為面赤不逆則否塞於中故為上下不通脾氣敗則無以制水故黑色見於面肺氣敗則治節不行故皮毛焦

經脈別論 脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛

脈氣者水穀之精氣而行於經脈中也言人胃之穀氣先淫氣於脈百脈之經氣總歸於大經經氣歸於肺是以百脈之氣皆朝會於肺也肺合皮毛故復輪精於皮毛

痹論 黃帝問曰痹之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痹也以秋遇此者為皮痹故骨痹不已復感於邪內舍於腎筋痹不已復感於邪內舍於肝脈痹不已復感於邪內舍於心肌痹不已復感於邪內舍於脾皮痹不已復感於邪內舍於肺所謂痹者各以其時重感於風寒濕之氣也

痹者閉也邪閉而為痛也言風寒濕三氣錯雜

而至相合而為癰蓋皮肉筋骨內合於五臟五臟之氣外合於四時始病在外之有形復傷在內之五氣外內形氣相合而邪舍於內矣

帝曰辨其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已

夫風寒濕氣中其食其氣實則邪不動藏若神氣消亡則癰聚在藏而死其留連筋骨間而不內舍於其合者疼久其留皮膚間者隨氣而易散若中其食則內通五臟之陰氣不藏則邪直入於臟而為不治之死證矣

帝曰善癰或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行滯經絡時疎故不通皮膚不營故為不仁

不仁不知痛癢也寒氣勝者為痛癢故痛者寒氣多也病久入深者久而不去將內舍於其合也邪病久則榮衛之道傷而行滯邪入深則不癰開於形身而經絡時疎故不痛也榮衛行滯則不能營養於皮膚故為不仁

帝曰夫癰之為病不痛何也岐伯曰癰在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也

骨有骨氣脈有脈氣筋有筋氣肌有肌氣皮有皮氣皆五臟之氣而外合於形身如病形而不傷其氣則止見骨癰之身重脈癰之血凝不行筋癰之屈而不伸肉癰之肌肉不仁皮癰之皮毛寒冷

故具此五者之形證而不痛也

皮部論

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡皆有度量其所主病各異別其分部左右上下陰陽所在病之終始願聞其道岐伯曰對曰欲知皮部以經脈為紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則癰黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經經陽主外陰主內少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰獨樞上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關關上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡十二經絡脈者皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於腑廩於腸胃邪之始入於皮也汙然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉焦髓破毛直而敗帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脈之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈

絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於臟腑也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善

此章論十二經之絡脈分絡於皮膚之間病之始生必先於皮毛入客於絡脈隨皮部所循之脈而傳入於經入舍於所主之臟腑如不入於絡則留於筋骨之間而為筋攣骨痛也

四時刺逆從論

少陰有餘病皮癢癢疹不足病肺癢癢則病肺風癢癢則病積浸血

肺主皮毛毛脈合精於皮膚之間是以少陰之為皮癢肺癢也癢則病在氣也浸血則病在血也秋氣在皮膚秋者天氣始收腠理閉寒皮膚引急

五常政大論

太陽司天寒氣下臨心氣上從而火且明土運潤水豐衍寒客至沉陰化濕氣變物水飲內積中滿不食皮膚肉苛筋脈不利甚則附腫身後癢

太陽司天則大陰濕土在泉故土乃潤積積滯癰癰也水飲中滿皮膚肉苛皆水濕之為病也身後癢者癰發於背也

至真要大論

歲少陰在泉熱淫所勝則焰浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立寒熱皮膚痛目瞤齒痛頸腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大熱蟲不藏此少陰在泉卯酉歲也少陰君火生於水中故焰浮川澤少陰陰陰而本火故陰處反明腹中常鳴者火氣奔動也氣上衝胃者火氣炎上也喘不能久立寒熱皮膚痛者火淫肺金也目瞤者熱甚陰

虛畏陽光也前痛顯腫熱乘陽明也發熱如瘧者少陰標本之氣病也熱在下焦則少腹中痛熱在中焦則腹大也

少陰司天熱淫所勝佛熱至火行其政民病竹中煩熱盛乾右肱滿皮膚痛寒熱欬喘

少陰司天子午歲也蓋少陰之火發於陰中故為佛熱少陰太陽陰中有陽陽中有陰陰陽相從標本互換是以火熱甚而大雨至水寒極而運火炎民病竹中煩熱盛乾右肱滿皮膚痛肺受火熱而津液不生也

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而為水身面附腫腹滿仰息泄注赤白痢瘡欬唾血煩心胃中熱甚則飢餓病本於肺天府絕死不治

少陽司天寅申歲也火淫所勝故金政不平少陽之火在天為暑故民病頭痛寒熱瘧熱上皮膚色變黃赤火上淫於肺也肺者太陰皆積水也傳為水者通其金木外溢故為腫滿之水病也仰息肺氣逆而不得偃息也泄注赤白瘡瘍唾血煩心火熱盛也飢餓甚而及於肺此火淫勝金故病本於肺天府附脈在腋下一寸動脈應手肺氣已絕故死不治

太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化痔瘡發寒厥入胃則內生心痛陰中乃癰隱曲不利互引陰股筋拘拘苛血脈凝泣絡滿色變或為血泄皮膚腐腫腹滿食減

太陽寒水氣勝故凝凜且至非時水冰者勝氣

在於歲半以前是以羽蟲後化也靈樞經曰足太陽是主筋所生病者為痔瘡者太陽寒熱之邪也厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛也陰中乃癰是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋故筋拘拘苛也血脈凝泣絡滿色變或為血泄邪入於經也皮膚腐腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水氣乘脾也

少陰之復燥熱內作煩躁飢餓少腹絞痛火見燔炳陰燥分注時止氣動於左上行於右欬皮膚痛暴瘡心痛胃胃不知人乃消漸惡寒振慄諸妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痿隔腸不便外為浮腫噦噫

軌噫噦噫上乘於肺也少腹絞痛少陰之陰氣發於下也火見燔炳君火之氣發於上也陰燥火燔金也夫陰寒在腹則注泄得火氣則注止少陰標本並發故時注時止也氣動於左者君火之氣發於左腎之水中上行於右者肺腎上下相交腎為水而肺為末也火淫肺金則欬而皮膚痛金主聲故暴瘡也心痛者火氣自傷也鬱胃不知人者寒熱之氣亂於上也消漸振慄者陰陽相搏也寒已而熱者少陰之陰寒從火化而為熱也是以渴而欲飲少氣骨痿蓋火盛則少氣熱盛則骨痿也噦者小腸之氣不通逆氣上走心而為噦也

疏五過論

始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿癱為變

始富後貧則傷其志意志意者所以御精神收魂魄適寒溫而喜怒者也故余衛調志意和則筋骨健強腠理緻密故傷其志意則精神不能內

守外為皮焦筋骨癱瘓之病

壽夭剛柔篇

形與氣相任則壽不相任則夭皮與肉相果則壽不相果則夭血氣經絡勝形則壽不勝形則夭

形謂皮肉筋骨人之形氣天命所生皮膚緩者天道之元亨也是以緩則壽而急則夭

本神篇

肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛瘁也天死於夏

喜樂心之情也如肺因喜樂無極則傷肺臟之魄魄傷則狂狂者意不存意者心之發蓋喜樂無極則神亦憊散而不存矣肺主皮毛故人皮革焦

決氣篇

上焦開發宣五穀味膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣穀入氣滿淖澤注於骨骨屬伸洩澤補益腦髓皮膚潤澤是謂液

上焦氣宣發五穀之精微充膚熱肉潤澤皮毛若霧露之溉是謂氣穀入氣滿淖澤注於骨使骨

若霧露之溉是謂氣穀入氣滿淖澤注於骨使骨屬屈伸洩澤從隨空而補益腦髓皮膚潤澤是謂液

脹論

三焦脹者氣滿於皮膚中輕然而不堅

五變篇

黃帝曰人之善病消瘠者何以候之少俞答曰五臟皆柔弱善病消瘠此人皮膚薄而目堅固以深者長衡直揚其心剛剛則多怒怒則氣上逆逆中蓄積