

中国农业科学院油料作物研究所主編

中国大豆品种资源目录

农业出版社



中国大豆品种资源目录

中国农业科学院油料作物研究所主编

农 业 出 版 社

中国大豆品种资源目录

中国农业科学院油料作物研究所主编

农业出版社出版 (北京朝内大街130号)

新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 36 印张 800 千字

1982 年 2 月第 1 版 1982 年 2 月北京第 1 次印刷

印数 1—3,000 册

统一书号 16144·2364 定价 4.40 元

(内部发行)

主 编 中国农业科学院油料作物研究所

编写单位 黑龙江省农业科学院大豆研究所

辽宁省铁岭地区农业科学研究所

内蒙古自治区农业科学研究所

北京市农业科学院

新疆农业科学院经济作物研究所

山西省农业科学院

河南省农业科学院经济作物研究所

江苏省农业科学院

江苏省淮阴地区农业科学研究所

安徽省农业科学院作物研究所

四川省万县地区农业科学研究所

浙江农业大学

福建省晋江地区农业科学研究所

江西省上饶地区农业科学研究所

贵州省安顺地区农业科学研究所

吉林省农业科学院大豆研究所

辽宁省丹东市农业科学研究所

中国农业科学院作物育种栽培研究所

宁夏农林科学院农作物研究所

河北省农林科学院

山东省农业科学院作物研究所

陕西省农林科学院粮食作物研究所

江苏省徐州地区农业科学研究所

江苏省镇江地区农业科学研究所

安徽省阜阳地区农业科学研究所

浙江省农业科学院作物研究所

浙江省嵊县农业科学研究所

福建省三明地区农业科学研究所

湖南省农业科学院作物研究所

广西壮族自治区农业科学院

编 写 者 翁秀英 李秀兰 张子金 葛佩清 赫冲 张玉成 王凤琴 肖沙沙 王洁
郝耕 刘育灿 王浩明 胡启林 马傅秀 李莹 李之琛 蒋惠兰 薛应离
崔润芝 戴勇民 费家骅 忻世琴 冯其虎 范海若 戴瓯和 丁淑侠 古
兰村 竺庆如 董明远 史文桢 陈映雪 石昭月 陈秀明 汪国瑾 周教
廉 傅子礼 王倩仪 王国勋 罗兴华 潘正纪 邓祥惠 徐巧珍 吴学军

全书由王国勋同志负责汇编成册。

前言

大豆原产我国，种植历史悠久。早在距今3000—3700年前殷商时期的甲骨文中就有“𧀇”字，据考证是“菽”的原体。在记述西周至春秋时代（公元前1027—481年）情景的《诗经》中最早出现“中原有菽庶民采之”、“七月亨葵及菽”等有关大豆的文字记载。公元前1—3世纪的《吕氏春秋》、《史记》、《汜胜之书》等以及之后的《四民月令》、《王祯农书》、《本草纲目》……等屡有大豆的记述。1953年在河南省洛阳烧沟汉墓（距今2000多年前）出土的陶仓上，有用朱砂写的“大豆万石”字样。而1975年在湖北省江陵县凤凰山一六八号汉墓中（公元前167年，距今2100余年前）发现有浸泡膨胀的大豆种粒以及在山西省侯马出土的2300年前的大豆粒等实物。历史上大量的文字记述、出土文物和种粒实物以及野生大豆及其向典型栽培大豆过渡的中间类型遍布我国各地，均是大豆原产我国和有长时期栽培历史的佐证。

我们祖先在长期的农业生产活动中，创造了丰富多采各具特点的大豆品种类型。它们广泛适应于祖国各地，满足不同耕作制度的要求，保证人民物质生活、医药卫生和国民经济建设等多种用途。长期以来，就做为育种工作的基础，以之选育创造出不少优异的大豆品种，而驰名中外。在近一个世纪以来，我国大豆品种资源广为世界各国所注意和利用。

品种资源工作是一项十分重要的工作，是选育创造优良品种不可缺少的物质基础。做好品种资源工作，可以鉴定出许多好品种直接为生产利用，并为创造新品种提供亲本材料，为制定育种目标和开展大豆品种生态研究提供科学依据。

解放初期在主要产区对大豆地方品种的调查、整理、评选、利用方面做了不少工作，以后又进行了包括大豆在内的农作物品种资源征集工作，共征得大豆地方品种材料一万五千余份。在1958、1961、1974年召开的全国农作物品种资源会议上，均研究并安排了有关品种资源整理、保存、研究利用工作。因之，不论在地方品种的整理利用，大豆品种生态研究和充分利用品种资源成果不断地培育新品种等方面，都做出了一定成绩，对促进我国大豆生产起了重要作用。

1974年原农林部转发《加强农作物品种资源工作的意见》文件，要求“认真清理现有品种资源，建立品种档案，编写出农作物品种资源目录和品种志”。据此，中国农业科学院油料研究所在1975年6月召开《中国大豆品种资源目录》编目工作会议，拟定编目方案和安排有关事宜。1976年3月在全国大豆科技会议上，对目录初稿进行初审。1977年3月又专门研究了大豆品种志的有关工作，对个别项目进行修改。至此，编就包括我国23省、市、区在内的6814份材料的《中国大豆品种资源目录》。

参加编制人员，克服资料不全、材料丢失等困难，认真核对资料，有的又进行重新收集、整理，较好地完成本项任务。

凡本书漏编和未编入的省、市、区材料，均将在今后续编。由于水平所限，目录难免有错误，不当之处，请提出宝贵意见。

中国农业科学院油料作物研究所

1980年10月

中国大豆品种资源目录编写说明

本书为了反映大豆品种资源材料的主要特点、利用价值和适应我国农业生产、科研发展的需要,力求文字简明,便于利用,规定了有二十个内容的品种资源目录表。兹将《中国大豆品种资源目录》的编制范围、内容、标准、填写排列次序等有关问题说明如下:

一、编目材料范围

- (一) 原产我国各地的栽培、半栽培以及部分野生大豆品种资源。
- (二) 我国各地选育的并在生产上推广利用的大豆新品种和在育种过程中创造的有价值新类型。
- (三) 对于有种子,但调查记载资料严重不全和有调查记载资料,但种子已遗失或丧失发芽能力的,均未编入。
- (四) 编入本目录的计有黑龙江(335份)、吉林(400份)、辽宁(762份)、内蒙古(19份)、北京(10份)、宁夏(18份)、新疆(34份)、河北(376份)、山西(615份)、山东(546份)、河南(476份)、陕西(126份)、江苏(1200份)、安徽(545份)、上海(30份)、湖北(429份)、四川(20份)、浙江(410份)、福建(98份)、江西(57份)、湖南(37份)、贵州(202份)、广西(69份)等23省、市、区6814份材料。

二、目录内容和标准

- (一) 总编号: 为全国统一编号,并均冠以“ZDD”做为全国总编号标志。
- (二) 品种名称: 指该品种材料的惯用名称,有别名的,在备注栏另行注明。安徽省皖北材料因已失名,故缺品种名称。
- (三) 原产地或来源: 地方品种填写原产省、县份(如湖北天门)。县名和属何省,除个别情况外,均按地图出版社1972年版《中华人民共和国行政区划简册》为准。另安徽省“皖北地区”系地理名词。选育品种注明育成单位和选育方法如混选(混合选种)系选(系统育种)、有性杂交、人工引变等。
- (四) 保存单位编号: 指各品种材料的实际保存单位及对该品种材料的编号。
- (五) 类型: 除河北省部分春大豆外,均系原产地的实际播种期类型,分春、夏、秋三种。
- (六) 生育月份: 反映各品种材料的生育期幅度范围,以月、旬表示。如5月上旬播种至9月下旬成熟,则表示为:“5/上—9/下”。
- (七) 生育日数: 春大豆以出苗的翌日算起,至成熟当天为止的日数。夏、秋大豆以播种的翌日算起,至成熟当天为止的日数。
- (八) 粒色: 分黄大豆——黄、淡黄、白黄、浓黄、暗黄。
青大豆——淡绿、绿、暗绿。
黑大豆——黑、乌黑。

褐大豆——茶、淡褐、褐、深褐、紫红。

双色大豆——虎斑、鞍挂。

(九) 子叶色：黄、绿。

(十) 百粒重：以克表示之。

(十一) 粒形：圆、扁圆、椭圆、扁椭（圆）、长椭（圆）、肾状。

(十二) 生育习性：直立、半直（立）、半蔓、蔓生。

(十三) 结荚习性：有（限）、亚（有限）、无（限）。

(十四) 茸毛色：棕、灰、无毛。

(十五) 花色：白、紫。

(十六) 植株高度：指主茎的长度，单位为厘米。

(十七) 叶形：披针、卵圆、椭圆、圆形。

(十八) 种子脂肪、蛋白质含量：均以干态种子测定。以百分率表示。

(十九) 备注：填写抗性、丰产性能等主要特性。

三、目录顺序

(一) 目录表按省、市、区为单位，依次排列。原则上从北向南，从东向西。如开始从黑龙江省起，依次为吉林、辽宁、内蒙古、北京、宁夏、新疆、河北、山西、山东、河南、……。

(二) 为了便于查找利用，对于不同播种期类型和不同粒色品种材料的排列次序，按如下规定进行：

1. 单一播种期类型地区：如黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、北京、宁夏、甘肃、新疆等省、市、区，按种皮黄、青、黑、褐、双色大豆次序排列。

2. 在有二或三个播种期类型，且每一播期类型中的各品种材料的光照类型反映差异不大的省、区，如河北、山西、陕西、山东以及长江流域以南各省、区，按春大豆、夏大豆、秋大豆次序填写。在各播种期类型中又依黄、青、黑、褐、双色大豆次序排列。

3. 江苏、安徽省先按淮北、淮南产区次序，再分春、夏、秋大豆类型。各类型再依黄、青、黑、褐、双色大豆次序编排。

目 录

中国大豆品种资源目录编写说明.....	1
目录索引.....	1
大豆品种资源目录表.....	2

目 录 索 引

总 编 号	所属省、市、区 (份数)	页 码	总 编 号	所属省、市、区 (份数)	页 码
ZDD0001—0335	黑 龙 江 省 (335)	2—28	ZDD3718—4917	江 苏 省 (1200)	308—408
ZDD0336—0735	吉 林 省 (400)	30—60	ZDD4918—5462	安 徽 省 (545)	408—452
ZDD0736—1497	辽 宁 省 (762)	60—124	ZDD5463—5492	上 海 市 (30)	452—456
ZDD1498—1516	内 蒙 古 自 治 区 (19)	124	ZDD5493—5921	湖 北 省 (429)	456—490
ZDD1517—1526	北 京 市 (10)	124—126	ZDD5922—5941	四 川 省 (20)	492
ZDD1527—1544	宁 夏 回 族 自 治 区 (18)	126—128	ZDD5942—6351	浙 江 省 (410)	492—526
ZDD1545—1578	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 (34)	128—130	ZDD6352—6449	福 建 省 (98)	526—534
ZDD1579—1954	河 北 省 (376)	130—162	ZDD6450—6506	江 西 省 (57)	536—540
ZDD1955—2569	山 西 省 (615)	162—212	ZDD6507—6543	湖 南 省 (37)	540—542
ZDD2570—3115	山 东 省 (546)	212—258	ZDD6544—6745	贵 州 省 (202)	542—560
ZDD3116—3591	河 南 省 (476)	258—298	ZDD6746—6814	广 西 壮 族 自 治 区 (69)	560—566
ZDD3592—3717	陕 西 省 (126)	298—308			

大豆品种资

总编号	品种名称	原产地或来源	保存单位 (编号)	类型	生育月份
ZDD 0001	新四粒黄	黑龙江省农科院系选育成	黑龙江省农科院 (黑第160)	春	5/上—9/下
0002	黑农1号	黑龙江省农科院、东北农学院 有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第901)	春	5/上—9/下
0003	黑农2号	黑龙江省农科院、东北农学院 有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第902)	春	5/上—9/下
0004	黑农3号	黑龙江省农科院、东北农学院 有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第903)	春	5/上—9/下
0005	黑农4号	黑龙江省农科院人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第904)	春	5/上—9/中
0006	黑农5号	黑龙江省农科院人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第905)	春	5/上—9/下
0007	黑农6号	黑龙江省农科院人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第906)	春	5/上—9/中
0008	黑农7号	黑龙江省农科院人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第907)	春	5/上—9/下
0009	黑农8号	黑龙江省农科院人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第908)	春	5/上—9/下
0010	黑农9号	黑龙江省农科院人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第909)	春	5/上—9/上
0011	黑农10号	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第910)	春	5/上—9/下
0012	黑农11	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第911)	春	5/上—9/下
0013	黑农16	黑龙江省农科院人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第916)	春	5/上—9/下
0014	黑农17	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第917)	春	5/上—9/下
0015	黑农18	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第918)	春	5/上—9/下
0016	黑农19	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第919)	春	5/上—9/下
0017	黑农21	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第21)	春	5/上—9/下
0018	黑农23	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第23)	春	5/上—9/下
0019	黑农24	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第24)	春	5/上—9/下
0020	黑农25	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第25)	春	5/上—9/下
0021	黑农26	黑龙江省农科院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第926)	春	5/上—9/下
0022	东农2号	东北农学院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第93)	春	5/上—9/下
0023	东农4号	东北农学院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第802)	春	5/上—9/下

源 目 录 表

生育 日数	粒 色	子 叶 色	百粒重 (克)	粒 形	生育 习性	结荚 习性	茸 毛 色	花 色	植株 高度 (厘米)	叶 形	脂肪 含量 (%)	蛋白质 含 量 (%)	备 注
128	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	椭圆	20.23	37.17	耐旱性较强
125	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	85.0	椭圆	20.20		
120	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	白	70.0	椭圆	19.35	38.07	
126	黄	黄	21.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	椭圆	21.04	35.89	
110	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	椭圆	22.05	35.97	
120	黄	黄	20.0	扁椭	半直	无	灰	白	90.0	椭圆	20.57	37.50	粒形近圆虫食粒率较低 有一定抗雹灾能力
110	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	椭圆	21.26	36.47	
125	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	100.0	椭圆	21.26	36.79	
110	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	椭圆	21.51	37.28	
105	黄	黄	20.0	扁椭	半直	无	灰	白	80.0	椭圆	22.14	36.65	
125	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	披针	22.44	39.60	早熟, 可为晚田播种用 耐肥、丰产 适于单作和间作
120	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	披针	21.51	37.31	
125	黄	黄	19.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	披针	22.25	35.57	
125	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	100.0	披针	21.58	35.50	
125	黄	黄	23.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	椭圆	20.18	38.92	
125	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	100.0	披针	21.06	36.28	分枝少, 叶片上举, 适于合理密植
125	黄	黄	21.0	椭圆	半直	无	灰	白	95.0	椭圆	22.12	36.41	
125	黄	黄	22.0	椭圆	半直	无	灰	白	95.0	椭圆	20.81	37.57	
120	黄	黄	22.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	椭圆	20.93	36.60	
120	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	披针	20.49	37.31	
126	黄	黄	19.0	椭圆	半直	无	灰	白	100.0	披针	21.60	40.83	
118	黄	黄	17.7	椭圆	半直	无	灰	白	77.4	椭圆	20.86	36.79	
120	黄	黄	20.0	扁椭	半直	无	灰	白	85.0	椭圆	20.80		

总编号	品种名称	原产地或来源	保存单位 (编号)	类型	生育月份
ZDD 0024	东农16	东北农学院有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第927)	春	5/上—9/下
0025	丰收1号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第294)	春	5/上—9/下
0026	丰收2号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第291)	春	5/上—9/上
0027	丰收3号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第586)	春	5/上—9/上
0028	丰收4号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第292)	春	5/上—9/中
0029	丰收5号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第807)	春	5/上—9/中
0030	丰收6号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第446)	春	5/上—9/中
0031	丰收7号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第930)	春	5/上—9/中
0032	丰收8号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第931)	春	5/上—9/中
0033	丰收9号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第932)	春	5/上—9/中
0034	丰收10号	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第933)	春	5/上—9/中
0035	丰收11	克山农科所人工引变育成	黑龙江省农科院 (黑第934)	春	5/上—8/下
0036	丰收12	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第935)	春	5/上—9/下
0037	丰收13	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第936)	春	5/上—9/下
0038	丰收14	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第937)	春	5/上—9/中
0039	丰收15	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第938)	春	5/上—9/中
0040	丰收16	克山农科所有性杂交育成	黑龙江省农科院 (黑第939)	春	5/上—9/下
0041	黑河1号	黑河地区农科所引种选出	黑河地区农科所 (黑第940)	春	5/上—9/中
0042	黑河3号	黑河地区农科所有性杂交育成	黑河地区农科所 (黑第941)	春	5/上—9/中
0043	黑河51	黑河地区农科所有性杂交育成	黑河地区农科所 (黑第942)	春	5/上—9/中
0044	黑河54	黑河地区农科所有性杂交育成	黑河地区农科所 (黑第943)	春	5/上—9/中
0045	黑龙江41	黑河地区农科所引种选出	黑河地区农科所 (黑第944)	春	5/上—9/中
0046	克北1号	克山农科所和北安良种场育成	黑龙江省农科院 (黑第808)	春	5/上—9/中
0047	合丰1号	合江地区农科所系选育成	合江地区农科所 (合豆50)	春	5/上—9/下

(续)

生育 日数	粒 色	子 叶 色	百粒重 (克)	粒 形	生育 习性	结荚 习性	茸 毛 色	花 色	植株 高度 (厘米)	叶 形	脂肪 含量 (%)	蛋白质 含 量 (%)	备 注
125	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	紫	90.0	椭圆	20.75	37.63	粒形近圆
120	浓黄	黄	24.9	椭圆	半直	无	灰	紫	81.2	卵圆	20.34	38.79	
120	黄	黄	19.5	椭圆	半直	无	灰	白	58.0	椭圆	20.58	39.34	
103	黄	黄	18.2	椭圆	半直	无	灰	紫	56.0	椭圆	20.06	40.97	
117	黄	黄	20.1	椭圆	半直	无	灰	白	93.4	椭圆	21.20	38.22	
115	黄	黄	20.4	椭圆	半直	无	灰	白	105.8	椭圆	19.73	39.66	
115	黄	黄	20.9	扁椭	半直	无	灰	白	81.6	椭圆	20.20	38.84	
120	黄	黄	19.9	圆	半直	无	灰	紫	98.0	椭圆	19.39	40.67	
125	黄	黄	19.0	圆	半直	无	灰	白	99.2	椭圆	20.78	38.60	
117	黄	黄	16.6	椭圆	半直	无	灰	紫	103.2	椭圆	21.63	38.22	粒形近圆
115	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	紫	85.6	披针	19.51	38.53	极早熟
90	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	白	50.4	披针	21.43	37.84	
122	黄	黄	22.0	椭圆	半直	无	灰	白	94.8	椭圆	20.02	39.12	
121	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	紫	96.6	椭圆	19.02	39.22	粒形近圆
115	黄	黄	16.7	椭圆	半直	无	灰	白	82.0	披针	19.40	39.20	粒形近圆
115	黄	黄	18.8	椭圆	半直	无	灰	白	82.4	椭圆	20.11	39.53	粒形近圆
120	黄	黄	22.1	椭圆	半直	无	灰	紫	96.0	椭圆	20.36	39.50	
110	黄	黄	22.0	圆	半直	无	棕	白	60.0	椭圆	22.60		
115	黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	紫	70.0	披针	20.43	37.72	
115	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	紫	70.0	椭圆	22.47	35.97	
110	白黄	黄	20.0	椭圆	直立	亚	灰	紫	60.0	椭圆	20.59	39.22	
115	暗黄	黄	16.0	椭圆	半直	无	棕	紫	70.0	卵圆	19.50		
117	淡黄	黄	19.8	圆	半直	无	灰	白	82.8	椭圆	20.80		
130	黄	黄	17.0	圆	半直	无	灰	白	70.0	卵圆	21.20		

总编号	品种名称	原产地或来源	保存单位 (编号)	类型	生育月份
ZDD0048	合丰5号	合江地区农科所系选育成	合江地区农科所 (合豆51)	春	5/上—9/下
0049	合丰6号	合江地区农科所系选育成	合江地区农科所 (合豆52)	春	5/上—10/上
0050	合交6号	合江地区农科所有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆53)	春	5/上—9/下
0051	合交8号	合江地区农科所有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆54)	春	5/上—9/下
0052	合交11	合江地区农科所有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆55)	春	5/上—9/中
0053	合交13	合江地区农科所有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆56)	春	5/上—9/中
0054	合丰14	合江地区农科所有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆57)	春	5/上—9/下
0055	合丰15	合江地区农科所无性杂交育成	合江地区农科所 (合豆58)	春	5/上—9/下
0056	合丰16	合江地区农科所无性杂交育成	合江地区农科所 (合豆59)	春	5/上—9/下
0057	合丰17	合江地区农科所有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆60)	春	5/上—9/下
0058	合丰22	合江地区农科所有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆61)	春	5/上—9/下
0059	牡丰1号	牡丹江地区农科所系选育成	牡丹江地区农科所 (牡110)	春	5/上—9/下
0060	牡丰2号	牡丹江地区农科所系选育成	牡丹江地区农科所 (牡021)	春	5/上—9/中
0061	牡丰3号	牡丹江地区农科所系选	牡丹江地区农科所 (牡157)	春	5/上—9/中
0062	牡丰4号	牡丹江地区农科所系选	牡丹江地区农科所 (牡218)	春	5/上—9/下
0063	牡丰5号	牡丹江地区农科所有性杂交育成	牡丹江地区农科所 (牡158)	春	5/上—9/下
0064	嫩丰1号	嫩江地区农科所有性杂交育成	嫩江地区农科所 (嫩6834)	春	5/上—9/下
0065	嫩丰2号	嫩江地区农科所有性杂交育成	嫩江地区农科所 (嫩62007)	春	5/上—9/下
0066	嫩丰3号	嫩江地区农科所有性杂交育成	嫩江地区农科所 (嫩6814)	春	5/上—9/下
0067	嫩丰9号	嫩江地区农科所有性杂交育成	嫩江地区农科所 (嫩66126—22)	春	5/上—9/下
0068	嫩丰7号	嫩江地区农科所有性杂交育成	嫩江地区农科所 (嫩64007)	春	5/上—9/下
0069	嫩良1号	嫩江实验农场系选育成	嫩江实验农场 (黑第945)	春	5/上—8/下
0070	嫩良2号	嫩江实验农场系选育成	嫩江实验农场 (黑第946)	春	5/上—8/下
0071	嫩良3号	嫩江实验农场有性杂交育成	嫩江实验农场 (黑第947)	春	5/上—9/中

(续)

生育 日数	粒 色	子 叶 色	百粒重 (克)	粒 形	生育 习性	结荚 习性	茸 毛 色	花 色	植株 高度 (厘米)	叶 形	脂肪 含量 (%)	蛋白质 含 量 (%)	备 注
127	黄	黄	17.0	圆	半直	无	灰	白	70.0	披针	19.80	33.20	粒形近圆
135	黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	紫	90.0	圆			
128	浓黄	黄	24.0	圆	半直	无	灰	白	80.0	卵圆	19.12	39.38	
124	黄	黄	22.0	圆	半直	无	灰	白	70.0	卵圆	21.40	37.37	
115	黄	黄	16.6	圆	半直	无	灰	白	80.0	卵圆	21.56	37.28	
112	黄	黄	19.0	圆	半直	无	灰	紫	60.0	卵圆	22.18	37.72	
125	黄	黄	17.0	扁圆	半直	无	灰	白	70.0	披针	20.13	37.51	
134	黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	白	70.0	披针	21.42	35.09	
133	黄	黄	19.0	圆	半直	无	灰	白	70.0	卵圆	20.20		
127	黄	黄	19.6	圆	半直	无	灰	白	70.0	披针	20.17	36.70	
120	黄	黄	19.6	圆	半直	无	灰	白	70.0	椭圆	20.13	37.35	
118	淡黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	67.8	披针	22.69	36.11	
107	淡黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	50.0	披针			
105	淡黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	56.0	披针			
118	淡黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	白	60.0	披针			
118	淡黄	黄	16.5	圆	半直	亚	灰	白	85.0	披针	18.90	40.12	
116	黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	白	70.0	卵圆	20.49	38.53	
116	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	卵圆	20.61	37.17	
113	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	70.0	卵圆	21.14	37.23	
117	黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	白	70.0	卵圆			
115	黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	卵圆	22.68	36.00	
95	黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	紫	70.0	圆			
100	黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	65.0	披针			
105	淡黄	黄	21.0	扁圆	半直	无	灰	白	70.0	披针			

总编号	品种名称	原产地或来源	保存单位 (编号)	类型	生育月份
ZDD0072	嫩良4号	嫩江实验农场有性杂交育成	嫩江实验农场 (黑第948)	春	5/上—9/中
0073	嫩良5号	嫩江实验农场系选育成	嫩江实验农场 (黑第949)	春	5/上—9/上
0074	嫩良6号	嫩江实验农场有性杂交育成	嫩江实验农场 (黑第950)	春	5/上—8/中
0075	嫩良7号	嫩江实验农场有性杂交育成	嫩江实验农场 (黑第951)	春	5/上—9/上
0076	绥农1号	绥化地区农科所有性杂交育成	绥化地区农科所	春	5/上—9/上
0077	绥农3号	绥化地区农科所有性杂交育成	绥化地区农科所	春	5/上—9/上
0078	满仓金	解放前留下	合江地区农科所 (合豆42)	春	5/上—9/下
0079	元宝金	解放前留下	合江地区农科所 (合豆43)	春	5/上—9/下
0080	东农1号	东北农学院系选育成	合江地区农科所 (合豆44)	春	5/上—9/下
0081	荆山扑	桦川县荆山扑选出	合江地区农科所 (合豆45)	春	5/上—9/下
0082	久兴紫花	合江地区农科所杂交后代依兰 久兴大队选育	合江地区农科所 (合豆47)	春	5/上—9/下
0083	东农64—286	东北农学院有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆48)	春	5/上—9/下
0084	东农35	东北农学院有性杂交育成	合江地区农科所 (合豆49)	春	5/上—9/下
0085	克霜	解放前留下	黑龙江省农科院 (黑第7)	春	5/上—8/下
0086	紫花2号	解放前留下	黑龙江省农科院 (黑第18)	春	5/上—9/中
0087	紫花4号	解放前留下	黑龙江省农科院 (黑第30)	春	5/上—9/中
0088	西比瓦	解放前留下	黑龙江省农科院 (黑第14)	春	5/上—9/中
0089	克系283	克山农科所系选育成	黑龙江省农科院 (黑第34)	春	5/上—9/中
0090	早铁荚青	克山农科所混选育成	黑龙江省农科院 (黑第303)	春	5/上—9/中
0091	紫花1号	解放前留下	黑龙江省农科院 (黑第59)	春	5/上—9/下
0092	紫花3号	解放前留下	黑龙江省农科院 (黑第75)	春	5/上—9/中
0093	四粒黄	黑龙江齐齐哈尔	黑龙江省农科院 (黑第419)	春	5/上—9/下
0094	霍龙门早熟豆	黑龙江嫩江	黑龙江省农科院 (黑第952)	春	5/上—8/中
0095	讷河早半月	黑龙江讷河	黑龙江省农科院 (黑第425)	春	5/上—8/下

(续)

生育 日数	粒 色	子 叶 色	百粒重 (克)	粒 形	生育 习性	结莢 习性	茸 毛 色	花 色	植株 高度 (厘米)	叶 形	脂肪 含量 (%)	蛋白质 含 量 (%)	备 注
115	淡黄	黄	24.0	扁圆	半直	无	灰	白	70.0	披针	20.35	38.54	粒形近圆
110	浓黄	黄	21.0	圆	半直	无	灰	紫	75.0	披针	21.17	38.20	
90	黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	紫	65.0	圆	22.80	41.50	
110	黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	紫	70.0	圆	20.95	37.67	
108	黄	黄	14.9	椭圆	直立	无	灰	紫	62.0	披针	20.72	36.15	
108	黄	黄	15.6	椭圆	直立	无	灰	白	58.0	披针	21.81	36.09	
125	浓黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	白	90.0	椭圆	20.63	40.02	
125	黄	黄	20.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	椭圆	20.70	40.59	
125	黄	黄	18.5	扁椭	半直	无	灰	紫	80.0	卵圆	19.71	40.02	
135	浓黄	黄	19.0	椭圆	半直	无	灰	白	80.0	披针	19.52	36.65	
127	黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	100.0	披针	19.40	35.00	秆强、分枝多
134	黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	80.0	披针	20.31	38.08	
124	黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	80.0	披针			
98	白黄	黄	18.0	椭圆	半直	无	灰	紫	60.0	卵圆	21.36	38.65	
110	白黄	黄	20.7	椭圆	半直	无	灰	紫	67.2	卵圆	18.65	40.78	
117	黄	黄	21.1	扁椭	半直	无	灰	紫	66.8	卵圆	20.70	43.00	
114	黄	黄	17.1	扁椭	半直	无	灰	紫	56.6	卵圆	19.03	38.97	
117	暗黄	黄	22.0	扁椭	半直	无	灰	紫	87.6	卵圆	19.73	40.91	
113	黄	黄	18.7	椭圆	半直	无	灰	紫	62.2	卵圆	19.58	39.38	
120	白黄	黄	21.3	椭圆	半直	无	灰	紫	84.0	卵圆	20.00		
118	黄	黄	22.3	椭圆	半直	无	灰	紫	73.2	卵圆	18.48	41.19	耐旱性强，鼓粒至成熟较快
118	黄	黄	18.0	圆	半直	无	灰	白	80.0	卵圆	20.44	37.69	
90	淡黄	黄	20.0	圆	半直	无	灰	紫	60.0	圆			
96	黄	黄	16.6	扁椭	半直	无	灰	紫	42.6	卵圆	19.93	38.71	