



贵州经济植物图说

第五册

贵州经济植物图说

第五册

贵州省野生植物普查办公室編

主 編 者

林 修 灝	王 兴 国
张 秀 实	曾 宪 章
周 吉 斌	姚 良 珍
汪 文 敏	冉 精 报



貴州人民出版社

1960年9月·貴陽

貴州經濟植物圖說

第五冊

貴州省野生植物普查辦公室編

*

貴州人民出版社出版

(貴陽市延安中路3號)

(貴州省書刊出版業營業許可証出字第1號)

貴州省新華書店發行 各地新華書店經售

貴州人民印刷廠印刷

*

開本: 850×1168 $\frac{1}{32}$ 印張: 4 $\frac{3}{4}$ 插頁: 5 字數: 96,100

1960年9月第1版

1960年9月第1次印刷

印數: 00,001—2,645冊

(內精裝1,100冊)

統一書號: 16115·260 (1463)

定價: (9) 精: 一元二角
平: 七角五分



石 榴

Punica granatum L.

1. 果枝。 2. 花。 3. 雌蕊。 4. 种子。



早 蓮 木

Camptotheca acuminata Dene

- 1.花枝。 2.花蕊。 3.花瓣。
4.去花瓣，示雌蕊。 5.雄蕊。 6.雌蕊。 7.披針翅果。



枸 桔

Poncirus trifoliata (L.) Raf.

1. 叶枝。 2. 花枝。 3. 果枝。 4. 去花瓣后，示雄蕊、雌蕊。
5. 示雄蕊背、腹面。 6. 雌蕊。 7. 叶（放大）、示顶端微凹，边缘具微波状浅齿。

目 录

三叶木通..... (1)	枣树..... (47)
三尖杉..... (3)	馬鞭草..... (50)
山抛子..... (6)	皂莢..... (53)
大卫梁王茶..... (9)	旱蓮木..... (56)
大果榆..... (11)	青杠櫟..... (58)
簸賴子..... (13)	苦茄..... (61)
小薊..... (15)	柯树..... (64)
川康櫻..... (18)	枸桔..... (66)
木蝴蝶..... (20)	草芍药..... (69)
木姜子..... (23)	威灵仙..... (72)
毛叶木姜子..... (25)	茶..... (74)
毛叶玉叶金花..... (27)	紅皮..... (77)
毛叶玉兰..... (29)	珙桐..... (79)
无患子..... (31)	海州常山..... (82)
云南八角..... (33)	鸡冠花..... (85)
石榴..... (35)	通草..... (87)
玉竹..... (38)	高山櫟..... (90)
半边蓮..... (41)	紫荆..... (92)
竹叶榕..... (43)	款冬..... (95)
多枝常春藤..... (45)	絡石..... (98)

槐木.....	(101)	寬叶清风藤.....	(113)
慈竹.....	(103)	藤五加.....	(115)
榉櫟.....	(106)	榉木.....	(117)
鵝掌楸.....	(109)	櫟櫟.....	(119)
檉柳.....	(111)	悬鈎子.....	(121)

三 叶 木 通

〔概述〕 别名：八月瓜、八月炸。系木通科(Lardizabalaceae)植物，学名：Akebia trifoliata Koiz, 喜生长在山間密林中和阴湿的岩石縫隙中，常纏繞其他树上。

〔植物形态〕 藤状攀援灌木，高可达8米。叶互生，指状，具三个小叶，柄长8—12厘米，小叶卵形至卵状椭圆形，全缘，頂端鈍或有缺刻，基部圆形或楔形。总状花序，梗长10—15厘米，花雌雄同株，雄花多数，淡紫色，着生于花序上部，雌花少数褐紅色，着生花序下部，雌花較雄花大，萼片3个，卵圆形，頂端尖，无花瓣，雄蕊6个，花药黄色无柄，心皮3—6个。果为肉质而开裂的浆果状，成熟时裂开，露出部分白色，多汁，有少数黑色种子排列成数行。花期4月，果熟期8月。


〔产地〕 黔南、黔东南自治州，铜仁、遵义专区等地。

〔成分〕 种子出油率可达30%。

〔用途〕 果实味甜可口，可作水果食用，亦可熬糖。种子可榨油。茎藤可編筐。

〔采收和加工〕 果熟即可采摘，把剥取之外皮搗成糊状，过滤去渣，取其滤液即可熬糖或做果酱。并在剥果皮时收集种子，晒干榨油。

〔品质规格〕 果紫色，发亮，肥大，肉厚，新鲜者为佳。种子，以饱满、无霉烂、无杂质为合格。



三 叶 木 通

Akubia trifoliata Koiz.

1. 果枝 2. 雌花 3. 雄花 4. 种子

三 尖 杉

〔概述〕 别名：藏杉（四川天全）、桃松（四川成都）、狗尾松（湖北兴山）、三尖松（湖北宜昌）、山榧树（浙江）、白头杉、崖头杉（松村植物名录）。系粗榧科（*Cephalotaxaceae*）植物，学名：*Cephalotaxus Fortunei* Hook. f.，多生长在石灰岩山地及杂木林中，庭园栽培。


〔植物形态〕 常绿乔木，高可达10米，树皮灰色，主枝轮生而稍下垂，小枝对生，枝顶叶芽常三个排列，发育旺盛之幼树或嫩枝上之叶则较短而窄。叶为螺旋状着生，通常多扭转为羽状排列，线形稍弯曲，先端渐尖，基部窄缩为短叶柄，表面暗绿色，背面苍白色，两侧有广阔气孔线，中脉两面隆起。花雌雄异株，雄花序以6—11朵雄花合成，球形有柄，单生于叶腋，花柄长5毫米，有鳞片，花直径约7毫米，各雄花有7—12雄蕊，药3室，具花丝，雌花头状有梗，由小枝基部伸出，雌花由数对心皮所成，每心皮有直立胚珠2颗。果为核果状，种子于每一花序中可成熟1—2粒，外种皮肉质，内种皮坚硬。6—7月结果。

〔产地〕 全省各地均有分布。

〔成分〕 种子含油率64.22%，出油率51.5%。

〔用途〕 种子可榨油供工业用，果实可蒸馏挥发油。木材坚韧，富有弹性，可作农具柄等用材。

〔鉴别〕 乔木，枝顶叶芽3枚排立。叶线形稍弯，2列，背面白色，气孔线2条，中脉两面隆起。果为核果状，种子全包被于蓝绿色之假种皮内。



三 尖 杉

Cephalotaxus Fortunei Hook. f.

1. 小 花 枝 2. 果 枝 3. 小 蕊 花 4. 小 蕊 5. 大 蕊 花 折 去 鳞 片 示 胚 珠

〔品质规格〕 种子：以成熟，全干，无杂质，无霉烂，无虫蛀者为合格。

山 抛 子

〔概述〕 别名：山泡子、木莓、山莓、菁、树莓、沿钩子。系蔷薇科 (Rosaceae) 植物，学名：Rubus corchorifolium L.f.，多自生于山地灌木丛中，林缘及路旁等地，为常见山间之野生荆棘。


〔植物形态〕 落叶直立灌木，茎有刺，幼时有密绒毛。单叶互生，卵状披针形，长8—16厘米，先端渐尖，基部心形，有3主脉，近基部处有短而且钝的裂片或无，着生在幼枝上的叶3裂，中央裂片特长，边缘具细锯齿，表面脉上有短柔毛，下面被灰色密绒毛，叶柄长2—8厘米，托叶线形。花白色，常单生，萼卵形，花瓣长椭圆形。果实红色而具光泽，果梗较短。花期4月。

〔产地〕 黔东南、黔南自治州，铜仁、遵义专区等地均有分布。

〔成分〕 粗分析：叶含鞣质30%，茎含鞣质5%，细分析：含新鲜类鞣质12.28%，非鞣质4.24%，水溶物16.52%，水分18.14%。果实中含有机酸，主要成分为枸橼酸、苹果酸、葡萄糖及抗坏血酸等。

〔用途〕 叶和茎为提取栲胶的原料。果大，可以鲜食或制作果酱。采割叶和嫩枝，用水煮沸、发酵处理后，可作猪饲料。

〔采收和加工〕 5—6月间割其茎叶用温水循环浸提，浸出液用间接火浓缩，即得栲胶。浸提过栲胶的叶，经处理还可用来喂猪。



山 抛 子

Rubus corchorifolium L. f.

1.花枝 2.花

〔品质规格〕 栲胶：同一般栲胶的规格。以色浅含鞣质在50%以上者为佳。成熟之果实，以新鲜、无腐烂者为好。

大 卫 梁 王 茶

〔概述〕 别名：树三加。系五加科 (Araliaceae) 植物，学名：Nothopanax Davidi Harms，多自生于700—1,500米地区山坡林下或灌丛中。

〔植物形态〕 无刺常绿灌木或小乔木，高达6米，全体无毛。叶为单叶，革质长椭圆形或长椭圆状披针形，长6—15厘米，宽4—6厘米，先端渐尖成尾状，基部阔楔形或圆形，边缘疏生锯齿，两面平滑无毛，3出脉，有时叶有3裂呈3个无柄窄披针形小叶，叶柄长5—15厘米。花两性，绿色，伞形花序，再结合为顶生圆锥花序，长18厘米，萼齿状5裂，花瓣5枚，镊合状排列，雄蕊5枚，子房下位，2室，花柱2个，连合，上部分离。果实扁平，直径5—6毫米，黑色。花期7月，果实9月成熟。

〔产地〕 我省瓮安、印江梵净山、遵义、贵阳市等地。

〔成分〕 幼茎含芳香油，果实含脂肪油。

〔用途〕 果实可榨取脂肪油；根皮煎汤服用，治胃病。

〔采收和加工〕 采收茎皮必须在6—7月开花时进行，此时植物生长旺盛，含油量丰富，采摘后及时蒸提挥发油。果实则宜在果实熟时采摘，采下晒干榨取脂肪油。

〔品质规格〕 果实以饱满，黄褐色，无杂质，无霉烂者为合格。