

多种经营丛书

家庭副业二十例

河北人民广播电台 编



农村读物出版社

家庭副业二十例

河北人民广播电台 编
对农村广播节目组



农村读物出版社

• 1982 •

家庭副业二十例

河北人民广播电台
对农村广播节目组

农村读物出版社 出版
(北京海淀区复兴路61号)

冶金工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

787×1092毫米 32开 25/8印张 60千字
1982年1月第一版 定价0.28元

书号4267·2

前 言

为了帮助社员发展多种经营，搞好家庭副业，我们电台《对农村广播》节目播送了十几种家庭副业的有关养殖和种植知识，受到了社员和农村基层干部的欢迎；收到了河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙、江苏、天津、北京等地几千封来信，向我们索取材料。为了满足大家的要求，我们把广播过的稿件经过编选，汇编成为《农村副业十三种》，印了四万五千册。许多社员、干部来信说：材料浅显，容易看懂，希望能够公开出版发行。

在群众的支持和鼓励下，我们在原来小册子的基础上，又增补一些内容，定名《家庭副业二十例》，推荐给了《农村读物出版社》出版。原广播稿有的是用对话形式写的，为了使文字更加简洁明了，根据出版社的意见，把对话都改成了叙述的体裁，还增加了一些插图。

现在，各地农村都在开展家庭副业，积累了不少好的经验，创造了许多新的方法，所以我们诚恳地希望读者如发现本书中某些错误或介绍的方法不适当的地方，来信指正。

河北人民广播电台


对农村广播节目组编辑部

1981年9月



目 录

前 言	编 者
	一、 水貂的经济价值高
二、 珍贵的毛丝鼠	1
三、 怎样喂养寒号鸟	5
四、 市场广阔的家兔	9
五、 怎样养鸡	13
六、 养鹅的方法	18
七、 坑塘养鱼	25
八、 养殖蚯蚓	28
九、 饲养土元虫	32
	36

十、	蝎子是药材	40
十一、	癞蛤蟆身上有珍宝	44
十二、	肥猪的快速育肥法	47
十三、	人工培植牛黄	50
十四、	瓶栽银耳	54
十五、	金银花全身是金银	58
	十六、 平头蘑菇的栽培	61
十七、	双孢白蘑菇	64
十八、	利用废木材培植黑木耳	67
十九、	栲楼浑身都是宝	72
二十、	种红花一举多得	75



水貂的经济价值高

一、价值 水貂的毛绒丰厚，色泽美观，有金褐色、白色、兰宝石色、银白色、米黄色、深褐色等，颌下有白斑。水貂皮板质地坚实、轻软，是制高级轻裘的上等原料。用它做成的斗蓬、围巾、皮帽、手套等，深受国内外人士欢迎，是我国重要出口商品之一。因此，饲养水貂有很高的经济价值。在一般情况下，每养一大组五十只水貂，一年可纯收入八千多元；每养一小组五只水貂，一年也能收入八百多元。如果饲养管理得好，养貂的收入还会更多些。

饲养水貂的数量可多可少，只要有饲养条件，集体和个人都可以养，是一项大有发展前途的副业。

二、习性 水貂原是一种野生动物，外形与黄鼬差不多，只是毛色不同。它是一种肉食性动物，喜欢有水的环境，性情凶猛，多在夜间活动，有贮食的习惯。水貂生长发育快，繁殖周期短。一只出生时只有半两左右重的小水貂，长到九个月后，体重可达4斤左右。仔貂自出生之日起，七~八个月基本长成。成年公貂一般体长40~50厘米，体重4斤左右；母貂体长35~40厘米，体重1.8~3斤。水貂长到十个月性成熟，当年四月下旬产仔。仔貂长到十二月即可剥皮，



留作种貂的第二年2~3月间又可配种。母貂繁殖能力保持八、九年，种貂只能利用三、五年。

水貂每年夏、冬两季各换毛一次，冬毛是制裘佳品。一般在农历小雪到冬至这个期间冬毛成熟，这时剥皮最好。

水貂的天敌有狗、狐狸、山獾子、猫头鹰等。

三、建场 貂场的环境应该设在安静蔽荫的地方，貂场周围要有围墙，还得有牢固的小室、铁笼和貂棚。

棚一般高2米、宽4米，长度可根据饲养多少而定。棚顶可用木板，然后再在上面盖水泥板或瓦片。貂棚主要是用来遮蔽雨雪和防止烈日对貂场的曝晒。



小室、铁笼是水貂栖息、御寒、产仔和活动的场所。小室用厚木板制成，设坚固耐用的门。门高40厘米，宽20厘米，走廊宽12厘米，出入孔直径为10厘米。笼可用14~17号铁丝编成长65厘米，宽和高与木箱相等的五面笼子钉在箱子上，供水貂活动、采食、饮水、交配、排便之用。

四、饲料 水貂的饲料以小杂鱼和猪、羊、鸡等畜禽的头蹄杂碎为主，此外还有鱼粉、蛇、蚌、昆虫、青蛙、老

鼠、麻雀等。水貂也吃些谷类食物，如玉米面、高粱面、大麦面、大豆饼等。马铃薯、甜菜、胡萝卜、大头菜、冬瓜等，也是水貂喜欢吃的食物。水貂吃的食物很多，但不同的发育时期又各有不同的需要。比方说：四月份正是母貂妊娠期，这时就需要喂些品质新鲜、营养丰富、易于消化的饲料，还要适当喂些滋补饲料，象鱼肝油、鸡蛋、骨粉等等。同时，还要让母貂增加日晒时间和饮水次数。

肉类、瓜菜可生喂，谷物、蛋类要熟喂，而且必须保持新鲜、卫生，腐烂变质的绝对不能喂。

五、管理 饲养水貂管理很重要。温度对水貂影响很大，尤其对仔貂的影响更为明显。产仔室内要经常保持 35°C 左右，出生仔貂小室内保持 40°C ，温度过低或过高都不利于仔貂发育。小室内要垫草保温，适当增加光照。夏天气温过高时，要注意防暑。另外，还要做好养貂场的灭蚊灭蝇工作，但使用杀虫药剂时，千万不要与饲料接触，以免发生中毒。

水貂饲养人员要及时清除污烂垫草。饮食具及笼舍要经常消毒。水貂常见疾病有感冒、肺炎以及营养不良等，对这些病症要及时预防和治疗。

六、配种 成貂在每年2月中旬开始发情，配种期在2月下旬到3月下旬。母貂怀胎期约为45~46天，4月下旬产仔，每年一胎，每胎产4~8只，最多的产19只。

每年9~10月份，正是成貂配种前期，应增加营养，多喂些豆浆、动物鲜血一类含蛋白质丰富的饲料。但要适度，由于营养充足而造成水貂过胖反倒不好。

成貂配种时间选在什么时候为最适宜呢？这要根据当地的气候条件和成貂发情情况而定。公貂发情时表现行动急躁，食欲不振，由于求偶心切而发出“咕、咕”的叫声。母貂发情时频繁出入窝门，也发出“咕、咕”的叫声，其外阴肿胀，排出白色粘液。这时候就可以将母貂放入公貂笼内，进行配种了。

有些母貂发情期的表现并不明显，属于隐性发情。遇到这种情况，在配种期内可对母貂采取试配方法，一般在早晨7~8点钟配一次，还可在当天下午6~7点钟复配一次。对假配的母貂要及时做好人工辅助工作。配种前一定要选好种貂。配种时和配种以后，要保持安静，不要恫吓，不要让人去惊扰。因为水貂胆小，受惊吓容易造成流产；安静舒适的环境，才利于胎儿的正常发育。

七、取皮的时间和方法 貂皮质量的好坏关系到经济收入的多少。因此，掌握取皮时机和技术十分重要。

取皮的时间，一般在农历小雪到冬至期间。取皮的方法是：先用左手握住水貂颈的后半部，右手抓住嘴部向后上方用力推折，把颈椎折断，水貂就死了，也就可以剥皮了。剥皮先从四肢开始，剥下后用刮刀刮净皮板上的油脂，然后再用锯末把皮板搓洗干净。接着，洗净毛绒，上楦板烘干。皮张烘干后，就可以送交收购部门了。



珍贵的毛丝鼠

毛丝鼠是一种珍贵的毛皮小动物。它的前半截好象兔子，后半截又象松鼠。它的体型肥胖，成椭圆型，体长大约二十五厘米，体重一斤左右。它的被毛丰厚，很象绒丝，艳丽新颖，光亮油滑，特别是毛绒的细密柔和以及自然色泽的美观，是其它毛皮动物无法相比的。毛丝鼠经济价值很高，再加上它的皮板很薄，所以制裘非常轻便，是国内外市场上最受欢迎而又供应不足的毛皮之一。现在看来，饲养这种动物是很有发展前途的副业门路之一。

饲养毛丝鼠，占用面积小，设备简单，成本低，每饲养一组毛丝鼠（一公四母共五只），按每只母鼠一年繁殖两胎、成活两只、每张皮四十元计算，除去饲料开支，一年可收入三百二十元。一般只要饲料充足，一个饲养员饲养二十组到三十组是完全可能的。

毛丝鼠原生长在南美洲海拔三千米以上的沙丘山区。人工饲养时一定要适应它的生活习性，如好动、磨牙、昼伏夜出，沙浴（用沙土洗澡）等。毛丝鼠的饲养方法：

一、饲养室的条件

毛丝鼠需要一个干燥、安静的饲养室。饲养室卫生条件要好，通风良好，但不要有穿堂风；阳光充足，但不要直射。室内必须备有温度计和湿度计，保证室内温度保持在14℃左右，最低不能低于0℃，最高不能过30℃；室内相对湿度保持在50—60%左右。毛丝鼠在笼子里饲养。鼠笼可用镀锌电焊网做成，规格长宽都是40厘米，高50厘米。每只毛丝鼠一个笼子，每个笼子出入口都和通道相连。母鼠要带上颈圈，防止它出入通道，而公鼠可以自由出入母鼠笼。一只公鼠搭配三到六只母鼠，组成一个饲养群。鼠笼内应该有饲料槽、封闭式的饮水器（即吸水管）、沙浴箱、松木做成的踏板、小巢箱等。

二、生活条件

毛丝鼠是草食性动物。它的饲料为颗粒饲料和草料。

颗粒饲料用小麦、大麦、燕麦、小米、玉米等多种谷物和维生素、矿物质、微量元素混合制成。颗粒饲料要存放在干燥处，保持新鲜，不要让饲料反潮变质。毛丝鼠吃了变质腐烂的饲料，容易引起肠炎等疾病。

毛丝鼠的肠道是它的身长的几倍。因此，需要大量的草料。毛丝鼠的饲草来源比较丰富，如三叶草、苜蓿、蒲公英、猫尾草等，都是好饲草。毛丝鼠干草、鲜草都吃，但是，草的品种必须相对固定，从喂干草到喂鲜草必须逐步进行，干鲜兼喂的时间不少于一周，从喂鲜草到喂干草，也是一样。注意不能喂带露水的鲜草。

饮水对毛丝鼠也十分重要。必须常年供给它足够清澈的酸性水，最好是矿泉水或山涧泉水。要喂生水，不能烧开。

毛丝鼠一般每天喂一至二次，主要在夜晚和早晨进行。如果每天只喂一次，每只每次一汤匙颗粒饲料；如果每天喂两次时，每只每次一平匙大约十五克颗粒饲料。草和水的数量不受限制。

在喂毛丝鼠之前，先打开饲养室的窗户，使空气新鲜。并给予它十至十五分钟的沙浴时间。接着取下饮水瓶，倒出用过的水，冲洗后装上新鲜饮水，并倒出食槽里没有吃完的饲料，清除剩余草料。然后关闭沙浴箱，开始喂料。

要供给毛丝鼠足够的沙子，保证它对沙土浴的需要，以便增强健康和纯洁毛皮。并不断投放干草、木块、树枝，也可以定期投放点报纸，供它啃咬、磨牙。

每只毛丝鼠每周可给钙片两片，分两次在夜间喂下。这样，可以增强毛丝鼠骨骼和牙齿的健康。

白天尽量不要打扰它，让它一直睡到夜晚。到夜晚又尽量设法让毛丝鼠多运动，促使它饥饿，这样到了第二天一早才能很好地吃草料。

三、注意繁殖

毛丝鼠从十月中旬开始交配，持续到来年一月份。母鼠的妊娠期111天到117天，每胎产仔一到三只。母鼠大多数是在分娩的当天或第二天，就和公鼠交配。这样算来，母鼠一年产三胎是可以的，但一般控制在两胎。第一胎产期从一月初到四月底止。第二胎产期在夏末或秋季。


母鼠在产仔时，要有人护理。如果发现它有阵痛或难产，可用2—3滴帕特精滴在苹果瓣上或葡萄干里，设法让

它吃下，这样可以起到催产的效果。当胎衣有一半出来的时候，要小心地用手指抓住伸出来的胎衣，缓缓地旋动拖出。脐带不要剪断，母鼠自己会咬断的。

母鼠分娩之后，同它交配的公鼠自然会协助母鼠舔干，并清洁刚分娩下来的仔鼠。但是，不能让别组的公鼠来干这些事情，否则，会把仔鼠咬死。对此，必须多加注意。

对初生多胞胎的仔鼠和母鼠必须认真检查：看看母鼠是不是有奶。如果母鼠发出“狺狺”的声音，并禁止小鼠吸奶时，大多是它还没有下奶或缺乏足够的奶汁。在这种情况下，要耐心地看护母鼠直到奶汁流出为止。为了让母鼠能及时分泌奶汁，第一次产仔前的母鼠最好喂点催乳剂。如果发现初生仔鼠比它的同窝显著衰弱，就要想办法让弱鼠多吃奶。如果需要人工喂养，可以用两份开水一份炼乳混匀后，在不烫手的温度下，用奶瓶喂养。也可以在奶瓶内加一些纯蜜，以加强和促进仔鼠消化。第一天喂六次，以后每天喂四次，十四天以后就可以喂干草加颗粒饲料。哺乳母鼠要求大量的饲料，大约3—4周时，可以给满满两汤匙颗粒饲料。

仔鼠6—7周时，根据健壮程度和大小，开始断奶并和母鼠分开饲养。三个月后，为避免仔鼠争食咬架，也要单笼分开饲养。七个月龄和最低不少于六个月龄的仔鼠才能交配。两岁以上的母鼠才开始有规律的产仔，一直正常繁殖到七岁左右。有的母鼠可以繁殖十几年。



怎样喂养寒号鸟


“五灵脂”这味中药味甘性温，无毒。具有活血化瘀、止痛的功能。内服能治疗妇女的月经不调、痛经、产后恶露不下、崩漏下血等症；外敷则能医治蛇、蝎、蜈蚣咬伤以及跌打损伤等。最近经医药部门研究，发现五灵脂具有缓解平滑肌痉挛的作用，并对葡萄球菌、伤寒杆菌和某些真菌有不同程度的抑制作用。

这味良药不是别的，而是寒号鸟的粪便。寒号鸟是野生的，也可以家庭饲养。一斤寒号鸟粪，可以卖一块钱，可以作为一项家庭副业。

寒号鸟的习性

提起寒号鸟，很容易让人误认为它是一种鸟，其实不然。它是一种哺乳动物，学名叫橙古鼯鼠。还有的地方叫它寒号虫、寒塔柱虫、催生虎。

寒号鸟身长大约有一尺半，身上的毛是灰褐色的，尾巴比较粗而且长，有一对圆溜溜的大眼睛，耳廓发达。前肢比后肢短，爪子带钩，善于爬山爬树。前后肢中间有飞膜，但不能高飞，只能从高处向下滑翔。滑翔时，飞膜展开，身体



滑翔时，飞膜展开的寒号鸟

几乎成正方形。寒号鸟常住在悬崖陡壁的石洞中或石头缝中，白天躲在窝里，夜里出来找食吃。它的主要食物是柏树叶和黄栌的嫩皮，以及其它有苦味的树籽和嫩枝。寒号鸟喜欢在安静、凉爽的地方活动，它胆子小，怕惊动，又怕严寒和高温。

我国河北、山西、甘肃、四川、云南等地都有野生的寒号鸟。一九五八年以来，河北省的莱水、易县、平山、赞皇、井陘等县山区，对寒号鸟进行人工饲养，获得成功。

饲 养 方 法

寒号鸟的饲养方法比较简便，现在一般采用箱养、笼养和洞养三种方法。

箱养法：用木板做一个三尺长、一尺半宽、二尺高的箱子，分上下两层，隔成四个小间，里面安上梯子，供寒号鸟上下。上边两间做为寒号鸟休息的地方，下边一个小间是吃东西喝水的地方，另一个小间是排粪的地方。箱子的一面可以安上玻璃，以便于观察。箱子还要留有窗口，保证空气流通。

笼养法：用铁丝做成比较大一点的笼子挂在屋里，笼子里放一枝小树枝，供寒号鸟攀登和滑翔。这样，寒号鸟活动量增加，就能多吃东西，多排粪便。笼子里放一个铁盘，好

让寒号鸟往盘里拉粪。

洞养法：在房屋附近的土坡上，在向阳的一面挖洞。洞里冬暖夏凉，适于寒号鸟的生长发育。洞口用铁丝网罩起来，以防寒号鸟跑掉。

注 意 管 理

不论采取哪种方法饲养寒号鸟，都必须有一个安静、清洁的环境。寒号鸟不能让小孩玩耍。每次喂食不宜太多，以当天基本吃完为好，饮水也要洁净。窝里的烂树叶要及时清除，但要放点柴草或麻刀，让寒号鸟搭窝用，冬天多放一点。凡不是从一个地方捉来的寒号鸟，不要和原来的寒号鸟放在一个窝里，防止它们互相咬伤。刚开始饲养的寒号鸟往往到处拉粪，这可以把它们的粪便收集起来，放在窝里一个固定的地方，时间长了，就会固定在一个地方拉粪了。冬天要注意防寒，把箱子、笼子放在暖和地方；夏天要注意防暑，如果发现寒号鸟身上有汗，要马上转移到阴凉地方，防止中暑。

繁殖小寒号鸟

每年的二月到四月是寒号鸟的交配期。不同窝的寒号鸟交配后，仍然各回各窝。母寒号鸟怀孕后，约七十五天生育。每胎生一只到三只，一年一胎。小寒号鸟出生后，一个月才能睁开眼，三个月左右自己找食吃。在繁殖期间，可用玉米面煮成浆糊，少放点白糖，作为补充饲料以增强母寒号鸟和小寒号鸟的体质。寒号鸟如果开始不吃这种饲料，可用木棍