

古今圖書集成

中国学术类编

艺术典

三

(九)



藝術典三

各部部长上所冠数字係在本典之原部次
各部部长下所附数字係在本典就部页次之起页

一〇醫部 (三)

- | | | | |
|------------|-------------|--------------|------------|
| 24 背脊門二〇九二 | 25 胃腹門二二三七 | 26 腰門三〇一一 | 27 四肢門三三一一 |
| 28 前陰門三三三四 | 29 後陰門二四〇七 | | |
| 30 皮門二四五一 | 31 肉門二四六三 | | |
| 32 筋門二四七七 | 33 骨髓門二四九四 | | |
| 34 風門二五〇四 | 35 癰門二五八六 | | |
| 36 寒門二六二三 | 37 暑門二六三八 | | |
| 38 濕門二六六〇 | 39 燥門二六八一 | 40 火門二六九〇 | |
| 41 痰門二七二三 | 42 欬嗽門二七五七 | | |
| 43 嘔吐門二八一四 | 44 泄瀉門二八五一 | 45 霍亂門二九〇〇 | |
| 46 滯下門二九二一 | 47 大小便門二九六九 | 48 淋濁遺精門三〇〇五 | |
| 49 血門三〇三九 | 50 汗門三〇八 | | |
| 51 渴門三二二六 | 52 哮喘門三二五六 | | |
| 53 瘧門三二七九 | 54 瘧門三三〇三 | | |
| 55 厥門三四七 | 56 癲狂門三七二 | 57 痢門三九七 | |

口鼻俱閉呼吸微喘者急灸氣海飲人參膏十餘斤而愈治積聚在肺致其所合大腸之氣不固者湧出上焦之痰則肺氣下降而大腸之虛自復矣治憂思太過脾氣結而不得升舉陷入下焦而成泄瀉者開其鬱結補其脾胃使氣升發也治陰虛而腎不能同禁固之權者峻補其腎而愈也凡此之類甚多因問先生治病何神也先生無他獨擅活法內經藥之自得其

經曰腎主大小便又曰腎司開闔又曰腎開於二陰可見腎不但主小便而大便之能開能閉者皆操權也今腎既虛則命門之火燒火燒則水竭治故令人多水瀉不止其瀉多在五更天明時必瀉二三大何也蓋腎氣水其位在北於時為亥子五更之時正亥子水旺之候故特甚也惟八味丸以補真陰則腎中之水火既濟而開闔之權得宜兌命門之火旺火能生土而脾亦強故古方有椒附丸五味子散者治腎瀉之神方也考之辭按云腎門虛寒下陷者用補中益氣湯加水香而果補腎脂者脾氣虛寒不榮者用六君子湯加炮薑肉桂若命門火衰腎虛虛寒者用八味丸若脾腎氣血俱虛者用十全大補湯合四神丸若大便滑利小便閉塞或尿頻者兼服嗽唾 助腎脂丸宜金匱加減腎氣丸腎門法律

論陰瀉

間逆秋氣則傷肺冬為陰瀉所傷於風夏生陰瀉有別者曰傷風而陰瀉以風為主風者東方水也傷肺而陰瀉以肺為主肺者西方金也其候各異爰得

此而問之風和傷人必入空竅而空竅惟脾胃為最風既居於脾胃其導引之機如順風揚帆不俟屏之運化食入即出以故噴已即泄也不知者以為脾虛完穀不化如長夏濕瀉來冬及冬月陰瀉之逆反以補脾剛燥之藥助風化之助有逆寒已甚至束手無策僅知從冬令治之用桂枝傾風從風表而出一二劑而可愈也而秋月之傷肺傷於肺之燥也與秋傷於燥冬生寒嗽同是一病但在肺則為嗽嗽在大腸則為瀉瀉所謂肺移熱於大腸久為腸澼者即此病也但使肺熱不傳於大腸則瀉自止不知者惟將止瀉以燥益燥吾目中所見諸大老之誤屢歷可指也竟哉

論證

凡內裡有言陰瀉者有言從瀉者皆從瀉也有言陽瀉者即下痢也然熱痢之初作必由於此瀉之於病本為同類但瀉瀉而痢深瀉而痢重瀉由水穀不分出於中焦瀉以瀉血傷脾病在下焦在中焦者瀉由脾胃而分於小腸故可證其源所以治宜分利在下焦者病在肝腎大腸分利已無所及故宜調理真陰并助小腸之主以益氣化之源此為瀉之證治有不同而門類亦當有所別病實相關不可不兼察以治也

運化使脾胃健則水穀腐熟而化氣化血以行營衛若飲食失節起居不時以致脾胃受傷則水反為濕穀反為滯滯華之氣不能輸乃致金沉下陷而瀉痢作矣脾強者瀉去即愈此強者之宜清宜利可達可攻也脾弱者因虛所以易瀉因瀉所以愈蓋蓋脾門不固則氣弱去氣主瀉脾陽來則寒從中生固不必外受風寒始瀉之寒也且陰寒性降下必及胃故瀉多必亡陰瀉亡其陰中之陽所以瀉瀉不愈必自太陽傳於少陰而為瀉瀉者豈非降瀉之甚而陽氣不升氣不固之病乎凡脾胃氣虛而有不止不固者若復寒之運之則無有不效敗者此虛弱之治大有不同故凡治此者有不可概言清利也

分利治法

凡瀉瀉之病多由水穀不分故以利水為上張然利水之法不同如渴瀉無源而瀉者宜四苓散小分清飲之類主之但欲分其清濁也如濕熱微瀉而瀉者宜五苓散胃瀉之類主之此以微瀉而利之也如

濕熱在脾熱渴喜冷而瀉者宜大分清飲茵陳飲益元散之類主之此去其濕熱而利之也

泄瀉之甚者見小水不利小水較分則瀉自止故曰治瀉不利小水非其治也然小水不利其因非一而有可利者有不可利者宜詳辨之如濕熱作瀉而小水不利者以一時水相亂脾失聰明而然有熱作瀉而小水不利者以水乘陰分水道閉澀而然有寒瀉而小水不利者以小腸之失受傳氣化無機而然有脾虛作瀉而小水不利者以土不制水清濁不分而然有命門火衰作瀉而小水不利者以真陰虧損元精枯涸而然凡此皆小水不利之候然惟察注新瀉者可判形氣強弱者可判溫濕過度口腫不腫者可判實熱無陰者可判小腹痛脹水瀉痛急者可判又若病久者不可利陰不足者不可利腹痛寒者不可利形氣虛弱者不可利口乾非瀉而不喜冷者不可利蓋虛寒之瀉水非水有餘實因火不足非水不利實因氣不行夫病不困水而利則亡陰瀉以火虛而利復傷氣倘不察其所病之本則未有不愈利愈速而速其危者矣

諸海論治

泄瀉之症者或爲飲食所傷或爲時氣所犯不由於口腹必各有原因宜察其因而治之如因食生冷寒滯者宜抑扶和則飲之屬以溫之因濕滯者宜平胃散開胃湯或白朮芍藥散以導之因食滯而脹痛有餘者宜大和中飲之屬以平之因氣滯而痛之甚者宜排氣散或平胃散之屬以導之因食滯而困結不散或胃氣之強實者宜神丸九素

金豆百順丸之屬以行之

凡初感者病氣未深驅氣未敗但略去其所病之滯則胃氣自安不難愈也

凡脾氣虛弱陽氣不強者。有時嘔吐未絕。即致潴滯。此雖爲初病。使當調理元氣。非強盛傷傷者之比。如因渴而飲。氣陷者。宜量中煎武溫調氣或聖木煎。或四君子湯。或五君子湯。如飲食兼滯而不虛者。宜佐開胃。而胃滯者。宜佐消食。若飲食不而微寒微滯。宜六味丸。或溫胃散。若因飲食不調。惡而滯滿。以藥而甚。或見偏痛。但所下酸臭。而顏色淡黃。便是脾虛胃寒不化之毒。即宜用五苓丸。再甚者。即宜用胃關散。切勿疑也。

凡象具隆不足而爲逆治者則或憂順下之痛或於
實即時爲匿或食人已入反及多不化而爲嘔惡瀉瀉
或瀉不其裏而多見定穀等證蓋因弓田不履所以
尾閥不固陰中少少所以中焦易寒此其咎在下集
故曰眞陰不足也本集中焦無渾故非分利所及惟
胃關爲最上一乘日人之患此者最多勿謂其爲

新病而不可用也勿謂其爲年少而未宜用也覺有
是證即宜是藥劑少功多微利非小但知者見其先
脈者見其後見之後恐見之遲失所以費先也
腎津者即謂所謂真不足證也每於五更初或天
將明時即洞泄數次有達旦連年弗止者或暫愈而
復作者或有痛有不痛者何也蓋腎爲胃關開竅於
二陰所以二便之開閉皆腎之所主今腎中陽氣
不足則命門火衰而陰寒獨盛故於子丑五更之後
當陽氣未復陰氣盛極之時即洞泄不止也古方有

椒附丸五味子散皆治此之良方若必欲陽生於陰而野氣充固則又權八味地黃丸為宜然余書用此則似猶未盡善故特製胃關煎

丹之屬斯得其濟者多也或五味子丸亦佳其有未
著者則如五德丸四神丸皆其最宜者

凡脾虛久滯滯大都與前治脾弱之法不相違但對
滿者可治標久滯者不可治標且久滿無火多因脾
腎之虛寒也若止因脾虛者惟四君子湯辛水湯參
苓白朮散之類爲宜若脾腎虛寒者宜五君子煎黃
芽九五德丸若脾氣虛寒兼陽悶者宜六味異功瀉
溫胃飲聖水煎若脾氣虛寒之甚而飲食減少神疲

製梅豆泥附湯水開湯十全大補湯名病在下焦腎氣虛而欲熱者宜六味地黃丸散來者宜八味地黃湯或胃關閉若脾虛濕滯久不能愈或小兒脾濕不止者用敗草煎藥末因轉難亦易見效若脾胃寒濕而瀉不止者輕湯丸亦佳若久瀉元氣下陷大腸虛滑不收者須於補劑中加烏梅五味子藥散之

大瀉如傾元氣漸脫者宜速用四味同陽飲或六味
同陽飲主之凡暑瀉用此無不即效若久瀉者發恐
無及蓋五奪之中惟瀉最急是不可見之不早也倘
藥未及效仍宜速灸氣海以挽瀉下焦之陽氣仍須
多服人參膏

酒之設飲酒之人多有之但酒有陰陽二性人有陰陽二臟而人多不能辨夫酒性本熱酒質則寒人但知酒有溫熱而不知酒有寒溫也故凡飲酒而生溫熱者因其性也以釀汁不滋陰而悍氣生熱也因酒

古今圖書集成

而生寒者因其質也以性去質不去而水留為寒何以辨之常見人有陽盛氣充而善飲者每多泄瀉若一日不瀉反云熱則其隨飲隨瀉則難為不致傷氣而得瀉反以去通此其先天稟厚胃氣過人者也最不易得亦不多見此而病者為陽證不過宜清宜利如四散散大分清飲或酒蒸連九之類去其濕熱而病可愈也若陽虛之人則與此大異蓋胃虛不能運濕而通導即能生寒陽虛因寒所以日敗胃氣因虛所以日盛其證則形容漸羸飲食漸減或嘔見逆嘔或口噤常見寒或腹脹常有隱痞或時運常多困倦或不安於五鼓或加其於秋冬但無熱證可據而常多陰證者則陽虛虛寒也凡此者若不速培陽氣必致漸衰而日以危矣余於四句之外亦嘗病此數年其勢已窘因通求治法見朱丹溪曰因傷於酒屢屢起必瀉者宜理中湯加葛根或吞酒蒸黃連九王師齋曰飲酒便泄者此酒積熱海也宜加黃連茵陳乾薑木香之屬蘇立帶曰若酒過未散脾胃氣未虛宜用此藥分利酒熱若酒熱已去中氣被傷宜用六君調補中氣又曰酒性大熱乃無形之物無形則元氣受傷當用葛花解醒湯分清其濕凡此諸論若已覺之然朱王二家之說則不分寒熱皆用黃連是但知酒之有熱而不知酒之有寒為足患也惟薛氏之說雖亦云酒性大熱而所重在脾虛者善矣余因飲之初服葛花解醒湯不效繼服六君子補中益氣湯又不效再服理中八味俱不效斯時也計窮力竭若無再生之望矣因醫思熟計料非峻補命門終無益也乃服自製腎關煎右歸丸一添丹等方仍

絕口不飲以杜其原調理年餘竟得全愈自後始明性質之理多得濟人向便已無難見熱濕熱之說而妄用黃連乾薑清分利之劑為望其有今日即或自明稍遲則既甚亦難挽矣別今人之病此者最多而是陰是陽不可不辨凡陽盛者脾虛胃健而氣不易奪故治法本無難而泄亦無難陽衰胃弱既傷則脫氣最易故宜防其無及不可不為深慮也若必以酒為熱則其為古法所誤者誠不少矣
氣泄泄凡遇惡氣便作泄瀉者必先以葛根枝食致傷脾胃故但有所犯即速瀉而得此肝脾二臟之病也蓋以肝木旺土脾氣受傷而後泄脾氣本強即有此邪未必能入今既易傷則脾氣非強可知矣故治此者當補脾之虛而順肝之氣此固大法也但虛實有數甚則治脾宜分輕重也如真壯氣實年少而因氣泄瀉者可先用不胃散或胃苓湯若肝氣不平而作泄瀉者宜解肝氣先順其氣若脾氣弱者宜二木煎或葛花茵陳湯或消食導氣飲若脾弱寒者宜抑扶調養氣散或吞木丸若脾弱居者宜溫胃飲聖木煎或六味其功擅此將必須切戒飲氣風泄泄亦當辨其風寒風熱而治之然者如傷寒外感熱利之屬是也宜以導藥內內得所云香傷於風夏為陰泄之屬是也宜以前溫理中之法治之石室秘錄云

泄瀉治法

脾經之病如水瀉乃脾氣不溫用白朮一兩車前五錢二味煎湯服之立效蓋水瀉者乃一時水氣侵脾

故傾腹而出用白朮以利脾之氣血用車前以分清其水勢白朮車前利輕瀉而水勢是矣然白朮亦能健脾健水濕自然分原不必借車前車前能通瀉而安風氣亦不止分清已也臨安則濕氣自消各有專能又能分助所以舉效如神耳
瀉瀉乃水瀉也寒瀉易治火瀉難醫往往有一日夜瀉至數百通者橫腸而出完脫不化黃門腫痛瀉下如火之熱此亦百千中之一見也然無方救之必致立亡我今酌定一方各散瀉方薤仁白芍各二兩黃連人參各三錢茯苓五錢甘草二錢山藥車前子各一兩肉桂三分水煎服一劑而瀉減半再劑而瀉止愈後用六君子湯調治此等證因火盛之極挾水殺之味一直下行不及傳遞所以完脫而出也若認作脾氣之虛以止瀉之則脾益旺而勢益急矣我來其勢而利導之則水氣分清火勢自散所以奏功能神
大瀉之證往往用止瀉之藥至數兩者亦一時權宜之計而不可執之為永久之法
大瀉瀉之始能止瀉若過於酸收則大腸細小矣下不能出又逆而上故止瀉之藥止可一時用之而不可經久用之也
大瀉方用白朮茯苓各一兩肉桂五分瀉瀉者各三錢一劑即止瀉更有解其作瀉五更時瀉下七八次者亦用八味地黃湯一料煎湯一碗服當服日即減大半二服愈四服全愈
大瀉之後必多亡陰亡陰既多則元陽亦脫若不急為收止則陰絕陽亡可立而待死當用止瀉之品或

疑邪未去盡如何止住其水黃一邪居中州則腹心之患不可不慮其言則是其理則非吾百大消者乃是純下清水非言下痢也則無止法蓋濁水亦無止法乎故入患水瀉者急宜止過方用白水五錢茯苓二錢車前子北五味酸漿仁各一錢吳茱萸五分水煎服此方止藥少於補藥健脾胃去濕水性分清不取而自收也若純以藥聚之類以清止之而不分清其滔天之勢則阻滯一時勢必潰決反生大害矣

水瀉者人見其如潮而來如瀑而下皆曰宜急止之以免亡陰之患用東穀烏梅之類止之其論則是其治則非也水瀉雖不比痢疾之斷不可止然而水瀉之中亦有不可遽止之病如腹疼重者是有火不比虛寒之瀉也宜用通因通用之法治之方用人參白芍各三錢懷慶車前甘草各一錢治之此方之妙在車前以滑之而佐以懷慶之去積自然有滑皆行况車前性滑滑而能分清水數則水氣自然分開第大瀉之後自然亡陰又用人參以補氣則氣足而陰自生又參入瀉自然熱中又加甘草以和之雖是通因通用之法實乃扶正之方也

大瀉之後雖是水瀉畢竟宜通補之以生其陰瀉一止即宜用四物湯加人參炮薑以溫補而不可謂水瀉忌溫而禁藥用歸熱也

陽虛之火瀉也完穀不化飲食下嘔即出一日或瀉十餘次或數十次或數夜數百大以爲熱也然而熱之生於腎中之水泉不能制火使胃土開門不司於上下也論其勢之急迫奔騰似乎宜治其標然治其標不能使火之驟降必須急補腎中之水使大

有可居之地而後不致於上騰方用熟地白芍各三兩山黃車前甘草茯苓各一兩肉桂三分水煎服此方乃補腎之湯非止瀉之藥也然而止瀉之妙捷如桴鼓蓋腎水一生腎火即降降則應降非好爲苛察而不據實理也若止作虛有火治之神書無功終不若此之捷捷約凡止瀉宜處此方之神哉

凡人大便溏泄小便頻數乃由氣虛身弱飲食不進方用人參一兩茯苓二錢白朮五錢陳皮甘草澤瀉車前子各一錢水煎服此乃病欲下行隨其性而下補之也方用人參爲君者因其胃氣弱爲腎之關關門不開則上之飲食不能入下之糟粕不能出妙在用人參以助胃土而茯苓車前能分清水穀也且胃之性最喜溫和不喜過通過則必上逆而嘔下積而爲矣今順其性而溫補之則飲食自進而大小便各安其位矣此方生胃土以清水穀雖曰不然然而不止生胃土也且能運脾健胃則胃氣益開而脾氣益壯方中最妙用白朮也白朮上利胃而下健脾且能助運以生腎有此大功則大小便得脾胃之氣而能開能關下既通達又何患飲食之不進乎吾見其飽餐而無礙也若服前方而不愈者兼服八味以補土母蓋八味丸最能助大腸利膀胱也

大瀉之後自多亡陰宜以補陰藥治之然而以補陰之藥治之反足增其水勢法當以溫藥補之用熟地白朮人參龜仁各五兩山藥山茱萸各四兩肉桂肉果北五味吳茱萸各一兩各爲末蜜丸如梧子大每日晚飯前吞五錢旬日即愈矣此方之妙不用茯苓澤瀉諸藥之類分清水氣而水氣自然分清蓋補

腎止所以補脾而後治勝於急治也

火瀉者乃火快邪勢將湧脫脾中水穀盡擊而出必欲無爾一絲而後快腹必大痛手不可撲先緩不化飲食下嘔即出健如每馬苦積積運必死亡頃刻盡其病得之於秋之暑熱一遇涼風便起波濤乘風拍浪薄日微天直衝海口而下若不急用大劑治之而尚王通之蓮瀉散不敗乃幸矣方用大黃一兩八錢二兩黃連車前子各五錢甘草一錢水煎服此方之奇全在用大黃既已火瀉何反助其威不知火瀉之證乃火留於腸胃之間若不因勢利導則火不去而水不流故必用大黃以利之也然徒用大黃而不多人參有收無補反致損傷真氣矣至方中又加甘草者畏大黃過於猛退用此緩之也更用車前者分清其水勢也不入於膀胱則大腸增勢而添流今得車前自然引水歸於故道又何至陸地爲水解哉此又善治之妙法也

方
香酒丸
治飲酒成癖骨立不能食但飲酒即吐
噉能甘酢酸 肉桂炒各一兩 麝香五分另研
右爲末陳白米飯丸梧子大每米飲下五十九
大承氣湯
治下利心下平而腹實者
大黃四兩酒洗 厚朴半斤炙去皮 芒硝 合
枳實五枚炙

二八 隨言 卷五

右四味以水一斗先煮 物取五升去滓內大黃
煮取 升去滓內芒硝更上火微煎一二沸分溫
山 下止服

小承氣湯

治下利瀉諸此有燥屎也

大黃四兩 厚朴二兩 枳實大者三枚炙

右三味以水四升煮取一升 合去滓分溫二服
得利則止

梔子散湯

治下利後更煩按之心下滿者為虛煩也

梔子十四枚 香豉四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取
一升半去滓分二服溫服一服得吐則止

通脈四逆湯

治下利清穀裏外熱汗出而脈者

附子人者一枚生用 乾薑三兩強人可四兩

甘草二兩炙

右三味以水 升煮取一升 合去滓分溫再服

黃連湯

治乾嘔下利

黃芩 人參 乾薑各二兩 大棗十二枚

桂枝 兩 芍藥半升

右六味以水七升煮取 升分溫三服

養胃丹

治脾胃不和 食中脘停滯 噯噯逆惡 心腹寒
澀 痢腹痛 腸鳴泄瀉 渴中寒 胃散飲思食

人參三分 丁香 兩半 甘草炙 白豆蔻仁

半夏湯各半兩 乾薑三兩也用乾生薑尤佳

右同為細末煉蜜為丸每兩作一丸每服一丸溫
湯化下空心食前服之或酒噴湯下亦可

養肝散

逐胃中風邪益脾進食凡入虛弱用補藥日久漸
至瘦損食少倦怠大便頻數泄瀉服此無不取效

白朮 白芍藥 白朮 桔梗各四兩

右各生為細末用不入水煎焙研五兩件小片子
或塊子并藥十五錢細切葱白一寸鹽一錢同拌

研令勻以竹簽子作串提火炙香熟咬之米飲送
下空心食前各一服忌勿喫冷水半月必安

黃連丸

治上焦冷下利腹內不安食如飢下

黃連 烏梅肉各八兩 枳心二兩 乾薑

附子 阿膠各四兩 棗皮 芍藥 黃連各三兩

右九味各為末蜜丸如梧子大飲下二十九如平
二十九

黃連煎

治中焦寒濕泄下利或困者服後黃白無度暖
中虛痛

黃連 酸石榴皮 地榆 阿膠各四兩 黃蘗

當歸 厚朴 乾薑各二兩

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓下阿膠更
煎取滓分三服

紫麥湯

治下利肺痛

紫麥半斤 甘草三兩

右三味以水五升先煮麥取一升內甘草煮取
一升半分溫服

阿膠散

治氣利

阿膠粉十枚煨

右一味為散粥飲和頓服

黃蘗止瀉湯

治下焦虛冷大小便閉澀不止

黃蘗 人參 地榆 阿膠各二兩 黃連五兩

右各 煨皮各四兩 炙藥

右八味以水四升 煮取 升去滓下鹽清分
二服

調中益氣湯

治夏月腹中不化

黃芪一錢 人參 蒼朮各五分 朱胡

橘皮 升麻各一分 白芍 一分或二分

右件制麻豆大蜜白 服水 大盞煎至一盞去
粗帶以宿食清盡服之寧心補脾寧必神效蓋病

作四肢厥脈空脈在口是也嗽者減人參

升陽除濕防風湯

治前症

蒼朮泔浸去皮淨四兩 防風 錢 白茯苓

白朮 白芍藥各一錢

右件咬咀除蒼朮另作片子水 梔牛黃至一大
盞內諸藥同煎至一大盞去粗精熟服空心食前

又方

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

注下腹有滿痛鳴嘔及腸胃過毒下如豆汁

或下瘀血日夜無度並宜服之

人參 白茯苓 芍藥 當歸 桂 白芍藥

白木各等分

右為散每服一錢水一大盞入粟米數百粒同煎

至七分去粗稍熱服空心食前小兒服方減之

扶聖丸

治脾胃虛寒腹中痛滿無度飲食不化

大麥蘖炒 神麴炒各四錢 乾薑 薑黃

紅豆各一錢 白木 茯苓 橘皮 半夏

河子皮 炙甘草 烏梅肉各一錢 乾生薑

白芍各五分

右為細末每服散為丸如梧子大每服五十九

白湯送下食前

黃芪補胃湯

治一日大便四次澀而不多有時作瀉腹中鳴

小使黃

黃芪 柴胡 當歸身 益母 橘皮各三分

升麻六分 炙甘草一錢 白芍少許

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗糖煎食

前服之

升陽除濕湯

治自下而上者引而去之

蒼朮一錢 柴胡 羌活 防風 升麻 神麴

澤瀉 猪苓各五分 炙甘草 陳皮白

麥蘖各一錢

右作一服水二盞煎至一盞去粗糖煎食

沉香溫胃丸

治中焦氣弱胃受寒飲食不美氣不調邪積

積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉

足厥逆便利

附子炮去皮膽 巴戟酒浸去心 乾薑炮

茴香各一兩 官桂七錢 沉香 甘草炙

當歸 吳茱萸洗炒去苦 人參 白木 貝蘘

白芍藥 白茯苓 木香各五錢 丁香三錢

右為細末用好酢打糊丸如梧子大每服五七

十九飲下空心食前日進三服忌一切生冷

黃附赤石脂砂丹

治虛寒泄瀉

附子 生乾薑各半兩 陳沙二兩另研

赤石脂一兩半七處

右為細末酒糊丸如梧子大每服十五丸至二十

丸米飲湯下伏各煎湯下尤妙

四風湯

治脾胃不足氣冷來之水澀不化泄瀉注下腹中

虛滿及腸胃受濕下如豆汁或下瘀血日夜無度

並宜服之

人參 白茯苓 芍藥 桂心不見火 當歸

白芍藥 白木 甘草炙

右等分咬咀每服四錢水一盞半入粟米百粒煎

煎至七分去下空心稍熱服

加味五苓散

治伏暑熱 氣及胃氣泄瀉注下或煩或渴或小便

便不利

赤茯苓 澤瀉 猪苓去皮 肉桂不見火

白木各一兩 車前子二兩

右咬咀每服四錢水一盞半入薑五片煎至八分

去澤瀉不拘時候或通米肉丹亦可

火輪丸

治腸胃虛寒心腹疼痛泄瀉不止

乾薑炮 附子炮去皮膽 肉豆蔻剝裏煨

右等分為細末米糊為丸如梧子大每服五十

丸空心米飲送下

白木附子湯

治腸胃虛寒瀉瀉或自汗

白木二兩 附子炮 茯苓各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半入薑七片煎至一

煎至七分去澤瀉不拘時候

黃芪補胃丸

治脾胃虛寒滑泄不寧

黃芪 芍藥 龍骨 附子剝裏煨

單及 乾薑炮 肉豆蔻剝裏煨 附子炮去皮膽

右等分為細末米糊為丸如梧子大每服七十

丸米飲送下食前

加味治中湯

治脾胃不足飲食不節過食生冷腸鳴腹脹泄瀉

注下

乾薑炮 白木 肉桂 縮砂仁各一兩

人參 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半入薑五片煎至一

煎至七分去澤瀉不拘時候或通米肉丹亦可

古今圖書集成

止瀉
寶鉤丸 方見

隔年陳麥麵作餅二兩炒二兩生 荷香五錢
生薑二兩煨一兩生

右為水用煎生薑打細為丸每服五錢白湯下

又方

治前症

滑石水龍夏二兩半秋二兩春冬一兩二錢半
肉豆蔻五兩

右為末飯丸或水調服

法六丸

去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同用並不單用

兼治產後腹痛或自利者能補脾補血亦治血痢

六一散 料 紅粉炒半兩

右為末飯丸每五錢五十九丸白湯下一方打

麴二兩半

大已寒丸

治脾胃虛寒泄瀉

粳麥 肉桂各四兩 乾薑炮 高良薑各六兩

右為末水煮麴丸每三十九丸空心米飲

吞下

八味湯

治命門虛寒泄瀉

吳茱萸湯洗七次 乾薑炮各二兩 陳皮

木香 肉桂 丁香 人參 當歸洗焙各一兩

右剉碎四錢水一盞煎七分溫服

本附湯

治脾胃虛寒泄瀉

甘草二兩炙 白朮四兩 附子炮一兩半

右剉碎每服三錢薑五片棗一枚煎空心服

感應丸

治前症

巴豆七箇去皮心取出油 乾薑炮一兩

杏仁百四十箇湯浸去皮尖研 木香 肉豆蔻

丁香各一兩半

右前四味為末外入百草霜二兩研與巴豆杏仁

七味同和勻用好蠟六兩溶化成汁以重絹濾去

相更以好酒一升拌濕石器內煮蠟數沸取出碎

酒令其蠟自浮於上取蠟隔用香皂餐合用清油

一兩錢內熬令赤沫盡會熱天下酒煮蠟四兩同化

成汁以酒四兩煮乾和油藥末代冬終合用清

油一兩半同煎與成汁和勻藥末成劑分作小

錠子油紙裹乾丸服之每三十九丸空心溫湯下

椒附丸

治命門火衰泄瀉

椒紅炒 桑椹焙炙 訖骨 山茱肉 附子炮

鹿茸酒蒸焙 右為末酒糊丸每六十九丸空心溫湯下

二神丸

治前症

液故紙炒四兩 肉豆蔻二兩半

右為末以大肥棗四十九箇生薑四兩切同煮棗

爛去棗取棗肉研食入藥和丸每五十九丸溫湯下

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大瀉後

調助脾胃

白茯苓 山藥 人參 白朮各二斤 扁豆炒

蓮子 砂仁 荳蔻仁 桔梗炒黃芩各一斤

甘草炙三斤

右為末每服三錢鹽湯調下

對金飲子 方見

治瀉利

草豆蔻炒薑煨 平胃散各五錢 五苓散二錢半

右相合作四服水一盞半煎三片棗一箇煎盡

去粗溫服食前

加減木香散

治瀉利

木香 高良薑 升麻 人參 檳榔各一錢半

神曲炒 錢 吳茱萸炮 肉果煨 縮砂仁

乾薑炮 陳皮各五分

右十一味為粗末每服四錢水一盞半煎至一盞

去粗溫服食前宜加白朮

南白膠香散

治脾胃虛寒泄瀉久為轉腹疼痛無休止

米殼四兩炒 訖骨 南白膠香各三兩

甘草七錢炙 乾薑半兩炮

右五味為粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去

粗溫服食前忌冷物傷胃

玉粉散

治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲食宜服神效

紅豆揀淨 大附子炮去皮粉 乾薑炮各半兩

船上破黃另研二錢半

右四味為末入研藥勻每服二錢空心半稀半稠
寒米飲下至晚又服重者十服必效輕者三五
服安

附了溫中湯

治中寒腹痛自利水穀不化脾胃虛弱不喜飲食
懶言語困倦喘臥

乾薑炮 黑附子炮去皮膽各七錢 人參去蘆

炙甘草 白芍藥 白茯苓去皮 白朮各五錢

草豆蔻煨去皮 厚朴薑炙 陳皮各三錢

右十味咬咀每服五錢或一兩水一盞半生薑五
片煎至一盞三分去粗溫服食前

堅中丸

治脾胃受濕泄瀉注下

黃連 黃蘗 赤茯苓 澤瀉 白朮各一兩

陳皮前白 肉豆蔻 人參 半夏鹽 官桂

白芍藥各半兩

右十一味為末湯浸蒸餅丸如桐子大每服五七
十九溫米飲送下食前

啓脾丸

治大人小兒脾弱五更瀉消渴腹痛定痛常服
生肌健脾益腎

人參 白朮 茯苓 山藥 蓮肉各一兩

陳皮 澤瀉 山柰 甘草各五錢

右為末蜜丸彈子大每一丸空心米飲化下或為
散服亦好

平胃散

平胃散

治脾瀉水瀉便紅下血等證久瀉先行機以此補
之詳效

治諸肚一具去脂膜以大蒜裝滿線縫用冷水熱水
各七碗先將水燒滾入肚煮至水乾為度取湯爛

蒜末 陳皮 厚朴各五兩 川椒少許

右四味同肚再煮至肚黃綠方可為丸梧子大每
服二錢白湯下

調中健脾丸

治脾弱氣虛早洩滑瀉及腹脹久瀉亦宜

白朮 硫黃紙 訶子 肉果各一兩 白茯苓

陳皮各八錢 黃連吳茱萸七錢 木香 厚朴

小茴砂仁 山藥 蓮子各五錢 神麝六錢

右為末粥丸梧子大每七十九蓮子煎湯下

大瀉下丸

治脾胃虛耗及臟腑停滯癰疽疔瘡下利滑數肌
肉消瘦飲食不入氣弱時發虛熱

訶子 附子 肉豆蔻 枳實 牡蠣 訶子

乾薑 赤石脂各一兩半 細辛七錢半 高良薑

右為末餅丸梧子大每服三十九丸米飲下

調子散

治瀉利久不止者

訶子肉一兩半生半熟 木香五錢 甘草

黃連各三錢

右為末無二錢白朮為藥煎湯下

古寇附丸

治風寒濕瀉及老人中氣不足久瀉不止

肉豆蔻二兩 附子一兩半

右為末粥丸梧子大每八十九蓮子煎湯下

衛生湯

治脾胃虛瀉

人參 白朮 茯苓 陳皮 甘草 山藥

澤瀉 黃連 黃蘗 黃連各等分

右水煎服

理中湯

治陽虛瀉瀉瀉有聲瀉瀉瀉

人參 白朮 乾薑炒 甘草炒各三錢半

加茯苓 厚朴薑炙各一錢

右作一服水一鍾生薑三片煎一服至一鍾不
拘時服

調中湯

治腸虛瀉瀉止嘔進食

藳香葉 訶砂仁 蓮木地 乾薑炮 肉桂

茴香炒 草果各一錢 蒼朮 橘紅 麥芽炒

益智仁 神麝炒 枳實 甘草炙各半錢

右作一服水一鍾生薑三片紅棗一箇鹽少許煎
至一鍾不拘時服

肉豆蔻散

治脾虛瀉瀉瀉瀉不食

肉豆蔻七枚每一枚剉一錢納丁香一錢在內以麝
香煨熟去麝不用

右為末分作二服不拘時用米飲湯調下

平胃散

治寒濕瀉瀉

芥木三錢炒 厚朴薑汁製 橘紅各三錢

甘草炙一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不

拘時服

厚朴丸

治泄瀉不止

白龍骨 乾薑炮 附子炮去皮膽 厚朴薑製

河子炮去核 肉豆蔻炮製 陳皮各一兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五七十

九空心米飲下

補脾丸

治滑泄不禁

肉豆蔻炮製 厚朴薑製 白薑炮 赤石脂

白木黃七炒各一兩 神麴炒 附子炮去皮膽

麥蘖炒 薑炭各五錢

右為細末酢煮糊為丸如梧桐子大每服五十九

空心用米飲送下

大養香散

治一切脾胃虛寒心腹振地泄瀉不已最效

藿香 兩 陳皮 厚朴炮製 木香 良薑炒

青皮炮製 白豆蔻炮製 麥蘖炒 神麴炒

河子肉煨 白豆蔻仁 人參 甘草炙各半兩

白乾薑炮 錢

四聖丸

肉豆蔻生二兩 破故紙炒四兩 木香不見火

荷香炒各一兩

右為細末生薑煮肉為丸如梧桐子大每八九

十九空心用鹽湯送下一方去荷香木香用神麴

麥蘖各炒一兩為丸

豆附丸

治腸胃虛弱內受風寒水穀不化泄瀉注下

肉豆蔻炮製 附子炮去皮膽 白茯苓各四兩

肉桂 木香 乾薑炮各二兩 丁香一兩

右為細末薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服五

七十九或至一百丸用生薑湯送下粥飲亦可

藥附丸

治臟腑寒清泄

端正大附子一箇 乾薑半斤

右同於銀石器中用水於慢火煮上甬水二指計

水乾旋添湯煮兩三時取出切作半箇再煮候至

乾爲末別製麝香肉和丸如梧桐子大每服四十

十九空心用米飲下忌酒並寒涼者服之皆愈

實錄九

治腸胃虛弱腹泄瀉時時刺痛

黃連一兩 肉豆蔻麝香煨 乾薑炮 白茯苓

當歸焙 阿子煨去核 丁香各半兩 木香一分

右爲細末用酒磨汁並麝香和丸如梧桐子大每

服五十九空心用米飲下

藥附丸

治腸胃虛寒泄瀉無度不進飲食

生薑黃四兩研粉 乾薑炮 附子炮去皮臍

鹿角霜 肉豆蔻麝香煨 山藥各三兩

右爲細末麝香爲丸如梧桐子大每服三十九丸

加至五十九丸用溫水飲下空心食前服

黃連烏梅丸

治飲食不節寒熱不和風邪侵襲臟腑之間致腸

胃虛弱泄瀉腹鳴腹瀉影脈裏急後重日夜頻仍

不思飲食

黃連 阿膠蛤粉炒成珠 當歸洗淨各二兩

人參 龍骨炭 赤石脂 乾薑炮 白茯苓

烏梅肉焙乾 陳皮去白 阿子去核 木香

肉豆蔻麝香煨 山藥各三兩

右爲細末用麝香爲丸如梧桐子大每服五十

丸食前米飲送下如腹痛當歸煎湯下下血地榆

煎湯下

藥附散

治臟腑久虛寒滑泄不止久食白生白帶

用椒去目炒出汁 商各半 肉豆蔻麝香煨

砂仁 丁香 木香各半兩 附子炮去皮臍

白木各一兩入生薑四兩用酒煮十數沸乾

右爲細末每用二錢用酒煎服或子煎一兩切作

片十批開擦藥水在內使用好紙三兩重裏於慢

火烘乾研取取出細嚼用酒送下不拘時候

換湯丸

治泄瀉不止及赤白痢

木香 阿子皮 白芍藥 高麗去蘆炒 人參

白茯苓去皮 白木土炒 甘草炒各一兩半

御木殼去節常搗碎微炒淨汁二兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十九用

生白薑絲鹽各少許拌勻用紙裹木炭火煨

熟却用生薑煮蜜送下食前日進一服

又方

摩下千種下利夏太守用此法療愈

黃連 黃蘗 吳茱萸 附子炮 甘草炙各一兩

烏梅下枚取肉煮乾二兩

右七味湯水煎丸如大豆服十丸漸至一十九日

忌肥肉生冷一方無附子甘草煮成一方除日

草附子

諸藥丸

治元氣久冷泄瀉不可飲食不進漸至危困

硫黃研 吳茱萸炒各一兩 厚朴一斤 乾薑炒

用豬膩一投洗淨入硫黃末在內攪勻兩兩用

醋五升同入磁瓶內鹽泥固濟用炭火一盞煎

酢乾爲度夾開瓶合固火入木炭一處同煎丸

如乾了大每服十丸空心溫酒送下

阿子皮散

治腸胃虛寒泄瀉水穀不化腹脹痛數日作

血日夜無度

阿子煨七分 乾薑炮六分 吳茱萸炒五分

橘皮各半升

右爲細末分作一服水一盞和子煎服

空心再服至愈

肥腎散

治水瀉腹痛不納飲食

龍骨 當歸 肉豆蔻麝香煨 木香各半兩

厚朴二兩去粗皮蜜炙

右爲細末每服一錢食前用酒飲調下

代豬丸

治水瀉腹痛腸鳴

附子炮去皮臍三分 代豬石散 乾薑炮

龍骨各一兩

右爲細末研散飯後丸如梧桐子大每服一十九

空心用米飲湯送下日三四服

如聖丸

治水瀉腹痛

本草綱目卷之九

漢豆 烏頭端正大薯炮製去皮各等分

右為細末新水和丸如菜豆大分砂為末每服五丸不拘時白痢乾瀉下赤痢甘草湯下赤白痢乾瀉甘草湯下小為新滾水下小兒服二九

胸瀉湯

治水瀉不止

烏梅 罌子各十箇非去核 罌子各一箇去蒂新右到細末每服二錢水一盞煎七分去滓不拘時溫服

紅豆丸

治腹瀉瀉瀉名為治瀉

紅豆 蓮香 檳榔 蓮木煨 鬱金 橘紅 半夏湯洗七次 縮砂仁各一兩半 高良薑

單發各一兩 丁香不見火半兩 硝砂一錢許化右為細末水調糊為丸如梧桐子大每服一百丸用米飲或鹽湯空心送下病甚者日連三服

高良薑湯

治腸胃受風久為瘧泄下利嘔逆腹內疼痛高良薑 木香 檳榔 赤茯苓 人參各三分

肉豆蔻去殼 吳茱萸湯洗焙炒 陳皮去白焙縮砂去皮各半兩 乾薑一分

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分不拘時日服

乾薑丸

治腸胃風冷瘧泄下腹瀉不止

乾薑 厚朴去粗皮煎汁炙 當歸燒各二分

阿膠炙 訶骨煨各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一十九空心用鹽湯下日再服

加減木香散

內傷白濁氣有下則生而泄久則入中則為

脾風脾風大瀉胃土也其氣冲和以化萬事今清

氣下而不升則風邪久而下則生木賊土也致中

即之氣不能化而物定出謂之泄瀉或飲食大

過腸胃所傷亦致水穀不化此俗呼木賊也法

寒下者藥之而解清熱此方主之

木香 厚朴 枳實 檳榔 人參各七錢半

肉豆蔻煨 吳茱萸湯洗 陳皮醋白 同

乾薑炮各半錢 神曲一錢半

右為細末每服四錢水一盞半煎至一盞半洋食前溫服

肉豆蔻散

治腸胃受風瀉不止

肉豆蔻去殼煨 訶骨粉煨去核 黃連各三分

炙甘草 赤茯苓去皮 乾薑炮 白木各半兩

厚朴去粗皮薑汁炙一兩

右為細末每服二錢空心米飲調下日一

食前服

治飲食生冷內受風寒泄瀉無度

川椒四兩 乾薑炮 附子炮 縮砂仁各半兩

肉豆蔻二兩 小茴香四錢炒

右為細末用白子附二三兩或煎豬肝或豬羊腰

子批開放藥末三四錢在內鹽一錢葱白二莖同

煎用內一處用濕紙裹燒香熱空心食前細嚼用

生薑湯或米湯或酒送下

訶骨黃連湯

治大便滑泄色如驚瀉

訶骨 黃連炒各三分 當歸切焙 乾薑炮

甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去渣食前服

眼目再

木香訶骨散

治瀉瀉大腸切痛腸鳴食不化

木香半斤半炒 高良薑炒 肉豆蔻去核

白木各一兩 官桂去粗皮 薑黃炒各一兩半

附子炮去皮膽 厚朴去粗皮薑汁炙各一兩

甘草炙半兩 乾薑炮一分 訶骨粉煨去核一分

右為細末用陳醋末調糊為丸如梧桐子大每服

二十九食前生薑湯送下

寒更斷下丸

治瀉瀉腹痛瀉不止其效

吳茱萸二兩半炒 赤石脂 川乾薑各半兩

艾葉炒 砂仁 肉豆蔻 附子炮去皮膽各一分

右為細末鈔糊為丸如梧桐子大每服五七十九

食前用米飲送下

豆蔻附子散

治腸胃久寒大腹虛滑瀉泄

木香半斤 肉豆蔻煨 附子去皮膽鹽炒

縮砂去皮半兩 右為細末每服一錢食前用米飲調下

因腸散

五入一圖書集

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水澀不分冷熱
不瀉下痢膿血赤少白黃或如魚腦腸腹痛瀉
數瀉併心腹脹滿食減乏力並宜服此
肉豆蔻生 粟殼去蒂並薑炙各二兩 訶薑炮
甘草炙各二兩半 陳米炒十二兩 木香一兩
石為細末每服二錢酒一盞生薑二片煎一校煎
至七分不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒
魚腥等物
加味三建湯

治瀉不止
大川烏 天雄二味並炮鹽水浸去皮酥
木香 肉豆蔻煨 訶子鈔裏煨去核各一兩
右剉散每服三錢水一盞生薑十片紅棗二枚鹽
梅一兩陳米一撮煎六分空心服
張氏建中湯

治脾胃虛弱口乾舌燥喉痛咽乾渴飲水食
而下瀉之症手足厥冷面色青白上瀉或中
滿氣短常服此中健胃養胃自消
附子 川烏並炮去皮燂 胡椒 艾醋清酒
桂心 乾薑炮 良薑炒 厚皮各三分
右為細末煎麥糊和丸如梧桐子大每服五十九
漸加至二百丸空心食前用水飲吞下
精氣丸

治虛寒泄瀉飲食不進氣虛倦忘
果菜黃連去枝性不酌多少水浸透
右用鹽豬膽一截去脂煎淨洗將果菜入藥內
兩頭用線紮定慢火煮令林薄用鹽酒煮九煎

味於日內楊子下合桃細丸如梧桐子大每服五
十九食前米湯下
大腹木香湯
治胃寒腸腹脹滿瀉
大腹子 製半夏焙 木香各二兩 枳殼煨炒
前胡 白甘 白朮 肉桂 橘紅焙各一兩
延胡索 當歸焙 旋覆花 柴胡 白芍藥
甘草炙各半兩 乾薑炮 人參各三分
右咬咀每服三錢水一盞生薑三片紅棗二枚煎
至六分去滓食前稍熱服
大橘皮湯
治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩
橘皮 茯苓各一兩 木香一分 滑石六兩
瀉心三錢 豬苓 澤瀉 白朮 官桂各半兩
甘草二錢
右為末每五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓
溫服小便澀先服十錢湯 日後再服此藥
桂苓白朮丸
治水腫熱泄瀉瀉不能止者服之利止虛度隨症
調之
肉桂 乾生薑各一分 茯苓 半夏各一兩
白朮 橘紅去白 澤瀉各半兩
右為末餅糊為丸如小豆大生薑湯下三十九
日三服尚在腸中食後在下食前在中不時候
一法更加黃連半兩黃芩 兩水丸取效金妙
防風芍藥湯
治濕利便下身熱微渴腹痛瀉及頭痛微汗
防風 芍藥 黃芩各半兩

防風 芍藥 黃芩各半兩
右咬咀每半兩或一兩水一盞煎一盞溫酒服
白朮芍藥湯
治泄瀉腹痛諸症
白朮 芍藥各 兩 甘草五錢
石到香 兩水 煮酒半 薑湯清溫服
蒼朮芍藥湯
治泄瀉腹痛微瀉者
蒼朮二兩 芍藥 兩 黃芩半兩
右剉每服一兩加煎陳桂半錢水一盞半煎至
溫溫服
何子散
治虛寒泄瀉
訶子去核一兩半生薑 木香半兩 黃連
甘草各三錢
右為細末每服 錢以白朮芍藥湯調下如止之
不已再服子散如早 兩兩其氣虛瀉久
不愈者多服幾劑則入心內除其為鬼邪先
以厚朴枳實為導其後服也
養水散
治瀉如木身身口 身虛冷脈微而弱氣少
血不能語其甚者加此此謂急病治之宜此
半錢二兩湯下 四錢 乾薑 桂枝
甘草炙各五錢 諸藥一錢半
右為細末每服二錢鹽水一盞煎至一盞和清熱
湯其苦一兩服者 諸藥一錢半 桂枝 枳實
大橘不能開卒然瀉下大小瀉九色其中或有