

常用中草药彩色图谱

第三册



广东人民出版社

说 明

1. 本册共收载广东出产的主要中药材 365 种，其中植物药 292 种，动物药 60 种，矿物药 13 种。

为配合药材收购工作，本册介绍的每种药材以名称、来源、植物形态、分布与生境、采收与加工、商品性状鉴别、性能与用途等七项进行记述，而与第一、二册稍有不同。

2. 所载药材名称，凡与《中华人民共和国药典》一部（1963 年版，正文中简称为《药典》）所载名称属同名异物的，均在附注项加以说明。

3. 几种药材取自同一种植物或动物的，为节省篇幅起见，一般采取合并记述，而在目录中分类列出。

4. 中名索引中，凡药材的广东惯用名称均用黑体字；属于动物药的，加注“*”号；属于矿物药的，加注“△”号；其余植物药名不另标注。

5. 初稿承广东省中医学院、广东省药品检验所、南海海洋研究所提出宝贵意见，并经广州市、海南行政区及广东省各地区药品公司组织药材主产地有关同志进行修改、补充，使书稿内容更适合实际需要。对此，我们表示感谢。

6. 由于我们学习马列主义、毛主席著作不够和业务水平所限，书中难免有缺点或错误，望广大读者批评指正。

编 者

一九七三年十一月

目 录

一、全草类 1

广东刘寄奴.....	2
土公英.....	4
土茵陈.....	6
山茨菇.....	8
小金牛草.....	10
毛麝香.....	12
石韦.....	14
石蚕干.....	16
石斛.....	18
环钗.....	18
金钗.....	24
黄草.....	26
金黄泽.....	32
白花蛇舌草.....	34
白薇.....	36
仙鹤草.....	38
灯芯花.....	40
地丁.....	42
防风草.....	44
声色草.....	46
灵香草.....	48
鸡骨草.....	50
析艾.....	52
卷柏.....	54

青天葵.....	56
青蒿.....	58
泽兰.....	60
金耳环.....	62
金钱草.....	64
穿心莲.....	66
香薷.....	68
独脚金.....	70
鬼羽箭.....	72
孩儿草.....	74
益母草.....	76
浮萍.....	78
淡竹叶.....	80
淫羊藿.....	82
蒲公英.....	84
豨莶草.....	86
察刁竹.....	88
薄荷.....	90
藿香.....	92
瞿麦.....	94

二、根和根状茎类 97

广东升麻.....	98
三七.....	100
干姜.....	102
姜皮.....	102

土茯苓	104
土地骨	106
大小蓟	108
山奈	110
山药	112
川芎	114
千年健	116
千斤拔	118
元胡	120
天门冬	122
天花粉	124
木防己	126
木香	128
巴戟天	130
丹参	132
乌药	134
牛大力	138
玄参	140
半夏	142
半枫荷	144
石菖蒲	146
龙胆	148
玉竹	150
北沙参	154
白术	156
白及	158
白芍	160
白芷	162
白茅根	164
白前	166

白蔹	168
生地	170
仙茅	172
地榆	174
百部	176
红大戟	178
走马胎	180
麦门冬	182
杜牛膝	186
芦根	188
牡丹皮	190
附子	192
泽泻	194
板蓝根	196
苦参	198
贯众	200
金果榄	202
狗脊	204
姜商陆	206
姜黄	208
郁金	208
前胡	210
首乌	212
南沙参	214
威灵仙	216
香附	218
独活	220
高良姜	222
党参	224
粉防己	226

桔梗	228
骨碎补	230
柴胡	234
狼毒	236
射干	238
常山	240
葶藶	242
黄连	244
黄精	246
黄藤	248
排草	250
续断	252
芫根	254
葛根	256
黑老虎	258
紫菀	260
榕树须	262
糯稻根	264
露兜根	266
川乌	192
桑白皮	344
金樱根	444
藕节	480

三、茎、枝与树皮类.....269

丁公藤	270
十大功劳	272
木通	276
白花茶	280
石楠藤	282

竹茹	284
沉香	286
杉树寄生	288
杜仲	290
苏木	292
皂角刺	294
鸡血藤	296
枫香寄生	298
侧柏	300
垂丝柳	302
降香	304
厚朴	306
钩藤	308
络石藤	314
海风藤	316
桂皮	318
桂枝	318
鸭脚皮	320
桑寄生	322
黄柏	324
檀香	326
夜交藤	212
桑枝	340
苏梗	342
海桐皮	348
相思藤	460
金沙藤	474

四、叶类.....329

龙脷叶	330
-----	-----

布渣叶	332
青药	334
枇杷叶	336
苦灯茶	338
桑叶	340
紫苏叶	342
大青叶	196
常山叶	240
桂芋	328
莲叶	478
莲梗	478

五、花类

丁香	346
木棉花	348
合欢花	350
沙葛花	352
佛桑花	354
谷精子	356
鸡冠花	360
鸡蛋花	362
闹羊花	364
金银花	366
南豆花	368
剑花	370
素馨花	372
旋复花	374
菊花	376
野菊花	378
葛花	380

槐米	382
茅根花	164
厚朴花	306
佛手花	432
春砂花	470
莲蓬	482
莲花	482
莲须	484
槟榔花	498
橘红花	500

六、果实和种子(孢子)类

.....385

广枣	386
大风子	388
马钱子	390
川楝	392
千层纸	394
女贞子	396
王不留行	398
木患子	400
木鳖子	402
巴豆	404
水柿蒂	406
乌梅	408
牛蒡子	410
石榴皮	412
冬瓜仁	414
丝瓜络	416
红豆蔻	418

补骨脂	420
诃子	422
枳果核	424
花椒	426
苍耳子	428
吴茱萸	430
佛手	432
陈皮	434
屈头鸡	436
青皮	438
苦石莲子	438
罗汉果	440
使君子	442
金樱子	444
草决明	446
草豆蔻	448
荔枝核	450
柚核	452
柚橘红	452
枳实	454
枳椇	456
枳壳	458
相思豆	460
南山楂	462
南天仙子	464
夏枯草	466
春砂仁	468
香橼	470
益智仁	472
海金沙	474

桃仁	476
莲子	478
莱菔子	480
黄皮核	482
梨皮	484
莲心	484
路路通	486
蔓荆子	488
槟榔	490
樟木子	492
樟木扣	492
鹤虱	494
橘红	496
橙皮	498
橘红胎	500
茺蔚子	76
栝蒌皮	124
栝蒌仁	126
皂角	294
桂子	328
桂盅	328
苏子	342
桑椹子	344
母丁香	346
槐角子	382
橘络	434
柑核	436
榔干	490
大腹皮	494
枣槟肉	494

大腹毛	498	血余炭	540
七、树脂与其他内含		全蝎	542
物类	501	土鳖虫	542
儿茶	502	牡蛎	544
安息香	504	龟板	546
竹黄	506	鸡内金	548
青黛	508	夜明砂	550
白胶香	486	虎骨	552
八、藻类和菌类	511	豹骨	554
马勃	512	罗仙子	554
红古菌	514	金沙牛	556
昆布	516	金蝉花	558
茯苓	518	蝉蜕	558
茯苓皮	518	珍珠	560
海藻	520	淡水珍珠	560
雷丸	522	珍珠贝壳层粉	562
九、动物类	525	玳瑁	562
山甲片	526	珍珠母	564
牛虻虫	528	家狗鞭	564
牛黄	530	海螺厝	566
合成牛黄	530	瓦楞子	566
石决明	532	海螵蛸	568
白花蛇	534	海麻雀	570
地龙	536	海龙	572
水蛭	536	海马	574
竹蜂	538	海嘴	574
斑蝥	538	盐蛇干	576
		蚕沙	578
		僵蚕	578
		桑螵蛸	580

游虫珠	580
蛇蛻	582
鹿茸	584
蛤蚧	586
蛤壳	588
鹅管石	588
蛤蟆干	590
紫河车	592
鹿角	592
鹿角胶	592
紫贝齿	594
白贝齿	594
猴骨	596
猴子肉	596
人中白	597
蜚壳	598
蜂房	600
鳖甲	602
鱈鱼鳃	604
麝香	606

十、矿石和化石类.....609

马赭石	610
石英	610
磁石	612
石蟹	612
自然铜	614
赤石脂	614
禹粮石	616
无名异	617
浮海石	618
花蕊石	620
钟乳石	620
寒水石	620
琥珀	622

中名索引.....625

拉丁名索引.....644

一、全 草 类

广东刘寄奴

(鸭脚艾、珍珠花菜)

来源 本品为菊科 (Compositae) 植物甜菜仔 (*Artemisia lactiflora* Wall.) (图〇〇一) 的全草。

植物形态 多年生、直立草本，高达2米，有香气；茎粗壮，具纵条纹。叶纸质，长4~15厘米，宽3~12厘米，羽状分裂或羽状深裂，裂片卵形或顶端一片为长圆形，边缘有锯齿。头状花序多数，直径约4毫米，排成疏散的圆锥花序；总苞片多层，外层的较小，边缘均为膜质，花托无毛；花白色，秋季开，全为管状，外围一层雌性，其余均为两性。瘦果小，有细纵纹，无冠毛。

分布与生境 分布长江以南各省、区；广东各地都有，以北部较多。生于路旁、林边湿润地方。

采收与加工 夏秋季未开花时采收地上部分，晒干。

商品性状鉴别 茎圆柱形，有纵棱，黄绿色或褐色，质脆易断，断面纤维性，中间为白色髓，叶较完整。以身嫩叶多、色青绿、茎细不带根者为佳。

性能与用途 甘、淡、微苦，平。破血通经，消积除胀。主治慢性肝炎、肝硬化、闭经、肾炎水肿、皮肤湿毒。用量3~6钱。孕妇忌服。

附注 汕头地区用菊科植物大泽兰 (*Eupatorium chinense* Linn.) 的地上部分作刘寄奴。



图〇〇一 甜菜仔

土 公 英

(药丸草)

来源 本品为菊科(Compositae)植物地胆头(*Elephantopus scaber* Linn.) (图〇〇二)的全草。

植物形态 多年生草本，高30~40厘米，全株被白色紧贴粗毛，茎粗壮，二歧分枝。叶大部分基生，匙形或长圆状倒披针形，长6~14厘米，两面均有长硬毛，边缘有浅齿。头状花序小，有花4朵，成束聚集于枝顶排成复头状花序，基部有3片卵形、长约1厘米的叶状苞片，总苞片质硬，顶端尖刺状；花秋冬开，淡紫色，全为两性、管状花，花冠4等裂，裂片扩展。瘦果纺锤形，有棱，顶端有硬刺毛，基部扩大。

分布与生境 我国南部各省、区均有分布；广东各地均产。多生于田埂、路边、林旁或空旷草地上。

采收与加工 全年可采，夏秋季开花前为宜。采收全草，洗净，晒干。

商品性状鉴别 全体被白色粗毛。茎短，丛生须根，呈灰黄色。根生叶比茎生叶大，叶面青绿色，叶背灰绿色，常皱卷成长条状，边缘具疏锯齿或不明显；茎自叶丛中抽出，直而硬，扁形。气微，味苦。以色青绿、不带花茎、无杂质者为佳。

性能与用途 苦，寒。清热解毒，止咳利尿。主治感冒、流感、伤暑腹痛、急性胃肠炎、菌痢、扁桃腺炎等症。用量0.3~1两。

附注 广东梅县、汕头等部分地区所用的地胆草为同科、属的白花地胆草(*Elephantopus tomentosus* Linn.)，它的特点是植物多分枝，叶茎生，花白色。



图〇〇二 地胆头

土 茵 陈

(白花茵陈)

来源 本品为唇形科(Labiatae)植物牛至(*Origanum vulgare* Linn.) (图〇〇三)的全草。

植物形态 多年生直立草本，高达60厘米，上部常分枝。单叶对生，卵形至卵圆形，长1~3厘米，顶端通常钝，基部圆，两面有腺点和微毛。秋季在上部叶腋和枝顶生伞房状圆锥花序；花小，长约5毫米，紫色，二唇形，上唇直立。小坚果褐色，光滑，藏于宿萼内。

分布与生境 广布于我国大部分地区，广东见于东部和北部，以韶关地区的北部较常见。常生于路边、山谷和山坡上。

采收与加工 夏季采收地上部分，晒干。以未开花前采收为宜。

商品性状鉴别 茎类方柱形，少分枝，灰绿色，被白色短柔毛，质脆易折断，断面黄绿色，中空，多节。叶对生，叶片多皱缩，叶柄和叶脉都有疏柔毛，叶面黄绿色，叶背灰绿色，质脆易碎易脱落。气芳香，味辛凉而微苦。以幼嫩、叶多、青绿色、不带根者为佳。

性能与用途 苦，寒。清湿热，利水。主治黄疸、湿滞腹痛。用量0.5~1两。



图〇〇三 牛至

山 茨 菇

来源 本品为马兜铃科 (Aristolochiaceae) 植物土细辛 (Asarum sagittarioides L.F.Liang) (图〇〇四) 的全草。

植物形态 多年生草本；根状茎匍匐；根肉质，多数，丛生，棕色，直径约 2 毫米。叶有长柄，纸质，卵形至戟形，长 10~20 厘米，宽 8~12 厘米，顶端渐尖，基部深裂，裂片钝三角形或近卵形，极叉开，上面绿色，中部常染灰白色斑块，下面浅绿色，两面叶脉上被短柔毛或近无毛。花早春开放，单生茎顶，花梗长 1~1.5 厘米；花被管长 2.5~3 厘米，中间缢缩，向上扩展，红带绿色；裂片 3，宽卵形，顶端短尖，基部具暗红色斑纹，喉部有白色海绵状物；雄蕊 12 枚，近无柄，花药卵形，药隔舌状突出；花柱 6，分离几达中部，柱头 2 裂。

分布与生境 我国南部；广东以肇庆、湛江、韶关的部分地区较常见。生于溪边、林下阴湿处。

采收与加工 夏秋季采收全草，洗净，晒干。

商品性状鉴别 叶根生，卵状，具长柄，常皱缩，青绿色或青褐色。叶柄及叶脉可见灰白色短茸毛。根簇生，细条状，表面灰白或灰黄色，断面粉白色。根稍具辛香气，味苦辛，微有麻舌感。以根叶齐全、色青黄、根断面粉白色、味辛辣者为佳。

性能与用途 辛，温。祛风散寒，解毒止痛。用量 1~2 钱。

附注 广东北部 (乐昌、连县) 产的山茨菇为同属的另一种植物大叶细辛 (Asarum magnificum Tsiang)，它的特点是叶厚革质，卵状三角形，花大，须根粗壮。