


高等学校理科教材

近世代数

熊全淹 编著



武汉大学出版社

高等学校理科教材

近 世 代 数

熊全淹 编著

武汉大学出版社

1995

近 世 代 数

熊全淹 编著

*

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省通山县印刷厂印刷

(437600 湖北省通山县通羊镇南市路 165 号)

新华书店湖北发行所发行

*

850×1168 1/32 11.875 印张 304 千字

1963 年 10 月上海科技第 1 版 1978 年 8 月上海科技第 2 版

1984 年 9 月本社第 1 版 1991 年 12 月本社第 2 版

1999 年 8 月第 2 版第 8 次印刷

印数:18001-- 21000

ISBN 7-307-00856-4/O · 74

定价:10.80 元

本书如有印装质量问题,请寄承印厂调换

范德瓦尔登氏名著
《近世代数学》1937年
再版后，武汉大学故教
授萧君绛先生率先译教
并自筹资出版。熊全淹
教授师承萧先生留校授
《代数学》多年，其讲稿
累经推敲、修改、增删逐
渐形成本书。在本社新
2版中增设模与代数一
章并尽可能在适当的
地方兼蓄若干近代发展的
成果。前四章介绍群、
环、体、模的基础理论，
后四章再作深入的论
述。全书注重阐明思路、
详尽推理、深入浅出、顺
其自然。在所谓“代数
化”的今天，尤利于初学
者用。

本书获1988年国
家教委高等学校优秀教
材二等奖。

责任编辑 夏天安

封面设计 马重慧

内 容 提 要

本书系统地介绍近世代数的基本理论. 全书共八章. 前四章对群、环、体、模的基础理论作一般的介绍, 后四章则作进一步较深入的论述. 每节后附有习题, 每章后列有参考文献. 书末附有习题解答, 供读者参考.

本书叙述由浅入深, 推理详尽, 便于阅读, 可作为高等院校数学系大学生和研究生近世代数课的教材或教学参考书, 也可供广大教师和数学工作者参考.

第二版前言

这次修改主要是充实模的内容,除在新增加的第4章 § 4.1 中系统地介绍外,在其他有关章节也适当补充,目的在介绍模的最基本的概念及性质,供读者阅读其他代数参考书之用.因为在本书对模的引用不多,所以不作更多的论述.此外简化了某些定义,改写了某些证明,改正了一些错误,还适当增补了一些内容,各章都有变动,大小不一.

新添了第4章,其中第2节是从以前的 § 4.4 搬来的,其它章节仍旧没有变动.这样全书共8章,前4章是群、环、体、模的基本介绍,后4章是它们较深入的论述.

这次改动承副教授谭季伟同志提出了很多宝贵意见,使本书生色不少,附此志谢.

熊全淹

1990年12月,时年八十

于珞珈山武汉大学

第一版前言

本书较系统、全面地介绍近世代数的基本理论,作为高等院校数学系学生的基础读本,在内容选择上,力求简明扼要,避免涉及一些过于艰深的问题,以求达到加深基础理论的认识.在次序编排上,大体参照范德瓦尔登著《近世代数学》一书.

本书自成系统,论述由浅入深,推理详尽,读者不必参考其它书籍就可顺利阅读.每节后附有习题,有些习题提出了一些重要概念和问题,读者宜加注意.书末附有解答,供读者校核.每章后列出了适当的参考文献,其中有些表明近代发展情况,也有不少选自 Amer. Math. Monthly 杂志上的短文;后者内容大都不太困难,读者如有可能,望选择阅读,以加深基本功的训练,增强解决问题的能力.

本书是根据多年来武汉大学数学系的《近世代数讲义》改编而成.1963年第一版和1978年第二版都由上海科学技术出版社出版,此次第三版则由武汉大学出版社出版.他们对本书出版的鼓励和支持,编者表示衷心感谢.

这次改版变动较大,主要是简化了一些定理的证明、添加了一些内容、改正了发现的错误、改写了某些节段,但仍保留了全书的结构.本书屡经修改,质量虽有所提高,但限于编者水平,缺点和错误仍在所难免,敬请读者惠予指正.

本书初版、二版以来,承蒙广大读者爱护,提出了不少宝贵意见,使得本书在修订改版中得以改进,在此一并谨表谢忱.

熊全淹

1983年10月

于珞珈山武汉大学

目 录

第 1 章 基本概念	1
§ 1.1 集合	1
§ 1.2 映射、分类	5
§ 1.3 自然数、数学归纳法	12
第 2 章 群	15
§ 2.1 群的概念	15
§ 2.2 子群	24
§ 2.3 正规子群	35
§ 2.4 同构	46
§ 2.5 同态	56
第 3 章 环与体	63
§ 3.1 环的概念	63
§ 3.2 体的概念	72
§ 3.3 同态、同构	77
§ 3.4 分式域	83
§ 3.5 多项式环	88
§ 3.6 理想	95
§ 3.7 理想的运算	102
§ 3.8 极大理想、质理想	108
§ 3.9 主理想环中元素的因子分解	113
§ 3.10 多项式的零点	121
第 4 章 模与代数	129
§ 4.1 模	129
§ 4.2 代数	138
第 5 章 域论	145
§ 5.1 添加	146
§ 5.2 质域、特征数	147
§ 5.3 单扩张域	151

§ 5.4	代数扩张体	158
§ 5.5	分裂域、正规扩张域	160
§ 5.6	可离扩张域、不可离扩张域	167
§ 5.7	有穷次扩张域的单纯性	177
§ 5.8	有穷体	180
§ 5.9	超越扩张体	188
第 6 章	群论	199
§ 6.1	算子	199
§ 6.2	同构定理	205
§ 6.3	正规群列	209
§ 6.4	直积	217
§ 6.5	交换群	230
§ 6.6	可迁群、非迁群	239
第 7 章	伽罗瓦理论	246
§ 7.1	伽罗瓦群	246
§ 7.2	伽罗瓦理论的基本定理	254
§ 7.3	正规底	261
§ 7.4	多项式能够用根号解出的条件	267
§ 7.5	多项式的解	272
§ 7.6	用圆规与直尺的作图	276
第 8 章	环论	280
§ 8.1	阿丁环	280
§ 8.2	幂零理想	286
§ 8.3	半单环	291
§ 8.4	单环	298
§ 8.5	贾柯勃逊根基	305
§ 8.6	次直和	317
§ 8.7	本原环、稠密环	321
习题答案		332
名词索引		361

第 1 章

基 本 概 念

本章简单地介绍集合、映射、分类等基本概念,并且解释记号 $\in, \subset, \supset, \cap, \cup, \{\dots\}$ 等的意义,作为以后各章的准备.

§ 1.1 集 合

数学中讨论的对象,如代数中的数、矩阵,几何中的点、直线等,我们现在统统叫做**元素**,有时就简单地叫做**元**.若干个(有穷个或无穷多个)元的集体,叫做**集合**,或简单地叫做**集**.

我们要知道一个集,必定要知道其中所有的元,也就是说,我们对于任意一个元,要能够判别它是否在这个集中.譬如,所有整数组成一个集,因为我们随便拿一个数来,都可以判别它是否是整数,这个集又叫做**整数集**,我们用 $\mathbb{Z}$ 来表示.

一个集都有自己的特性,譬如,整数集中任意元,都有整数这个特性.平面上所有点组成的集与平面上所有圆组成的集都各有各的特性.因此,对于一个集,我们可以用它的特性来判别任意元是否在它里面.

任意一个元 a ,如果它有集合 M 的特性,也就是说,它是 M 中元时,我们就用记号

$$a \in M$$

来表示.如果它没有集合 M 的特性,也就是说,它不是 M 中元时,我们就用

$$a \notin M$$

来表示. 有时, a 在 M 中我们也说 a 属于 M , 或者说 M 包含 a . 同样, a 不在 M 中我们也说 a 不属于 M , 或者说 M 不包含 a . 一个集所包含的元假如是有穷个, 就叫做有穷集, 否则就叫做无穷集. 一个集所包含的元的个数, 叫做这集的元数或浓度. 有穷集的元数当然是正整数.

集合可以用列举其中所有元来表示, 譬如, 整数集 Z 可以写成 $Z = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$, 或

$$Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

一般, 假如 M 含元 $a, b, c, \dots$, 我们就用记号为

$$M = \{a, b, c, \dots\}.$$

通常一个集都含有一个以上的元, 但是当它只含一个元时, 这个集就与它所含的那唯一一个元常常不加区别. 为了叙述方便, 我们便假定不包含任何元的也成为一集, 叫做空集, 它的元数是零. 譬如, 大于 1 而小于 2 的整数集合就是空集.

假如集合 N 中所有元都是集合 M 中元, 也就是说, N 是 M 的一部分, 或者说, 任意一个元, 如果它有 N 的特性, 它一定也有 M 的特性, 那么 N 就叫做 M 的子集, M 又叫做 N 的包含集. 我们用记号 $N \subseteq M$ 或 $M \supseteq N$ 表示. 子集与包含集的关系可以用图形(图 1.1)来说明.




图 1.1

有穷集的子集是有穷集, 无穷集的包含集又是无穷集.

为了方便, 我们假定任意集都包含空集. 再从 $A \subseteq B$ 及 $B \subseteq C$, 我们就得到 $A \subseteq C$.

假如 M 中所有元都属于 N , 同时 N 中所有元又都属于 M , 即

$$M \subseteq N, N \subseteq M,$$

也就是说, M 与 N 的特性完全相同时, 我们就说 M 与 N 相等, 用记号

$$M = N$$

表示. 假如 $N \subseteq M$, 但 M, N 不相等, 那么 N 就叫做 M 的**真子集**, M 叫做 N 的**真包含集**, 用记号

$$N \subset M \text{ 或 } M \supset N$$

表示, 这时 N 中所有元都属于 M , 但 M 中至少有一个元不属于 N .

上面, 我们介绍了集合的基本概念, 现在介绍它的三个结合法.

定义 1 假如 M, N 是两个集, 那么属于 M 同时又不属于 N 的所有元形成的集 D , 叫做 M 与 N 的**差集**, 用记号

$$D = M - N$$

表示.

D 是 M 的子集, 我们可以用图形 (图 1.2) 中 M 中的阴影部分来说明.




图 1.2

显然

$$M - N \neq N - M.$$

定义 2 假如 M, N 是两个集, 那么属于 M 同时又属于 N 的所有元形成的集 P , 叫做 M 与 N 的**交集**, 用记号

$$P = M \cap N$$

表示.

于是 P 是 M, N 的子集, 并且任何集只要它同时是 M, N 的子集, 它一定是 P 的子集, 因此 P 是包含在 M, N 中的**最大集**. 关于交集的概念, 我们可以用图形 (图 1.3) 来说明.




图 1.3

定义 3 假如 M, N 是两个集, 那么属于 M 或者属于 N 的所有元形成的集 S , 叫做 M 与 N 的**并集**, 用记号

$$S = M \cup N$$

表示.

于是 S 是 M, N 的包含集, 并且任何集只要它同时是 M, N 的包含集, 它一定也是 S 的包含集, 因此 S 是包含 M, N 的最小集. 关于并集的概念, 我们可以用图形(图 1.4)来说明.

由定义, 我们容易得知 $N \cap (M - N)$ 是空集, 又

$$M = (M \cap N) \cup (M - N).$$

假如 A, B, C 是三个集, 显然

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

$$(A \cap B) \cap C = (A \cap C) \cap (B \cap C),$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$

$$(A \cup B) \cup C = (A \cup C) \cup (B \cup C).$$

下面是关于交集与并集的两个分配律.

定理 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

用图形说明如左.

证明 首先因为

$$B \subseteq B \cup C,$$

$$\text{所以 } A \cap B \subseteq A \cap (B \cup C).$$

同样 $A \cap C \subseteq A \cap (B \cup C)$, 因此

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C).$$

再假如 $a \in A \cap (B \cup C)$, 那么 $a \in A, a \in B \cup C$. 于是 $a \in B$ 或 $a \in C$. 从前者言, $a \in A \cap B$; 从后者言, $a \in A \cap C$. 因此 $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, 这就是说

$$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

所以定理成立.

同样我们有

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

为了区别, 由元组成的集, 叫做**第一层集**, 把第一层集当作元




图 1.4




图 1.5

组成的集,叫做第二层集. 第二层集又常叫做系.

若干个集的交集与并集可以按两个集的情形同样定义. 假定 L 是由集 $A, B, C, \dots$ 组成的系, 我们用

$$A \cap B \cap C \cap \dots$$

表示 L 的交集, 用

$$A \cup B \cup C \cup \dots$$

表示 L 的并集. 要注意的是 L 虽然是第二层集, 但它的交集、并集却都是第一层集.

习 题 1.1

1. 任意两个集是否都有交集与并集?
2. 假定 $A \subseteq B$, 那么 $A \cup B = ?$ $A \cap B = ?$
3. 假定 A, B, C 是三个集, 试证:
 - (i) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
 - (ii) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$.
4. 假定 A, B, C 是三个集, 如果它们的乘法规定是

$$AB = (A \cup B) - (A \cap B),$$

试证: $(AB)C = A(BC)$.

5. 假定 M 是元数为 n 的有穷集, L 是 M 的所有子集组成的系, 试证: L 的元数是 2^n .

§ 1.2 映射、分类

我们知道, 近世代数中集合的元是抽象的, 因此, 两个集合如何进行比较是一个重要问题. 映射这个概念主要用途之一就是用来解决这个问题, 它是近世代数中最基本的工具.

下面是一些最基本概念.

对于集 M 中每一个元 a , 如果根据某种规则, 我们可以使它与集 N 中唯一一个元对应, 那么这对应叫做 M 射到 N 的映射, 那个与 a 对应的元, 叫做 a 的像, a 又叫做它的像的像源. 这时 M 中

任意元在 N 中都有像,但 N 中任意元在 M 中不一定都有像源. 如果 N 中元在 M 中不都有像源,那么这映射叫做 M 射到 N 内的映射. 如果 N 中任意元在 M 中都有像源,那么这映射叫做 M 射到 N 上的映射. 有时又叫做满射.

假如 M 射到 N 的映射用 σ 来表示,那么 a 的像,我们就用 $\sigma(a)$ 来表示,有时这映射又表为 $a \rightarrow \sigma(a)$. 映射这个概念与数学分析中函数的概念一致,因此 $\sigma(a)$ 又常叫做 a 的函数.

显然, M 射到 N 内的映射就是 M 射到 N 中某个子集上的映射. 譬如在整数集 $\mathbb{Z}$ 中,根据自乘这个规则,把任意整数 a 与它的自乘 a^2 对应,即 $a \rightarrow a^2$,那么这对应是 $\mathbb{Z}$ 射到自己内的映射,也是 $\mathbb{Z}$ 射到由所有整数平方组成的子集上的映射.

我们知道,对于映射 σ ,像源 a 固然只有唯一的像 $\sigma(a)$,但是像 $\sigma(a)$ 就不一定只有一个像源 a ,它可能有一个以上的像源. 任意像只有一个像源的映射,又叫做一对一的映射;有时叫做单射,不是一对一的映射,又叫做多对一的映射. 假如 σ 是 M 射到 N 的映射, B 是 N 的子集, A 是 M 中所有这样元组成的子集,它们的像都在 B 中,那么 A 叫做 B 对于映射 σ 的完全像源.

M 射到 N 的映射 σ ,当 $a_1 \neq a_2$ 时, $\sigma(a_1) \neq \sigma(a_2)$,也就是说,当 $\sigma(a_1) = \sigma(a_2)$ 时, $a_1 = a_2$,那么 σ 就是单射. 单射又是满射时,有时叫做双射.

集合 M 射到 N 的双射 σ 又叫做可逆映射,用记号

$$a \longleftrightarrow \sigma(a)$$

表示. 这时 N 中元 b 的像源用 $\sigma^{-1}(b)$ 来表示. 显然 $b \rightarrow \sigma^{-1}(b)$ 是 N 射到 M 上的映射,我们叫它做 σ 的逆映射,用记号 σ^{-1} 表示. 因此,任意可逆映射都有唯一一个逆映射,这逆映射也是可逆映射. 假如 σ 是可逆映射,那么它的逆映射 σ^{-1} 的逆映射就是 σ ,这就是说

$$(\sigma^{-1})^{-1} = \sigma.$$

譬如,在整数集 $\mathbb{Z}$ 中,我们把偶数与 0 对应,奇数与 1 对应,这样就得到 $\mathbb{Z}$ 射到集合 $\{0, 1\}$ 上的映射,这映射是多对一的,0 的完

全像源是所有偶数, 1 的完全像源是所有奇数, 它们都没有唯一的像源. 假如我们把整数 n 与 $2n$ 对应, 即 $n \rightarrow 2n$, 那就得到 $\mathbb{Z}$ 射到偶数集上的映射, 这映射是单射, 因此它是可逆映射, 它的逆映射就是 $2n \rightarrow n$.

假如有一个单射把两个集 M, N 中的一个, 譬如说 M , 射到另一个 N 上, 那么这两个集就叫做有相等的浓度, 或元数. 显然 $\mathbb{Z}$ 与偶数集有相等的浓度, 因此一个集的浓度也可以与它的真子集的浓度相等, 这是无穷集的一个重要性质. 任意有穷集是没有这个性质的. 与正整数集或它的子集有相等浓度的集, 叫做可数集. 一个集如果不是可数集, 就叫做不可数集. 任一可数集中元可以用正整数做标号来排列, 于是任意可数集 M 可以写成

$$M = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}.$$

有穷集是可数集, 正整数集是可数集, 整数集 $\mathbb{Z}$ 也是可数集. 再可数个可数集的并集又是可数集, 因此有理数集是可数集.

假定 $M = N$, 那么 M 射到 N 的映射, 就叫做 M 射到自己的映射, M 射到 N 上(内)的映射, 就叫做 M 射到自己上(内)的映射. M 射到自己的双射即 M 的可逆映射, 有时又叫做 M 的变换. 对于 M 中任意元使自身与它对应, 也就是说, 不使 M 中任意元变动, 是 M 射到自己的双射, 叫做 M 的恒等映射, 用 I 表示, 即 $I(a) = a$. 很多重要的映射都是射到自己上的映射, 譬如, 平面上的旋转就可以看成为平面上的点集射到自己上的映射. 要注意的是 M 射到自己内的映射有时是单射, 而 M 射到自己上的映射却有时不是单射. 譬如, 映射 $n \rightarrow 2n$ 就是一个 $\mathbb{Z}$ 射到自己内的单射, 而映射 $2n \rightarrow n, 2n+1 \rightarrow 2n+1$ 则是一个 $\mathbb{Z}$ 射到自己上的多对一的映射.

假如 σ_1, σ_2 都是 M 射到 N 的映射, 如果对于 M 中任意元 a , 有 $\sigma_1(a) = \sigma_2(a)$, 我们就说这两个映射相等, 用记号 $\sigma_1 = \sigma_2$ 表示. 假如 σ 是 A 射到 B 的映射, τ 是 B 射到 C 的映射, $\sigma(a) = b, \tau(b) = c$, 即 $a \rightarrow b, b \rightarrow c$, 我们容易证明, 对应 $a \rightarrow c$ 就是 A 射到 C 的映射, 叫做映射 τ, σ 的积, 用记号 $\tau\sigma$ 表示, 即

$$\tau\sigma(a) = \tau(\sigma(a)).$$

这就是说, $\tau\sigma$ 是先施行 σ , 后施行 τ 得到的映射.

要注意的是, 同一个集的任意两个映射的积是存在的, 但一般对于不同集的两个映射不一定有积, 假如有积, 其积也不只一个. 譬如 σ 是 M 射到 N 的映射, τ 是 N 射到 M 的映射, 这时, $\tau\sigma, \sigma\tau$ 都有意义, 但前者是 M 射到自己的映射, 而后者则是 N 射到自己的映射, 两者显然不一致. 即令 $M=N$, 一般 $\tau\sigma$ 与 $\sigma\tau$ 也不一定相等, 即 $\tau\sigma \neq \sigma\tau$, 也就是说, 映射的乘法不适合交换律. 像这样的例子, 我们在几何上是常见的. 再假如 σ 是可逆映射, 那么 $\sigma^{-1}\sigma(a) = a$, 因此 $\sigma^{-1}\sigma = I$, 这就是说, $\sigma^{-1}\sigma$ 是恒等映射. 同样, $\sigma\sigma^{-1}$ 也是恒等映射. 再假如 σ, τ 都是可逆映射, 那么 $\tau\sigma, \sigma\tau$ 又都是可逆映射. 显然 $\sigma^{-1}\tau^{-1}, \tau^{-1}\sigma^{-1}$ 就分别是它们的逆映射.

为了方便, 映射等式 $\gamma = \tau\sigma$ 有时用交换图(图 1.6)来表示. 同样, 交换图(图 1.7)表示 $\tau\sigma = \delta\gamma$. 这里所谓的交换是指图中从一个始点沿着每一条路线到达一个终点所得到的映射都是相等的.




图 1.6




图 1.7

假定对于集 M 中任意两元 a, b , 根据某个规则, 我们可以把 a, b 与某集中唯一的一个元 c 对应, 那么这对应, 我们叫做 M 的结合法, 有时又叫做 M 的代数运算. 这时我们又常常说, 根据这结合法, 可以把 a, b 结合得到元 c , 因此我们又说 M 有一个结合法. 譬如, 对于整数集 $\mathbb{Z}$ 中任意两数 a, b , 我们命 $a+b$ 与它们对应, 那么这对应就是 $\mathbb{Z}$ 的结合法, 它就是普通的加法. 同样, 对于 a, b , 我们