


实用牛病中西医验方

戴杏庭 等 编著

江苏科学技术出版社



实用牛病中西医验方

戴杏庭 陈东亭 蒋兆春 编著
袁锦和 郭 浩 徐魁梧

江苏科学技术出版社

实用牛病中西医验方

戴杏庭等 编著

出版发行：江苏科学技术出版社

经 销：江苏省新华书店

印 刷：常熟市印刷二厂

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 5.625 字数 120,000

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数 1—8,000 册

ISBN 7—5345—1020—1

S·134 定价：2.40元

责任编辑 张士冷

前 言

为了适应当前养牛业生产发展的需要，我们在总结多年兽医临床工作经验的基础上，本着理论与实践相结合的原则，编著了《实用牛病中西医验方》一书。本书内容包括内科、产科、外科、传染病、寄生虫病、犊牛疾病等六大类，160种疾病的中西医验方共计1200余个。可供临床兽医和基层场、站技术人员参考使用。

本书编写者有南京市牛奶公司陈东亭，江苏省农业科学院蒋兆春，南京农业大学戴杏庭、袁锦和、徐魁梧，南京市江宁奶牛场郭浩，通力合作而成。最后由戴杏庭高级兽医师统一修改审定。

在编著过程中，得到了南京市牛奶公司、南京市奶类项目办公室的大力支持。南京市牛奶公司毕庆平、谷俊林、郭先治、金明功等同志提供部分处方，并提出宝贵意见，在此，一并表示感谢。

因业务水平有限，难免有不足之处，甚至错误，敬请读者提出批评指正。

编著者

一九八九年九月

目 录

一、内科疾病治疗 验方.....	(1)
(一)口炎.....	(1)
(二)食道阻塞.....	(3)
(三)前胃弛缓.....	(4)
(四)瘤胃积食.....	(6)
(五)过食豆谷综合症.....	(7)
(六)瘤胃臌气.....	(8)
(七)瓣胃阻塞.....	(11)
(八)真胃积食.....	(13)
(九)真胃炎与真胃溃疡.....	(14)
(一〇)真胃左方移位.....	(17)
(一一)真胃扭转.....	(18)
(一二)创伤性网胃炎.....	(18)
(一三)肠痉挛.....	(19)
(一四)肠胃炎.....	(20)
(一五)腹膜炎.....	(23)
(一六)腹水.....	(25)
(一七)肠便秘.....	(25)
(一八)肝脓肿.....	(27)
(一九)脂肪肝.....	(27)
(二〇)胆管结石.....	(28)
(二一)鼻出血.....	(29)
(二二)咽喉炎.....	(30)

(二三)感冒.....	(31)
(二四)支气管炎.....	(32)
(二五)肺炎.....	(34)
(二六)肺气肿.....	(35)
(二七)胸膜炎.....	(37)
(二八)水胸.....	(38)
(二九)心力衰竭.....	(39)
(三〇)创伤性心包炎.....	(40)
(三一)肾盂肾炎.....	(41)
(三二)膀胱炎.....	(43)
(三三)膀胱麻痹.....	(44)
(三四)日射病与热射病.....	(45)
(三五)脑膜-脑炎.....	(46)
(三六)慢性脑室积水.....	(47)
(三七)癫痫.....	(48)
(三八)脑灰质软化症.....	(49)
(三九)多汗症.....	(49)
(四〇)骨软症.....	(50)
(四一)营养性衰竭症.....	(51)
(四二)水牛血红蛋白尿.....	(52)
(四三)青草搐搦.....	(53)
(四四)母牛“倒地不起”综合症.....	(53)
(四五)醋酮血症.....	(54)
(四六)前肢强直症.....	(55)
(四七)瘤胃酸中毒.....	(56)
(四八)感光过敏.....	(57)
(四九)维生素A缺乏症.....	(57)
(五〇)维生素E-硒缺乏症.....	(58)
(五一)有机磷化合物中毒.....	(58)

(五二)有机氯化物中毒.....	(60)
(五三)慢性铅中毒.....	(61)
(五四)砷中毒.....	(62)
(五五)汞中毒.....	(63)
(五六)氢氰酸中毒.....	(63)
(五七)亚硝酸盐中毒.....	(64)
(五八)尿素中毒.....	(64)
(五九)霉烂甘薯中毒.....	(65)
(六〇)霉玉米中毒.....	(66)
(六一)霉稻草中毒.....	(67)
(六二)棉籽中毒.....	(68)
(六三)酒糟中毒.....	(69)
(六四)乔麦中毒.....	(69)
(六五)甜菜中毒.....	(70)
(六六)芥子饼中毒.....	(71)
(六七)夹竹桃中毒.....	(71)
(六八)蕨中毒.....	(72)
(六九)食盐中毒.....	(73)
(七〇)柴油中毒.....	(74)
(七一)氟中毒.....	(74)
(七二)磷化锌中毒.....	(75)
(七三)酚类中毒.....	(76)
(七四)四环素类(族)中毒.....	(77)
(七五)四氯化碳中毒.....	(77)
(七六)阿托品类药物中毒.....	(78)
(七七)咖啡因中毒.....	(79)
(七八)麻黄中毒.....	(79)
(七九)蓖麻中毒.....	(80)
(八〇)蛇毒中毒.....	(81)

二、产科疾病治疗 验方……………(83)

(一)妊娠水肿……………(83)

(二)胎动(阵缩过早)……………(84)

(三)胎水过多……………(85)

(四)胎死腹中……………(85)

(五)子宫出血……………(86)

(六)流产……………(87)

(七)阴道损伤……………(88)

(八)阴道脱……………(89)

(九)阴道狭窄……………(90)

(一〇)子宫颈口开张不全……………(91)

(一一)胎衣不下……………(92)

(一二)产后子宫复旧不全……………(95)

(一三)子宫脱出……………(96)

(一四)子宫扭转……………(98)

(一五)卵巢囊肿……………(99)

(一六)持久黄体……………(100)

(一七)卵巢机能衰退……………(101)

(一八)抗精子免疫性不孕……………(102)

(一九)子宫内膜炎……………(103)

(二〇)难产……………(103)

(二一)产前截瘫……………(109)

(二二)生产瘫痪……………(110)

(二三)产后败血症……………(112)

(二四)产后截瘫……………(113)

(二五)乳房炎……………(113)

(二六)乳房水肿……………(116)

(二七)乳头痛狭窄……………(117)

(二八)乳滞……………(118)

(二九)缺乳症.....	(118)
(三〇)漏乳.....	(119)
(三一)乳房外伤.....	(120)
三、外科疾病治疗 验 方.....	(121)
(一)新鲜创.....	(121)
(二)化脓创.....	(121)
(三)挫伤.....	(123)
(四)血肿.....	(124)
(五)淋巴外渗.....	(125)
(六)烧伤.....	(125)
(七)结膜炎.....	(127)
(八)角膜炎和角膜翳.....	(128)
(九)四肢骨折.....	(130)
(一〇)蹄叶炎.....	(131)
(一一)腐蹄病.....	(133)
(一二)蜂窝织炎.....	(135)
(一三)腕前粘液囊炎.....	(136)
(一四)关节炎.....	(137)
(一五)风湿症.....	(138)
(一六)颜面神经麻痹.....	(140)
(一七)桡神经麻痹.....	(141)
(一八)荨麻疹.....	(141)
(一九)膀胱破裂.....	(142)
(二〇)腹壁疝.....	(143)
(二一)直肠脱.....	(143)
四、传染病治疗 验 方.....	(145)
(一)结核病.....	(145)
(二)巴氏杆菌病.....	(146)
(三)放线菌病.....	(147)

(四)钩端螺旋体病.....	(149)
(五)破伤风.....	(150)
(六)流行热.....	(151)
(七)副结核.....	(153)
(八)布氏杆菌病.....	(154)
(九)冬痢.....	(155)
(一⑤)牛传染性胸膜肺炎.....	(155)
五、寄生虫疾病治疗 验方.....	(157)
(一)肝片形吸虫.....	(157)
(二)焦虫病.....	(158)
(三)疥癣病(螨病).....	(158)
(四)锥虫病.....	(159)
(五)毛滴虫病.....	(160)
(六)无浆体病(边虫病).....	(160)
(七)球虫病.....	(161)
(八)血吸虫病.....	(162)
(九)弓形虫病.....	(163)
(一〇)蝉.....	(163)
(一一)虱.....	(164)
六、犊牛疾病治疗 验方.....	(165)
(一)新生犊牛窒息.....	(165)
(二)新生犊牛腹泻.....	(165)
(三)脐带类.....	(167)
(四)犊牛大肠杆菌病.....	(167)
(五)肺炎.....	(168)
(六)佝偻病.....	(169)
(七)白肌病.....	(170)
(八)犊牛水中毒.....	(170)

一、内科疾病治疗验方

(一) 口 炎

1. 2%硼酸溶液、0.1%高锰酸钾溶液、0.5~2%明矾溶液、1%食盐溶液、2~3%碳酸氢钠溶液或0.1%雷佛奴尔溶液适量。

用法：冲洗口腔，每日2~3次。

2. 青霉素粉1000单位，蜂蜜适量。

用法：调成软膏样，涂擦于患部，每日数次。必须临用现配。

3. 复合维生素B注射液20毫升。

用法：肌肉注射，每日1次，连用1周。

4. “青黛散”：青黛9克，黄连、黄柏、桔梗、儿茶各6克，薄荷3克，冰片1克。

用法：共研细末，扎入布袋内，置于热水内浸透，取出后噙在病牛口内，布袋两端用细绳固定在笼头或牛角上，喂食时取下，每天换1次。

5. 白芨100克，麻油50克，冰片10克。

用法：先将麻油烧开，放入白芨末，搅拌均匀后，待凉取出，加冰片。涂擦患部，每日1~2次。

6. “冰硼散”：冰片1.5克，硼砂15克，元明粉15克，朱砂1.8克。

用法：共研细末。每日用1克，涂擦或吹于患处。

7. 朴硝、白矾各等份。

用法：共研细末。取少许涂于舌体肿胀而无糜烂处。

8. 黄柏、儿茶、枯矾各等份。

用法：共研细末。取少许涂于舌体糜烂处。

溃疡性口炎时，选用下列处方：

1. 碘甘油(碘50克，碘化钾100克，甘油200毫升，加蒸馏水至1000毫升，混合备用)或1%碘胺甘油乳剂适量。

用法：先用消炎收敛药洗清溃疡面后，涂擦患部。

2. 1~2%硝酸银溶液或0.5%强蛋白银溶液适量。

用法：涂擦患部，每日数次。

3. 硼酸粉2克，鱼肝油100毫升。

用法：混合调制成流膏，涂擦患部，每日数次。

出现吃食困难，体温升高等全身症状时，除局部处理外，可选用下列处方：

1. 青霉素320万单位，链霉素4克，注射用水适量。

用法：肌肉注射。每日2次，连用数天。

2. 盐酸四环素4克，5%葡萄糖溶液1000~1500毫升。

用法：混合，溶解。静脉注射。每日1次，连用2~3天。

3. 林格氏液(氯化钠90毫克，氯化钾3毫克，氯化钙3毫克，注射用水加至100毫升)1000~1500毫升，5%葡萄糖溶液1000~1500毫升。

用法：静脉注射。每日1次，连用数天。

4. 10%维生素C注射液30~50毫升，5%葡萄糖溶液1000毫升，0.9%氯化钠溶液1000毫升，50%葡萄糖注射液100毫升。

用法：静脉注射。每日1次，连用数天。适用于治疗牙龈发炎、出血的病例。

(二) 食道阻塞

咽部、颈部上方食道阻塞时，可选用下列处方：

1. 装上开口器，用手或钢丝圈套住阻塞物，从口腔中取出。

2. 用手于颈部沿左侧食道将阻塞物向上挤压，直至咽部附近时，从口腔中取出。

3. 将缰绳系于前肢球节下部，收紧，尽量使牛头下垂，然后驱赶快跑。由于头部下垂或因驱赶大出汗而使肌肉松弛，则阻塞物有时能自然脱出。

颈下部、胸部食道阻塞时，可选用下列处方：

1. 用硬质橡皮胃导管插入食道，缓缓将阻塞物推入瘤胃内。

2. 将胃导管插入食道后，取露于口腔外的一端，接上打气筒缓缓打气，将阻塞物推入瘤胃内。

3. 1%盐酸的卡因溶液10~20毫升。

用法：先用胃导管灌至阻塞处，半小时后，让其自然或用胃导管将阻塞物送入瘤胃内。

4. 5%盐酸普鲁卡因溶液20~30毫升，液体石蜡(或植物油)100~200毫升。

用法：先灌服普鲁卡因溶液，10分钟后再灌入液体石蜡。半小时后，让其自然或用胃导管将阻塞物送入瘤胃内。

5. 0.5%硝酸毛果芸香碱注射液10~20毫升。

用法：皮下注射。然后让其自然或用胃导管将阻塞物送入瘤胃内。

6. 黄酒0.25~0.5公斤。

用法：灌服。半小时后，用胃导管缓缓将阻塞物送入瘤胃内。

临床出现不安时，可选用下列处方：

1. 30%安乃近注射液20毫升。

用法：肌肉注射。

2. 2.5%盐酸氯丙嗪注射液20毫升。

用法：肌肉注射。

3. 0.1%硫酸阿托品注射液15~30毫升。

用法：皮下注射。

(三) 前胃弛缓

1. 人工盐120~150克，酒石酸锑钾8克，常水适量。

用法：灌服。每日1~2次。

2. 人工盐500克，龙胆末250克，马钱子250克。

用法：混合均匀备用。每次30克拌水灌服。每日1~2次。

3. 姜酊、大黄酊、龙胆酊、橙皮酊各60毫升，番木鳖酊15毫升。

用法：加倍量水，灌服。每日3次。

4. 10%氯化钠注射液300~500毫升。

用法：静脉注射。

5. 5%氯化钙注射液250毫升，10%氯化钠注射液400毫升，10%苯甲酸钠咖啡因注射液20毫升。

用法：静脉注射。

6. (1) 5%葡萄糖注射液1000毫升。

用法：静脉注射。

(2) 胰岛素150单位。

用法：肌肉注射。

7. 0.05%甲基硫酸新斯的明注射液5~10毫升。

用法：皮下注射。必要时，隔2~3小时再重复注射1次。

孕牛忌用。

8. 健康牛瘤胃液4000~8000毫升或反刍出的食团数个。

用法：灌服。每日1~2次。

9. 党参、白术、陈皮、茯苓、木香各30克，麦芽、建曲、生姜各60~90克，红枣(去核)120克。

用法：煎服。如属虚寒型，加苍术、半夏、豆蔻、砂仁各25~50克；如属湿兼热型，去生姜，加佩兰、藿香、龙胆、茵陈各25~50克。

10. “扶脾散”：焦白术50克，党参50克，黄芪50克，炒苍术40克，青皮30克，厚朴30克，广木香20克，茯苓50克，泽泻30克，炙甘草25克。

用法：共研末。开水冲，温后灌服。

11. “党参藜芦散”：藜芦30克，党参60克，白术45克，柴胡30克，干姜30克，陈皮45克。

用法：水煎去渣。候温灌服。

12. “党参马钱子散”：制马钱子7克，党参60克，白术45克，柴胡30克，干姜30克，陈皮45克。

用法：水煎去渣。候温灌服。

13. 番木鳖粉6克，酒石酸锑钾5克，藜芦8克。

用法：共研细末。拌水灌服。每日1~2次。

14. 发酵面200~500克，红糖100~200克，白酒100毫升，加水2000毫升。

用法：混合，均匀。灌服。

15. 电针脾俞、百会、肚角等穴位。

16. 10%葡萄糖溶液20毫升, 0.2%硝酸士的宁注射液2~4毫升。

用法: 混合。注入健胃穴内。健胃穴位于颈静脉沟前1/3与中1/3交界处, 食道与气管之间, 以右侧为宜(其深部位于气管轮的外侧上方肌沟间隙内, 有迷走神经通过)。向对侧斜下方进入5~6厘米深, 针尖抵达气管轮后, 再稍退针向上刺入少许即可。

(四) 瘤胃积食

1. 硫酸钠(或硫酸镁)500~1000克, 常水10000毫升。

用法: 溶解。灌服。

2. 硫酸镁800克, 液体石蜡1000毫升, 鱼石脂15克。

用法: 先用5000~10000毫升水溶解硫酸镁和鱼石脂, 灌服。然后再灌服液体石蜡。

3. 10%氯化钠注射液500毫升, 10%苯甲酸钠咖啡因注射液20毫升。

用法: 静脉注射。每日1次, 连用2~3天。

4. (1)10%氯化钠注射液300~500毫升。

用法: 静脉注射。

(2)液体石蜡1000毫升或豆油1000毫升。

用法: 当(1)注射后, 立即灌服。

5. 硫酸镁300克, 白藜芦末10克, 龙胆末20克。

用法: 混合, 均匀。分成2包, 上、下午拌水灌服。

6. 植物油1000~2000毫升, 马钱子酊30毫升。

用法: 混合, 摇匀。灌服。

7. “三仙散”加减: 山楂、麦芽、建曲、莱菔子、木

香、槟榔、枳壳、陈皮各30克，大黄、朴硝各60克，煎汤去渣。加生萝卜汁500毫升，麻油250毫升。

用法：灌服。加減：如大便干燥而不通者，加重大黄、朴硝用量；若有恶寒表症者，加生姜、大葱；若腹胀甚者，加青皮、厚朴；若正气虚者，加党参。

临床上出现脱水、酸中毒等症时，可选用下列处方：

1. 5%葡萄糖生理盐水1500~2000毫升，5%碳酸氢钠注射液500毫升，10%苯甲酸钠咖啡因注射液20毫升。

用法：静脉注射。每日1次，连用2~3天。

2. 0.9%氯化钠注射液2000~3000毫升，10%苯甲酸钠咖啡因注射液20毫升，2.5%维生素B₁注射液20毫升，10%维生素C注射液20毫升，5%碳酸氢钠注射液300~500毫升。

用法：静脉注射。

(五) 过食豆谷综合症

1. 植物油500~1500毫升。

用法：灌服。适用在没有出现临床症状前。

2. 5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液8000毫升，5%碳酸氢钠注射液500~1000毫升。

用法：静脉注射。

3. “石膏汤”加味：生石膏250克，知母、甘草、生地、玄参、银花、连翘、板蓝根、天花粉各25~30克。

用法：水煎，去渣，灌服。若大便干硬，加大黄30克，芒硝60克；若口干舌燥，饮水过甚者，加石斛、麦冬各30克。

4. 生石膏250~500克(一般按偷食黄豆1公斤用100克生石膏的比例用药)，入水久煎去渣，加口碱10~15克(研末)，萝