

MINGGUI ZHONGCAOYAO YUANSE TUPU

# 名贵中草药

## 原色图谱

◎ 杨世林 林余霖 主编





# 名贵中草药原色图谱

杨世林 林余霖 主编

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

名贵中草药原色图谱 / 杨世林, 林余霖主编. - 北京: 中国农业出版社, 2005.3

ISBN 7-109-09556-8

I . 名 ... II . ①杨 ... ②林 ... III . 中草药 - 图谱  
IV . R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 006172 号

中国农业出版社出版  
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)  
(邮政编码 100026)  
出版人: 傅玉祥  
责任编辑 贺志清 赵立山

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行  
2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 17.75

字数: 300 千字 印数: 1~5 000 册

定价: 100.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 杨世林 林余霖

副主编 刘玉琇

编 者 刘玉琇 李葆莉

林余霖 刘春雨

胡炳义 冯锦东

摄 影 刘玉琇 林余霖

张效杰 彭治章





## 前 言

中医药是祖国的一个优秀传统文化宝库，为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献。中国作为一个传统医药大国，有着丰富的药物资源、系统的理论指导，更有悠久广泛应用的民众基础。在4000年的实践中，积累了丰富的临床应用经验，秘方、验方达30多万首，有记载的就有6万余首。

至20世纪80年代开始进行的全国中药资源调查表明，我国现有的中药资源种类已达12 807种，其中药用植物11 146种，药用动物1 581种，药用矿物80种。这部图谱收载其中常用的植物类中药265种，每种附有一幅自然生长的植物图片和药材图片，并对原植物形态、栽培要点、药材性状、性味功能、主治用法作简要叙述，这将对从事重要科研、教学、经营等人员有很好的参考作用。

人类跨入21世纪的今天，我们感到传统医药在回归大自然的潮流中再次焕发出强大的生命力和现代化发展的广阔前景，并深信它将为世界人民做出应有的贡献。

这部著作以指导辨认植物及药材为主要目的，因而读者在具体应用时，须在医师的指导下能进行，以免误用。

# 凡例



1. 《名贵中草药原色图谱》全书收藏我国中草药265种，全部采用各种中草药自然生长环境下的彩色照片，及经产地初加工的药材彩色照片，并附有中文描述，以便广大读者对该中草药能更加深入的了解。
2. 本书收载的中草药按笔划顺序排列。
3. 每种中草药的描述，包括来源、正名、别名、原植物形态、分布、栽培要点、采收加工、药材性状、性味功能、主治用法等内容。
4. 本书所述正名，以《中华人民共和国药典》（2000年版）为标准；非《中华人民共和国药典》品种，以《中药志》为标准。若某植物的根或果实，根茎或块根均作中药应用，则以一药作正名，另一药附在括弧内，说明一种植物的不同部位作两种中药使用，如麻黄（附：麻黄根）、槟榔（附：大腹皮）、紫苏子（附：紫苏叶及紫苏梗）。
5. 来源。科学地记载各种中草药原植物的科名、植物名及其药用部位。
6. 原植物。其中别名收载我国各地该中草药的主要民间俗名，植物学名收载该植物在国际上通用的拉丁学名。本项较详细地描述各种中草药原植物的形态特征，在野生状态下的生长环境，及其在我国境内的分布概况，分布的区域列至大区，如长江以南各省（自治区）及东北、西南等，但多以省（自治区）为主。
7. 栽培要点。简要记述该植物的喜生环境、土壤要求、繁殖方法等。
8. 采收加工。记述各种中草药的采收季节及采收方法，以及该中草药的产地简易加工方法，不包括饮片加工企业的炮制加工技术。
9. 药材性状。记述该中草药的形态特征。图名为其基源植物名称。
10. 性味功能。记述该中草药的味、性及功能。
11. 主治用法。记述该中草药的主治、用法、用量等。
12. 如果一种植物的不同部位作两种中药使用，本书对两种中药的采收加工、药材性状、性味功能、主治用法分别记述。
13. 书前附有全书的目录，书后附有各种中草药的拉丁学名、中名书画及拼音索引，以便检索。



# 目 录

前言

凡例

006

001	丁香 Dingxiang	1	025	广藿香 Guanghuoxiang	25
002	八角茴香 Bajiaohuixiang	2	026	女贞子 Nüzhenzi	26
003	人参 Renshen	3	027	小茴香 Xiaohuixiang	27
004	儿茶 Ercha	4	028	马钱子 Maqianzi	28
005	九里香 Jiulixiang	5	029	马兜铃 Madouling (附: 天仙藤) ....	29
006	三七 Sanqi	6	030	马鞭草 Mabiancao	30
007	三白草 Sanbaicao	7	031	天仙子 Tianxianzi	31
008	三棱 Sanleng	8	032	天冬 Tiandong	32
009	干姜 Ganjiang (附: 生姜)	9	033	天花粉 Tianhuafen	33
010	土木香 Tumuxiang	10	034	天南星 Tiannanxing	34
011	土贝母 Tubeimu	11	035	天麻 Tianma	35
012	大黄 Dahuang	12	036	天葵子 Tiankuizi	36
013	山麦冬 Shanmaidong	13	037	木瓜 Mugua	37
014	山柰 Shannai	14	038	木香 Muxiang	38
015	山茱萸 Shanzhuyu	15	039	木贼 Muzei	39
016	山药 Shanyao	16	040	木蝴蝶 Muhudie	40
017	山楂 Shanzha	17	041	木鳖子 Mubiezi	41
018	千年健 Qiannianjian	18	042	王不留行 Wangbuliuxing	42
019	千金子 Qianjinzi	19	043	五加皮 Wujiapi	43
020	川贝母 Chuanbeimu	20	044	五味子 Wuweizi	44
021	川牛膝 Chuanniuxi	21	045	五倍子 Wubeizi	45
022	川芎 Chuanxiong	22	046	车前子 Cheqianzi (附: 车前草) ....	46
023	川楝子 Chuanlianzi	23	047	化橘红 Huajuhong	47
024	广枣 Guangzao	24	048	牛蒡子 Niubangzi	48



049	牛膝 Niuxi	49	081	白前 Baiqian	81
050	升麻 Shengma	50	082	白扁豆 Baibiandou (附: 扁豆花)	82
051	乌药 Wuyao	51	083	白薇 Baiwei	83
052	乌梅 Wumei (附: 梅花)	52	084	玄参 Xuanshen	84
053	丹参 Danshen	53	085	半边莲 Banbianlian	85
054	火麻仁 Huomaren	54	086	半枝莲 Banzhilian	86
055	巴豆 Badou	55	087	半夏 Banxia	87
056	巴戟天 Bajitian	56	088	丝瓜络 Sigualuo	88
057	水红花子 Shuihonghuaizi	57	089	地肤子 Difuzi	89
058	功劳木 Gonglaomu (附: 功劳叶)	58	090	地骨皮 Digupi	90
059	平贝母 Pingbeimu	59	091	地黄 Dihuang	91
060	玉竹 Yuzhu	60	092	地榆 Diyuan	92
061	甘草 Gancao	61	093	老鹳草 Laoguancao	93
062	甘遂 Gansui	62	094	西红花 Xihonghua	94
063	石韦 Shiwei	63	095	西河柳 Xiheliu	95
064	石菖蒲 Shichangpu	64	096	西洋参 Xiyangshen	96
065	石斛 Shihu	65	097	亚麻子 Yamazi	97
066	石榴皮 Shiliupi	66	098	百合 Baihe	98
067	龙胆 Longdan	67	099	百部 Baibu	99
068	龙眼肉 Longyanrou	68	100	肉豆蔻 Roudoukou	100
069	北沙参 Beishashen	69	101	肉苁蓉 Roucongrong	101
070	仙鹤草 Xianhecao	70	102	肉桂 Rougui (附: 桂枝)	102
071	冬瓜皮 Dongguapi (附: 冬瓜子)	71	103	伊贝母 Yibeimu	103
072	冬虫夏草 Dongchongxiacao	72	104	延胡索 Yanhusuo	104
073	白及 Baiji	73	105	合欢皮 Hehuanpi (附: 合欢花)	105
074	白术 Baizhu	74	106	决明子 Juemingzi	106
075	白头翁 Baitouweng	75	107	安息香 Anxixiang	107
076	白芍 Baishao	76	108	关木通 Guanmutong	108
077	白芷 Baizhi	77	109	防己 Fangji	109
078	白附子 Baifuzi	78	110	防风 Fangfeng	110
079	白茅根 Baimaogen	79	111	红花 Honghua	111
080	白果 Baiguo (附: 银杏叶)	80	112	灵芝 Lingzhi	112





# 目 录

113 麦冬 Maidong	113	140 补骨脂 Buguzhi	140
114 远志 Yuanzhi	114	141 陈皮 Chenpi (附: 橘红、橘核)	141
115 杜仲 Duzhong	115	142 附子 Fuzi (附: 川乌)	142
116 豆蔻 Doukou	116	143 鸡血藤 Jixueteng	143
117 芫花 Yuanhua	117	144 鸡骨草 Jigucao	144
118 花椒 Huajiao	118	145 鸡冠花 Jiguanhua	145
119 苍术 Cangzhu	119	146 玫瑰花 Meiguihua	146
120 苍耳子 Cangerzi	120	147 青果 Qing guo	147
121 芡实 Qianshi	121	148 青葙子 Qingxiangzi	148
122 苏木 Sumu	122	149 枇杷叶 Pipaye	149
123 赤芍 Chishao	123	150 板蓝根 Banlangen (附: 大青叶)	150
124 两头尖 Liangtoujian	124	151 刺五加 Ciwujia	151
125 两面针 Liangmianzhen	125	152 苦木 Kumu	152
126 连钱草 Lianqiancao	126	153 苦杏仁 Kuxingren	153
127 连翘 Lianqiao	127	154 苦参 Kushen	154
128 吴茱萸 Wuzhuyu	128	155 苦棟皮 Kulianpi	155
129 牡丹皮 Mudanpi	129	156 茴麻子 Qingmazi	156
130 何首乌 Heshouwu	130	157 郁李仁 Yuliren	157
131 伸筋草 Shenjincao	131	158 郁金 Yujin	158
132 佛手 Foshou	132	159 虎杖 Huzhang	159
133 皂角刺 Zaojiaoci (附: 猪牙皂)	133	160 罗布麻叶 Luobumaye	160
134 余甘子 Yuganzi	134	161 罗汉果 Luohanguo	161
135 辛夷 Xinyi	135	162 知母 Zhimu	162
136 沙苑子 Shayuanzi	136	163 委陵菜 Weilingcai	163
137 沙棘 Shaji	137	164 垂盆草 Chupencao	164
138 沉香 Chenxiang	138	165 使君子 Shijunzi	165
139 诃子 Kezi	139	166 侧柏叶 Cebaiye (附: 柏子仁)	166



167	佩兰 Peilan	167
168	金银花 Jinyinhua (附: 忍冬藤)	168
169	金樱子 Jiningzi	169
170	狗脊 Gouji	170
171	鱼腥草 Yuxingcao	171
172	京大戟 Jingdaji	172
173	闹羊花 Naoyanghua	173
174	泽兰 Zelan	174
175	泽泻 Zexie	175
176	卷柏 Juanbai	176
177	枳壳 Zhiqiao	177
178	枳实 Zhishi	178
179	梔子 Zhizi	179
180	枸杞子 Gouqizi	180
181	枸骨叶 Gouguye	181
182	葫芦巴 Huluba	182
183	胡椒 Hujiao	183
184	荆芥 Jingjie	184
185	南沙参 Nanshashen	185
186	南鹤虱 Nanheshi	186
187	茜草 Qiancao	187
188	荜茇 Bibo	188
189	草乌 Caowu	189
190	草豆蔻 Caodoukou	190
191	砂仁 Sharen	191
192	牵牛子 Qianniuzi	192
193	厚朴 Houpu	193
194	威灵仙 Weilingxian	194
195	鸦胆子 Yadanzhi	195
196	骨碎补 Gusuibu	196
197	钩藤 Gouteng	197
198	香加皮 Xiangjiapi	198
199	香橼 Xiangyuan	199
200	重楼 Chonglou	200
201	胖大海 Pangdahai	201
202	急性子 Jixingzi	202
203	洋金花 Yangjinhua	203
204	前胡 Qianhu	204
205	穿心莲 Chuanxinlian	205
206	姜黄 Jianghuang	206
207	珠子参 Zhuzishen	207
208	秦艽 Qinjiao	208
209	桔梗 Jiegeng	209
210	桃仁 Taoren	210
211	核桃仁 Hetaoren	211
212	莪术 Ezhu	212
213	夏枯草 Xiakucao	213
214	柴胡 Chaihu	214
215	党参 Dangshen	215
216	射干 Shegan	216
217	徐长卿 Xuchangqing	217
218	高良姜 Gaoliangjiang	218
219	凌霄花 Lingxiaohua	219
220	浙贝母 Zhebeimu	220
221	益母草 Yimucao (附: 莳蔚子)	221
222	益智 Yizhi	222
223	拳参 Quanshen	223
224	娑罗子 Shaluozhi	224
225	预知子 Yuzhizi	225
226	桑白皮 Sangbaipi (附: 桑叶、 桑椹、桑枝)	226
227	通草 Tongcao	227
228	菊花 Juhua	228
229	黄芩 Huangqin	229





# 目 录

010

230 黄芪 Huangqi	230	248 紫菀 Ziwan	248
231 黄连 Huanglian	231	249 锁阳 Suoyang	249
232 黄柏 Huangbai	232	250 蒲公英 Pugongying	250
233 黄精 Huangjing	233	251 路路通 Lulutong	251
234 常山 Changshan	234	252 锦灯笼 Jindenglong	252
235 蛇床子 Shechuangzi	235	253 椿子 Feizi	253
236 野菊花 Yejuhua	236	254 槟榔 Binglang (附: 大腹皮)	254
237 银柴胡 Yinchaihu	237	255 蔓荆子 Manjingzi	255
238 旋覆花 Xuanfuhua	238	256 莼大青叶 Liaodaqingye	256
239 商陆 Shanglu	239	257 罂粟壳 Yingsuqiao	257
240 麻黄 Mahuang (附: 麻黄根)	240	258 墨旱莲 Mohanlian	258
241 淫羊藿 Yinyanghuo	241	259 颠茄草 Dianqiecao	259
242 密蒙花 Mimenghua	242	260 萱白 Xiebai	260
243 续断 Xuduan	243	261 薏苡仁 Yiyiren	261
244 楮实子 Chushizi	244	262 薄荷 Bohe	262
245 款冬花 Kuandonghua	245	263 藁本 Gaoben	263
246 葛根 Gegen (附: 葛花)	246	264 藕节 Oujie (附: 莲子、莲心、 莲房、莲须、荷叶)	264
247 紫苏子 Zisuzi (附: 紫苏叶及 紫苏梗)	247	265 瞿麦 Qumai	265
药材名、植物名索引			266
拉丁学名索引			270
参考文献			274



001

# 丁香

Dingxiang

**【来 源】**本品为桃金娘科 (Myrtaceae) 植物丁香的花蕾。

**【原植物】**

丁香 别名：母丁香、公丁香（通称）。

*Eugenia caryophyllata* Thunb.

常绿乔木，高达10cm。叶对生，叶柄长1~2cm，两侧有下延叶基；叶长圆状卵形或长圆状倒卵形，革质，长5~10cm，宽2.5~5cm，先端渐尖或急尖，基部渐狭至叶柄，全缘，两面无毛。聚伞状圆锥花序顶生，花直径约6mm，芳香；花萼肥厚，绿色后转淡紫色，长管状，先端4裂，裂片三角形；花冠白色，带淡紫色，短管状，4裂；雄蕊多数，花丝纤细，花药纵裂；子房下位，与萼管合生，花柱粗厚，柱头不明显。浆果红棕色，长方椭圆形，长1~1.5cm，直径5~8mm，有光泽，先端宿存花萼，裂片肥厚，有香气。种子长方形，与果皮分离。花期6~7月。果期8~9月。

生于温暖潮湿的热带地区。

我国海南、广东、广西、云南等省、自治区有栽培。

**【栽培要点】**喜温暖潮湿的气候。宜栽培于肥沃的砂质壤土或黏壤土。用种子繁殖。种子采收后应及时播种，随采随播。播前先剥掉果肉，于8~9月开沟点播，行距15cm，株距5cm，覆薄土，浇水。培育1年后苗高20~25cm时，按行距6m，株距5m挖穴定植。

**【采收加工】**在9月至次年3月间，花蕾由青转为鲜红时采摘，除去花梗、杂质、晒干。

**【药材性状】**花蕾似短棒状，长1~2cm，直径3~5mm，表面红棕色或暗棕色。上部花蕾球形，下部花托圆柱形，稍扁，稍显纵棱。萼筒圆柱形，有的稍弯曲，长0.7~1.4cm，直径0.3~0.6mm，红棕色或棕褐色。萼片4，肥厚。质坚实，花冠4裂，雄蕊多数；子房3室，位于花托上部。气芳香浓烈，味辛辣、有麻舌感。投入水中，花托部垂直向下（未去油）。

**【性味功能】**味辛，性温。有温中降逆，补肾助阳，下气止痛的功能。

**【主治用法】**用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿，小儿吐乳，腰膝酸痛，阴冷等症。用量1~3g。



001

002

# 八角茴香

Bajiaohuixiang

**【来 源】** 本品为木兰科 (Magnoliaceae) 植物八角茴香的果实。

**【原植物】**

**八角茴香** 别名：大茴香、八角、大料（通称）。  
*Illicium verum* Hook. F.

常绿乔木，高达20m。树皮灰绿色或红褐色，枝密集。单叶互生或3~6叶簇生于枝顶。叶柄长约1cm；叶革质，椭圆状倒卵形或椭圆状倒披针形，长5~12cm，宽1.5~4cm，先端急尖或渐尖，基部窄楔形，全缘，稍内卷，上面有光泽和透明油点，下面疏生柔毛。花两性单生于叶腋；花被片7~12，数轮，覆瓦状排列，内轮粉红色或深红色；雄蕊11~12，排成1~2轮；心皮8~9，离生，轮状排列，花柱与子房近等长或稍短。果实多由8个蓇葖果放射状排列成八角形的聚合果，红褐色或淡棕色，直径3.5~4cm，果柄长1~3cm，钩形弯曲。蓇葖果扁平，成熟时由腹缝线开裂，果皮较厚。种子1，扁卵形，红褐色有光泽。花期春、秋季。果期秋季至翌年春季。

生于温暖、湿润的山谷中。栽培或野生。

分布于福建、台湾、广东、广西、云南、贵州等省、自治区。

**【栽培要点】** 喜温暖潮湿的气候。宜栽培于土层深厚、疏松、腐殖质多、排水良好的偏酸性土壤或砂质壤土。用种子繁殖。春播于1~2月，秋播于11~12月。按行距15cm开沟条播，种距约3cm，覆细土，浇水，盖草保湿，出苗后，搭棚遮阴。次年2月份芽未萌动前按4m×4m株行距定植。

**【采收加工】** 每年采收两次，秋、冬季于果实变黄时采摘，置沸水中稍烫后干燥或直接干燥。2~3月采收量较少。

**【药材性状】** 多由8个放射状排列成八角形的聚合果，直径3~4cm，下面有弯曲的果柄，长3~4cm，常脱落。蓇葖果长1.2~2cm，宽0.7~1cm，上缘开裂呈小艇状，先端钝或钝尖，外表面褐色或红棕色，有不规则裂纹，内面淡红棕色或淡黄棕色，光滑，有光泽。种子1枚，扁卵形，长约8mm，宽约5mm，一端有种脐及珠孔，另端有合点，中间有种脊，种皮红棕色或黄棕色，平滑有光泽；质脆，富油性。香气浓，味甜。

**【性味功能】** 味辛，性温。有温中散寒，理气止痛的功能。

**【主治用法】** 用于胃寒呕吐，食欲不振，疝气腹痛，肾虚腰痛。用量3~6g。



**【来 源】**本品为五加科(Araliaceae)植物人参的根。

**【原植物】**

人参 别名：园参(栽培品)，山参(野生品)，棒槌(东北)。

*Panax ginseng* C. A. Mey.

多年生草本，高达65cm。根茎短。主根粗壮，肉质，圆柱形或纺锤形，下部分枝，黄白色。茎直立，圆柱形，不分枝。掌状复叶轮生茎端，常一年生者为1片三出复叶，二年生者为1片五出复叶，三年生者为2片五出复叶，每年递增1叶，多达6片复叶。复叶有长柄，小叶多为5片，椭圆形、长椭圆形，先端渐尖，基部楔形，边缘有细锯齿，脉上有疏刚毛。伞形花序顶生，总花梗长7~20cm，花小，多数；苞片小，线状披针形；花萼钟形，5裂；花瓣5，卵形，淡黄绿色；雄蕊5，花丝短；子房下位，2室，花柱2，下部合生。核果浆果状，扁球形，熟时鲜红色。种子2，肾形，乳白色。花期6~7月。果期7~9月。

生于山地的针阔叶混交林或杂木林下。

分布于东北三省、河北北部深山中。辽宁、吉林有大量栽培。

**【栽培要点】**喜冷凉湿润的气候。喜斜射及漫射光，忌强光直射和高温。宜栽培于排水良好、含腐殖质多的砂质壤土及壤土。用种子繁殖。分春播、夏播和秋播。春播于4月上旬至5月上旬。用催芽裂口种子；将上年的干籽用清水浸泡36~48h，按1份种子混合3份稍湿河沙，装木箱内，置入室内催芽。夏播于6月中、下旬播种上年采收的干籽，以自然温度促进种胚后熟。秋播于8月初播当年的种子。按行距5cm，株距4~5cm点播，覆土3~4cm。培育3年生苗，于10月移栽，行株距20~25cm，覆土5~9cm。

**【采收加工】**秋季挖取生长5~7年的园参或野山参，晒干，前者称生晒参，后者称生晒山参。洗净后蒸熟再晒干或烘干的称红参。

**【药材性状】**

**生晒参** 根圆柱形或纺锤形，中部常分2~5条支根；表面淡黄棕色至淡灰棕色，有纵皱纹及细根断痕；主根上部或全体有断续粗横纹，顶端有根茎(习称芦头)。全须参下部有数细长的须状根。主根质硬，折断面平坦，淡黄白色，形成层处棕黄色，皮部有数放射状裂隙。气微香而特异；味淡，后稍苦。

**红参** 根形与生晒参相似，外观棕红色，半透明，有纵沟、皱纹及细根断痕。质硬脆，折断面平坦，角质样，中心色较淡。

**生晒山参** 主根粗短，多有2个支根呈人字形或圆柱形，表面灰黄色，有纵皱纹，顶端有细长根茎，常与主根等长或更长，有密集的碗状茎痕，靠主根的一段光滑无茎痕称“圆芦”。支根上生细长须状根，有明显的疣状突起。

**【性味功能】**味甘、微苦、性温。有大补元气，固脱，生津，安神，益智的功能。

**【主治用法】**用于体虚欲脱，气短喘促，自汗肢冷，精神倦怠，食少吐泻，气虚作喘，久咳，津亏口渴，失眠多梦，惊悸健忘，阳萎，尿频，一切气血津液不足等。用量1.5~9g，大量15~30g。反藜芦，畏五灵脂，均不宜同用。



004

# 儿 茶

Ercha

**【来 源】**本品为豆科(Leguminosae)植物儿茶心材的水煎干膏。

## 【原植物】

儿茶 别名：儿茶膏、黑儿茶、孩儿茶（通称）。

*Acacia catechu* (L.) Willd.

落叶乔木，高6~13m。树皮棕色，条状薄片开裂；小枝细柔弱，有双生刺，托叶下面常有1对扁平、棕色的钩状刺。叶2回双数羽状复叶互生，长6~20cm，叶轴上有灰色柔毛，着生羽片10~20对，羽片长2~4cm，每羽片上有小叶20~50对，小叶线形，长3~6mm；两面有疏毛。总状花序腋生，长2.5~10cm；花黄色或白色；花萼基部连合成钟状，萼齿5，三角形，有疏毛；花瓣5，有稀柔毛，披针形或倒披针形，长约2.5cm；雄蕊多数，伸出花冠外；子房上位，长卵形，花柱细长。荚果扁薄，带状，紫褐色，有光泽，长5~12cm，宽1~1.8cm。花期4~8月。果期10~11月。

生于村旁、路边。有栽培。

分布于云南西双版纳自治州，现浙江、福建、广东、海南、广西等省、自治区有栽培。

**【栽培要点】**喜温暖潮湿的气候。宜栽培于向阳、土层深厚、排水良好的壤土。用种子繁殖。于5~6月雨季初期，按行距3m，株距2m开穴，每穴播种5~6粒，覆土，盖住种面。苗高6~8cm时间苗，留苗2株。

**【采收加工】**冬季采收枝、树干，除去外皮，砍成碎块，加水煎煮，浓缩成膏状，稍冷，倾于特别模型中，干燥后取出。

**【药材性状】**儿茶膏近方形块状或不规则块状，大小不一。表面棕褐色或黑褐色，光滑或有龟裂纹，稍有光泽。质脆，易破碎，断面不整齐，有光泽及细孔。无臭，味涩、苦、稍回甜。

**【性味功能】**味苦、涩，性微寒。有清热，生津，化痰的功能；外用有收涩，敛疮，止血的功能。

**【主治用法】**用于痰热咳嗽，咯血口喝；外用于溃疡久不收口，湿疹口疮，痔疮，外伤出血。用量1~3g，包煎，多入丸散服。外用适量。



004

# 九里香

Jiulixiang

**【来源】**本品为芸香科 (Rutaceae) 植物九里香的叶或带叶嫩枝。根、花也供药用。

**【原植物】**

**九里香** 别名：七里香（广东、福建），七路香（云南）。

*Murraya paniculata* (L.) Jack.

灌木，高2~4m。树皮灰褐色。分枝多，小枝圆柱形，嫩枝部有微柔毛。单数羽状复叶互生；小叶3~9片，革质，有短柄或几无柄；小叶卵形或倒卵形，长2~8cm，宽1~3cm，先端钝，渐尖或微凹，基部楔形，偏斜，全缘，上面绿色有光泽，有透明腺点。多花的聚伞花序顶生或腋生；花小，白色，芳香，花梗细；萼片5，三角形，长约2mm，宿存；花瓣5，倒披针形或长圆形，长1~2.5cm，宽0.7~1cm，有细柔毛；雄蕊10，花丝丝状，扁平，花药椭圆形或卵形；子房2室，花柱棒状，柱头膨大。浆果卵形或球形，熟时鲜红色，先端尖。种子1~2。花盛期4~6月。果期9~11月。

生于山坡较旱的疏林中。有栽培。

分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南等省、自治区。

**【栽培要点】**喜阳又耐阴。宜栽培于排水良好的砂质壤土。用种子繁殖或分株繁殖。①种子繁殖：采收红色果实，搓洗去果皮，捞出种子，晾干，用湿沙混合贮藏或随采随播。直播：在大田上按行距40cm开沟条播，种距5~10cm，覆薄细土，浇水。育苗移栽：在苗床上按行距15cm条播，种距2~5cm，覆薄细土，盖草浇水，出苗后及时揭盖草。苗高30cm时，按行距40cm，株距20cm，开穴移植。②分株繁殖：早春挖出分株较多的母株，连根分成多株，按行距40cm，株距20cm，每穴栽1株，覆土浇水。

**【采收加工】**全年可采。叶于阴凉处阴干；枝和根采后去净泥土杂质，切段成片，晒干或阴干。鲜品随采随用。

**【药材性状】**茎细圆柱形，一般截成3~5cm段，直径约7mm；灰黄色，有细纵纹，栓片剥落，木质部肉色，质坚硬。小叶3~9片，革质，卵形或椭圆形，先端钝尖，圆形或微凹，基部楔形，干后黄色，有光泽，有透明腺点。气香，味苦、辛，有麻舌感。

**【性味功能】**味辛、微苦，性温，有小毒。有行气止痛，活血散瘀，祛风活络，除湿，麻醉，镇惊，解毒消肿的功能。

**【主治用法】**用于胃痛，风湿痛，跌打肿痛，风湿骨痛，牙痛，破伤风，流行性乙型脑炎，蛇虫咬伤，局部麻醉。用量为根、叶9~15g(鲜品15~30g)。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

005



006

三 七

Sanqi

**【来 源】**本品为五加科 (Araliaceae) 植物三七的根。

**【原植物】**

三七 别名：参三七、田七（通称）。

*Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen

多年生草本，高30~60cm。根茎短；主根粗壮肉质，倒

圆锥形或圆柱形，有分枝和多数支根。茎直立，单生，不分枝，绿色或有细纵条纹。掌状复叶3~4片轮生茎顶；叶柄长4~9cm，基部有多数披针形或卵圆形托叶状附属物；小叶片5~7，膜质，长椭圆状倒卵形或长圆状披针形，长5~15cm，宽2~5cm，基部1对较小，先端长渐尖，基部近圆形，叶缘有密锯齿，齿端有小刚毛，沿脉疏生刚毛。伞形花序单个顶生，有花数朵，总花梗长13~30cm，花小多两性，有时杂性，小花梗长1cm，基部有鳞片状苞片。花萼5齿状；花瓣5，淡黄绿色，长圆状卵形，先端尖；雄蕊5，花丝线形，花药向内纵裂；子房下位，2室，花柱上部2裂；花盘平坦或微凹。浆果状核果，近肾形，熟时红色。种子1~3，扁球状，白色。花期6~8月。果期8~10月。


野生于山坡丛林下。

分布于江西、湖北、广西、四川、云南等省、自治区。多栽培。

006

**【栽培要点】**喜冬暖、夏凉的气候。宜栽培于阴凉通风、排水良好、土质疏松肥沃的土壤。种子繁殖：10~11月末收成熟果实，洗去果皮，即可播种；或用65%代森锌配成300倍液或用0.2~0.3波美度石流合剂消毒15min。按株行距6cm×6cm开深1.5cm穴，每穴放种子1粒，覆土、盖草。幼苗生长1年后，于11月上旬至12月份挖苗，按行距15cm，株距12cm开穴，穴深约3cm，斜栽于穴内，覆土盖住芽头，盖草。

**【采收加工】**秋季开花前采收栽培3年以上的植株，除去茎叶及泥土，剪下芦头、侧根及须根，分别晒干。主根晒至半干时用手搓揉，以后每日边晒边搓，直至全干。



**【药材性状】**根近圆锥形或圆柱形，长1~6cm，直径1~4cm。表面灰黄色或灰棕色，顶端有根茎痕，周围有瘤状突起，侧面有断续纵皱纹及支根断痕。体重，质坚实，打碎后皮部与木质部分离；横断面灰绿、黄绿或灰白色，皮部有细小棕色树脂道斑点。气微，味苦而后微甜。

**【性味功能】**味甘、微苦、性温。有止血散瘀，消肿定痛的功能。

**【主治用法】**用于吐血，咯血，衄血，便血，血痢，崩漏，产后血晕，瘀血胸腹刺痛，跌扑肿痛，外伤出血，痈肿。内服用量3~9g，外用粉末适量。孕妇忌服。

