



实用中草药 图本

Practical Illustrations of
Chinese Materia Medica

4

叶类、木类、全草类

主编 徐国钧 王 强

福建科学技术出版社

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



实用中草药

图本



4

叶类、木类、全草类

主 编：徐国钧 王 强
编 著 者：曾金虎 彭治章 张 勤
刘守金 黄 芸 崔秀明
曹沛琴 张婷婷 刘 海
验方提供者：朱濂溪 华碧春 江英志
助 编：陈丽红 周劲松 施天慧
刘潇潇 杨 杰 王丽萍
柳 玲 陈筱清 丁 尧
施 宇 赵 耀

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药图本 4 叶类、木类、全草类 / 徐国钧, 王强主编. —
福州: 福建科学技术出版社, 2006.2

ISBN 7-5335-2719-4

I. 实… II. ①徐… ②王… III. 中草药 - 图谱

IV. R28-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 118076 号

- | | |
|------|------------------------------------|
| 书 名 | 实用中草药图本 4 叶类、木类、全草类 |
| 编 著 | 徐国钧 王 强 |
| 出版发行 | 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001) |
| 网 址 | www.fjstp.com |
| 经 销 | 各地新华书店 |
| 排 版 | 视觉 21 设计工作室 |
| 印 刷 | 福建彩色印刷有限公司 |
| 开 本 | 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 |
| 印 张 | 7.5 |
| 字 数 | 163 千字 |
| 版 次 | 2006 年 2 月第 1 版 |
| 印 次 | 2006 年 2 月第 1 次印刷 |
| 印 数 | 1—8000 |
| 书 号 | ISBN 7-5335-2719-4 |
| 定 价 | 25.00 元 |

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

前言

1989年,在福建科学技术出版社的鼎力支持下,我们在国内率先出版了《中草药彩色图谱》。十多年来该书一直深受广大读者的欢迎。尽管在《中草药彩色图谱》一书出版后,又有多种此类图书出版,但它始终保持良好的销售势头,得到社会和市场的青睐,现已印刷19次,印数近15万册。

读者的厚爱 and 信任,让我们不敢有丝毫懈怠,为了满足各层次读者的不同需求,我们在修订《中草药彩色图谱》(第三版)的过程中将植物药的内容加以挑选、增补,重新汇编了这套《实用中草药图本》系列。

《实用中草药图本》系列是在《中草药彩色图谱》(第三版)的基础上,按入药部位将其分为4册,各分册约筛选120个品种,即:

《实用中草药图本1》:根类、花类;

《实用中草药图本2》:根茎类、皮类、茎藤类、其他类;

《实用中草药图本3》:果实类、种子类;

《实用中草药图本4》:叶类、木类、全草类。

《实用中草药图本》系列收录的内容包括以下几方面:

1. 收录品种均为植物药,包括传统中药、草药和民间用药。

2. 每个品种收录的项目有药材中文名、拉丁名、别名、来源、形态、采制、性状、性味、功用、验方等。

3. 为了突出本书的实用性,应广大读者的强烈要求,特地在每味药材下增添了验方内容。

在此须提醒读者注意的是,本书“功用”中的用药剂量较保守,除个别有毒药物须严格控制用量外,一般药物在临床中的用量视实际情况而定;个别“验方”中有用到国家级保护的动植物,如穿山甲等,现已禁止非法捕猎与贸易,临床应用时可换替代品;临床疾病往往错综复杂,选用验方之前一定要有明确的诊断,若诊断不明确或病情严重的,应及时就医。

书中部分照片由周印锁、赖茂祥、吴家荣、邬家林、王年鹤、王峥涛、余伯阳、李萍、陈道峰、陈虎彪、格桑索朗、钟国跃、林惠蓉、敬松、杨莉等同仁提供,在此深表感谢。

最后,衷心希望本套图本能满足广大读者的需要。

徐国钧、王强
于中国药科大学
2005年2月

叶类

十大功劳 / 2
 凤尾蕉叶 / 4
 艾叶 / 6
 石韦 / 8
 石楠叶 / 10
 四季青 / 12
 芙蓉叶 / 14
 牡荆叶 / 16
 苦丁茶 / 18
 枇杷叶 / 20
 罗布麻叶 / 22
 侧柏叶 / 24
 金边龙舌兰 / 26
 茶叶 / 28
 胡颓子叶 / 30
 枸骨叶 / 32
 臭梧桐叶 / 34
 桑叶 / 36
 黄花夹竹桃叶 / 38

棕榈 / 40
 紫苏叶 / 42
 紫珠叶 / 44

木类

文冠果木 / 46
 苏木 / 48
 沉香 / 50
 降香 / 52
 樟木 / 54
 檀香 / 56

全草类

一点红 / 58
 三白草 / 60
 大蓟 / 62
 千里光 / 64
 千屈菜 / 66

及己 / 68
 广金钱草 / 70
 广藿香 / 72
 小蓟 / 74
 马鞭草 / 76
 天胡荽 / 78
 木贼 / 80
 瓦松 / 82
 乌菰莓 / 84
 水飞蓟 / 86
 龙葵 / 88
 仙鹤草 / 90
 白毛夏枯草 / 92
 白花蛇舌草 / 94
 白英 / 96
 白屈菜 / 98
 瓜子金 / 100
 半边莲 / 102
 半枝莲 / 104
 地柏枝 / 106

地椒 / 108
地锦草 / 110
西番莲 / 112
列当 / 114
灯盏细辛 / 116
红旱莲 / 118
杠板归 / 120
连钱草 / 122
含羞草 / 124
陆英 / 126
鸡屎藤 / 128
青蒿 / 130
松萝 / 132
虎耳草 / 134
岩白菜 / 136
败酱草 / 138
垂盆草 / 140
委陵菜 / 142
佩兰 / 144
金钱草 / 146
肿节风 / 148
鱼腥草 / 150
泽兰 / 152
泽漆 / 154
空心莲子草 / 156

细辛 / 158
荆芥 / 160
茵陈 / 162
芥菜 / 164
荔枝草 / 166
穿心莲 / 168
绞股蓝 / 170
鸭跖草 / 172
铁苋菜 / 174
臭草 / 176
益母草 / 178
荜茇 / 180
雪莲花 / 182
野马追 / 184
野颠茄 / 186
蛇莓 / 188
麻黄 / 190
淫羊藿 / 192
淡竹叶 / 194
篇蓄 / 196
紫参 / 198
景天三七 / 200
瞿草 / 202
蒲公英 / 204
矮地茶 / 206

鼠曲草 / 208
焯菜 / 210
豨莶草 / 212
墨旱莲 / 214
薄荷 / 216
爵床 / 218
瞿麦 / 220
翻白草 / 222
藿香 / 224

药材中文名索引 / 226
药材功效分类索引 / 232



实 用

中草药

图 本

十大功劳

Folium Mahoniae

别名 土黄柏、土黄连、八角刺、刺黄柏、黄天竹。

来源 为小檗科植物阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr. 的叶。

形态 常绿灌木，高达4米。根、茎断面黄色，味苦。羽状复叶互生，长30~40厘米，叶柄基部扁宽抱茎；小叶7~15，厚革质，广卵形至卵状椭圆形，长3~14厘米，宽2~8厘米，先端渐尖成刺齿，边缘反卷，每侧有2~7枚大刺齿。总状花序粗壮，丛生于枝顶；苞片小，密生；萼片9，3轮，花瓣状；花瓣6，淡黄色，先端2浅裂，近基部内面有2蜜腺；雄蕊6；子房上位，1室。浆果卵圆形，熟时蓝黑色，有白粉。花期7~10月，果期10~11月。生于山谷、林下阴湿处。

采制 全年可采，晒干。药材产于甘肃、河南、浙江、安徽。

性状 羽状复叶，小叶片7~15，对生，无小叶柄，多略皱缩，革质，广卵形，边缘反卷，每侧有刺3~5个，叶脉明显向背面突起，上表面绿色至灰绿色，下表面黄绿色。总叶柄圆柱状，直径约至5毫米，着生小叶处膨大并有环纹。气微，味苦。

性味 性凉，味苦。

功用 补肺气，退潮热，益肝肾。用于肺结核潮热、咯血、腰膝无力、胃火牙痛、目赤肿痛、头痛；肠炎腹泻、黄疸型肝炎。用量9~15克。

验方 ①肠炎：十大功劳、番石榴叶、土牛膝各15克，黄连、白头翁各9克，马鞭草30克，水煎服。②高血压：十大功劳、石仙桃、豨莶草各15克，六棱菊9克，水煎服。③阴道炎：十大功劳、白头翁各等量，炒焦研粉。阴道冲洗后，撒上药粉。



阔叶十大功劳

十大功劳

④支气管炎：十大功劳、穿心莲各 15 克，橘皮 6 克，水煎取汁 100 毫升，分 2 次服。⑤急性黄疸型肝炎：十大功劳、赛葵各 15 克，水煎服。⑥结膜炎：十大功劳叶 200 克，加蒸馏水 1000 毫升，煎煮后取汁过滤，高压消毒，滴眼用，每日数次。⑦风火牙痛：十大功劳叶 9 克，水煎顿服，每日 1 剂，痛甚者日服 2 剂。

附注 同属植物细叶十大功劳 *Mahonia fortunei* (Lindl.) Fedde 的叶同等入药。

凤尾蕉叶

Folium Cycadis Revolutae

别名 苏铁叶、铁甲松叶、铁树叶。

来源 为苏铁科植物苏铁 *Cycas revoluta* Thunb. 的叶。

形态 常绿木本植物，不分枝，高1~4米，稀达8米以上，密被宿存的叶茎和叶痕。羽状叶从茎的顶部生出，长0.4~2米，基部的两侧存刺，刺长2~3毫米，羽片达100片以上，掌形，厚革质，长9~18厘米，宽4~6毫米，先端锐尖，边缘显著向下弯曲，基部狭，两侧不对称，上面深绿色，有光泽，中央微凹，下面浅绿色，中脉显著隆起。雌雄异株，雄球花圆柱状，长30~70厘米，直径8~15厘米；小孢子叶长方状楔形，长3~7厘米，有急尖头，下面中肋及先端密生褐色或灰黄色长绒毛；大孢子叶扁平，长14~22厘米，密生淡黄色或淡灰黄色绒毛，上部叶片宽卵形，边缘羽状分裂，其下方两侧着生数枚近球形胚珠。种子卵圆形，微扁，顶凹，长2~4厘米，直径1.5~3厘米。熟时朱红色。花期6~7月，种子10月成熟。

采制 全年均可采收，鲜用或晒干。药材产于福建、广东、广西、海南。

性状 叶大型，1回羽状，叶轴扁圆柱形，叶柄基部两侧具刺，黄褐色。质硬，断面纤维性。羽片线状披针形，长9~18厘米，宽4~6毫米，黄色或黄褐色，边缘向背面反卷，背面疏生褐色柔毛。质脆，易折断，断面平坦。

性味 性温，味甘。

功用 收敛止血，止痛。用于各种出血、痢疾、腰痛、胃痛、关节酸痛。用量9~30克；外用鲜品适量。

验方 ①创伤出血：凤尾蕉叶适量，研成细末，敷患处。



苏铁



凤尾蕉叶

②胃痛、咳嗽痰多：凤尾蕉叶 15 克，水煎服。③难产：凤尾蕉叶 3 片，水煎服。④闭经：凤尾蕉叶适量，晒干后烧存性，研细末，每次 6 克，用红酒送服，每日 1 次。⑤吐血：凤尾蕉叶、紫金牛各 15 克，糯米草 12 克，青石蚕 9 克，水煎服。

艾叶

Folium Artemisiae Argyi

别名 大艾叶、杜艾叶、菱蒿。

来源 为菊科植物艾 *Artemisia argyi* Lévl. et Vant 的叶。

形态 多年生草本，高0.5~1.2米。茎直立，被白色细软毛，上部分枝。叶互生，中下部叶片广阔，3~5深裂或羽状深裂，裂片椭圆形或椭圆状披针形，边缘有不规则的锯齿，上面散生白色腺点，疏生毡毛，下面密生白色毡毛。头状花序钟形，长3~4毫米，直径2~2.5毫米，几无柄；总苞片4~5层，密被白色绵毛，边缘膜质，外层披针形；雌花长约1毫米；两性花结实，长约2毫米，紫褐色。瘦果椭圆形，无毛。花期7~10月。生于荒地、林缘，有栽培。分布于东北、华北、华东、西南。

采制 夏季花未开时采收，除去杂质，晒干。

性状 叶多皱缩、破碎，有短柄。完整叶片展开后呈卵状椭圆形，羽状深裂，裂片椭圆状披针形，边缘有不规则的粗锯齿，上表面灰绿色或深黄绿色，有稀疏的柔毛及腺点，下表面密生灰白色绒毛。质柔软。气清香，味苦。

性味 性温，味辛、苦；有小毒。

功用 散寒止痛，温经止血。用于少腹冷痛、经寒不调、宫冷不孕、吐血、衄血、崩漏经多、妊娠下血；外治皮肤瘙痒。用量3~9克；外用适量，供灸治或熏洗用。

验方 ①保胎：艾叶每6克配鸡蛋1枚，加水煮10分钟，鸡蛋去壳后再煮5分钟至鸡蛋成褐色，供药用。孕3个月内，每次吃2个，症状严重者每日2次，好转后每日1次。孕4个月以上，症状严重者每次3个，每日2次，好转后每次2个，每日1次维持。一般不用辅助药物。②痛经：生艾叶10克，红花5克，加



艾



艾叶

开水 300 毫升冲服。经前 1 日或经值时服 2 剂。③老年性皮肤瘙痒：艾叶 90 克，雄黄、花椒各 6 克，防风 30 克；或艾叶 30 克，花椒 9 克，地肤子、白鲜皮各 15 克。水煎熏洗患处，每日 1 剂，每剂熏洗 2 次，一般用药 3~6 剂。

石韦

Folium Pyrrosiae

别名 大石韦、光板石韦。

来源 为水龙骨科植物庐山石韦 *Pyrrosia sheareri* (Bak.) Ching. 的叶。

形态 多年生草本，高30~60厘米。根茎粗壮，横走，密生披针形鳞片，鳞片边缘有睫毛。叶同型，簇生，坚革质，上面仅沿叶脉有毛或无毛，有细密而不整齐的凹点，下面有分叉、短阔的黄色星状毛；叶柄粗壮，以关节着生于根茎上；叶片宽披针形，长20~40厘米，宽3~5厘米，向顶端渐尖，向基部稍变宽，为不等的圆耳形；侧脉在两面略下凹。孢子囊群小，在侧脉间排列成多行，无盖。生于石上、树干上。分布于长江以南各省区。

采制 全年均可采收，除去根茎及根，晒干或阴干。

性状 叶片略皱缩，展平后呈披针形，长10~25厘米，宽3~5厘米。先端渐尖，基部耳状偏斜，全缘，边缘常向内卷曲。上表面黄绿色或灰绿色，散布有黑色圆形小凹点；下表面密生红棕色星状毛，有的侧脉间布满棕色圆点状的孢子囊群。叶柄具四棱，长10~20厘米，直径1.5~3毫米，略扭曲，有纵槽。叶片革质。气微，味微涩苦。

性味 性微寒，味甘、苦。

功用 利尿通淋，清热止血。用于热淋、血淋、石淋、小便不通、淋沥涩痛、吐血、衄血、尿血、崩漏、肺热咳嗽。用量6~12克。

验方 ①泌尿道结石：石韦20克，金钱草30克，巴戟天15克，生大黄、生甘草各10克。每日1剂，水煎服。绞痛重者加延胡索、琥珀；血尿重者加白茅根、三七。②泌尿系统感染：石



庐山石韦

石韦

韦、蒲公英、马齿苋各30克，苦参9~15克，柴胡9~18克，黄柏9克，水煎服。

附注 同属植物石韦 *Pyrrosia Lingua* (Thunb.) Farwell 的叶同等入药。

石楠叶

Folium Photiniae

别名 石南叶、石眼树叶、老少年叶、凿树、石纲。

来源 为蔷薇科植物石楠 *Photinia serrulata* Lindl. 的叶。

形态 常绿灌木或小乔木，高可达10米，枝光滑。叶片革质，长椭圆形、长倒卵形或倒卵状椭圆形，长8~22厘米，宽2.5~6.5厘米，基部宽楔形或圆形，边缘疏生有细锯齿，近基部全缘，幼时自中脉至叶柄有绒毛，后脱落，两面无毛；叶柄长2~4厘米。复伞房花序多而密；花序梗和花柄无皮孔；花白色，直径6~8毫米；花瓣近圆形，内面近基部无毛；子房顶端有毛，花柱2~3裂。梨果近球形，直径约5毫米，红色，后变紫褐色。花期4~5月，果期10月。野生或栽培。分布于安徽、江苏、浙江、广东、广西、四川、云南、甘肃。

采制 全年可采收，晒干。

性状 叶上表面暗绿色至棕紫色，较光滑，下表面淡绿色至棕紫色，主脉突起，侧脉似羽状排列；常带有叶柄。革质而脆。气微，味苦、涩。

性味 性平，味辛、苦；有小毒。

功用 祛风补肾。用于风湿筋骨痛、阳痿遗精。用量4.5~15克。

验方 ①脚膝挛痹：石楠叶、白术、牛膝（三味以酒浸一夜，焙干）、防风、天麻、枸杞子、黄芪各60克，桂枝（去粗皮）、鹿茸（酥炙、去毛）各45克，共为细末。另取木瓜1枚，去皮取肉，蒸至烂熟，和入以上药末捣烂，加面糊少许，同为丸，如梧桐子大。每服30~50丸，空腹以盐汤或温酒送下。②女子神经性偏头痛：石楠叶9克，川芎3克，白芷5克，天麻5克，女贞子6克，水煎，分3次服。③风疹：石楠叶90克，捣为末，每