

癩科全書方證捷詠

成秉真 著

癲科全書方證捷詠

開本：850×1168/32

印張：2 1/2

字數：54 千字

成 采 真 著

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區錢子胡同三十六號 •

人民衛生出版社  
長 春 印 刷 廠 印刷 • 內部發行

統一書號：14048 • 1523

1958年2月第1版—第1次印刷

(長春版) 印數：1—500

## 癡科全書方證捷詠序

癡科書多矣。不是太簡。就是太煩。要求一簡單而不遺漏重點。詳悉而又便於記誦者。三  
公元一九三〇年。我居長市應診。閒時即取謝瓊齋氏癡科活人全書逐條入覽。因其書較之舊書詳  
完備。惟過於煩瑣。設非平時多多與它接觸者。斷難分析使用。於是我即決心這書裡面鑽研了半年之  
久。吸取其精華凡數十條。二十年來。雖避難播遷。猶有時把它玩閱。然到了臨證時候。平日所看的  
書。大半不復記憶。因此未嘗不歎息醫師難爲也。

一九四七年秋。復返長沙。專治醫學。恨平生經典之不能熟讀。運用之不能左右逢其源。乃發憤尋  
繹內難經。及傷寒、金匱等書。已而復取金匱之方劑與證狀一一作成歌括。名曰雜病論方證捷詠。經  
過幾年。初稿始就。以其猶有餘勇。復取昔年癡科摘要仿雜病論捷詠例而詠之。既而擇其必要者而讀  
之。此時臨證。不像前日那樣茫然了。

不過我的心裡還不十分快足。嗣後每年春必取謝氏全書逐條校對和體味。既求其精。又求其簡。或嫌  
其太簡而補入些。或嫌其仍煩而刪去些。進退出入。五載於茲。凡得五十章。始覺大致已定。雖其修  
正有待高明的人。然其最要者在此幾年中。不覺讀之已熟。到了這時。才知道求學的方法、莫如摘要。  
記誦的祕訣、莫如讀歌。

且我的願望。不僅雜病論癲科必撰捷詠。雖傷寒論之難讀。亦將不避艱險而完成其同樣功夫。嘻。此豈易言的事嗎。祇有興奮淬厲、百折不回、以冀實踐其言、誠不自知其老之將至也。

一九五七年丁酉冬寧鄉成秉真識於湖南省文史研究館

## 凡例

一、本書凡五卷。癩疹分消毒、宣毒、化毒、養陰四期。且四期稱號皆以治療主方之名名之。使醫者顧名思義。即知用藥之宜忌。蓋癩疹不分階段。不出主方。則研究者無從著手。著手如何。先讀主方。次讀發熱及鼻涕汗液之有無。與夫癩出不快、不透表、早收、氣促、氣喘、癩色淡紫等條歌括。熟讀之後。到了臨證。自有主張。再擇其必要者熟讀之。則泛應曲當矣。不過階段雖分。然前期證有至後期而後及之者。後期證有已於前期附帶及之者。此又不可按期索之也。惟女子患癩。經水適來。以及妊婦產婦出癩。痘挾癩出。和溫癩、奶癩、風癩等證。不便專置一期者。則別爲一卷而以奇恆名之。以便研究也。

一、古語云。有是證、必有是方。有是方、必有是藥。可見證狀與方與藥、分開不可的。假使醫者但記其證、而不記其方。或記其方、而不記其藥。甚至證狀與方與藥都不記憶。其原因固由平時不肯用功。或用功而苦于不得良好門徑。我于癩科金匱等書必將證狀與方藥作成歌括。只是爲了上述這些緣故。

一、本書既名捷詠。文字方面、應力求簡要以省讀者腦力和時間。故摘錄原文時、有時不能不前後移動。然于全書本旨、則斷不敢違背。間有不同意者、則附拙見于後、以俟高明正之。

一、每方之後加入右幾味水煎服等字。原方後水煎服字、或有或無。不但合乎古方格式。且可藉此查對。免致藥味有所出入不符。

一、古人治癩疹，以升麻、桔梗、甘草爲必用之藥。惟全書不然。其意以爲癩本火候。火性上炎。宜疏散。不宜升提。宜瀉火。不宜補中。故凡治癩疹，總不用此三味。不爲無見。惟歌括有時限于字句，不便詠及。讀者切莫誤會而仍用之也。又木通丹皮有下胎之能。從來癩科書不曾言及。故誤事者往往有之。凡遇妊娠癩疹。此等藥最不宜用。

一、癩疹，小兒患者居多。而本書方劑用量多有不合小兒者。考醫宗金鑑用量例。如大人每用一錢。

小兒只用二分。十歲者，用五分。又按近代醫學小兒用量例。

一九五二年十二月湖南省衛生廳編印呼吸系傳染病附記

三歲以下的，

爲成人量四分之一。三歲以上，至十二歲的，爲成人量三分之一。或三分之二。十二歲以上的，與成人同。余從上面兩說斟酌。再加分析如下。似較明確可從。譬如成人每用一錢者，一二三歲小兒只用二分。四五六歲者，用三四分。七八九歲者，用五六分。十至十二者，用七八分。十三歲者，即與成人同。惟小兒病勢急而且重。而其形氣強實。又性拗強不肯服藥者。仍當按照年齡酌加相當分量。才不因循誤事。

歌 成人一錢三歲二。四五六歲三四分。七八九者五六可。十至十二七八香。若問十三宜幾許。

此時剛好等成人。通帶此例誠堪法。重證身強再酌增。

# 目錄

## 卷一 第一期 消毒期 西醫潛伏期

第一章 預防癩疹主方

第二章 癩疹禁忌

第三章 癩疹傷寒辨

第四章 癩疹原因

## 卷二 第二期 宜毒期 西醫前驅期

第五章 癩疹初潮主方

第六章 癩疹欬嗽

第七章 癩疹嘔涕

第八章 癩疹汗出

第九章 癩疹糞渣水泄  
嘔吐證治見初潮主方加減條中不重出

第十章 癩疹發熱微甚及乍熱潮熱

第十一章 癩疹壯熱及壯熱無汗

第十二章 癩疹氣促氣喘

第十三章 癩疹不食

第十四章 癩疹咽喉痛

第十五章 癩疹口臭

第十六章 癩疹沈睡昏睡似寐非寐煩躁不眠

第十七章 癩疹四肢逆冷或下身厥冷

第十八章 癩疹大小便不通

第十九章 癩疹咬牙

第二十章 癩疹發搐

第二十一章 癩疹出不快

第二十二章 癩疹不透表

## 卷三 第三期 化毒期 西醫發疹期

第二十三章 癩疹全身已現主方

第二十四章 癩疹盡透表

第二十五章 癩疹陰陽兩部多少順逆辨

第二十六章 癩疹輕證重證不治證

第二十七章 癩色鮮紅淡紅

第二十八章 癩色淡白紫黑焦枯

第二十九章 癩出一片

第三十章 癩出挾斑

第三十一章 癩疹謔語

第三十二章 癩疹舌胎純黑

第三十三章 癩疹唇舌破裂

第三十四章 癩疹腹痛

第三十五章 癩疹痢疾

第三十六章 癩疹早收易收遲收

卷四 第四期 養陰期 西醫恢復期

第三十七章 癩疹收後主方

第三十八章 癩疹口瘡

第三十九章 癩疹牙疳

第四十章 癩疹腰痛

第四十一章 癩後吐泄

第四十二章 癩後目疾

第四十三章 癩後卒死

第四十四章 癩後身癢

第四十五章 癩後身腫

卷五 奇恆疹

第四十六章 癩疹女子經水適來

第四十七章 妊娠出癩

第四十八章 產後出癩

第四十九章 痘挾癩出

第五十章 溫癩癩風癩



# 癩科全書方證捷詠卷一

寧鄉成秉真撰

## 第一期 消毒期 西醫潛伏期

凡見地方癩疹剛剛發現之際。果係未曾患過癩疹的人。即當預服消毒保嬰丹。并遵行一切禁忌。以期達到普遍性徹底消滅癩疹目的。醫療本以預防為主。消毒保嬰丹爲預防癩疹主方。故本期癩疹即以消毒名之。

## 第一章 預防癩疹主方

消毒保嬰丹 癩科活人全書<sub>以下簡稱全書</sub>第三條云。爲父兄者但見境里痘癩正行。宜先以消毒保嬰丹、代天宣化丸以預解之。可使毒微而不能已甚。

### 代天宣化丸

秉真按上兩方。其修合之法。全書所載。純係迷信作用。又無徹底消滅癩疹之可能。故兩方藥味皆不錄。而以本草綱目方代之。

附本草綱目二方

凡附方較正方低一格。又于方上加一大圈以資識別。後仿此。

○奇效消毒保嬰丹

因方尾云。奇效良方。故名。其方曰奇效消毒保嬰丹。

時行瘡疹正發。服此。則可無患。

茜草

本經上品。一名血見愁。又名過山龍。茜、音倩。

右一味。水煎濃汁。入少酒飲之。奇效良方。

○預解痘瘡毒方

雞卵一枚

右一味。用童便浸七日。水煮食之。永不出痘。

歌

茜草水煎入酒飲。即過時行免瘡疹。雞卵一枚燭浸七。水煮食之痘不出。全書消毒非無方。

惟此奇效勸君嘗。

## 第二章 癰疹禁忌

全書第十條云。癰疹禁忌。比痘尤甚。故凡肉類、魚腥、鹽、醋、甘甜、麪食、五辛、滯氣、煎燂等物。必癰收後四十九日之外。方可與食。若七七之前不知禁忌。則終身但遇天行、癰必復出。即不復出。亦有後患。雖豬肉一味可以先食。亦必待身涼不效。并無他

病者始宜食之。其餘必須遵期謹戒。非但出痧之人當慎。即乳兒乳母亦必禁忌。庶免禍生不測云。

全書第七條云。癰疹既收。必待二七之後。熱退身涼。無痰不效。飲食如常。精神復舊。方可不避風寒。慎之慎之。

歌曰肉甜鹽麪醋魚腥。煎滯五辛禁忌同。收後四旬九日外。此時開禁慶成功。早嘗豬肉雖無害。

必待身涼不效中。設若不遵多後患。天行一遇疹猶重。乳兒乳母宜知禁。食性全從乳裡通。

腿、重、俱平聲。

其二收後身涼二七餘。無痰不效食如初。風寒到此方無禁。否則仍須密室居。

· 乘其按地方癰疹剛裁發現之際。凡是未曾出疹者。不待其類似疹狀發現。即當特別提高警惕。按照下列五條戒律一一實行之。癰出必然順利。

一、戒感冒風寒。使腠理之間經常暢達。癰出必順。

一、戒奔走長途赤日。使元氣不爲暑氣所傷。癰出必順。

一、戒飲食冷酸等物。使腸胃生理機能不失正常。癰出必順。

一、戒喫食蒜、韭、葱、薤、椒、薑、紅棗、參、朮、熟地黃等熱性補性滯性之物。使其毒素不

得支援。癩出必順。

一、成人宜戒色慾。女子尤戒惱怒和喫熱性補性等物。誠恐血爲熱逼。又因怒動肝火。致血不寧。而經水不待正臨之期而早降。甚至倒經逆行。大吐大衄不止。以致莫救。

余謂果能早服奇效消毒保嬰丹。又能實踐上列五條戒律。縱不能免。癩出必順。惟今人每怪癩疹之險。而歎其死亡率之高。而不知其所以至是者。實由預防工作不綽。而又多以人爲害之也。昔人有言。明者遠見于未萌。智者避危于無形。今後吾人應將上列各項禁忌和預防方法、隨時隨地向廣大羣衆宣傳。俾其一一執行。而不專靠醫療爲能事。則善矣。

### 第三章 癩疹傷寒辨

全書第二條云。癩疹之證。其初發熱與傷寒相似。但癩則面頗紅。欬嗽噴嚏。鼻流清涕。日中淚出。呵欠喜睡。或吐。或利。或手摺眉目鼻面之間爲異耳。

全書第五條云。夫癩初起既與傷寒相似。而認癩者須細看兩耳根下。頸項連耳之間。以及背脊之下。至于腰間。必有三五紅點。此即癩之報標。如無紅點以爲證佐。則當以別證施治。此屢試屢驗者也。

全書第四十八條云。癩證初起。全類傷寒。但中指冷者。乃是癩候。

• 秉真按朱丹溪云。癩疹將發。視其耳後有紅脈赤縷者爲眞。又按近代醫學云。惟癩疹、則口腔頰部粘膜上生白色微隆起的小點。週圍有紅暈。名科拍力克氏斑。是它的特徵。

曰初潮癩疹似傷寒。效驗面紅涕淚攢。呵欠好眠或吐利。報標三五色如丹。而聞手拍祇中冷。

是否從頭仔細看。好、去聲。祇、音、俱平聲。

## 第四章 癩疹原因

全書第三條云。癩雖胎毒。未有不由天行時令而發者。故一時傳染相似。遠近大小皆發。

• 秉真按癩疹病原。近代醫學謂是濾過性病毒。屬單純性傳染病。余謂果係單純性傳染病。即未必人人經過。以其可能避免故也。惟癩疹則幾無一人不患。且其出疹時。從一歲至十歲。或二十三十歲不等。此足證明其病毒屬遺傳性自發病。而傳染不過爲其誘因耳。又按近代醫學證明小兒患過癩疹者。即于本身產生免疫力。以後不會再患癩疹。查一九五五年七月號北京中醫雜誌記載安徽省試用中藥紫草根預防癩疹有效。果爾。則紫草效能。是入腸胃後產生免疫力呢。還是入腸胃後解除先天性毒素呢。疑團莫釋。願高明明以教我焉。

全書第五十條云。夫癩原發于心。心火內亢。則肺金受剋。以致肺葉焦舉。故有欬嗽。

全書第五條云。目中淚出者。肺熱則移于肝。肝之竅在目也。肝屬木。木能生風。故有呵欠也。

全書第七十一條云。癰本胎毒。純是火候。如上焦火盛者則吐。下焦火盛者則瀉。中焦火盛者則吐瀉並作。

全書第九十一條云。癰乃火候。丙丁熬煎。壬癸必涸。故癰收之後。陰血必虧。津精重耗。多見腰痛。乃爲腎敗之候。最爲難治。惟此證幼孩罕有耳。

全書第十五條云。正癰之出。由于胎毒。其出也。必在出痘之後。或隔兩三月。或隔半年一年之久。甚至八九年之遠。感正癰之氣而出。一次後。永不復出矣。

秉眞按火之與風。往往相因而至。是故癰疹初潮。少陰君火既動。不但有刑肺金。致令欬嗽。即厥陰風木之氣亦必乘勢而起矣。夫淚爲肝液。欠爲肝風。故疹甫熱時。未始不即涕淚呵欠者。且人身之火。惟肝火最橫。況其風乘火勢。火藉風威。烈烈轟轟。中土爲之焦灼。此其所以吐利交作。大熱汗出。目腫面赤。甚至鼻血氣喘。煩躁擾亂而無暫寧時也。治療之法。以救津液爲主要。蓋津液存。則元氣無傷。一切險證不會發現。是故始用宣毒發表湯以透表。中用化毒清表湯以瀉火。終用養陰湯以滋水。其藥其時不同。其所以救津液則一。陳修園云。一部傷寒論以存津液三

字爲主。余謂治癰疹者。尤當三復斯言。依五臟病情。吟成五十六字。即盼高明正之。

曰歌癰雖胎毒必時行。發自心家火內并。肺爲津枯聲欲嘎。肝因風動淚將傾。中焦更患吐兼利。

水涸尤關死與生。若是痘餘疹始出。只今一現不重呈。

并、重、皆平聲。爲、去聲。所嫁切。沙去聲。聲破也。

## 癩科全書方證捷詠卷二

寧鄉成棄真撰

### 第二期 宣毒期 西醫前驅期

癩疹由初潮至全部將透表。其間每多併發證。其原因、不因先天性毒素太重。即由後天性種種人爲害之。除遵行上述各項禁忌外。即宜宣毒法宣通腠理經絡、使癩疹容易透表。宣毒發表湯爲本期主方。故本期癩疹即以宣毒名之。

### 第五章 癩疹初潮主方

宣毒發表湯 全書第五條云。治癩疹發熱。欲出未出時。各證並宜。縱非癩候。用之無礙。

荊芥穗 防風 葛根 連翹 牛蒡子炒 淡竹葉 木通 枳殼炒各一錢 薄荷八分 升麻  
白桔梗 甘草

右十二味。加燈芯引。水煎服。勿用生薑。冬天寒月、可加蘇葉八分。又加蔥白爲



引。暑月炎天，可加生黃芩一錢。總除升麻、甘草、桔梗不用。

·秉真按西河柳爲發癩疹聖藥。本方加入更妙。方中木通、妊婦忌用。

曰歌癩疹初潮似外邪。辛甘發散勿沾牙。若施宣毒發表法。不是真癩亦不差。芥穗通防翹薄荷。

桔升甘枳葛牛加。燈芯爲引水煎服。冬月蘇葱用一些。若是炎天芩可入。總除甘桔與升麻。

### 附加減法

若初潮無汗，加蔥白以發之。更畧添衣被以取其汗。使毒得透。切不可遽用胡荽酒外治之法。免助邪火內攻。肺金重受其剋也。

若初潮小便赤者，除薄荷葉。加赤茯苓。或更加車前子以利之。

若初潮潮熱太甚者，加赤茯苓、生地黃。并可加生黃芩。不必拘癩初用寒涼冰伏、癩不得出之說。

正當用之以保肺受火剋之虞。但春冬寒月，黃芩宜畧少耳。

若初起往來潮熱者，除淡竹葉，免解膚熱，致癩難透表。在寒月天，仍宜加蘇葉、蔥白，以疏表之。

若初潮即現喘促。加黃芩、瓜蒌仁、葶藶子，以清肺開胸。或更加薑汁炒芥子、蘇子、萊菔子，以降之。

·秉真按芥子、萊菔子，氣味雄壯辛烈。惟癩疹挾有感冒致生痰喘者，或可用之。況與蘇子葶藶子