


北京市华罗庚学校奥林匹克系列丛书

奥林匹克中学数学讲座

中国人民大学附中编



中国大百科全书出版社

北京市华罗庚学校奥林匹克系列丛书

奥林匹克 中学数学讲座

中国人民大学附中 编

中国大百科全书出版社

北京·1996

顾 问：王 元 裘宗沪 冯克勤
陈德泉
主 编：刘彭芝
副主编：王书丹 童 欣
总策划：王书丹 陶晓勇 刘彭芝
冯克正 魏 钢
撰稿人：邵光砚 李珞珈 陶晓勇
刘彭芝 陈俊辉 邓 均
张春条 王健民 孙维纲
周春荔 李念伟 吴其明
李延林 周国镇 周沛耕
袁素芬 王人伟

图书在版编目 (CIP) 数据

奥林匹克中学数学讲座/中国人民大学附中编.
—北京：中国大百科全书出版社，1996，2
(北京市华罗庚学校奥林匹克系列丛书)
ISBN7—5000—5652—4

I. 奥… II. 中…
III. 数学课—中学—讲座 IV. G634. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 19416 号

前 言

北京市华罗庚学校是由中国科学院华罗庚实验室、中国科技大学和中国人民大学附中联合创办的，是中国人民大学附中超常教育体系的重要组成部分。其办学目标是为国家大面积早期发现与培养现代杰出科技人才开辟一条切实可行的途径，为我国教育事业面向现代化、面向世界、面向未来的战略方针探索一项行之有效的举措。在这里，一大批高级教师、大学教授和研究员精心执教，一批批数理超常儿童茁壮成长。华校全体师生缅怀我国著名数学家华罗庚教授，崇尚他为国为民鞠躬尽瘁的高贵品质，决心沿着他的路继续走下去，在教育改革的时代大潮中争做弄潮儿，为实现中华民族重振雄风的宏图大业甘当马前卒。

超常教育与早期教育，为当今各国教育家、心理学家所重视。超常教育研究得到了各国政府以及有远见卓识的社会各界人士的支持和赞助。他们认为，早期教育一旦在世界范围内推广成功，给世界带来的巨大影响，远比世界上任何一次科技革命和产业革命更深刻、更广泛。在前苏联，国家开办有各类天才学校，用于培养科技文体方面的超常儿童。在美国，控制论的创立者、“神童”维纳就是家庭和学校共同精心培育成功的典型。

近年来，我国众多有识之士在改革开放、建设有中国特色社会主义的宏图大业感召下，投身超常教育事业，辛勤耕

耘，刻苦研究，已经取得可喜的成果。超常教育是人类教育史上的一大进步。然而，不言而喻，超常教育又是一个异常复杂的新的教育课题。不论是历史上还是现实生活中，少年出众，而成年寻常的人比比皆是。究其原因，往往在于成长环境不佳，而主要则是未能在超常教育理论指导下施以特殊教育的结果。因此，我们必须更新教育观念，采取新的教育理论和方法，把大批聪慧儿童培养成为高科技时代的栋梁之材。创办华罗庚学校的主旨，就在于探索一条使那些天资优异的孩子们，既不脱离群体，以免身心畸形发展，又使他们的才华得以充分开发的可行之路。

七百多年前，英国思想家、实验科学的先驱罗吉尔·培根曾说：“数学是科学的大门和钥匙。”时至今日，人们更加清楚地看到了数学在现代教育中占据着永恒的地位。当今世界，自然科学、社会科学和数学已发展成为三足鼎立之势，而数学更是各门科学发展的基础；科学和技术的迅猛、巨大的进步，主要就是得益于数学的现代发展，特别是数学在物理学、生物学以及社会科学中的纵深渗透。因此，华校在以数学为带头学科的施教前提下，同时又鼓励学生们在自己感兴趣的其他课程，如物理、化学、生物、外语、计算机等学科中开拓进取，施展才华。这样，近而言之，希望他们在运用中体验数学的思维模式和神奇魔力；远而图之，则是为他们日后发展的多价值取向打下全面的科学文化素质的坚实基础。

华校采取科学的教学方法，进行开放式教学，努力开发学生的潜在能力，对学生实行超前教育。除由人大附中选派经验丰富的优秀教师任教外，还聘请中国科学院、中国科技

大学、北京大学、清华大学、中国人民大学以及北京师范大学等高校专家、教授来校办讲座。用最新的科技知识丰富学生的头脑，开阔他们的视野。

华校小学部属校外培训性质，从小学二年级选拔招生。入学后每周学习一次，寒暑假进行集中培训。招生时间定于每年10月份，招生范围以北京市为主，面向全国。届时小学各年级同时进行考试。录取时每个年级的前50名编为A班。几年来，华校小学部六年级A班的学生几乎百分之百被保送进入人大附中学习。初、高中部每个年级一个华校班，又称实验班。每年暑期，华校高中部聘请高等学校中的学科奥林匹克的高级教练来校讲授奥林匹克数学、物理、化学等知识，进行较强的针对性学习与训练，培养学生的独立思考、观察、分析和解决问题的能力，为他们参加区、市、全国乃至世界级的学科竞赛准备条件。

实践证明，华罗庚学校对超常儿童的培养方略是可取的。近十年来，华校为高一级学校输送了大量的学业优异的人才。以第一、二、三届试验班为例，三届毕业生总数为136人。其中，直接保送到国家第一流重点大学35人，占25.7%。参加高考的101人中，考入清华大学42人，占30.8%；北京大学41人，占30.1%；中国科技大学10人，占7%。总计考入上述三校为93人，加保送35人，总计为128人。第四届实验班又进一步：全班44人，保送9人，参加高考35人，高考平均分数为610.83分，数学平均分数为137分；总分数超过600分的有25人。不仅如此，还有数以千计的学生在区、市、国家乃至世界级的数理学科的竞赛中获奖夺魁，位居北京市重点中学之首。上述大量事实证明，一种新的教育理论和实

践,使得一批又一批英才脱颖而出,足以显示华罗庚学校的办学方向是正确的,教学是成功的。

更可喜的是:在探索办学的过程中,以华校为核心,造就并团结了校内外一大批具有新思想、新观念、肯吃苦、敢拼搏的优秀教师和教育专家。在这个来自平凡的教学科研岗位的不平凡的群体中,有多年工作在教学第一线的中小学高级教师,有近年来执着于数学、物理、化学、生物、计算机等学科奥林匹克活动的高级教练员,有中国科学院和各高等学校中教学科研上成绩卓著的专家教授。他们就像当年的华罗庚那样,做为人师,做为长者,着眼于祖国的未来,甘愿给下一代当人梯。狭义地说,他们是华校藉以成长、引以自豪的中流砥柱;广而言之,他们是推动中小学教育事业改革的一支特别劲旅;他们的教学经验和长期积累起来的教学资料更是我国中小学生在国内外学科奥林匹克赛场上争雄夺魁的无价“法宝”。

今天,在对华校创办十余年的经验进行总结时,我们可以说,在朝着自己的办学目标的不懈奋斗中,华校具有四大办学特色:

第一,从娃娃抓起的早期智力开发;

第二,必名师启蒙的成功教育传统;

第三,在全面发展时力求业有专精;

第四,处强手如林中敢于应接挑战。

教材是教学质量的基本保证,也是教学的基础建设。高质量的教材,是建立在高水平的学术研究成果和丰富的教学经验的基础上的。因此,华罗庚学校开创了荟萃专家编书的格局,愿将《华罗庚学校奥林匹克系列丛书》奉献给广大教

师、中小学生及学生家长同享。目前已出版和即将出版的有《华罗庚学校数学试题解析》（小学部一册、中学部六册）、《华罗庚学校数学课本》（小学部六册、中学部六册）《奥林匹克中学数学讲座》、《奥林匹克小学数学讲座》、《华罗庚学校计算机教材》、《华罗庚学校图解英语》、《华罗庚学校模范作文》、《华罗庚学校物理试题》、《华罗庚学校物理教材》、《华罗庚学校化学教材》、《华罗庚学校化学试题》。这套丛书的编选者都是华校的骨干教师，他们为了共同的目标献出了自己多年的教学经验和最新的教学科研成果，因而使得这套丛书具有实用、新颖、通俗、严谨的特点。这些特点使全书别具一格，面目一新。我相信，它必将博得广大师生与家长的喜爱。

俗云：“一花怒放诚可爱，万紫千红才是春。”华校在努力办学、完善自身的同时，诚望对国内中小学教学水平的提高微尽绵薄，诚望与其他兄弟学校取长补短，携手共进。“合抱之木，生于毫末，九层之台，起于垒土。”遥望未来，我们同呼志士之言：为中国在 21 世纪成为科技强国而献身。

作为本教材的主编，我谨以一个超常教育的积极参与者与组织者的名义，向各位辛勤的编著者致以衷心的谢意；恳请教育战线的前辈和同仁给予指导和推荐，也恳请广大师生在使用过程中提出宝贵的意见。

刘彭芝

目 录

第一讲	因式分解	(1)
第二讲	代数式的恒等变形 (一)	(17)
第三讲	代数式的恒等变形 (二)	(35)
第四讲	应用题选讲	(52)
第五讲	方程和方程组 (上)	(66)
第六讲	方程和方程组 (下)、	(82)
第七讲	二次函数	(97)
第八讲	不等式与最值	(113)
第九讲	正弦定理和余弦定理	(130)
第十讲	用面积关系解题	(155)
第十一讲	平等几何中的不等关系	(170)
第十二讲	几何变换 (一)	(198)
第十三讲	几何变换 (二)	(213)
第十四讲	棋盘上的数学	(227)
第十五讲	数论初步	(244)
第十六讲	极端性原理	(259)
第十七讲	反证法	(273)
第十八讲	操作与对策	(287)
第十九讲	逻辑推理	(298)
第二十讲	组合初步	(314)

第一讲 因式分解

多项式的因式分解是代数式恒等变形的最基本形式之一，是中学数学的一个重要的基础知识。因式分解方法灵活，技巧性强，应用广泛，在代数、几何、三角的解题与证明中起着重要的作用。

把一个多项式表示成几个整式乘积的形式，叫做多项式的因式分解。因式分解最基本的方法有：提取公因式法；运用公式法；可化为“ $x^2 + (a+b)x + ab$ ”型的二次三项式的分解法；分组分解法；二次三项式的“十字相乘法”。

除教科书内讲授的上述因式公解的基本方法之外，下面介绍的方法、技巧也是因式分解中经常用到的。

一、拆项与添项

由于因式分解是多项式乘法的逆运算，在多项式乘法运算后的整理化简中，经常会把几个同类项全并成一项，或两个仅符号相反的同类项相互抵消为零，所以对某些多项式进行因式分解时，常常需要把被合并的项或相互抵消的项恢复原状。

把多项式中的某项拆成两项或几项代数和的方法叫做拆项。

在多项式中添上两个仅符号相反的项的方法叫做添项。
拆项和添项的目的是使拆项或添项后的多项式能用分组

分解的方法进行因式分解. 常见以下两种情况.

① 为使分组后各组之间有公因式而拆项或添项.

② 为使分组后各组之间能用公式分解而拆项或添项.

例1 因式分解:

① $x^3 + 9x^2 + 26x + 24$;

② $a^2b + b^2c + c^2a - ab^2 - bc^2 - ca^2$.

解: ① 方法一:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^3 + 2x^2) + (7x^2 + 14x) + (12x + 24) \\ &= x^2(x+2) + 7x(x+2) + 12(x+2) \\ &= (x+2)(x^2 + 7x + 12) \\ &= (x+2)(x+3)(x+4).\end{aligned}$$

方法二:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^3 + 5x^2 + 6x) + (4x^2 + 20x + 24) \\ &= x(x^2 + 5x + 6) + 4(x^2 + 5x + 6) \\ &= (x+4)(x+2)(x+3).\end{aligned}$$

方法三:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^3 + 8) + (9x^2 + 26x + 16) \\ &= (x+2)(x^2 - 2x + 4) + (x+2)(9x + 8) \\ &= (x+2)(x^2 + 7x + 12) \\ &= (x+2)(x+3)(x+4).\end{aligned}$$

②

$$\begin{aligned}\text{原式} &= ab(a-b) + bc(b-c) + ca(c-a) \\ &= ab(a-b) + bc[(b-a) + (a-c)] + ca(c-a) \\ &= ab(a-b) - bc(a-b) + bc(a-c) - ca(a-c) \\ &= b(a-b)(a-c) + c(a-c)(b-a) \\ &= (a-b)(a-c)(b-c).\end{aligned}$$

说明:例1中的两个小题和第①题的三种方法,都是为了使分组后各组之间有公因式而进行的拆项.

例2 因式分解:

$$\textcircled{1} (m^2-1)(n^2-1)+4mn;$$

$$\textcircled{2} x^3+y^3+z^3-3xyz;$$

$$\textcircled{3} 2a^2b^2+2a^2c^2+2b^2c^2-a^4-b^4-c^4.$$

解:① 原式 $=m^2n^2-m^2-n^2+1+4mn$

$$=(m^2n^2+2mn+1)-(m^2-2mn+n^2)$$

$$=(mn+1)^2-(m-n)^2$$

$$=(mn+m-n+1)(mn-m+n+1).$$

② 原式 $=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3+z^3-3xy(x+y)-3xyz$

$$=(x+y)^3+z^3-3xy(x+y+z)$$

$$=(x+y+z)[(x+y)^2-(x+y)z+z^2]$$

$$-3xy(x+y+z)$$

$$=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx).$$

③ 原式 $=4a^2b^2-(a^4+b^4+c^4-2a^2c^2-2b^2c^2+2a^2b^2)$

$$=4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2$$

$$=(2ab+a^2+b^2-c^2)(2ab-a^2-b^2+c^2)$$

$$=[(a+b)^2-c^2][c^2-(a-b)^2]$$

$$=(a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b).$$

说明:例2中的①、③两小题,将原多项式通过拆项,使分组后能用平方差公式分解因式. ②题的第一步,我们添上了仅符号相反的两部分 $+3xy(x+y)$ 和 $-3xy(x+y)$,使第二步出现了 $(x+y)^3+z^3$ 可用立方和公式分解,并和后面的一组 $-3xy(x+y+z)$ 有公因式 $x+y+z$.

二、换元法

把一个较复杂的代数式中的某个部分,看做一个整体,并将这个整体以一个新的字母代替,使关于新字母的式子便于分解因式,这种方法叫做换元法.

1. 应用换元法化简代数式

例3 分解因式:

$$\textcircled{1} x(x+1)(x+2)(x+3)-8;$$

$$\textcircled{2} (x^2+4x+8)^2+3x^3+14x^2+24x;$$

$$\textcircled{3} x^4+2x^3+3x^2+2x+1.$$

解: $\textcircled{1}$ 式 $= (x^2+3x)(x^2+3x+2)-8$

设 $u=x^2+3x$ 则

$$\text{原式} = u(u+2)-8 = u^2+2u-8$$

$$= (u+4)(u-2)$$

$$= (x^2+3x+4)(x^2+3x-2)$$

说明:在无其他说明的情况下,多项式的因式分解在有理数范围进行. $\textcircled{1}$ 题分解至 $(x^2+3x+4)(x^2+3x-2)$ 即可.

若要求在实数范围分解因式,则 $\textcircled{1}$ 题的答案应是

$$(x^2+3x+4)\left(x+\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)\left(x+\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right).$$

$\textcircled{2}$ 设 $u=x^2+4x+8$ 则

$$\text{原式} = u^2+3xu+2x$$

$$= (u+x)(u+2x)$$

$$= (x^2+5x+8)(x^2+6x+8)$$

$$= (x^2+5x+8)(x+2)(x+4).$$

说明:上述答案是在有理数范围,也是在实数范围内分解

的结果.今后,凡因式分解习题,若不加以说明,则均在有理数范围内分解因式.

$$\begin{aligned}\textcircled{3} \text{原式} &= (x^4+1)+2(x^3+x)+3x^2 \\ &= x^2 \left[\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 2\left(x + \frac{1}{x}\right) + 3 \right]\end{aligned}$$

设 $t = x + \frac{1}{x}$, 则 $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$

$$\begin{aligned}\therefore \text{原式} &= x^2(t^2 - 2 + 2t + 3) \\ &= x^2(t^2 + 2t + 1) \\ &= x^2(t+1)^2 \\ &= x^2\left(x + \frac{1}{x} + 1\right)^2 \\ &= (x^2 + x + 1)^2.\end{aligned}$$

说明:③题中的多项式的特点是系数的对称性.

2. 二元对称式的换元

含有两个字母的多项式,当互换两个字母的位置时,多项式保持不变,这样的多项式叫做二元对称式.如:

$$x^4 + y^4 + (x+y)^4, \dots$$

对于一个较难分解的二元对称式,我们经常令 $u = x + y$, $v = xy$,用换元法分解因式.

例4 分解因式

$$\textcircled{1} x^4 + y^4 + (x+y)^4;$$

$$\textcircled{2} (x^2 + xy + y^2)^2 - 4xy(x^2 + y^2).$$

解:① 令 $u = x + y, v = xy$

$$\begin{aligned}\therefore x^4 + y^4 &= (x+y)^4 - 4x^3y - 6x^2y^2 - 4xy^3 \\ &= (x+y)^4 - 4xy(x^2 + y^2) - 6x^2y^2 \\ &= (x+y)^4 - 4xy[(x+y)^2 - 2xy] - 6x^2y^2\end{aligned}$$

$$=u^4-4v(u^2-2v)-6v^2$$

$$=u^4-4u^2v+2v^2$$

$$\therefore \text{原式} = u^4 - 4u^2v + 2v^2 + u^4$$

$$=2(u^4-2u^2v+v^2)$$

$$=2(u^2-v)^2$$

$$=2(x^2+xy+y^2)^2.$$

$$\textcircled{2} \text{ 令 } u=x+y, v=xy$$

$$\therefore x^2+xy+y^2=(x+y)^2-xy=u^2-v$$

$$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=u^2-2v$$

$$\therefore \text{原式} = (u^2-v)^2 - 4v(u^2-2v)$$

$$=u^4-2u^2v+v^2-4u^2v+8v^2$$

$$=u^4-6u^2v+9v^2$$

$$=(u^2-3v)^2$$

$$=(x^2+2xy+y^2-3xy)^2$$

$$=(x^2-xy+y^2)^2.$$

三、待定系数法

先假定已知多项式具有某种分解式,这个分解式中含有若干个待定的字母系数,然后应用多项式恒等的性质,或取多项式中原有字母的几个特殊值,列得关于待定的字母系数的方程或方程组,解出待定的字母系数值,这种分解因式的方法,叫做待定系数法.

例 5 分解因式:

$$\textcircled{1} x^4-2x^2+3x-2;$$

$$\textcircled{2} 2x^2+3xy-9y^2+14x-3y+20.$$

① 分析 已知多项式是关于 x 的 4 次式,我们首先假定

它能分解为两个关于 x 的二次式之积. 由于 x^4 项系数为 1, 常数项为 -2 , 所以这个分解形式必为 $(x^2+mx+1)(x^2+nx-2)$ 或 $(x^2+mx-1)(x^2+nx+2)$, 当我们列出关于待定系数 m, n 的方程组时, 发现第二种分解式是不可能存在的.

解: 设原式 $= (x^2+mx+1)(x^2+nx-2)$

$$\therefore x^4 - 2x^2 + 3x - 2 = x^4 + (m+n)x^3 + (mn-1)x^2 + (n-2m)x - 2$$

$$\therefore \begin{cases} m+n=0 & (1) \\ mn-1=-2 & (2) \\ n-2m=3 & (3) \end{cases}$$

由 (1) 得 $m=-n$ 代入 (2), 得

$$\begin{cases} m=1 \\ n=-1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} m=-1 \\ n=1 \end{cases}$$

将上面两组解分别代入 (3), 得 $m=-1, n=1$.

$$\therefore \text{原式} = (x^2-x+1)(x^2+x-2) \\ = (x^2-x+1)(x+2)(x-1).$$

说明: 设原式 $= (x^2+mx+1)(x^2+nx-2)$, 即 $x^4-2x^2+3x-2 = (x^2+mx+1)(x^2+nx-2)$. 取 x 的两个不同的值, 列得关于 m, n 的二元方程组, 仍可得 $m=-1, n=1$.

②分析 已知多项式中的前三项 $2x^2+3xy-9y^2$ 可分解为 $(x+3y)(2x-3y)$, 因此已知多项式必有分解式 $(x+3y+m)(2x-3y+n)$, 再求待定系数 m, n 的值.

解: 设原式 $= (x+3y+m)(2x-3y+n)$

$$\therefore 2x^2+3xy-9y^2+14x-3y+20 \\ = 2x^2+3xy-9y^2+(2m+n)x+(3n-3m)y+mn,$$

$$\therefore \begin{cases} 2m+n=14 \\ 3n-3m=-3 \\ mn=20. \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} 2m+n=14 \\ m-n=1 \\ mn=20. \end{cases}$$

解得 $m=5, n=4$

$$\therefore \text{原式} = (x+3y+5)(2x-3y+4).$$

说明:应用待定系数法分解因式时,所列出的关于待定系数的方程组中,方程的个数一般多于未知数的个数,如①题,由方程(1)、(2)解得 m, n 的值,再代入(3)检验,如果由(1)、(2)解出的 m, n 的值都不适合(3),则关于待定系数的方程组无解,此时可下结论:已知多项式不能分解为两个二次式之积.

例如:求证 x^2-xy+y^2+x+y 不能分解成两个一次因式的乘积,就可用上述方法证明.

四、求根法

1. 一元多项式

[因式定理]若 a 是一元多项式 $f(x)$ 的根(即 a 是方程 $f(x)=0$ 的根, $f(a)=0$ 成立),则 $x-a$ 是多项式 $f(x)$ 的一个因式.

在某个数集中对一个一元多项式进行因式分解,只要这个一元多项式在该数集中有根,就可以根据因式定理,应用求根法,找出这个一元多项式的一个或几个一次因式,再应用多项式除法(或拆项后的分组分解法)确定另一个因式,然后考虑另外一个因式可否继续分解因式.

求根法是一个容易掌握的方法,又是在复数范围内因式分解最常用的方法,求根法的关键是求根.求整系数多项式