


# 微積分

下冊

EDWIN E. MOISE 原著

李巡伯 徐復 張德新 葉福 合譯



校閱者

李新民 徐道寧

東華書局印行

# 微積分

## CALCULUS

下 册

EDWIN E. MOISE 原著

李巡伯 徐復  
張德新 葉福  
合譯

校閱者

李新民 徐道寧

東華書局印行



---

## 版權所有・翻印必究

中華民國五十八年九月初版  
中華民國六十六年九月三版

大學 微 積 分 (全三冊)  
用書

下冊 定價 新台幣陸拾元整

(外埠酌加運費滙費)

譯 者 李巡伯 吳森原 葉福  
發 行 人 卓 鑑  
出 版 者 臺灣東華書局股份有限公司  
臺北市博愛路一〇五號  
電話：3819470 郵撥：6481  
印 刷 者 中臺印刷廠  
臺中市公園路三十七號

---

行政院新聞局登記證 局版臺業字第零柒貳伍號  
(58040)

# 微 積 分

## 下 冊 目 次

### 第十一章 無窮級數

11. 1 序列之極限.....	697
11. 2 無窮級數・收斂性・比較檢驗法.....	703
11. 3 絶對收斂・餘式之估計.....	713
11. 4 級數之逐項積分・表 $\tan^{-1}$ 及 $\ln$ 之冪級數 .....	723
11. 5 絶對收斂之比值檢驗法・對冪級數之應用.....	732
11. 6 級數之積分及微分・表 $\exp$ $\sin$ 與 $\cos$ 之級數.....	739
11. 7 二項級數.....	746
11. 8 級數之導數與積分・一致收斂.....	753
11. 9 泰勒級數・餘式之估計.....	761
11. 10 複數系.....	769
11. 11 複指數函數・棣莫夫定理.....	779
11. 12 收斂半徑・複變數冪級數之微分.....	788

### 第十二章 線性空間與向量空間

12. 1 三維空間之笛卡爾坐標.....	797
12. 2 三維空間視為向量空間.....	809
12. 3 笛卡爾 $n$ 維空間, 直線, 平面, 標準正交基底.....	820

12. 4 向量空間之維 ..... 828  
 12. 5 許瓦茲不等式・範數與距離之更一般概念 ..... 837

### 第十三章 富氏級數

13. 1 射至子空間的之射影・三角多項式與富氏級數 ..... 849  
 13. 2 用三角級數作均一趨近 ..... 859  
 13. 3 富氏級數之積分・一致收斂定理 ..... 869

### 第十四章 線性變換・矩陣・行列式

14. 1 線性變換 ..... 878  
 14. 2 線性變換之合成與矩陣之乘法 ..... 888  
 14. 3 矩陣代數之形式性質，群與環 ..... 897  
 14. 4 行列式函數 ..... 903  
 14. 5 子式展開法・克萊姆解法與矩陣之逆 ..... 913  
 14. 6 列與行之運算・函數組之線性無關 ..... 920  
 14. 7 線性微分方程式 ..... 927  
 14. 8 解空間之維數定理・非齊次之情況 ..... 935

### 第十五章 多變數之函數

15. 1  $\mathbf{R}^3$  中之曲面與立體 ..... 944  
 15. 2 二次曲面 ..... 951  
 15. 3 二變數之函數・切片函數與偏微分 ..... 958  
 15. 4 方向導數與可微分函數・路線之連鎖法則 ..... 968  
 15. 5 多變數之可微分函數・連鎖法則・方向導數與坡度 ..... 981


15. 6 二變數函數之內局部極大與極小・等高線 .....	990
15. 7 二重積分之直觀處理法.....	1001
15. 8 空間之柱坐標・積分之定義.....	1008
15. 9 非均質體之力矩與形心.....	1018
15. 10 線積分.....	1027
附錄 K 逐次極限・混合偏微分 .....	1033
附錄 L 二變數函數可能之特異性 .....	1038
附錄 M 二變數函數之極大與極小 .....	1043
附錄 N 函數概念之正確定義 .....	1046
表一 自然三角函數 .....	1049
表二 指數函數 .....	1050
表三 數之自然對數 .....	1051
答案選輯 .....	1052
英漢名詞索引 .....	1062
漢英名詞索引 .....	1070

# 11

## 無窮級數

### 11.1 序列之極限

前在2.10節中已有求序列(sequence)極限之問題。當時欲求  $y=x^3$  之圖形下由 0 至  $h$  之區域  $R$  之面積。



如圖所示，以多邊形區域  $R_n$  趨近於  $R$ ；得  $R_n$  之面積為

$$A_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n \left( \frac{ih}{n} \right)^3 \frac{h}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{h^3}{n^3} i^3 = \frac{h^3}{n^3} \sum_{i=1}^n i^3$$

$$= \frac{h^3}{n^3} \cdot \frac{n}{6} (n+1)(2n+1) = \frac{h^3}{3} \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \left( 1 + \frac{1}{2n} \right);$$

而欲證得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = h^3/3.$$

此即欲證當  $n$  充分大時,  $A_n \approx h^3/3$ . 令此近似值之誤差為  $E_n$ , 則

$$E_n = A_n - \frac{h^3}{3} = \frac{h^3}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{2n}\right) - \frac{h^3}{3} = h^3 \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6n}\right).$$

上式右端第三個因式恆小於 1, 故  $E_n < h^3/n$ , 因而當  $h^3/n < \frac{1}{1000}$ ,

即當  $n > 1000h^3$  時, 可得  $E_n < \frac{1}{1000}$ . 一般言之, 對每一  $\epsilon > 0$ , 欲得

$$E_n = h^3/n < \epsilon,$$

僅須取  $n > h^3/\epsilon$  即可。

由上之討論, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = L$$

之定義可寫成:

**定義:** 已予一數列(每項均為數之序列特稱為數列)  $A_1, A_2, \dots$  及一數  $L$ . 若對每一  $\epsilon > 0$ , 恒存在一  $N$ , 使

$$n > N \Rightarrow L - \epsilon < A_n < L + \epsilon$$

成立, 則

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = L.$$

此與 5.3 節中

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

之定義類似. [事實上, 一序列可視為一定義域為所有正整數之函數: 對每一  $n$ , 此函數在  $n$  之值表為  $A_n$  以替代  $f(n)$ .]

依此定義, 和、積與商之定理均能加以證明. 在附錄 C 中, 此各定

理已寫成使其證明顯易之次序。為便於查考起見，茲簡述之如下；今後用及時，均不再加以註明。

**定理 1.** 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = B$ ，則

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n + B_n) = A + B, \quad (1)$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n B_n = AB. \quad (2)$$

若  $B \neq 0$ ，且對每一  $n$ ,  $B_n \neq 0$ ，則

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n / B_n = A / B. \quad (3)$$

有極限之序列稱為收斂 (convergent)。注意：上述定理中，須知序列  $A_1, A_2, \dots$  與  $B_1, B_2, \dots$  均收斂，始能證得其和、積與商亦如是。下面將述及一較強之定理，其收斂性在其結論中而不在假設中。

**定義：**若對每一  $n$ ,  $A_n \leq A_{n+1}$ ，則序列  $A_1, A_2, \dots$  稱為遞增 (increasing)。若對每一  $n$ ,  $A_n \geq A_{n+1}$ ，則此序列稱為遞減 (decreasing)。遞增 (減) 數列亦可簡稱為增 (減) 數列。若對每一  $n$ ,  $A_n < A_{n+1}$ ，則此序列稱為嚴格遞增 (strictly increasing)；若對每一  $n$ ,  $A_{n+1} < A_n$ ，則此序列稱為嚴格遞減 (strictly decreasing)。

**定義：**若存在一數  $M$ ，使對每一  $n$ ,  $A_n \leq M$ ，則  $M$  稱為數列  $A_1, A_2, \dots$  之一上界 (upper bound)，而謂此數列上方有界 (bounded above)。若有一數  $K$ ，使對每一  $n$ ,  $K \leq A_n$ ，則  $K$  稱為此數列之下界 (lower bound)，而謂此數列下方有界 (bounded below)。

欲證之定理如下：

**定理 2.** 若一數列遞增且上方有界，則此數列收斂。

此即若

$$A_1 \leq A_2 \leq \cdots \leq A_n \leq A_{n+1} \leq \cdots \leq M,$$

則此數列有一極限。此原理之第一個有趣的應用可能讀者已於幾何中見過。已予一直徑爲 1 之圓，作其內接正  $2n$  邊形。對每一  $n$ ，令  $A_n$  為此正  $2n$  邊形之周長。（最好由  $n=2$  開始。）由初等幾何知此數列  $A_1, A_2, \dots$  遞增，且因每一內接多邊形之周長小於外接正方形之周長，故對每一  $n$ ， $A_n < 4$ 。（試作出一圖形。）於是知此數列收斂。當然，其極限爲  $\pi$ 。

今開始證明此定理。令  $S$  為一切  $A_n$  所成之集合，即

$$S = \{A_n\}.$$

於是  $S$  有一上界。由最小上界公設 (LUBP)，知  $S$  有一最小上界。（參看上冊第 5.6 節。）此數稱爲  $S$  之上限 (**supremum**)，而以  $\sup S$  表之。令


$$A = \sup S.$$

今證

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A.$$

令  $\epsilon$  為任一正數，則  $A - \epsilon < A$ ，故  $A - \epsilon$  不爲  $S$  之上界，因而有一  $N$ ，使  $A_N > A - \epsilon$ 。但由於此數列遞增，故知

$$n > N \Rightarrow A_n > A - \epsilon.$$



因  $A$  為  $S$  之一上界，且  $A + \epsilon > A$ ，故  $A + \epsilon$  為  $S$  之一上界，因而對每一  $n$ ，

$$A_n < A + \epsilon,$$

故

$$n > N \Rightarrow A - \epsilon < A_n < A + \epsilon,$$

因而  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ , 即所欲證者.

對減數列可得一“對稱之定理”:

**定理 3.** 若一數列遞減, 且下方有界, 則此數列收斂.

此即若  $A_1, A_2, \dots$  遞減, 且對每一  $n$ ,  $A_n \geq K$ , 則此數列收斂.

**【證明】** 對每一  $n$ , 令  $B_n = -A_n$ , 則  $B_1, B_2, \dots$  遞增, 且上方有界, 故為收斂. 令  $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = B$ , 則  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = -B$ .

最後提及附錄 C 中之些定理, 此諸定理將有助於解下之習題.

**定理 4 (消失定理 annihilation theorem).** 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0$  而  $B_1, B_2, \dots$  有界, 則  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n B_n = 0$ .

(若有一數  $M$ , 使對每一  $n$ ,  $|B_n| \leq M$ , 則稱數列  $B_1, B_2, \dots$  有界. 意即此數列既為上方有界又為下方有界.)

**定理 5 (壓縮原理 The squeeze principle).** 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = L$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = L$ , 且對每一  $n$ ,  $A_n \leq B_n \leq C_n$ , 則  $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = L$ .

**定理 6.** 收斂數列恆有界.

此事對增數列顯然為真: 若  $A_1, A_2, \dots$  遞增, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ , 則對每一  $n$ ,  $A_1 \leq A_n \leq A$ . 同理, 對減數列亦真. 一般情形之證明參看附錄 C. 此定理有一簡易之應用: 若一數列不為有界則必不收斂.

### 敘述

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = -\infty$$

之意義正如所期者, 可參照第 5.3 節之形式自行寫出其定義. 此類數列不收斂. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \infty$ , 則謂此數列發散至無限大 (diverges to infinity). 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = -\infty$ , 則謂此數列發散至負無限大 (diverges

**to minus infinity).** 此處必須注意：若允許極限值為  $\infty$  或  $-\infty$  者為收斂，則定理 6 不成立，且定理 1 於多種情形下變為無意義。(無法作“數” $\infty$  與  $-\infty$  之代數運算。)

### 習題 11.1

討論下列之極限，即指出其是否存在，如可能並求出此數。

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$  (須由極限之定義入手。)

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + n}$  (試用本節中最後幾個定理之一。)

3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^3 + n^2 + \pi}$

4.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(2n+1)}{n}$

5.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

[提示： $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$  為已知。試求出  $\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y$ ，並用其結果於本題。]

6.  $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n$ ，其中  $B_n$  為半徑為 1 之圓外切正  $2n$  邊形之周長。(不必證明所作之答案為真，但事實上應為真。)

7.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n$

8.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln 1/n$

9.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x^2}$

10.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x^3}$

11.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$  (僅討論存在。可用幾何解釋。)

12.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x}$ .

13.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^3}$  (僅討論存在。)

14.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$  (僅討論存在。)

## 11 無窮級數

15.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left( \sin \frac{i\pi}{n} \right) \frac{\pi}{n}$  (幾何意義?)

16.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(i/n)} \left( \frac{1}{n} \right)$

17.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{i/n}$

18.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n}$

19.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \cos \frac{1}{n} \right)$

20.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \tan \frac{1}{n}$

21.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} - \ln n \right]$

(事實上，此極限存在；若能求出其幾何意義，則可加以證明。此極限稱為歐拉常數 (Euler's constant)。無人知其是否為有理數。)

22.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i+1)^2}$  (僅討論存在。)

## 11.2 無窮級數・收斂性・比較檢驗法

無窮級數為如下所示之“形式和”：

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots.$$

此處稱其為“形式和”，蓋因在多種情形下，此無窮多之項並無任何之“和”。例如級數

$$1 + 1 + 1 + \cdots \text{ (至無窮多項)}$$

無和；同樣級數

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 \cdots \text{ (至無窮多項)}$$

亦無和。但在多種情形下無窮多項之和可用下述極限之方式以定義之。

已予一級數

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i.$$

對每一  $n$ , 令

$$A_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

則稱  $A_n$  為此級數之  $n$  項部分和 (nth partial sum). 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A,$$

其中  $A$  為一(有限)數, 則謂此級數收斂 (convergent), 以  $A$  為其和 (sum). 或謂此級數收斂至  $A$ . 若此數列  $A_1, A_2, \dots$  無極限值, 則謂此級數發散 (divergent). 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \infty,$$

則謂此級數發散至無限大; 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = -\infty,$$

則謂此級數發散至負無限大. 此各敘述可簡記為

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = A, \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_i = \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_i = -\infty.$$

讀者所曾見之收斂級數最初之例或為幾何級數

$$1+r+r^2+\cdots+r^n+\cdots \quad (0 < r < 1),$$

此處

$$A_n = 1+r+r^2+\cdots+r^n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} = \frac{1}{1-r} - \frac{r^{n+1}}{1-r}.$$

若已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \quad (0 < r < 1), \quad (1)$$

則

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{1-r} \quad (0 < r < 1); \quad (2)$$

即

$$\sum_{i=0}^{\infty} r^i = \frac{1}{1-r} \quad (0 < r < 1). \quad (3)$$

有甚多種方法可以證明(1)式。下之證明較為有趣。因  $0 < r < 1$ ，故知對每一  $n$ ，

$$r^{n+1} < r^n.$$

由此知數列  $r, r^2, r^3, \dots$  遲減，且有一下界，即 0。因而此數列收斂至某一極限值  $L$ 。於是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = L, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r^{n+1} = L.$$

(何故？一數列去掉其第一項後，其極限有無變動？)。故

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} r^{n+1} = r \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = rL,$$

而

$$L = rL, \quad \text{即} \quad (1-r)L = 0.$$

因  $1-r \neq 0$ ，故得  $L=0$ 。於是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \quad (0 < r < 1).$$

事實上此結果對  $-1 < r \leq 0$  亦成立。由下述之簡易定理即可得知

**定理 1.** 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ ，則  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。反之亦然。

證明？(寫出  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$  與  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  之定義，立即可以看出其幾乎完全相同。)

由此得下之定理。

**定理 2.** 若  $-1 < r < 1$ ，則

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0.$$

因對每一  $r \neq 1$ ，代數公式

$$1 + r + r^2 + \dots + r^n = (1 - r^{n+1}) / (1 - r)$$

恆成立，故對幾何級數有下述更一般化之結果：

**定理 3.** 若  $-1 < r < 1$ ，則

$$\sum_{i=0}^{\infty} r^i = \frac{1}{1-r}.$$

因  $\lim_{n \rightarrow \infty} [-r^{n+1}/(1-r)] = 0/(1-r) = 0$ , 故上式成立. 若其第一項為  $a$  而不為 1, 則得

**定理 4.** 若  $-1 < r < 1$ , 則

$$\sum_{i=0}^{\infty} ar^i = \frac{a}{1-r}.$$

用下述定理易於看出級數之發散。

**定理 5.** 若  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$  收斂, 則  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**【證明】** 對每一  $n$ , 如前令

$$A_n = \sum_{i=1}^n a_i.$$

設  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ , 則對  $n > 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_{n-1} = A$ . 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n - A_{n-1}) = A - A = 0.$$

但  $A_n - A_{n-1} = a_n$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 即所欲證。

例如當  $a \neq 0$ ,  $|r| \geq 1$  時, 幾何級數  $\sum_{i=0}^{\infty} ar^i$  發散。此例中  $|a_n| = |a| \cdot |r|^n \geq |a|$ , 故  $a_n$  不趨近於 0.

注意：定理 5 之逆不成立，即一級數之第  $n$  項可趨近於 0，而此級數仍為發散。最簡單之例為下列級數：


$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \cdots.$$

其後五項均為  $\frac{1}{5}$ ; 等等。此處  $a_n \rightarrow 0$ , 但其部分和  $A_n$  無界。

一個更為有趣之例乃所謂之“調和級數”(harmonic series)

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots.$$

事實上此級數發散。欲證此，最簡單之方法為作一圖：



對每一  $n$ , 此圖形下由  $x=1$  至  $x=n+1$  之面積較所有外接矩形之全面積為小, 故

$$A_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \int_1^{n+1} \frac{dx}{x}.$$

但此一積分為  $\ln(n+1)$ ; 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = \infty,$$

故其部分和  $A_n$  構成一無界數列, 因而此級數必發散至無限大. 簡述之為下列定理.

**定理 6.**  $\sum_{i=1}^{\infty} 1/i = \infty.$

上述之比較方法亦可適用於級數收斂之證明. 例如討論

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2}.$$

此處  $a_i = 1/i^2$ , 故  $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$ , 但由此並不能推證此級數收斂. 然而其代數形式暗示其可能與下列之瑕積分有關: