

例須賠償的職業病指南



GUIDE TO
OCCUPATIONAL
DISEASES
PRESCRIBED FOR
COMPENSATION
PURPOSES



勞工處

勞工處

例須賠償的職業病指南

香港勞工處

一九九一年五月

例須賠償的職業病指南

引言

僱員如因患上職業病而致喪失謀生能力者，可參照工業意外賠償辦法獲得賠償。大部份法定職業病已於僱傭賠償條例第二附表中列明，而矽肺病及石棉沉着病則按肺塵埃沉着病（賠償）條例之規定處理。

本小冊子旨在淺釋法定職業病，其中包括有關概況及引起職業病的各種工作環境。更為詳盡的資料則收錄在另一本由勞工處出版的小冊子內，該本定名為「職業病診斷須知」的小冊子旨在供診治上述疾病的醫生作為參考之用。

指導服務

職業健康科人員樂意就有關法定職業病的任何問題或其他職業健康事宜，提供意見及協助。聯絡地址如下：

香港海港政府大樓十六樓勞工處職業健康科（電話號碼：八五二四〇四一）

目 錄

	法定職業病的分類.....	5
A 類	——物理因素所引致的疾病：	
A 1	放射病.....	5
A 2	熱內障.....	5
A 3	氣壓病.....	6
A 4	手部或前臂痙攣.....	6
A 5	手部皮下蜂窩織炎.....	6
A 6	膝部粘液囊炎.....	6
A 7	手肘粘液囊炎.....	6
A 8	手部或前臂腱鞘炎.....	6
B 類	——生物因素所引致的疾病：	
B 1	炭疽病.....	7
B 2	馬鼻疽病.....	7
B 3	鉤端螺旋體病.....	7
B 4	外在過敏性肺炎.....	7
B 5	布魯氏桿菌病.....	8
C 類	——化學因素所引致的疾病：	
C 1	鉛中毒.....	8
C 2	錳中毒.....	8
C 3	磷中毒.....	8
C 4	砷中毒.....	9

頁數

C 5	汞中毒	
C 6	二硫化碳中毒	
C 7	苯中毒	
C 8	苯衍生物中毒	
C 9	二硝基酚中毒	
C 10	碳氢化合物之鹵素衍生物中毒	
C 11	氧化二乙烯中毒	
C 12	氯化苯中毒	
C 13	亞硝酸中毒	
C 14	鉍中毒	
C 15	鎘中毒	
C 16	角膜退化	
C 17	皮膚癌	
C 18	鉻毒性潰瘍	
C 19	尿道癌	
D 類	——其他因素所引致的疾病：	
D 1	皮膚發炎或潰瘍	
D 2	上呼吸道或口腔發炎或潰瘍	
D 3	鼻癌	
	肺塵埃沉着病類：	
	矽肺病	
	石棉沉着病	
	摘要	

例須賠償的職業病指南

法定職業病的分類

爲着簡化鑒別工作起見，有關法例中列明的法定職業病是根據下列病因而予以分類的：

僱員賠償條例：

A 類——物理因素所引致的疾病；

B 類——生物因素所引致的疾病；

C 類——化學因素所引致的疾病；

D 類——其他因素所引致的疾病。

肺塵埃沉着病（賠償）條例：

肺塵埃沉着病——礦質塵埃所引致的疾病。

上述的類別和職業病係依次列於各條例內，現按照相同次序而就有關情況作進一步的探討。

A 類——物理因素所引致的疾病

這類職業病是由於工場內的物理因素（例如放射綫及壓縮空氣等）而引致的。其中包括下列各種：

A 1 放射病

接觸各種電磁輻射，包括X光及電離粒子，可以引致不同類型的放射病。感染放射綫的皮膚，可能引起毛髮脫落、急性發炎、潰瘍、皮膚炎及皮膚癌等病症。血液亦可能受到破壞，引致貧血或血癌。如果與鎘接觸，會引致骨瘤。另一種可能產生的有害影響就是導致眼部受損，產生白內障，並會妨礙視力。

涉及接觸電磁輻射或電離粒子的工作，都列爲法例所規定的職業，例如醫學上或工業上的射綫照像工作；或處理鎘、硝酸鈦或氫——八十五等放射性物質的工作。

A 2 熱內障

接觸高溫熱源可能引致眼部損傷，引起內障，逐漸影響視力，並可能引致雙目或其中一隻眼睛失明。最容易引起內障病的職業是那些須要與熔化或熾熱物質接觸的工作，例如玻璃製造及金屬鑄造等作業。

A 3 氣壓病

在加壓環境工作會產生突發性或遲發性影響骨骼的疾病。突發性的氣壓病稱為減壓症，是在進行減壓處理後即時或二十四小時內發作。通常症狀是骨骼及關節突然出現嚴重疼痛現象。這種疼痛現象稱為「佝僂」。有時更會出現虛脫、呼吸困難及肌肉麻痺等症狀，不過上述情況則較為少見。至於遲發性的氣壓病則稱為骨癆病，其病徵為骨骼及關節疼痛，更可能在幾個月或幾年後出現肩或股關節機能衰退。在進行加壓時，竇道及耳朵有時會感到疼痛，情況嚴重者，更會引致耳鼓破裂。

從事有關壓縮空氣的工作及潛水都是受到這類疾病威脅的職業。

A 4 手部或前臂痙攣

這類機能衰退病症見於不同行業，並有各種名稱，例如書寫痙攣、電報員痙攣或捻紗工痙攣等。這種病是由於手部或前臂重複類似動作，包括經常重複的肌肉運動，以致出現痙攣及疼痛。

與這類病症有關的職業就是那些須要長期重複精巧動作的工作，例如書寫、打字及編織等。

A 5 手部皮下蜂窩織炎

A 6 膝部粘液囊炎

A 7 手肘粘液囊炎

皮下蜂窩織炎或粘液囊炎的病況是受感染的部位除腫、痛外，更可能因惡化而產生膿液。

有關職業的工作使手、肘或膝部備受磨擦或壓力。便會產生這種現象；例如負責剝掘工作的工人，工作時手肘觸及地面的礦工，而需要跪着勞動的清潔工，可引起「女傭膝症」。

A 8 手部或前臂腱鞘炎

這是一種手部或前臂的腱或腱鞘發炎的病症。疼痛、腫脹及觸痛等症狀可能蔓延至前臂部份。腱鞘炎是由於手部肌肉及前臂肌肉因未經習慣的運動及過度勞累所引起的。有關職業如需要體力勞動或使手部及腕部重複運作，都會引起腱鞘炎。

B類——生物因素所引致的疾病

這類疾病是由於上場內經由動物或人類傳播的細菌或其他傳染因素所引起的。其中包括下列各種疾病：

B 1 炭疽病

由炭疽桿菌引起的炭疽病是牛、馬及其他動物的疾病。但人類如果接觸這些動物或其皮毛之類的產品，亦可能被傳染。人類皮膚最常受到感染。炭疽桿菌通常由手部、前臂或面部的微細傷口或抓損的傷處侵入體內。然後，感染部位會發生痕癢、腫脹、出現膿疱，並會腐爛及引起頭痛、發熱、嘔吐及虛脫等症狀。

接觸有炭疽桿菌的動物及處理動物產品或殘渣的工作，都列為有關的職業。屠場工人、農夫、獸醫、皮革廠及毛料業工人便是其中的一些例子。

B 2 馬鼻疽病

馬鼻疽病是另一種動物病，馬隻最易受到感染，而通常是由於接觸病畜而引起的。人類如果感染馬鼻疽菌，則會出現虛弱、頭痛、惡心及關節疼痛等急性病狀。感染部位會繼而腫脹及潰瘍。全身感染則會引致肝臟腫大及發高熱、皮疹。病狀較為緩慢者，則皮膚腫塊遍佈全身，繼而出現潰瘍。

職業上需要接觸馬科動物或其屍體的人士，都可能感染這種病症。

B 3 鉤端螺旋體病

鉤端螺旋體病見於鼠類、犬類及其他哺乳類動物。人類接觸這些動物或其帶有病原體的尿液亦可能受到感染。通常病情嚴重者，會有發熱和全身虛脫等病徵，而黃疸病更是常見的症狀。

在有鼠類出沒的地方工作，例如榮務工人；農夫；處理狗隻以及牛、豬等類動物的工作，都是受到鉤端螺旋體病威脅的職業。

B 4 外在過敏性肺泡炎

這是一種肺病名稱，病症是由於吸入發霉乾草或其他因霉菌而引致腐爛的蔬菜產品的塵埃所引起的。（由發霉乾草所引起之肺病亦稱農夫肺）。典型的症狀是咳嗽、發冷、發熱，並在吸入上述塵埃後幾小時內即開始呼吸困難。呼吸困難可能持續，而肺部損傷的情況亦會日益嚴重。

任何農作業及其他需要接觸發霉乾草或發霉蔬菜產品的職業，其從業人員均可能染上這類疾病。

B 5 布魯氏桿菌病

布魯氏桿菌病爲另一種可能會傳染人類的動物疾病。疾病的症狀包括發熱、頭痛、身體虛弱及全身疼痛，同時可能會引起腦膜炎和肺炎併發症。

有關涉及處理受感染的動物或其製品的工作，都列爲法例所規定的職業。例如，農夫、獸醫和屠夫、

C 類——由化學因素所引起的疾病

此類包括工業界常見的化學品中毒，其中包括下列各種疾病：

C 1 鉛中毒

在工業界中的鉛中毒通常是由吸入鉛塵或鉛烟所致，雖然鉛亦可以因吞食，或於處理有機化學品時，在偶然的情況下，透過皮膚進入體內。骨髓積聚太多鉛通常是會引起貧血和疲勞。這種疾病亦會侵襲神經系統，因而引致肌肉衰弱和麻痺，例如腕下垂等。而腹部絞痛和便秘便是其他可能出現的症狀。

法例所規定的職業是指那些涉及接觸鉛或鉛化合物的塵埃或烟霧的工作，而最爲危險是將鉛加熱至攝氏五百度以上時，例如在熔鉛、拆船和廢鐵翻新等行業。

C 2 錳中毒

吸入或吸收含有錳的塵埃或烟霧會產生腿部肌肉疲倦、僵硬和痙攣的症狀。此外，這種疾病又會影響神經系統，對步態、聲音、面部表情和性格造成影響。

與這種疾病有關的職業是那些使用錳或錳化合物的工作，例如製造乾電池和玻璃。

C 3 磷中毒

黃磷或白磷均含有劇烈的毒性，吞食這種物質會引致急性中毒，症狀包括腹痛、嘔吐、抑鬱、全身衰弱、毒性黃疸病，同時肝臟亦會受到嚴重損害；慢性中毒則可能會產生「磷毒性頷疽」，這種疾病會侵襲頷骨，引致嚴重發炎和壞死。磷化氫是磷的一種氣體化合物，毒性非常劇烈，吸入可以引致頭暈、頭痛、噁心、肺炎和神經系統受到干擾。與有機磷化合物接觸亦可引致中毒，症狀包括失去食慾、噁心、頭暈、腹瀉和疲勞。嚴重者瞳孔收縮、肌肉顫搐、絞痛、昏迷、抽搐或癱瘓。這種化合物是應用於殺虫劑和除莠劑之用。

在有關的職業上使用磷或有毒磷化合物，例如化工業和處理殺虫劑的農民便有這種危險。

C 4 砷中毒

在工業界中的砷中毒有兩類，急性砷中毒是由於與砷氣（砷化二氣）接觸所致，而慢性砷中毒通常是由於長期吸入砷化合物塵埃所致。砷氣破壞血液，引致貧血和黃疸病等徵狀。在輕微的病例中，可能會出現噁心、頭痛、戰慄、腹痛和嘔吐，而嚴重的情況則會引致血液和腎臟受到廣泛破壞和迅速昏迷。接觸砷塵會令皮膚發炎、生瘤；影響結膜引發眼炎；刺激鼻、喉及腸胃，引致嘔吐、絞痛和腹痛等症狀。

有關的職業是那些使用金屬砷或砷化合物的工作，例如製造農業用的殺蟲劑和除莠劑和涉及皮革、獸皮和皮革的防腐工作。

C 5 汞中毒

正如很多其他的化學品一樣，汞（水銀）是可以通過皮膚吸收，吞食和吸入煙塵而進入體內。通常最初期的汞中毒症狀是呈現出蒼白的面色、頭痛和失去食慾。牙齦會變得柔軟和腫脹及牙齒鬆脫，肌肉呈現震顫，而性格亦會改變，並且出現抑鬱或有時會產生幻覺和失憶。

有汞中毒危險的職業包括開採汞礦、製造含汞的爆炸品、殺菌劑、溫度計和其他儀器、使用含汞的消毒劑和防汚油漆，及將絨毛染紅的工作。

C 6 二硫化碳中毒

急性中毒病例的初期症狀是頭痛、頭暈、呼吸困難、嘔吐、胸部和腹部疼痛，嚴重者更會神智不清、昏迷及因呼吸衰竭引致死亡。在慢性中毒的病例中，會有腸胃失調、時常頭痛、頭暈、甚至性格轉變、精神緊張、神經過敏、失眠和失眠，如果病情加深，則中樞神經系統嚴重不適，肌肉衰弱和癱瘓及眼睛缺損。

二硫化碳是一種溶劑，用於橡膠的硫化過程，而用於製造人造絲和賽璐珞則較為普遍。此外，亦有用於製造化學品、防水混凝土，亦有時用作製造殺蟲劑。通常中毒事件是因為接觸這種物質的煙霧所致。

C 7 苯中毒

急性中毒是由於吸入高濃度苯煙霧，症狀包括頭痛、頭暈、噁心和嘔吐，嚴重者會胸部疼痛、抽搐和癱瘓、昏迷和呼吸衰竭。慢性中毒是較為常見，主要是對血細胞構成影響，引致疲勞、肌肉衰弱、面色蒼白，甚至貧血和白血球過多症。

苯是一種蒸餾煤焦油的產品，這種溶劑可以用作抽取其他化學品和製造墨水、染料、顏料、橡膠和人造皮革。苯亦可以用作去除油污和清潔劑。法例所規定的職業是指任何使用苯或與苯的化學性質相似的化合物，例如使用甲苯或二甲苯從事工作的職業。

C 8 苯衍生物中毒

苯同系的硝基、氨基衍生物或與苯有化學關係的物質，主要是指硝基苯、硝基甲苯、苯胺和氨基衍生物，例如一氯化苯等都是有毒的物質。各種物質的毒性各有不同，但是大多數急性中毒的症狀都大致相同。在輕微中毒的情況中，由於毒性影響血液，因而引致呼吸困難、面部潮紅或青紫，全身覺得虛弱和頭痛，如果病情惡化，面部青紫色加深、噁心、嘔吐、絞痛和虛脫。

有這種危險的職業包括有乾洗工作、使用上述物質作為清洗和去油污溶劑的工作、油漆和漆器上漆工作、擦光劑和皮革衣服的製造及處理木防腐劑、熏蒸劑和殺蟲劑等工作。

C 9 二硝基酚中毒

1,2,4-異構體是工業界中最常見的一種二硝基酚(DNP)。這是一種黃白色的結晶體物質，而這種物質在化學本質上與二硝基鄰甲酚(DNOC或DNOC)和二硝基丁基酚有關連。輕微中毒會引致胃部不適、失去食慾、噁心和嘔吐，嚴重的會引致流汗，尤其在晚上流汗的情況更為顯著、發熱、口渴、脈搏跳動加快、呼吸困難、體重急劇減低、皮膚轉黃、進一步更會發高熱昏迷。

法例所規定的職業是指那些使用化學品的工作，例如製造染料和將二硝基酚用作木防腐劑和殺蟲劑等工作。

C 10 碳氫化合物之鹵素衍生物中毒

常見的碳氫鹵素化合物有四氯(代)乙烯、四氯乙烷、四氯化碳、三氯乙烯、甲基氯和甲基溴，這些物質可以用作溶劑、膠粘劑、滅火器和殺蟲劑。各種化合物的毒性效力各有不同。急性中毒的常見症狀有頭痛、頭暈和肌肉衰弱，嚴重的更會急速虛脫，皮膚和眼睛亦經常受到刺激，同時視乎化學品的種類，肺、肝和腎都會受到損害。

有關的職業是那些使用任何該類化合物，以供清洗及去除金屬零件油污的工作、乾洗、製造和修理雪櫃及滅火器和防治蟲鼠工作等。

C 11 二氯化二乙烯中毒

二氯化二乙烯又稱爲二噁烷，是一種溶劑。它的烟霧會刺激眼睛和喉嚨。長時間接觸這種溶劑，會引起頭痛、暈眩、失去食慾、噁心和嘔吐等症狀，如果病情加深，更會引致腹部和背部疼痛及肝和腎受到嚴重損害。

法例所規定的職業是指那些使用二噁烷的工作，這些化學品主要是用於製造磨光化合物、化粧品和脫漆製品等。

C 12 氯化萘中毒

接觸氯化萘的烟霧會令皮膚出現粉刺或肝臟因受損而產生毒性黃疸病和嚴重的疾病。

有中毒危險的職業包括那些使用氯化萘的工作，例如在電綫上加上絕緣外層和電鍍時將金屬部份消隱等工作，都會發生中毒的危險。

C 13 亞硝酸中毒

吸入亞硝酸會損害肺部，引致咳嗽、胸部緊迫和呼吸困難，如果病情加深，會引致肺炎和呼吸衰竭。

當亞硝酸與空氣接觸或與有機物(例如木)發生反應，便會產生亞硝酸。此外，亦會於燃燒某些物料，例如假象牙和炸藥，以及在高溫燒焊時即產生亞硝酸。法例所規定的職業是指那些會產生亞硝酸的工作，而電弧焊接和使用爆炸品的工作便是其中的例子。

C 14 鍍中毒

鍍與人體接觸時，會產生刺激作用。主要影響皮膚及粘膜，引致皮膚炎、結膜炎及鼻咽炎。情況嚴重時，更會引致氣管支氣管炎或肺炎，症狀包括咳嗽、發熱、胸痛、呼吸困難及虛脫等。倘長期與鍍接觸，除皮膚可能出現小結外，更會導致肺部機能日益衰退。

鍍是用於製造合金、收音機真空管、坩堝及電瓷器的金屬。任何職業須接觸鍍均被列爲法定的職業病。

C 15 鎘中毒

鎘中毒通常是由於吸入烟霧所引起。如屬急性中毒，咽喉會感到輕微不適，引起咳嗽。數小時後，出現類似流行性感冒的病徵，包括胸口緊迫及胸痛、呼吸困難、打顫、出汗、背部及四肢疼痛、頭痛及暈眩等。

此外，亦會引致肺部或腎臟嚴重喪失功能。如屬慢性中毒，則會出現疲倦、咳嗽等病徵，而肺部、腎臟、肝臟或血液的功能亦會明顯受到損壞。

有這種危險的職業包括那些使用鎢的工作如塗鎢工序、塑膠製造業、鍍鎢金屬的焊接以及鎢合金製造業等。

C 16 角膜退化

某些物質特別容易刺激眼部，進而引致角膜潰瘍，使眼部受損。症狀包括眼部不適、疼痛及紅腫。這些物質有砷、焦油、瀝青、礦油、煤烟、醃及醃型化合物。在有關職業內發生這些情況，被列為法定的職業病。

C 17 皮膚癌

C 16 所述的同類物質，如經長期接觸，亦可能導致皮膚癌。腫瘤通常生在與化學品接觸的手臂或身體其他部份。

在有關的職業內，與砷、焦油、木瀝青、瀝青、礦油及煤烟接觸均會受到這種疾病的危害。

C 18 鉻毒性潰瘍

鉻微粒經由抓損的傷處或微細傷口進入皮膚。最初出現圓形硬塊，繼而形成潰瘍（稱為「鉻孔」）。吸入鉻鹽則可引致鼻部潰瘍。

從事鍍鉻、陽極氧化、紡織、毛皮染色及製革工作的工人均有患病的危險。

C 19 尿道炎

長期與某些芳香族胺接觸，例如β萘胺、α萘胺或聯苯胺，都可能引起尿道炎。最常接觸這些物質的行業有紡織印染、橡膠及電纜製造、化驗所工作等。

職業性膀胱腫瘤的徵狀與非職業性引起的並無不同。最初出現的徵狀是血尿，即在尿液內發現紅血球

D 類——其他因素所引致的疾病

這類疾病係由各類塵埃、液體或蒸氣所致。現分述如下：

D 1 皮膚發炎或潰瘍

工作時，接觸刺激性物質可引致皮膚發炎或潰瘍。手部及臂部是最常見受影響的部位。最早出現的症狀為皮膚呈現紅色，繼而出現腫脹、發庖及潰瘍的現象。

在有關職業內，工作上使用刺激皮膚物質，如溶劑，去污劑及油類等，都會引致皮膚炎或潰瘍。

D 2 上呼吸道或口腔發炎或潰瘍

很多工業物質的煙霧或塵埃經吸入後，會刺激口腔膜、咽喉及支氣管。症狀包括呈現紅斑、疼痛、咳嗽，甚至潰瘍及引致出血。

產生刺激性塵埃或煙霧的任何有關職業，都可能引致上述的情況。

D 3 鼻癌

某些木屑及皮革屑會導致鼻腔及鼻竇癌。鼻塞、腫脹、鼻液帶血及疼痛均為鼻癌的症狀。

法例所規定的職業就是那些製造或修理木器業以及造鞋或補鞋業，其中涉及的人士包括傢具及鞋業工人。

肺塵埃沉着病類（肺塵埃沉着病（賠償）條例所規定的職業病）

這類疾病包括因吸入礦質塵埃而引致的疾病。現分述如下：

矽肺病

這種情況，是由於吸入矽石（矽）粉塵多年後，肺部出現纖維化的現象所致。症狀包括呼吸急促、咳嗽以及肺部功能日漸衰退等。

由於花崗岩含有矽，有關的職業主要便是與花崗岩接觸的工作，例如採石礦、挖掘隧道及建築工作等。

石棉沉着病

吸入石棉纖維亦會導致肺部出現纖維化的現象。這種疾病稱為石棉沉着病。石棉沉着病引致肺部機能日益衰退，症狀包括呼吸困難、咳嗽及軟弱無力。此外，與石棉接觸更會導致肺部及胸膜生癌。

有這種危險的職業是那些使用石棉及產生石棉塵的工作，例如處理鍋爐墊和蒸氣管的接縫物及其他隔熱工序，造船及拆船業以及石棉物品的製造等。

摘要

職業病

病徵

有關職業

A 1 放射病

皮膚炎、皮膚瘤、貧血、白內障

工業放射攝影、製造燈紗、夜光錶、保養X光機等。

A 2 熱內障

視力衰退

製造玻璃、鋼鐵廠、火爐操作員。

A 3 氣壓病

佝僂、肩痛、腳痛、呼吸困難、休克

壓縮空氣工作員、潛水員。

A 4 手部或前臂痺攣

疼痛、痙攣

捻紗員、書寫、打字、編織等。

A 5 手部皮下蜂窩織炎

手部發炎

體力勞動

A 6 膝部粘液囊炎

膝部發炎

礦工、清潔人員。

A 7 手肘粘液囊炎

手肘發炎

礦工、起磚。

A 8 手部或前臂腱鞘炎

手腕腫痛

體力勞動

B 1 炭疽病

發燒、紅腫、膿疱、潰瘍

屠場工人、獸醫、皮革廠、毛料業工人。

B 2 馬鼻疽病

發燒、皮膚腫脹

馬房工作者

B 3 鉤端螺旋體病

發燒、黃疸病、流鼻血

染務工人、養豬場、農夫。

B 4 外在過敏性肺泡炎

氣喘、發冷、咳嗽

農夫

B 5 布魯氏桿菌病

感冒、肺炎

屠場工人、獸醫、農夫。

C 1 鉛中毒

肌絞痛、貧血、腕下垂、神智不清

造船業、拆船業、製造汽車電池、溶鉛業。

職業病

病徵

有關職業

C 2 錳中毒

性格變化、疲倦

製造乾電池、玻璃等。

C 3 磷中毒

黃疸病、頰疽、判斷力弱、頭暈、抽搐

製造炸藥、毒老鼠藥、肥料、殺蟲劑、農夫。

C 4 鉀中毒

肚痛、痙攣、貧血、荷血

殺蟲劑、防腐(木、皮革)劑。

C 5 汞中毒

流牙血、腸胃不適、手顫、性格變化

製造科學儀器、防腐劑。

C 6 硫化砷中毒

神智不清、性格變化、手顫

製造人造絲橡膠、防水混凝土。

C 7 苯中毒

頭暈、興奮、痙攣、貧血、白血球過多症

製造墨水、染料、顏料、橡膠、人造皮革。

C 8 苯衍生物中毒

面紅、頭痛、面色青紫、腦力衰退

乾洗、去油污、油漆、防腐劑。

C 9 二硝基酚中毒

流汗、口乾、發燒

製造染料、防腐劑、殺蟲藥。

C 10 碳氮化合物之鹵素衍生物中毒

頭暈、昏迷、黃疸病

去油污、乾洗、殺蟲藥。

C 11 二氯化乙烯中毒

頭暈、肚痛、背痛

製造磨光化合物、化粧品、脫漆劑。

(二噁烷)

C 12 氯化苯中毒

粉刺、黃疸病

製造絕緣電綫、電鍍業。

C 13 亞硝酸中毒

咳嗽、呼吸困難、痰有血

石礦場爆炸工序、燒焊行業。

C 14 鉍中毒

呼吸急促、咳嗽、痰有血、皮膚小結、肺氣腫

製造合金、收音機真空管、電器等。

C 15 鎘中毒

胸痛、氣促、貧血

電鍍、鎘電池。

職業病

病徵

有關職業

C 16

角膜退化

視力退化、眼痛

處理焦油、瀝青、醃、煤烟化合物。

C 17

皮膚癌

皮膚小結、潰瘍

長期接觸焦油、瀝青、醃、礦物油、煤烟、砷。

C 18

鉻毒性潰瘍

硬塊、鉻孔

鉻電鍍、染料、皮革行業。

C 19

尿道癌

排尿困難、血尿

紡織品染色及印刷、橡膠及電纜製造、實驗室工作。

D 1

皮膚炎

紅、腫、起水疱

電子、建築、紡織、傢俬、皮革業。

D 2

上呼吸道發炎

咳嗽、流鼻水

處理鉻、砷、梳打等。

D 3

鼻癌

流鼻血、面腫、鼻塞

製造傢俬、鞋行業。

肺塵埃沉着病

矽肺病

氣促、乾咳

石礦場、建築、挖掘隧道、磨光、砂噴、玻璃、搪瓷業。

石棉沉着病

氣促、咳嗽、痰、胸痛

造船、拆船、隔熱、處理石棉物品等。