



实用中草药

图本

Practical Illustrations of
Chinese Materia Medica

2

根茎类、皮类、茎藤类、其他类

主编 徐国钧 王 强

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

实用中草药

图本



2

根茎类、皮类、茎藤类、其他类

主 编：徐国钧 王 强
编 著 者：曾金虎 彭治章 张 勤
刘守金 黄 芸 崔秀明
曹沛琴 张婷婷 刘 海
验方提供者：朱濂溪 华碧春 江英志
助 编：陈丽红 周劲松 施天慧
刘潇潇 杨 杰 王丽萍
柳 玲 陈筱清 丁 尧
施 宇 赵 耀

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药图本 2 根茎类、皮类、茎藤类、其他类 / 徐国钧, 王强主编. —福州: 福建科学技术出版社, 2006.2

ISBN 7-5335-2717-8

I. 实… II. ①徐… ②王… III. 中草药 - 图集

IV. R28-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 119145 号

- | | |
|------|------------------------------------|
| 书 名 | 实用中草药图本 2 根茎类、皮类、茎藤类、其他类 |
| 编 著 | 徐国钧 王 强 |
| 出版发行 | 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001) |
| 网 址 | www.fjstp.com |
| 经 销 | 各地新华书店 |
| 排 版 | 视觉 21 设计工作室 |
| 印 刷 | 福建彩色印刷有限公司 |
| 开 本 | 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 |
| 印 张 | 7.5 |
| 字 数 | 164 千字 |
| 版 次 | 2006 年 2 月第 1 版 |
| 印 次 | 2006 年 2 月第 1 次印刷 |
| 印 数 | 1 — 8000 |
| 书 号 | ISBN7-5335-2717-8 |
| 定 价 | 25.00 元 |

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

前言

1989年,在福建科学技术出版社的鼎力支持下,我们在国内率先出版了《中草药彩色图谱》。十多年来该书一直深受广大读者的欢迎。尽管在《中草药彩色图谱》一书出版后,又有多种此类图书出版,但它始终保持良好的销售势头,得到社会和市场的青睐,现已印刷19次,印数近15万册。

读者的厚爱 and 信任,让我们不敢有丝毫懈怠,为了满足各层次读者的不同需求,我们在修订《中草药彩色图谱》(第三版)的过程中将植物药的内容加以挑选、增补,重新汇编了这套《实用中草药图本》系列。

《实用中草药图本》系列是在《中草药彩色图谱》(第三版)的基础上,按入药部位将其分为4册,各分册约筛选120个品种,即:

《实用中草药图本1》:根类、花类;

《实用中草药图本2》:根茎类、皮类、茎藤类、其他类;

《实用中草药图本3》:果实类、种子类;

《实用中草药图本4》:叶类、木类、全草类。

《实用中草药图本》系列收录的内容包括以下几方面:

1. 收载品种均为植物药,包括传统中药、草药和民间用药。

2. 每个品种收载的项目有药材中文名、拉丁名、别名、来源、形态、采制、性状、性味、功用、验方等。


3. 为了突出本书的实用性,应广大读者的强烈要求,特地在每味药材下增添了验方内容。

在此须提醒读者注意的是,本书“功用”中的用药剂量较保守,除个别有毒药物须严格控制用量外,一般药物在临床中的用量可视实际情况而定;个别“验方”中有用到国家级保护的动植物,如穿山甲等,现已禁止非法捕猎与贸易,临床应用时可换替代品;临床疾病往往错综复杂,选用验方之前一定要有明确的诊断,若诊断不明确或病情严重的,应及时就医。

书中部分照片由周印锁、赖茂祥、吴家荣、邬家林、王年鹤、王峥涛、余伯阳、李萍、陈道峰、陈虎彪、格桑索朗、钟国跃、林惠蓉、敬松、杨莉等同仁提供,在此深表感谢。

最后,衷心希望本套图本能满足广大读者的需要。

徐国钧、王强
于中国药科大学
2005年2月



根茎类

干姜 / 2

土茯苓 / 4

大黄 / 6

大蒜 / 8

山药 / 10

山柰 / 12

千年健 / 14

川贝母 / 16

川芎 / 18

川射干 / 20

天南星 / 22

天麻 / 24

升麻 / 26

水仙 / 28

水半夏 / 30

水菖蒲 / 32

玉竹 / 34

石菖蒲 / 36

石蒜 / 38

北豆根 / 40

仙茅 / 42

白及 / 44

白术 / 46

白附子 / 48

白茅根 / 50

白前 / 52

半夏 / 54

百合 / 56

延胡索 / 58

伊贝母 / 60

丽江山慈菇 / 62

苍术 / 64

芦根 / 66

羌活 / 68

虎杖 / 70

虎掌南星 / 72

知母 / 74

金荞麦 / 76

狗脊 / 78

泽泻 / 80

茺蔚贯众 / 82

贯众 / 84

骨碎补 / 86

香附 / 88

重楼 / 90

鬼臼 / 92

姜黄 / 94

穿山龙 / 96

莪术 / 98

射干 / 100

粉萆薢 / 102

拳参 / 104

浙贝母 / 106

海芋 / 108

黄连 / 110

黄药子 / 112

黄精 / 114

绵马贯众 / 116

绵萆薢 / 118

菝葜 / 120

落新妇 / 122

紫萁贯众 / 124

湖北贝母 / 126

藁本 / 128

皮类

土荆皮 / 130

川桐皮 / 132

五加皮 / 134

乌柏根皮 / 136

白鲜皮 / 138

地骨皮 / 140

肉桂 / 142

杜仲 / 144

牡丹皮 / 146

苦楝皮 / 148

厚朴 / 150

香加皮 / 152

秦皮 / 154

海桐皮 / 156

黄柏 / 158

椿皮 / 160

茎藤类

丁公藤 / 162

大血藤 / 164

川木通 / 166

木通 / 168

石斛 / 170

西河柳 / 172

肉苁蓉 / 174

竹茹 / 176

灯心草 / 178

皂角刺 / 180

鸡血藤 / 182

爬山虎 / 184

钩藤 / 186

鬼箭羽 / 188

络石藤 / 190

桑寄生 / 192

通草 / 194

常春藤 / 196

锁阳 / 198

槲寄生 / 200

其他类

马勃 / 202

冬虫夏草 / 204

血竭 / 206

芦荟 / 208

灵芝 / 210

阿魏 / 212

青黛 / 214

昆布 / 216

茯苓 / 218

海金沙 / 220

猪苓 / 222

雷丸 / 224

药材中文名

索引 / 226

药材功效分类

索引 / 232



实 用

中草药

图 本

干姜

Rhizoma Zingiberis

别名 均姜、川姜、白姜、黄姜。

来源 为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的根茎。

形态 多年生草本，高40~100厘米。叶2列，线状披针形，长15~30厘米，宽约2厘米，光滑无毛。花茎自根茎生出，高约20厘米；穗状花序卵状至椭圆状；苞片淡绿色，卵圆形；花冠黄绿色，裂片披针形；唇瓣中央裂片长圆状倒卵形，较花冠裂片短，有淡紫色条纹及淡黄色斑点；雄蕊微紫色。本品栽培时很少开花。我国大部分地区有栽培。

采制 冬季采挖，除去茎叶及须根，洗净，晒干或低温干燥。药材主产于四川、贵州。

性状 根茎呈扁平块状，指状分枝，长3~7厘米，厚1~2厘米。表面灰黄色或淡灰棕色，粗糙，具纵皱纹及环节。分枝处常有鳞叶残存，分枝顶端有茎痕或芽。质坚实，断面黄白色或灰白色，粉性或颗粒性，内皮层环纹明显，维管束及黄色油室散在。气香、特异，味辛辣。

性味 性热，味辛。

功用 温中散寒，回阳通脉，燥湿消痰。用于脘腹冷痛、呕吐泄泻、肢冷脉微、痰饮喘咳。用量3~9克。

验方 ①胃腹冷痛：干姜9克，高良姜6克，制香附9克，水煎服。②虚寒腹泻：干姜9克，党参15克，白术9克，茯苓9克，炙甘草6克，白蔻仁6克，水煎服。③肺寒咳嗽、气喘：干姜9克，桂枝9克，款冬9克，紫苑9克，煮半夏9克，茯苓10克，五味子9克，北细辛0.5克，水煎服。



姜



干姜

土茯苓

Rhizoma Smilacis Glabrae

别名 冷饭团、硬饭头、红土苓。

来源 为百合科植物光叶菝葜 *Smilax glabra* Roxb. 的根茎。

形态 常绿攀援状灌木。茎无刺。叶互生，薄革质，长圆形至椭圆状披针形，长5~12厘米，宽1~5厘米，先端渐尖，全缘，下面通常绿色，有时略有白粉，基出脉3条，有卷须。花单性异株，腋生伞形花序；花被片6，内轮细小，白色或黄绿色；雄花雄蕊6；雌花具退化雄蕊，子房上位。浆果球状，红色，外被白粉。花期7~8，果期9~10月。生于山坡或林下。

采制 夏、秋两季采挖，除去须根，洗净，干燥，或趁鲜切成薄片，干燥。药材主产于广东、湖南、湖北、浙江、江苏、四川。

性状 根茎略呈圆柱状，稍扁或呈不规则条块，有结节状隆起，具短分枝，长5~22厘米，直径2~5厘米。表面黄棕色或灰褐色，凹凸不平，有坚硬的须根残基，分枝顶端有圆形的芽痕。质坚硬。切片呈长圆形或不规则，切面类白色至淡红棕色，粉性，可见点状维管束及多数小亮点。无臭，味微甘、涩。

性味 性平，味甘、淡。

功用 除湿，解毒，通利关节。用于湿热淋浊，带下，痈肿，瘰疬，疥癣，梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨疼痛。用量15~60克。

验方 ①疔疮疖肿：土茯苓24克，蒲公英24克，金银花15克，一点红24克，水煎服。②过敏性皮炎：土茯苓30克，苍耳子10克，豨莶草15克，芋环干15克，杠板归20克，水煎服。③梅毒：土茯苓30克，鬼针草30克，连翘15克，一枝黄花30克，水煎服。



光叶菝葜



土茯苓

大黄

Radix et Rhizoma Rhei

别名 将军、葵叶大黄、北大黄、天水大黄。

来源 为蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L. 的根茎及根。

形态 多年生草本，高达2米。基生叶宽卵形或近圆形，长、宽均达35厘米，掌状5~7中裂，裂片窄三角形，叶柄粗壮；茎生叶互生，较小；托叶鞘大，膜质，淡褐色。大圆锥花序顶生；花小，红紫色，花被片6。瘦果三棱形，具翅。花期6~7月，果期7~8月。生于山区林缘或草坡；有栽培。

采制 秋末采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，绳穿成串干燥或直接干燥。药材主产于青海、甘肃、四川、陕西。

性状 本品呈类圆柱状、圆锥状、卵圆状或不规则块状，长3~17厘米，直径3~10厘米。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，有的可见类白色网状纹理及星点（异形维管束）散在，残留的外皮棕褐色，多具绳孔及粗皱纹。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，有星点环列或散在；根木部发达，横断面具放射状纹理，形成层环明显，无星点。气清香，味苦而微涩，嚼之黏牙，有沙粒感。

性味 性寒，味苦。

功用 泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘、积滞腹痛、泻痢不爽、湿热黄疸。用量3~30克，用于泻下不宜久煎；外用适量。

验方 ①便秘：生大黄10克，草决明15克，生地黄30克，大枣5个，水煎服。②疮痈肿：生大黄（研粉）适量，鲜一点红适量捣烂调大黄粉敷患处。③跌打损伤：生大黄粉、白芷粉、栀子粉各适量，酒、水各半，调敷患处。



掌叶大黄



大黄

附注 同属植物唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf.、药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的根及根茎同等入药。

大蒜

Bulbus Allii Sativi

别名 葫、青蒜。

来源 为百合科植物蒜 *Allium sativum* L. 的鳞茎。

形态 多年生草本，全株具特异蒜臭气。鳞茎扁圆锥状或球状。叶数片，基生，扁平，线状披针形，灰绿色，长可达50厘米，宽2~2.5厘米，基部鞘状。花茎直立，较叶长，高55~100厘米，圆柱状，苞片1~3，膜质，浅绿色。伞形花序，花小，多数稠密，花间常杂有淡红色珠芽，直径4~5毫米；花梗细长；花被片6，粉红色；雄蕊6，白色；雌蕊1，子房上位，淡绿白色，长圆状卵形，3心皮，3室，蒴果。种子黑色。花期5~7月，果期9~10月。全国各地均有栽培。

采制 夏初采收，除去泥沙，通风晾干或烘烤至外皮干燥。

性状 鳞茎类球状，直径3~6厘米，由6~10个鳞茎瓣着生在鳞茎盘上抱合而成，外包1~3层白色或淡紫红色膜质鳞叶，中央有干缩的花葶残基。小鳞茎瓣长卵圆形，顶端略尖，背面略隆起，外被膜质鳞叶，内为白色肥厚的肉质鳞叶。气特异，味辛辣。


性味 性温，味辛。

功用 行气消积，杀虫解毒。用于感冒、细菌性痢疾、阿米巴痢疾、肠炎、饮食积滞、痈肿疮疡。用量4~9克。

验方 ①痈疖肿痛：大蒜适量，捣烂调大黄粉敷患处。②急性肠炎：大蒜15克，鱼腥草15克，凤尾草15克，水煎服。③蛲虫病：大蒜适量，捣烂浸入酸醋内，临睡时，取大蒜液涂肛门口。



蒜



大蒜

山药

10

Rhizoma Dioscoreae

别名 淮山药、怀山药、山菇。

来源 为薯蓣科植物薯蓣 *Dioscorea opposita* Thunb. 的根茎。

形态 缠绕草质藤本。茎通常带紫红色。单叶在茎下部互生，中部以上对生；叶片卵状三角形至宽卵状或戟状，变异大，基部深心形，边缘常3浅裂至3深裂。花单性，雌雄异株，成细长穗状花序；蒴果三棱状扁圆形或三棱状圆形，外面有白粉。花期6~9月，果期7~11月。生于山坡、山谷林下，或溪边、路旁灌丛中，或杂草中。

采制 秋季或冬季挖取根茎，除去泥土、须根，切去芦头，洗净，用水浸后刮皮，晒干。有的用木板搓成圆柱状，切段，晒干，打光，可称“光山药”。药材主产于河南。

性状 根茎略成圆柱状，弯曲而稍扁，长15~30厘米，直径1.5~6厘米。表面黄白色或淡黄色，有纵沟、纵皱纹及须根痕，偶有浅棕色外皮残留。质坚实，不易折断，断面白色，粉性。无臭，味淡，微酸，嚼之发黏。光山药呈圆柱状，两端平齐，长9~18厘米，直径1.5~3厘米，表面光滑，白色或黄白色。

性味 性平，味甘。

功用 补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少、久泻不止、肺虚喘咳、肾虚遗精、带下、尿频。用量15~30克。

验方 ①糖尿病：山药40克，积雪草20克，旱莲草15克，女贞子15克，水煎服。②脾胃虚腹泻：山药15克，党参15克，白术9克，茯苓10克，炙甘草6克，砂仁3克，水煎服。③肾虚遗精：山药30克，枸杞24克，白果10克，煮粥服。