

張仲華醫案精華

上海秦伯未編纂

■ 內傷

病經匝月。表熱解後。杳不思納。脈靜舌淨。神倦言懶。既無外感留戀。又非老景頹唐。晴光流動。面色開曠。間所服之藥。苦寒沈降者多矣。諒係胃氣爲藥。所困。非病也。亦非衰也。且進和中醒中。以悅脾胃。令其納穀乃昌。

人參鬚 炒麥冬 炒橘白 北沙參 甘草 靈石斛 生穀芽 野薑黃

又 胃氣乍醒。脈形軟弱。久飢之後。藏府之氣尙微。納穀以勻爲穩。至於用藥。尙利輕靈。須俟胃氣日隆。方可峻補。蓋凡投補劑。必藉胃氣敷布故也。經云。百病以胃氣爲本。又云。安穀則昌。其斯之謂歟。

人參鬚 益智仁 炙甘草 石斛 茯神 南棗 北沙參 炒麥冬 橘白 香穀芽
竟日悲思。半載納減。詢非惱怒感觸所致。在病人亦不知悲從何來。一若

放聲號泣。乃能爽快。睡醒之際。特甚。餘如默坐亦然。韓昌黎云。凡人之歌也。有思哭也有懷。出於口而爲聲者。其皆有不平者乎。夫悲哀屬肺。寢則氣窒。醒則流通。想其乍醒之際。應通而猶窒焉。是以特甚。揆之脈象。右寸細數而小滑。伏火挾痰有諸。或更有所驚恐。驚則氣結。結則成痺。痺則升降失常。出納呆鈍。胃氣所以日餒耳。擬以開結通痺爲先。毋急急於補也。

旋覆花 元參 炒竹茹 瓜萎皮 蕤白頭 紫苑 橘絡 安息香 生鐵落

眩暈多年。每發於溼蒸之令。今年初夏潮溼過重。發亦頻頻。診脈濡細。舌苔膩白。考古法眩暈一證。概從內經諸風掉眩。皆屬於肝之論。大旨不外乎風陽上旋。更辨別挾火挾痰以治之。今按脈證。乃溼鬱上泛。挾濁痰膩膈所致。因前人未經論及。而臨證亦罕見也。擬辛香運中。以化溼化痰主之。

製厚朴 煙草果 炒蘇子 旋覆花 茅朮 製半夏 陳皮 白芥子 椒目 赤荳

又 眩暈不復作。舌白依然。脈濡便溏。脘中較爽。信係體肥多溼。嗜酒多溼。臥

於地坑之上亦感濕。好飲冷茶亦停濕。偷泥於古法而投滋降。不亦遠乎。再擬昨方加減。仍守太陰陽明主治。

茅朮 煙草果 製半夏 土炒白朮 佩蘭葉 製厚朴 旋覆花 藿梗 陳皮 通草

□ 溼 痘

形凜汗漬。脈濡神糊。舌如傅粉。沈睡痰迷。素係嗜酒之體。溼痰瀰漫。蒙遏清陽。擾亂神明所致。非陷也。亦非閉也。慎勿開泄。擬達原飲意。

製厚朴 煙草果 枳實 炒陳皮 茅朮 白芷 法半夏 山茱萸

□ 失 血

鼻衄盛發。成流不止者已三日。面赤足冷至膝。脈數寸關尤甚。血去過多。心蕩神馳。陰虧內熱之體。厥陽化火上逆。擾動脈絡。血行清道。從高灌注而下。非若吐紅之易定。血有幾何。豈堪如此長流。擬仿志火升騰治例。用涼血滋降法。

犀角 炒女貞子 黃連 熟地 青鉛 鱷炙板 旱蓮草 煙磁石 阿膠 鹹水炒牛膝
又。鼻衄雖止而面色唇口㿠白。虛陽雖降而額汗心悸畏明。脈虛而數。舌光
而顫。氣乏血滯。血無氣護。陰陽有離脫之象。氣血有渙散之險。急進雙補法庶
幾有所依附。再佐鹹降酸收以攝之。

人參 天冬 炒棗仁 秋石 熟地 柏杞炭 白芍 阿膠 茯神 大棗

□ 消 證

乍納又飢。消爍迅速。如火之燎於原。遇物即爲灰燼。病此半月。肌肉盡削。
詢係失意事多。焦勞苦思。內火日熾。胃液日乾。藏陰既損。而充斥之威愈難撲
滅耳。姑擬玉女煎加味。

大生地 麥冬 元參 阿膠 知母 石膏 炒白芍 女貞子 旱蓮草 甘草

□ 嘔 逆

惱怒傷肝。木火犯胃入膈。支撐胸背。嘔吐血塊痰涎。不納不便。舌白苔膩。

胃爲水穀之海。多氣多血之府。性喜通降。所畏倒逆。經此氣火衝激。溼濁乘機錯亂。倘肆其猖狂。厥勢立至。若再侮脾土。脹滿必增。左脈絃硬。右脈細軟。穀不沾唇者已五日。胃氣憊矣。而嘔尙甚。中無砥柱。何恃而不恐。諸先生所進苦寒沈降。蓋欲止其嘔而順其氣。誠是理也。然內經云。百病皆以胃氣爲本。苦寒性味。又屬伐胃。胃不能安。藥力何藉。拙擬苦寒以制肝之逆。苦辛以通胃之陽。而必參以奠安中氣。庶幾倒逆之勢得緩。幸勿拘於見血畏溫之議。

人參 吳萸 旋覆花 川棟子 川椒 法半夏 茯苓 川連 另肉桂 酒炒龍膽草
同研飯丸煎藥送下

口外感

得食則嘔。已延月餘。形神疲乏。宛如膈證。聽其言。觀其人。惟知明而動晦而休。務農無怠者。流診左關脈數。右關細軟。舌白口苦。寒熱往來。汗之有無。病者不知。蓋少陽見證。原有嘔惡。揆其病情。是任其嘔逆。以致反胃厭穀。胃氣日

逆似乎噎膈。實由邪蘊於少陽。一經胃被邪克。氣不通達。據是脈證。宜先泄少陽之邪。爲要。擬小柴胡法。佐以辛通。

柴胡 製半夏 製厚朴 蘇葉 薏子 炒川椒 橘皮 青皮 淡薑渣

又 汗暢熱解。煩躁已除。脈轉細小。形疲體瘦。嗜臥而思納穀矣。其發也凶悍。其傳也迅速。其退也亦易。易究屬質弱者。易感易達。不若北方風氣剛勁。稟賦厚而腠理實。必至傳徧六經乃已。是證若宗三時六氣治之。勢必淹纏幾候耳。擬和營衛法。

桂枝 桔白 薑渣 防風 茯苓 桑枝 秦艽 大棗

表熱九日。有汗不解。舌絳起刺。煩渴引飲。間作寒戰之象。熱甚下午至夜。神志時糊。脈洪無力。陽明經分之邪。又傳少陽。陽明府分之滯。灼傷津液。極似大柴胡證。而與脈情不符。細繹病情。正虛津竭。旣非陷裏之神糊。如何香開致使內傳。欲其府滯能通。必俟津回液復。擬宗仲聖人參白虎湯意。參入景岳柴

胡煎庶與脈證符合。諸先生以爲何如。

參鬚 柴胡 石膏 鮮石斛 元參 竹葉 麥冬 黑山梔 知母

又汗熱煩渴已減。舌絳淡而尖刺已少。津液稍回。正氣較振。脈數未平。神志已爽。少陽陽明之表分既清既泄。而府分之滯。尙待清潤育陰而下也。切勿因滯而遽投蕩滌審證二字。其難其慎。臨時應變。平日之工夫也。

生地 知母 銀花 赤芍 麻仁 瓜蔞仁 花粉 丹皮 鮮霍石斛

口疫邪

壯熱神糊。陡然而發。脈數大而混糊無序。舌垢膩而層疊厚布。矢氣頻轉。小溲自遺。脘腹痞硬。氣粗痰鳴。既非尋常六氣所感。亦非眞中類中之證。觀其濺濺自汗。汗熱而不黏指。轉側自如。四體無強直之態。舌能伸縮。斷非中風設使外感。何至一發便劇而安能自汗。倘守傷寒先表後裏。下不嫌遲之例。是坐待其斃矣。亦曾讀吳又可先裏後表。急下存陰之論。否。蓋是證也。一見藍癰則

胃已爛而包絡已陷。迅速異常。蓋早議下。尙可僥倖。諸同學以爲然否。

厚朴 大黃 黃芩 枳實 檳榔 草果 知母 陳皮

又 神志得清。表熱自汗。腹猶拒按。矢氣尙頻。便下黏膩極穢者未暢。小水點滴如油。脈數略有次序。舌苔層布垢濁。胃中穢濁蒸蘿之勢尙形燔灼。必須再下。俟裏滯漸楚。然後退就於表。吳又可治疫之論。闡發前人所未備。甚至有三四下而後退走表分者。若作尋常發熱論治。豈不謬乎。

大黃 枳實 銀花 知母 細川連 丹皮 滑石 元明粉 厚朴

■ 瘟 疾

間瘡止後復發。發不歸期。或二三日。或七八日。發則寒戰熱甚。兩三月如此。從無汗泄。脈沈而細。形瘦骨立。胃納式微。證由久瘡傷陰。陰損不復。其爲勞瘡顯然。現屆夏令。已得可汗之時。且服存陰泄邪。以冀汗泄於表。陰復於裏。轉準瘡期。庶有畔岸可依。擬少陽少陰並治。

柴胡 大生地 地骨皮 黃芩 鱉甲 青蒿 歸覆 細辛 丹皮

又藥四服而值癟來。寒戰依然。熱勢轉短。熱退時汗已暢達。脈沈轉出。神氣覺爽。而食物有味。察其轉輕之象。皆從汗後。究由外感乘虛蘊伏。愈伏愈深。延爲怯象。茲有向外泄化之機。仍宗前議加減。必得轉爲間癟乃妥。

黃芩 炒歸須 炒知母 青蒿 煎血炒柴胡 丹皮 炒秦艽 小生地 荆芥炭 豆卷

又癟準日作解後。有汗寒熱之勢大減矣。脈形細小。舌不生苔。久癟陰傷。復其陰可耳。證屬轉機。已得坦途。凡腥羶鮮發以及麥食等。均須慎禁。擬清養法參以泄化。

洋參 桑葉 炙鱉甲 石斛 丹皮 青蒿 穀豆衣 穀芽 秦艽

口黃疸

癟證多種。黑者屬腎。腎氣過損者曰女勞黑癟。今肌膚舌質盡黑。手指映日俱黯。強壯之年。腎陽早已不舉。體雖豐腴。腰軟不耐久坐。脈弱神疲。納減足

冷顯屬腎臟傷殘太甚。尙謂北路風霜所致乎。昔有人患此遍處醫治皆曰風毒。後遇顧西疇道破證名宗溼熱流入腎經主治試以此證較之證雖同而虛實又異矣。現屆深冬姑先治本需春暖陽和再商他法。

製附子 炒枸杞 炒黃藥 兔絲子 茯苓 牡蠣 茵陳 杜仲 熟地 血餘 猪油

熬至髮枯取油盛貯一切食物中可以用油者俱用之

又膚色花斑證轉陰黃較之黑瘻淺一層矣。培植脾胃之藥已進四十餘劑形神色脈俱屬平善節令將交驚蟄春暖之氣已和治當開泄腠理以滌膚斑內經云必先歲氣毋伐天和易曰待時而動何不利之茲擬宗仲聖茵陳四逆法加減三劑卽停接服丸藥可耳黑色退盡之時當在夏初。

製附子 白朮 赤小豆 麻黃 炒黃柏 茵陳 連皮苓

■腹痛

脾腎之陽素虧醉飽之日偏多腹痛拒按自汗如雨大便三日未行舌垢

膩脈沈實。溼痰食滯。團結於內。非下不通。而涉及陽虛之體。又非溫不動。許學士溫下之法。原從仲聖大實痛之例化出。今當宗之。

製附子 肉桂 乾薑 生大黃 枳實 厚朴

口 腫 脹

旬日內遍體俱腫。膚色鮮明。始也原有身熱。不慎風而卽止。亦無汗泄。診脈浮緊。氣喘促。小便閉。舌白。不思飲。證係水溼之邪。藉風氣而鼓行經隧。是以最捷。偷喘甚。氣塞。亦屬至危之道。治當以開鬼門。潔淨府爲要著。

麻黃 杏仁 赤苓 蘇子 桂木 蕎仁 紫苑 檜目 浮萍 大腹皮

口 癥 癥

少腹塊磊上攻及腕。其力猛而痛勢劇。轉瞬之間。腹中鳴響。則塊磊一陣。向下卽平。證名奔豚者。因其性情踪跡行止類似江豚耳。然考其證有三。犯肺。

之賁豚屬心火。犯心之賁豚屬腎寒。臍下悸欲作賁豚者屬水邪。今係腎水寒邪所發。體屬陽虧所致。擬以真武湯參賁豚湯意。

茯苓 川芎 小茴 歸尾 附子 白芍 半夏 橘核 李根皮

口 痢 疾

腹痛下痢。晝夜無度。汗出肢冷。脈細舌白。暑濕熱挾滯互結。病經五日不減。嗜酒中虛之體。邪不能化熱外達。而見多汗傷陽。多痢傷陰之險。凡裏急後重腹痛者。治法宜通口燥煩躁溲秘者。又當清滻。此證中陽先餒。不能托化邪滯未動。虛波已至。誠屬棘手。姑擬溫清並進。宗瀉心湯意。參以疏邪化滯。若正氣保和之類。何足恃耶。

製附子 厚朴 桂木 蔡梗 建翹 赤苓 木香 蔡渣 酒炒黃連

又 下痢減半。赤白相雜。肢冷較和。汗亦稀少。舌白苔膩不化。裏急後重已緩。

診脈沈細。腹中猶痛。究屬中虛溼勝。暑積阻結。不能藉陽和運動。尙非坦途。再擬溫中運邪一法。

製附子 厚朴 黃連 白朮 淡乾薑 防風 木香 枳實 丹皮 赤苓

暑溼熱病下痢。始係赤白垢膩。晝夜數十餘次。旬日後痢雖減而純下血矣。傷及肝腎。病情最深。非易治者。姑先清熱存陰。宗厥陰下痢之條。擬白頭翁湯合黃連阿膠湯意。

白頭翁 秦皮 丹皮 黃連 地榆炭 白芍 荷蒂 炒黃芩 阿膠

口婦人

痛經數年。不得孕育。經水三日前必腹痛。腹中有塊凝滯。狀似癥瘕伏梁之類。納減運遲。形瘦神羸。調經諸法。醫者豈曰無之。數載之中。服藥無間。何以漠然不應。詢知閨閣之時。無是病。旣嫁之後。有是疾。痛之來源。良有以也。也是證考古郤。無曾見於濟陰綱目中。姑勿道其名目。宗其意而立方。不必於平時服。

俟其痛而進之。經至即止。下期再服。

荆三棱 義朮 延胡 香附 製軍 歸身 丹皮 川芎 桃仁 枳實

又 前方於第二期經前三劑。經來紫黑。下有似胎非胎一塊。彌月不復痛而經至矣。蓋是證亦係凝結於胞中者。今既下矣。復何慮乎。

白芍 石斛 川芎 醋炒柴胡 楠白 白朮 歸身 丹皮 穀芽

經停三月。驟然崩衝。閏五月而又若漏卮。詢係暴崩屬虛。虛陽無附。額汗頭震。聞聲驚惕。多語神煩脈微虛軟。勢將二氣脫離。其危至速。擬回陽攝陰法。急安其氣血。

附子 鹿角霜 杞子炭 熟地 五味 白芍 人參 龜板 天冬 山藥

上臘嚴寒。生產受寒必甚。當時瘀露未暢。臍下陣痛。迄今五月未止。閱所服藥。皆宗產後宜溫之例。固屬近是。惜未考經穴經隧耳。譬諸鎖則買矣。何以不付以匙。買者不知。賣者當知。病者不知。醫者當知。致使遠途跋涉。幸遇善與。

人配匙者。

肉桂

細辛

研末飯丸