

初等数学综合训练

下 册

熊大寅	陈昌祥	成应璪	陈纪绵
梁法驯	肖若朴	李伯粤	樊 恺
	合	编	

湖北人民出版社

初等数学综合训练

下 册

熊大寅等合编

*

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

武汉市江汉印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 18.625印张 431,000字

1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷

印数：1-20,200

统一书号：7106 1607 定价：1.48元

目 录

下 册

三、平面几何.....	1
§ 3.1 直线形	1
§ 3.2 圆	86
§ 3.3 轨迹与作图.....	157
四、立体几何	220
§ 4.1 直线与平面.....	220
§ 4.2 多面体.....	258
§ 4.3 旋转体.....	312
五、平面解析几何	330
§ 5.1 平面上的点与直线.....	330
§ 5.2 二次曲线.....	359
1° 圆	359
2° 椭圆	384
3° 双曲线	405
4° 抛物线	426
§ 5.3 坐标变换.....	458
§ 5.4 极坐标.....	479
§ 5.5 参数方程.....	502
六、杂题	539

三、平面几何

§ 3.1 直 线 形

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 延长二中线 BD 、 CE 到 F 、 G , 使 $DF = BD$, $EG = CE$. 求证: G 、 A 、 F 三点在一直线上.

证法一 连 BG ,

CE .

$$\because AE = BE,$$

$$GE = CE,$$

$$\angle AEG = \angle BEC,$$

$$\therefore \triangle AEG \cong \triangle BEC.$$

$$\therefore \angle EAG = \angle EBC.$$

$$\text{即 } \angle BAG = \angle ABC.$$

$$\text{同理 } \angle CAF = \angle ACB.$$

$$\text{而 } \angle ABC + \angle BAC + \angle ACB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle BAG + \angle BAC + \angle CAF = 180^\circ.$$

故 G 、 A 、 F 三点在一直线上.


$$\text{证法二 } \because AE = BE, GE = CE,$$

$$\therefore AGBC \text{ 是平行四边形.}$$

$$\therefore AG \parallel BC.$$

$$\text{同理 } AF \parallel BC.$$

但过 A 只能作一直线平行于 BC , 故 G 、 A 、 F 三点在一直线上.



(图 3-1.1)

〔附注〕 证明三点共线，一般的方法是：


(1) 利用平角，对顶角和等角，如本题证法一；第3题证法一；

(2) 利用平行公理，如本题证法二；

(3) 利用某些点（如线段的中点）的唯一性，如下题证法一；

(4) 利用 Menelaus 定理（见第4题）。

2. 线段 AB 的中点是 O ，以 AO 和 BO 为对角线作平行四边形 $ACOD$ 和 $BEOF$ ，又作平行四边形 $OCGE$ 和 $ODHF$ ，求证： G 、 O 、 H 在一直线上。



(图 3-1.2)

证法一 连 AG 、 HB 、 AH 、 GB 。

$\because CA \parallel OD \parallel FH$,

$CG \parallel OE \parallel FB$,

$\therefore \angle ACG = \angle HFB$.

$\therefore \triangle ACG \cong \triangle HFB$.

$\therefore AG = HB$.

同理 $AH = GB$.

由此， $AHBG$ 是平行四边形，其对角线 GH 与 AB 将相交于 AB 的中点 O 。这就是说， G 、 O 、 H 在一直线上。

证法二 设 O 为坐标原点，并以相应的小写字母记其他各点所对应的复数。则

$$a = -b, f = b - e, d = a - c = -b - c,$$

$$g = c + e, h = d + f = -c - e.$$

由此 $\frac{g}{h} = \frac{c+e}{-(c+e)} = -1$.

所以， G 、 O 、 H 在一直线上。

3. 自 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点 P 作 AC 、 AB 的平行线，
 交过 B 、 C 的任意二平行线于 Q 、 R 两点。求证： A 、 Q 、 R
 三点共线。

证法一 分别延长 BA ，
 CA ，设交 CR ， BQ 于 B' ， C' 。

$$\because BC' \parallel CB',$$

$$\therefore \angle QC'A = \angle RCA.$$

$$\text{又 } \frac{C'A}{CA} = \frac{C'B}{CB'}.$$

$$\text{且 } \frac{C'Q}{C'B} = \frac{CP}{CB} = \frac{CR}{CB'},$$

$$\text{即 } \frac{C'Q}{CR} = \frac{C'B}{CB'}.$$

$$\therefore \frac{C'A}{CA} = \frac{C'Q}{CR}.$$

$$\therefore \triangle AC'Q \sim \triangle ACR.$$

$$\therefore \angle QAC' = \angle RAC.$$

于是 A 、 Q 、 R 三点共线。

证法二 仍如上图，延长 QA 设交 CR 于 R' 。可得

$$\frac{B'R'}{R'C} = \frac{BQ}{QC'}.$$


$$\text{而 } \frac{B'R}{RC} = \frac{BP}{PC} = \frac{BQ}{QC'},$$

$$\therefore \frac{B'R'}{R'C} = \frac{B'R}{RC}.$$

$$\frac{B'R'}{B'R' + R'C} = \frac{B'R}{B'R + RC}$$

$$\text{即 } \frac{B'R'}{B'C} = \frac{B'R}{B'C}.$$

$$\therefore B'R' = B'R, R' \text{ 与 } R \text{ 重合}.$$



(图 3—1.3)

于是 A, Q, R 三点共线.


4. 设 L, M, N 各是 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 或其延长线上的点, 则 L, M, N 三点共线的充分必要条件是

$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1.$$


(Menelaus 定理)

证 ①先证明题设关系式是 L, M, N 三点共线的必要条件.

设 L, M, N 三点共线, 如图 3—1.4 (或图 3—1.5).



(图 3—1.4)



(图 3—1.5)

$$\frac{CM}{LC} = \frac{\sin \angle 1}{\sin \angle 2}, \quad \frac{AN}{MA} = \frac{\sin \angle 3}{\sin \angle 4}, \quad \frac{BL}{NB} = \frac{\sin \angle 5}{\sin \angle 1}.$$

注意到 $\sin \angle 2 = \sin \angle 3$, $\sin \angle 4 = \sin \angle 5$, 即得

$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = \frac{\sin \angle 1 \cdot \sin \angle 3 \cdot \sin \angle 5}{\sin \angle 2 \cdot \sin \angle 4 \cdot \sin \angle 1} = 1.$$

(如果从顶点 A, B, C 作直线 LMN 的垂线, 根据相似三角形的对应边成比例, 也容易证得上面的关系式.)

②再证明题设关系式是 L, M, N 三点共线的充分条件.

设 $\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1.$

连 LM ，设交 AB 于 N' 。则由①得

$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN'}{N'B} = 1.$$


将两式作比较，得 $\frac{AN}{NB} = \frac{AN'}{N'B}$ 。

于是 $\frac{AN}{AN+NB} = \frac{AN'}{AN'+N'B}$ ，即 $\frac{AN}{AB} = \frac{AN'}{AB}$ 。

$\therefore AN = AN'$ 。

故 N 和 N' 重合，从而 L 、 M 、 N 三点共线。

5. 在 $\triangle ABC$ 中，设 B 、 C 在 $\angle A$ 的平分线 AE 上的射影为 B' 、 C' 。求证： BC' 、 $B'C$ 及 $\angle A$ 的外角平分线交于一点。



(图 3—1.6)

证 设 BC' 与 $B'C$ 交于 P ，连 AP 。

$\because \angle BAB' = \angle CAC'$ ，

$\therefore \text{rt}\triangle ABB' \sim \text{rt}\triangle ACC'$ 。

$\therefore \frac{AB'}{AC'} = \frac{BB'}{CC'}$ 。

又 $BB' \parallel CC'$ ，

$$\therefore \frac{BB'}{CC'} = \frac{BP}{C'P}.$$

$$\therefore \frac{AB'}{AC'} = \frac{BP}{C'P}.$$

于是 $\frac{AB' - AC'}{AC'} = \frac{BP - C'P}{C'P}$, 即 $\frac{B'C'}{AC'} = \frac{BC'}{C'P}$.

$\therefore AP \parallel BB'$, 从而 $AP \perp AE$.

这就是说, AP 是 $\angle A$ 的外角平分线, 从而结论得证.

【附注】 证明三线共点, 一般的方法是证其中两线的交点在第三线上; 或过其中两线的交点另作一线, 证其合于第三线. 另外, 证明三线共点也常利用 Ceva 定理.


6. 设 L 、 M 、 N 各是 $\triangle ABC$ 的三边 BC 、 CA 、 AB 或其延长线上的点, 则 AL 、 BM 、 CN 三直线共点或互相平行的充分必要条件是

$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1.$$


(Ceva 定理)

证 ①先证明题设关系式是 AL 、 BM 、 CN 三直线共点或互相平行的必要条件.

设 AL 、 BM 、 CN 相交于一点 O , 如图:



(图 3—1.7)



(图 3—1.8)

对 $\triangle ABL$ 及截线 CON 应用 Menelaus 定理, 得

$$\frac{BC}{CL} \cdot \frac{LO}{OA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1,$$

再对 $\triangle ALC$ 及截线 BOM 应用 Menelaus 定理, 得

$$\frac{LB}{BC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AO}{OL} = 1.$$

两式相乘, 即得

$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1.$$

若 $AL \parallel BM \parallel CN$, 同样可推得上面的关系式.

②再证明题设关系式是 AL 、 BM 、 CN 三直线共点或互相平行的充分条件.

设
$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1.$$

若 AL 、 BM 、 CN 中有两条相交, 不妨设是 AL 和 BM 相交于 O . 连 CO , 设交 AB 于 N' , 则由①得

$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN'}{N'B}.$$


将两式作比较, 得

$$\frac{AN}{NB} = \frac{AN'}{N'B}.$$

由此即不难推得 N 和 N' 重合, 从而 AL 、 BM 、 CN 三直线共点.

若 AL 、 BM 、 CN 中有两条平行, 不妨设是 $AL \parallel BM$, 同样容易推得 $AL \parallel BM \parallel CN$.

7. 于 $\triangle ABC$ 的各边上向形外作相似等腰三角形 BCE 、 CAF 、 ABG . 试证 AE 、 BF 、 CG 相交于一点.



(图 3—1.9)

证 设三个相似等腰三角形的底角为 θ , AE 、 BF 、 CG 各交 BC 、 AC 、 AB 于 L 、 M 、 N .

$$\therefore \frac{S_{\triangle ABL}}{S_{\triangle ACL}} = \frac{BL}{CL},$$

$$\frac{S_{\triangle BEL}}{S_{\triangle CEL}} = \frac{BL}{CL},$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ABL}}{S_{\triangle ACL}} = \frac{S_{\triangle BEL}}{S_{\triangle CEL}} = \frac{BL}{CL}.$$

$$\frac{S_{\triangle ABL} + S_{\triangle BEL}}{S_{\triangle ACL} + S_{\triangle CEL}} = \frac{BL}{CL}.$$

即
$$\frac{BL}{LC} = \frac{S_{\triangle ABE}}{S_{\triangle ACE}} = \frac{\frac{1}{2}BE \cdot AB \sin(\theta + B)}{\frac{1}{2}CE \cdot AC \sin(\theta + C)}$$

$$= \frac{AB \sin(\theta + B)}{AC \sin(\theta + C)}.$$

同理
$$\frac{CM}{MA} = \frac{BC \sin(\theta + C)}{AB \sin(\theta + A)}, \quad \frac{AN}{NB} = \frac{AC \sin(\theta + A)}{BC \sin(\theta + B)}.$$

故
$$\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1.$$


由 Ceva 定理, 可知 AE 、 BF 、 CG 相交于一点.

8. 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 上向外各作正方形 $ABEF$ 、 $ACGH$, 又作 $AD \perp BC$ 于 D , 求证: AD 、 BG 、 CE 三直线共点.

证 延长 DA 至 K , 使 $AK = BC$. 连结 BK 、 CK , 分别交 CE 、 BG 于 L 、 M .

$$\therefore \angle KAF + \angle DAB = \angle ABD + \angle DAB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle KAF = \angle ABD.$$



(图 3—1.10)

$$\begin{aligned} \because \quad & \angle FAB = \angle EBA = 90^\circ, \\ \therefore \quad & \angle KAF + \angle FAB = \angle ABD + \angle EBA. \end{aligned}$$

即 $\angle KAB = \angle CBE.$

又 $AK = BC, AB = BE,$

$$\therefore \triangle KAB \cong \triangle CBE.$$

$$\therefore \angle ABK = \angle CEB.$$

即 $\angle NBL = \angle LEB. (N \text{ 是 } AB \text{ 与 } CE \text{ 的交点})$

但 $\angle LEB + \angle LNB = 90^\circ,$

$$\therefore \angle NBL + \angle LNB = 90^\circ, \angle NLB = 90^\circ.$$

由此 $CL \perp KB.$


同理 $BM \perp KC.$

而 $\triangle KBC$ 的三高 KD, BM, CN 交于一点 O , 故得 AD, BG, CE 三直线交于一点 O .

〔附注〕 本题的证明方法是变更原题, 使题中要证的共点三线在另一图形中成为已知的共点线.

9. 在等腰三角形 ABC 中, $AB = AC$, $\angle B$ 之三等分线与 BC 边上的高 AD 交于 M, N , 又 CN 之延长线交 AB 于 K .

求证: $KM \parallel BN$.



(图 3—1.11)

证 设等腰三角形 ABC 的底角为 3α , 则

$$\angle ABM = \angle MBN = \angle NBD = \alpha.$$

连结 MC , 由对称性不难得到

$$\angle ACM = \angle ABM,$$

$$\angle MCN = \angle MBN,$$

$$\angle NCD = \angle NBD.$$

由此 $\angle ACM = \angle MCN$

$$= \angle NCD = \alpha.$$

因 CM 是 $\angle ACK$ 的平分线, AN 是 $\angle CAK$ 的平分线, 故 M 是 $\triangle ACK$ 的内心, 于是 KM 是 $\angle AKC$ 的平分线.

而 $\angle AKC = \angle KBC + \angle KCB = 3\alpha + \alpha = 4\alpha$,

$$\therefore \angle AKM = \frac{1}{2} \angle AKC = 2\alpha.$$

又 $\angle KBN = \angle KBM + \angle MBN = 2\alpha$,

$$\therefore \angle AKM = \angle KBN.$$

故 $KM \parallel BN$.

〔附注〕 证明两线平行, 一般的方法是:

① 利用角 (同位角、内错角或同旁内角) 的关系, 如本题;

② 利用平行四边形, 如下题证法一;

③ 利用三角形 (梯形) 的中位线定理, 或一直线分三角形两边成比例线段定理, 如第 12 题证法一、证法二.

10. 如图, AD 、 BE 、 CF 是 $\triangle ABC$ 的三条中线, 又 $FG \parallel BE$, $EG \parallel AB$, 连 GC , 求证 $AD \parallel GC$.

证法一 连 AG 、 FE .

$\therefore FBEG$ 是平行四边形,

$\therefore GE \parallel FB \parallel AF.$

$\therefore AFE G$ 是平行四边形.


$\therefore AG \parallel FE.$

又 $FE \parallel \frac{1}{2}BC \parallel DC,$

$\therefore AG \parallel DC.$

$\therefore ADCG$ 是平行四边形.

$\therefore AD \parallel GC.$



(图 3—1.12)

证法二 设 B 为坐标原点, 并以相应的小写字母记其他各点所对应的复数, 则

$$f = \frac{a}{2}, \quad d = \frac{c}{2}, \quad e = \frac{a+c}{2},$$

$$g = f + e = \frac{2a+c}{2}.$$

于是 $\overrightarrow{AD}$ 对应于复数

$$d - a = \frac{c - 2a}{2};$$

$\overrightarrow{GC}$ 对应于复数


$$c - g = \frac{c - 2a}{2}.$$

故得 $AD \parallel GC.$

〔附注〕 在复平面上, 两直线平行或重合的充要条件是, 这两直线上的向量所表示的两个复数的商是一个实数。据此也可以应用复数来解决证明两线平行 (如本题) 以及三点共线 (如第 2 题) 的问题。

11. 在四边形 $ABCD$ 中, E 、 F 各是 AD 、 BC 两边的中点, 且 $EF = \frac{1}{2}(AB + CD)$, 求证: $AB \parallel CD$.

证法一 假设 AB 不平行于 CD . 连结 AC , 取它的中



(图 3—1.13)

点 G ，再连结 GE 、 GF 。则

$GF \parallel AB$ ， $GE \parallel CD$ 。

由此 EGF 不能是直线，于是


$$EF < GF + GE$$

$$= \frac{1}{2}AB + \frac{1}{2}CD$$

$$= \frac{1}{2}(AB + CD).$$

这与题设矛盾。

故有 $AB \parallel CD$ 。



(图 3—1.14)

证法二 连 DF 并延长至 G ，使 $FG = DF$ 。连结 AG ，则 $AG = 2EF$ 。

再连结 BG ，因 BC 、 DG 互相平分，故 $BGCD$ 为平行四边形。于是 $BG \parallel CD$ 。由已知


$$AB + CD = 2EF,$$

$$\therefore AB + BG = 2EF.$$

$$\therefore AG = AB + BG.$$

由此， AB 、 BG 成一直线。而 $BG \parallel CD$ ，故有

$$AB \parallel CD.$$



(图 3—1.15)

12. O 为 $\triangle ABC$ 中线 AM 上任意一点. BO, CO 之延长线分别交 AC, AB 于 D, E , 求证:

$$ED \parallel BC.$$


证法一 因 AM, BD, CE 共点, 根据 Ceva 定理有

$$\frac{BM}{CM} \cdot \frac{CD}{AD} \cdot \frac{AE}{BE} = 1.$$


已知 $BM = CM$,

$$\text{则 } \frac{CD}{AD} \cdot \frac{AE}{BE} = 1. \text{ 因此 } \frac{AD}{CD} = \frac{AE}{BE}.$$

$$\therefore ED \parallel BC.$$



(图 3—1.16)



(图 3—1.17)

证法二 如图 3—1.16, 过 A 作 $B'C' \parallel BC$, 分别交 BD, CE 于 B', C' . 则

$$\frac{BM}{B'A} = \frac{CM}{C'A}.$$

但 $BM = CM$, 故 $B'A = C'A$.

$$\text{又 } \frac{AE}{EB} = \frac{C'A}{BC}, \quad \frac{AD}{DC} = \frac{B'A}{BC},$$

$$\therefore \frac{AE}{EB} = \frac{AD}{DC}.$$

因此 $ED \parallel BC$.

证法三 如图 3—1.17, 过 D 作 $DE' \parallel CB$, 分别交 CO 、 AB 、 AM 于 E' 、 E'' 、 F' . 则


$$\frac{E'F'}{CM} = \frac{DF'}{BM}, \quad \frac{E''F'}{BM} = \frac{DF'}{CM}.$$

但 $BM = CM$, 故 $E'F' = E''F'$.

由此, E' 、 E'' 将重合于 CO 和 AB 的交点 E , 因而 $E'D$ 和 ED 也将重合.

$\therefore ED \parallel BC$.

13. 在平行四边形 $ABCD$ 的边 AB , AD 上向形外作两个正方形 $ABMX$, $ADNY$. 求证: 对角线 AC 与两正方形的顶点 X 与 Y 的连线垂直.



(图 3—1.18)

证法一 设 CA 的延长线交 XY 于 E .

$$\begin{aligned} \because \angle XAY + \angle BAD \\ = \angle ABC + \angle BAD = 180^\circ, \end{aligned}$$

$$\therefore \angle XAY = \angle ABC.$$

$$\text{又 } AX = AB,$$

$$AY = AD = BC,$$

$$\therefore \triangle AXY \cong \triangle BAC.$$

$$\therefore \angle YXA = \angle BAC.$$

$$\text{但 } \angle BAC + \angle XAE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle YXA + \angle XAE = 90^\circ.$$

由此, 得 $\angle XEA = 90^\circ$, 即 $AC \perp XY$.

证法二 以 A 为原点建立坐标系, 设 B 、 X 、 Y 分别对应于复数 1 , i , z , 则 D 对应于复数 iz , C 对应于复数 $iz + 1$.

注意到 $\overrightarrow{AC}$ 对应于复数 $iz + 1$, $\overrightarrow{XY}$ 对应于复数 $z - i$, 而