

吳鞠通先生

吳塘。字鞠通。清河縣人。九歲父病。年餘卒。致不起。遂發憤事醫。長客京師。頗多治驗。其學師法葉天士。就葉氏遺文揣摩研索。成溫病條辨一書。行於世。其他有醫醫病書一種。亦爲後人所傳誦。

吳 鞠 通 醫 案 目 錄

傷寒	暑溫	濕溫	燥症	瘧疾	中風	厥症	肺痛	癲狂
.....								
一	六	二	三	四	五	五	七	二

虛勞	吐血	衄血	便血	腫脹	痢疾	積聚	淋濁	泄瀉
.....								
二	六	六	元	三	三	呈	元	元

吳鞠通醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

傷寒

昨服開肺。與大腸痺法。溼滯已下。小便亦清。身熱已退。但大便與痰中微有血跡。症從寒溼化熱而來。未便即用柔藥以清血分。今日且與宣行腑腸。右脈仍見數大。可加苦藥。如明日血分未清。再清血分未遲。

飛滑石 半夏 生苡仁 杏仁泥 厚朴 黃柏炭 黃芩炭 廣皮 細蘇梗

中風漏汗。兼之腎水上凌心。心悸腹痛。昨用桂枝加附子湯。諸症悉退。今左脈沈緩。右脈滑數。表雖清而濁陰未退。議苓桂伐腎邪。歸茴溫衝脈。吳萸半夏生薑兩和肝胃。白芍以收陰氣。合桂枝而調營衛。加黃芩。一以清風化之熱。合諸藥爲苦辛通法。此外感之餘。兼有下焦裏症之治法也。

茯苓塊 桂枝 淡吳萸 薑半夏 青皮 全當歸 小茴香 生薑 黃芩炭 焦白芍

脈緩濁陰久踞。兼有滯物續下。用藥仍不外苦辛通法。稍加推蕩之品。因其勢而利導之大意。通補陽明之陽。正以驅濁陰之陰。若其人陽明本旺。胃陰自能下降。六腑通調。濁陰何以能舉。再胃旺自能坐鎮中州。濁陰何能越胃而上攻心下。反覆推求。病清自現。

桂枝尖 厚朴 焦白芍 茯苓塊 青皮 小枳實 淡吳萸 烏藥 廣木香 小茴香 廣皮

黃芩炭 川棟子

凡痛脹滯下。必用苦辛通降。兼護陽明。固不待言。前法業已見效。細詢病情。已十有餘年。以半產後得之。誤用壅補而成。按久病在絡。再痛脹偏左。下至少腹。扳着其中。必有瘀滯。非純用湯藥所能成功。蓋湯者蕩也。滌蕩腸胃。通和百脈。固其所長。至於細雕密鏤。緩行攻絡。是其所短。非兼用化散回生丹。緩通不可。且湯劑過重。有痕散爲蟲之虞。不得不思患預防也。

桂枝尖 半夏 廣木香 炒白芍 厚朴 地榆炭 降香末 紅花 炒桃仁 川棟子

小茴香 廣鬱金 全當歸 烏藥 兩頭尖 黃芩炭 黃連 廣炭 甘瀾水煎

今年風木司天。現在寒水客氣。故時近初夏。猶有太陽中風之症。按太陽中風。係傷寒門中第一關。最忌誤下。時人不讀晉唐以上之書。故不識症之所由來。仲景謂太陽至五六日。太陽症不罷者。仍從太陽驅去。宜桂枝湯。現在頭與身仍微痛。既身熱而又仍惡風寒。的是太陽未罷。理宜用桂枝湯。但其人素有溼熱。不喜甘。又有微咳。議於桂枝湯內去甘藥。加辛燥。服如桂枝湯法。

桂枝 半夏 廣皮 白芍 杏仁

太陽中風誤下。前日先與解外。昨日太陽症罷。卽瀉胸痞。今日胸痞解。惟自利不渴。舌灰白。脈沈數。經謂自利不渴者。屬太陰也。太陰宜溫。但理中之人參甘草恐不合拍。議用其法而不用其方。

茯苓 蒼朮炭 乾姜 半夏 廣皮炭 生姜

太陽中風。先與解外。外解已。卽與瀉。誤下之胸痞。痞解而現自利不渴之太陰症。今日口不渴而利止。是由陰出陽也。脈亦頓小其半。古云。脈小則病退。但仍沈數。身猶熱而氣粗不寐。陷下之餘邪不淨。仲景傷寒論。謂真陰已虛。陽邪尙盛之不寐。用阿膠雞子黃湯。按此湯重用黃芩黃連。議用甘草瀉心法。

半夏 黃芩 生姜 雲苓 川連 大棗 甘草

再診。脈沈數。陰經熱。陽經不熱。是陷下之餘邪在裏也。氣不伸而噦。噦者傷寒門中之大忌也。皆誤下之故。議少用丁香柿蒂湯法。加黃連以徹裏熱。疏逆氣。

公丁香 黃芩 柿蒂 真川連 廣皮 薑汁

三診。誤下成胸痞自利。兩用瀉心。胸痞自利俱止。但陷下之邪與受傷之胃氣搏而成噦。作用丁香柿蒂湯。去人參。加芩連。方雖易。仍不外仲景先

師苦辛通降之法。病者畏而不服。今日噦不止。而左脈加進。勉與仲景噦門中之橘皮竹茹湯。其力量減前方數等矣。所以如此用者。病多一日。則氣虛一日。仲景於小柴胡湯中。卽用人參。况誤下中虛者乎。

廣皮 半夏 生姜 竹茹 炙甘草 人參 大棗

四診誤下之陷症噦而喘。昨連與金匱橘皮竹茹湯。一面補中。一面宣邪。茲已邪潰。諸惡候如失。脈亦漸平。但其人宗氣受傷不淺。議與小建中湯。加橘皮半夏。小小建立中氣。調和營衛。兼宣胃陽。令能進食安眠。

焦白芍 桂枝 生姜 新會皮 半夏 大棗 炙甘草 膠飴

太陽中風。耽延五日不解。衝氣上動。宛若奔豚。腹滿泄瀉而渴。兼有少陰症矣。兩層兩感。太陽少陽。並見一兩感也。其人積怒內傷。又加外感。此二兩感也。可畏之至。且先伐其衝氣。

桂枝 雲苓塊 川芎 當歸 川椒炭 生姜

復診太陽少陽兩感。衝氣上動如奔豚。與蒼桂薑朮腎邪。今日一齊俱解。脈靜身涼。衝氣寂然。可喜之至。微有痰飲咳嗽。當與和胃令能食。

雲苓塊 桂枝 生姜 姜半夏 廣皮 大棗 焦白芍

太陽中風汗多。誤與收瀋。引入少陽。寒熱往來。口苦脈弦。與小柴胡湯和法。其人向有痰飲喘症。加枳實橘皮去人參。

柴胡 姜半夏 生姜 廣皮 小枳實 大棗 炙甘草 黃芩炭

暑 溫

世人悉以羌防柴葛治四時雜感。竟謂天地有冬而無夏。不亦冤哉。以致暑邪不解。深入血分成厥。衄血不止。夜間煩躁。勢已膠固難解。焉得速功。

飛滑石 犀角 冬桑葉 羚羊角 元參 鮮薄荷 細生地 丹皮 鮮荷葉邊 杏仁泥

小便短而赤甚。微咳。面微赤。尺脈仍有勁數之象。議甘潤益下。以治虛熱。少佐苦味。以治不盡之實邪。且甘苦合化陰氣而利小便也。按甘苦合化

陰氣利小便法。舉世不知。在溫熱門中。誠爲利小便之上妙法。蓋熱傷陰液。小便無由而生。故以甘潤益水之源。小腸火腑。非苦不通。爲邪熱所阻。故以苦藥瀉小腸而退邪熱。甘得苦則不呆滯。苦得甘則不剛燥。合而成功也。

生鱉甲 元參 麥冬 生白芍 沙參 麻仁 川連 阿膠 丹皮 炙甘草

暑溫。舌苔滿佈。色微黃。脈洪弦而剛甚。左反大於右。不渴。初起卽現此等脈症。恐下焦精血之熱。遠甚於上焦氣分之熱也。且舊有血溢。故手心熱。又甚於手背。究竟初起。且清上焦。然不可不心知其所以然。

連翹 細生地 粉丹皮 銀花 苦桔梗 白茅根 麥冬 牛蒡子 香豆豉 薄荷 元參

藿香梗 生甘草

向有失血。又屆暑病之後。五心發熱。法當補陰以配陽。但脈雙弦而細。不惟陰不充足。卽真陽亦未見其旺也。議二甲復脈湯。仍用舊有之桂枝薑棗。

白芍 大生地 沙參 桂枝 生鱉甲 麥冬 麻仁 生牡蠣 生薑 阿膠 炙甘草
大棗

暑熱。木易傷陰。誤用消導攻伐。重傷陰氣。致令頭中耳中鳴無止時。此係肝風內動。若不急救肝腎之陰。痙癇熱厥立至矣。

大生地 麥冬 生牡蠣 炒白芍 丹皮 菊花炭 生鱉甲 桑葉 炙甘草 火麻仁

頭痛。左關獨高。責之少陽內風掀動。最有損一目之弊。若以爲外感寒則遠甚矣。議清少陽膽絡法。再此症除左關獨高。餘脈皆緩。所謂通體皆寒一隅偏熱。故先清一隅之熱。金匱爲先治新病。宿病當後治也。

羚羊角 丹皮 茶菊花 苦桔梗 生甘草 薄荷 刺蒺藜 桑葉 鮮荷葉 鈎藤鈎

復診。前日左關獨浮而弦。係少陽頭痛。因暑而發。用清膽絡法。茲左關已平其半。但緩甚。舌苔白厚而滑。胸中痞悶。暑中之熱已解。而溼尙存也。議先宣上焦氣分之溼。

生薑仁 飛滑石 霍香梗 杏仁泥 半夏 廣郁金 旋覆花 廣皮 白通草 茯苓皮
白薏仁

六脈洪大之極。左手更甚。目邪視。怒氣可畏。兩臂兩手捲曲而痠癢。舌邪向。不語三四日。面赤身熱。舌苔中黃邊白。暑入心包。膽絡以清。心膽之邪爲要。先與紫雪丹。

連翹 羚羊角 竹茹 金銀花 暹羅犀角 丹皮 麥冬 細生地 桑葉 天冬 鮮荷葉
涼芳香以清肺熱。開心包。陽有汗。陰無汗。及頸而還。極大症也。
生石膏 連翹 丹皮 飛滑石 銀花 桑葉 細生地 知母 甘草 苦桔梗

暑兼溼熱。暑溫不比春溫之但熱無溼。可用酸甘化溫。鹹以補腎等法。且無形無質之熱邪。每借有形有質之溼邪。以爲附依。此症一月有餘。僉用大劑純柔補陰退熱法。熱總未減。而中宮痞塞。得食則痛脹。非抹不可。顯係

暑中之溼邪蟠踞不解。再得柔膩膠固之陰藥。與邪相搏。業已喘滿勢甚重。大勉與通宣三焦法。仍以肺氣爲主。蓋肺主化氣。氣化則溼熱俱化。六脈弦細而沈洪。

苡仁 生石膏 厚朴 杏仁 雲苓皮 青蒿 連翹 藿香梗 白蔻 銀花 鮮荷葉邊

暑溼誤用陰柔藥。致月餘熱不退。胸膈痞悶。前與通宣三焦。今日熱減。脈亦減。但痞滿如故。喘仍未定。舌有白苔。猶爲棘手。

生石膏 厚朴 藿香梗 飛滑石 連翹 小枳實 雲苓皮 廣皮 白蔻仁 生苡仁

濕 溫

證似溫熱。但心下兩脅俱脹。舌白。渴不多飲。嘔惡。噯氣。則非溫熱。而從溼溫例矣。用生姜瀉心湯之苦辛通降法。

茯苓塊 生姜 古勇連 生苡仁 半夏 炒黃芩 生香附 乾姜

面赤目赤。舌苔滿佈。至重之溫熱病。脈反緩而弦。外熱反不盛。口反不

渴肢微厥。所謂陽症陰脈。乃本身陽氣不能十分充滿。不肯化解耳。茲與化邪法。

廣鬱金 杏仁 藿香 苦桔梗 荆芥穗 連翹心 銀花 青蒿 香豆豉

六脈弦細而勁。陰寒證脈也。咳嗽稀痰。陰溼咳也。舌苔刮白而滑。陰舌苔也。嘔吐泄瀉。陰溼症也。雖發熱汗出而解。乃溼中兼風。病名溼溫。天下有如是之陰虛症乎。

茯苓塊 桂枝 炒白芍 桑半夏 於朮 蜜皮炭 生苡仁 澤瀉 生薑汁

復診。痰飲兼風。誤治成壞症。前用溫平逐飲除風。諸惡症俱減。惟寒少熱多。熱後汗出未除。現在面赤口渴。暮夜譫語。有風化熱之象。但六脈尚弦。未盡轉陽也。再咳嗽則胸脅小腹俱微痛。又有金木相尅像。

桂枝 生石膏 青蒿 半夏 茯苓塊 生薑 杏仁 焦白芍 大棗 豬苓 炙甘草

六脈俱弦而細。左手沈取數而有力。面色淡黃。目白睛黃。自春分午後

身熱。至今不愈。曾經大瀉後。身軟不渴。現在雖不泄瀉。大便久未成條。午
小便清。午後小便赤濁。與溼中生熱之苦。辛寒法。

飛滑石 茵陳 蒼朮炭 雲苓皮 杏仁 晚蚕沙 生苡仁 黃芩 白通草 海金沙
川黃連

燥 症

感受燥金之氣。腹痛泄瀉嘔吐。現在泄瀉雖止。而嘔不能食。腹痛仍然。
舌苔白滑。肉色刮白。宜急溫之。兼與行太陰之溼。

藜苓塊 吳萸 川椒炭 姜半夏 良姜 益智仁 生苡仁 廣皮 公丁香

燥金感後。所傷者陽氣。何得以大劑熟地補陰。久久補之。胃陽困頓。無
怪乎不能食而嘔矣。六脈弦緊。豈不知脈雙弦者寒乎。

半夏 雲苓塊 廣皮 苡仁 川椒炭 生姜 乾姜 公丁香

胃痛脅痛。或嘔酸水。多年不愈。現在六脈弦緊。皆起初感受燥金之氣。

金來克木。木受病未有不克土者。土受病之由來。則自金始也。此等由外感而延及內傷者。自唐以後無聞焉。議變胃而不受胃變法。即用火以克金也。又久病治絡法。

雲苓 生苡仁 枳實 半夏 川椒炭 生姜 廣皮 公丁香

感受燥金之氣。陽明之上。中見太陰。胸痛脅痛。腹脹泄瀉。飲咳。皆太陰病也。誤服寒涼。勢已重大。勉與開太陽闔陽明法。

雲茯苓 豬苓 厚朴 藿半夏 澤瀉 乾薑 桂枝 川椒炭 廣皮 廣木香

六脈陽微之極。弦細而緊。內而飲聚。外而癰痛。兼之內苛。飲食減少。得食嘔。乃內傷生冷。外感燥金之氣而然。以急救三焦之陽。與陽明之陽爲要。

桂枝 藿半夏 乾薑 降香 雲苓塊 苡仁 吳萸 川椒炭 廣皮 蘆白 公丁香 生薑

燥金克木。連少腹久痛不休。腿脚俱痛。兼有溢飲。與陽明從中治法。

藿半夏 雲苓 淡吳萸 川椒炭 益智仁 良姜 公丁香 廣皮

瘧疾

但寒不熱。似乎牝瘧。然渴甚。皮膏捫之亦熱。乃伏暑內發。新涼外加。熱未透出之故。仍用苦辛寒法。加以升提。

飛滑石 花粉 藿香葉 杏仁泥 知母 廣鬱金 生苡仁 青蒿 白蔻仁 老厚朴 黃芩

妊娠七月。每日午後先寒後熱。到戌時微汗而解。已近十日。此上年伏暑成瘧。由初春升發之氣而發。病在少陽。與小柴胡法。

柴胡 姜半夏 生姜 人參 炙甘草 大棗 黃芩

體厚本有小腸寒溼。糞後便血。舌苔灰白而厚。中黑滑。嘔惡不食。但寒不熱。此溼瘧也。與刼法。

茯苓塊 生草果 熟附子 生蒼朮 杏仁 檳榔 黃芩炭 生苡仁

脈雙弦。伏暑成瘧。間三日至。舌苔白滑。熱多陰少。十月之久不止。邪已深入。急難速出。且與通宣三焦。使邪有出路。勿得驟補。

蜜蒼皮 知母 杏仁泥 生苡仁 炒黃芩 青蒿 藿香梗 姜半夏 白蔻仁

中風

左肢拘攣。舌厚而塞不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與膩藥補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏 杏仁 鮮桑枝 雲苓塊 防己 白通草 姜半夏 廣皮 桑三杯分三次服

中風。神呆不語。前能語時。自云頭暈。左肢麻。口大歪。不食。六脈弦數。此痺中也。與柔肝法。

直生地 白芍 左牡蠣 生鱉甲 麥冬 炙甘草

厥症

肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再肝厥之症。亦有寒熱之不同。此證脈沈而弦細。其爲寒也無疑。大凡寒厥必死。今不死者。以其爲腑厥而非臟厥也。現脅下有塊有聲。經色紫黑。議先用溫通絡