

女科經綸

清 樵李 蕭 壘 廣六纂著

卷四

胎前證下

經論妊娠舌瘡屬胞之絡脈絕

素問曰。人有重身。九月而瘡。此何爲也。曰。胞之絡脈絕也。曰。何以言之。曰。胞絡者。繫於腎。少陰之脈貫腎。繫舌本。故不能言。曰。治之奈何。曰。無治也。當十月復。

妊娠不語名。子瘡不須藥

大全曰。孕婦不語。非病也。間有如此者。不須服藥。臨產月。但服保生九。四物湯之類。產下便語得。亦自然之理。非藥之功也。醫者不說與人。臨月以尋常藥服之。產後能語。以爲醫之功。豈其功也哉。博陵醫之神者。曰郝翁士。有一婦人妊娠。嘿

不能言。郝曰：兒胎大經壅，兒生經行，則言矣。不可毒以藥。

薛立齋曰：內經窮理之言，人有患此，當調攝以需之，不必驚畏而泛用藥也。

妊娠子瘕以降心火清肺金爲治

張子和曰：婦人重身，九月而瘕者，是脬之絡脈不相接也。經曰：無治。雖有此論，可煎玉燭散二兩，放冷，入蜜少許，時呷之，則心火下降而肺金自清，故能作聲也。

妊娠子瘕治當補心腎

馬玄臺曰：經云：婦人重身，九月而瘕者，胞之絡脈絕也。無治。當十月復。方論人之受孕，一月肝經養胎，二月膽經養胎，三月心經養胎，四月小腸經養胎，五月脾經養胎，六月胃經養胎，七月肺經養胎，八月大腸經養胎，九月腎經養胎，十月膀胱經養胎。先陰經而後陽經，始於木，終於水，以五行之相生言也。然以理推之，手足十二經之脈晝夜流行無間，無日無時而不共養胎氣也。必無分經養胎之理。今曰九月而瘕，時至九月，兒體已長，胞絡宮之絡脈繫於腎經者，阻絕不通，故間有之。蓋腎經之脈下貫於腎，上繫舌本，脈道阻絕，則不能言。故至十月分娩後，自能言，不必治。治之當補心腎爲宜。大奇論以胞精不足者，善言爲死，不言爲生，此可

驗九月而瘡非胞精之不足。故十月而復也。

張嶠璜曰瘡謂有言而無聲。故經曰不能言。此不能二字。非絕然不語之謂。凡人之音。生於喉嚨。發於舌本。因胎氣肥大。阻腎上行之經。以腎之脈入肺中。循喉嚨。繫舌本。喉者肺之部。肺主聲音。其人切切私語。心雖有言。而人不能聽。故曰瘡。肺腎子母之臟。故云不必治。若夫全解作不語。則爲心病。以心主發聲爲言也。與子瘡了不相干。若子和有降心火之說。玄臺有補心腎之言。如果腎之脈絡絕。而上于心。則其病不治。豈有產後自復之理乎。故經云胞之絡脈絕。此絕字當作阻字解。

慎齋按。已上四條。序胎前有子瘡之證也。妊娠不語。遵內經之旨。固無治法。故大全而下。後人不敢強立方論。獨子和以降心火爲治。玄臺以補心腎立法。則以胞之絡脈屬手足少陰二經故也。但產後不語。屬敗血之入心。中風舌瘡。屬痰涎之滯絡。則胎前子瘡。亦必有所感。更當詳證參治。以補張馬二公之未盡。若子瘡用玉燭散。似屬無理。

妊娠中風宜養血以安胎爲主

薛立齋曰。按機要云。風本爲熱。熱勝則風動。宜靜勝其躁。是養血也。治法宜少汗。亦宜少下。多汗則虛衛。多下則損榮。雖有汗下之戒。而有中腑中臟之分。中腑者。多着四肢。則脈浮惡寒拘急不仁。中臟者。多着九竅。則脣緩失音耳聾鼻塞目瞽便秘。中腑者宜汗。中臟者宜下。表裏已和。宜治在經。當以大藥養之。妊娠患之。亦當以此施治。佐安胎之藥爲主。勿過用治中風藥。

妊娠風瘧爲子癰屬體虛受風

陳良甫曰。妊娠體虛受風。傷足太陽經絡。復遇風寒相搏。則口噤背強。甚則腰反張。名曰瘧。其候冒悶不識人。須臾自醒。良久復作。謂之風瘧。一名子癰。

子癰分諸證用藥之法

薛立齋曰。前證若心肝風熱。用鈎藤湯。肝脾血虛。加味逍遙散。肝脾鬱怒。加味歸脾湯。氣逆痰滯。紫蘇飲。肝火風熱。鈎藤湯。脾鬱痰滯。二陳加竹瀝薑汁。

妊娠瘧癰屬心肝二經風火相熾

薛立齋曰。瘧者筋脈急而縮。癰者筋脈緩而伸。一伸一縮。手足相引搖擲。此證多屬風。蓋風主搖動。駱龍吉云。心主脈。肝主筋。心屬火。肝屬木。火主熱。木主風。風火

相熾。則爲瘕瘕。治法若因風熱。鈎藤湯加梔柴芩朮。以平肝木。降心火。養氣血。若風痰上湧。加半夏南星竹瀝。若風邪急搐。加全蝎天蟲。若氣血虧損。八珍湯加鈎藤山梔。若無力抽搐。戴眼反折。汗出如油者。肝絕也不治。

慎齋按。已上四條。序胎前有中風證。而風痙。子癇。瘕瘕。其類及也。中風證多因。治法亦不一。立齋以潔古一論。爲妊娠中風治法。惟靜勝其躁。養血爲主。斯爲療胎前中風之要。夫胎之賴以養者。血也。血虛則易於感邪。血行風自滅。丹溪於胎前。惟清熱養血爲主。立齋祖之。引機要一條爲證。論誠有本矣。慎齋再按。胎前中風。此正河間所謂將息失宜。腎水衰而心火旺。肝無所養。是非外中風邪。急當滋其化源。瀉南補北。壯水制火。則肝木自平。胎氣可安。恐養血猶屬第二義也。

妊娠感寒咳嗽爲子嗽

陳自明曰。肺內主氣。外司皮毛。皮毛不密。寒邪乘之。入射於肺。則咳嗽。夫五臟六腑俱受氣於肺。各以其時。感於寒而爲病。秋則肺受之。冬則腎受之。春則肝受之。夏則心受之。長夏則脾受之。嗽不已。則傳於腑。妊娠而嗽。謂之子嗽。久嗽不已。則

傷胎。

妊娠咳嗽屬肺燥鬱熱

朱丹溪曰。胎前咳嗽。由津血聚養胎元。肺乏濡潤。又兼鬱火上炎所致。法當潤肺爲主。天冬湯主之。

妊娠咳嗽分證用藥之法

薛立齋曰。前證若秋間風邪傷肺。金沸草散。夏間火邪剋金。人參平肺散。冬間寒邪傷肺。人參敗毒散。春間風邪傷肺。參蘇飲。若脾肺氣虛。六君子加歸芎桔梗。若血虛。四物加桑皮杏仁桔梗。腎火上炎。六味丸加五味。脾胃氣虛。爲風寒所傷。補中湯加桑皮杏仁桔梗。蓋肺屬辛金。生於己土。嗽久不已。多因脾虛。不能生肺氣。腠理不密。致外邪復感。或因肺虛。不能生水。致陰火上炎。治法當壯土金。生腎水。以安胎爲要。

慎齋按。已上三條。序胎前有咳嗽證也。咳嗽屬肺病。大全主於外感寒邪。丹溪主於內傷肺燥。若立齋則分四時所感。五臟均受。有風寒火之不同。外感內傷之各別。雖不盡屬胎前咳嗽論。而治法無殊。總兼安胎爲主也。

妊娠傷寒以清熱安胎爲主

萬密齋曰。妊娠傷寒。專以清熱安胎爲主。或汗或下。各隨五臟表裏所見脈證主治。勿犯胎氣。

妊娠傷寒不可犯胎

吳蒙齋曰。妊娠傷寒。六經治例皆同。但要安胎爲主。凡藥中有犯胎者。不可用也。如藿香正氣散。十味芎蘇散。參蘇飲。小柴胡湯之類。有半夏能犯胎。如用。須去之。如桂附硝黃等藥。皆動胎。凡用。必須斟酌。大抵妊娠傷寒。合用湯劑。必加黃芩白朮。能安胎。或與此二味煎湯與之。如妊婦素稟弱者。藥中四物佐之。不可缺。如用小柴胡。去半夏。加白朮。合四物湯用之。可以保胎除熱。其效如神。餘倣此用之。則妙矣。

慎齋按。白朮黃芩。爲安胎之聖藥。此丹溪之妙論也。丹溪以胎前須清熱。故用黃芩。胎前須健脾燥濕。故用白朮。若妊娠傷寒。爲三陽經病。如頭痛惡寒發熱。白朮可遽用之乎。而謂其保胎除熱。是關門趕賊矣。

妊娠傷寒用六合湯法

醫壘元戎曰。胎前病。惟當安胎順氣。若外感四氣。內傷七情。以成他病。治法與男子無異。當於各證類中求之。但胎前病動胎之藥。切須詳審。當以四物湯加減六合湯。

慎齋按。已上三條。序胎前有傷寒證也。傷寒六經傳變。婦人與男子無殊。惟妊婦患此。其用藥汗下溫之中。當以保胎爲主。其一切犯胎之藥。當酌之。不可云有故無殞而毒藥亂投。以致傷胎夭枉也。

妊娠瘧疾寒熱屬氣血虛損所致

產寶百問曰。瘧者寒熱之疾。皆因於風寒也。風爲陽邪。化氣而爲熱。寒爲陰邪。化氣而爲寒。陰陽相反。邪正更作。或陰併於陽。則陰實陽虛。若陽併於陰。則陽實陰虛。或先傷於風。後傷於寒。則先熱後寒。或先傷於寒。後傷於風。則先寒後熱。作止有時。故名爲瘧。經云。夏傷於暑。秋必病瘧。此因暑氣所傷也。若妊娠寒熱。皆因氣血虛損。風寒乘之。致陰陽并挾。寒熱互見。經云。陽微惡寒。陰弱發熱。此皆虛所致。不因暑氣所作。若寒熱不已。熏蒸其胎。胎必傷。人參羌活湯主之。

妊娠瘧疾用藥以安胎爲主

何松庵曰。妊娠病瘧。寒熱俱作。氣爲陽。陽虛則惡寒。血爲陰。陰虛則發熱。蓋懷胎最怕寒戰。筋骨皆振。易動其胎。用藥者必以安胎爲首務。蓋脾胃虛弱。飲食停滯。或爲暑邪所感。六君子加桔梗。蒼朮。藿香。若外邪多。飲食少。藿香正氣散。外邪少。飲食多。人參養胃湯。去半夏。熱多寒少者。清脾飲。去半夏。虛者用四獸飲。四君子加陳皮。半夏。草果。大棗。若久不愈。六君子爲主。佐以安胎藥。

妊娠卽瘧屬肝虛血燥

趙養葵曰。有患胎瘧者。一遇有胎。瘧病卽發。此人素有肝火。遇有孕則水養胎元。肝虛血燥。寒熱往來。似瘧非瘧也。以逍遙散清肝火。養肝血。兼六味丸以滋化源。慎齋按。已上三條。序胎前有瘧疾證也。妊娠瘧疾。或有風寒暑熱之邪。或有氣血虛損之候。寒熱交作。顫戰股慄。百節振搖。墮胎最易。故古人用藥。先以安胎爲急。但邪不去。則胎亦未必安。故安胎莫先於去邪。而去邪如常山。草果。檳榔。厚朴。麻桂。大黃。又未可須投。惟發表之中兼補氣。清熱之中兼養血爲當耳。

妊娠痢疾屬飲食生冷

陳良甫曰。妊娠飲食生冷。脾胃不能剋化。致令心腹疼痛。若血分病則色赤。氣分

病則色白。血氣俱病。則赤白相雜。若熱乘大腸。血虛受惠。則成血痢矣。

妊娠痢疾屬相火上炎

壺仙翁曰。有婦妊娠。病痢不止。診其脈。虛而滑。兩關若瀉。此由胎氣不和。相火上炎。而有熱。似痢實非痢也。用黃芩白朮以安胎。四物生地以調血。數劑而安。

妊娠痢疾屬下元氣虛

薛立齋曰。有婦妊娠久痢。用消導理氣之劑。腹內重墜。胎氣不安。又用阿膠艾葉之類。不應。此腹重墜。下元氣虛也。胎動不安。內熱盛也。用補中湯而安。又用六君子湯全愈。

妊娠下痢黃水屬脾虧氣陷

薛立齋曰。妊娠痢下黃水。乃脾土虧損。真氣下陷也。當升補中氣。若黃而兼青。乃肝木剋脾土。宜平肝補脾。若黃而兼白。乃子令母虛。須補脾肺。若黃而兼黑。是水反侮土。必溫補脾腎。若黃而兼赤。乃心母益子。但補中益氣湯。若腸胃虛弱。風邪客之。用胃風湯。或脾氣不安。急補脾胃自安。凡安胎之藥。當臨病制宜。不必拘用阿膠艾葉之類。

慎齋按。已上四條。序胎前有痢疾證也。胎前痢。亦有暑邪濕熱外感致病。不可
端主。飲食生冷爲患。但妊娠痢疾。本於脾胃不和。因而氣血受病。氣傷則白。血
傷則赤。若守河間之法降氣。後重自除。行血便膿自止。不知胎前之氣果可降
乎。氣降則胎下墜。胎前之血果可行乎。血行則胎必墮。莫若多用木香以調氣。
多用當歸以養血。此二藥乃爲胎前痢疾妙劑。再以四物倍白朮黃芩。丹溪所
謂先托住正氣以固其胎。而後順氣和血。佐以消積導滯。此治妊娠之要法也。
妊娠霍亂屬飲食風冷

大全曰。飲食過度。觸冒風冷。陰陽不和。清濁相干。謂之霍亂。其間或先吐。或腹痛
吐痢。是因於熱也。若頭痛體疼。發熱。是挾風邪也。若風折皮膚。則氣不宣通。風熱
上衝爲頭痛。若風入腸胃。則泄痢嘔吐。甚則手足逆冷。此陽氣暴竭。謂之四逆。妊
娠患之多致傷胎。

薛立齋曰。前證若因內傷飲食。外感風寒。用藿香正氣散。若因飲食停滯。用平胃
散。若果脾胃頓傷。陽氣虛寒。手足逆冷者。須用溫補之劑。治當詳審。毋使動胎也。

妊娠霍亂吐利邪氣易傷胎元

萬密齋曰。霍亂者。陽明胃經之病名也。因平日五味肥醲。腐積成痰。七情鬱結。氣盛爲火。停畜胃中。乍因寒熱之感。邪正交爭。陰陽相混。故令心腹絞痛。吐痢並作。揮霍變亂。如邪在上胃脘。則當心而痛。其吐多。邪在下胃脘。則當臍而痛。其利多。邪在中脘。其腹中痛。吐痢俱多。吐多則傷氣。利多則傷血。血氣受傷。不能護養其胎。邪氣鼓擊胎元。母未有不殞者。此危證不可不亟治。宜香蘇散加藿香葉主之。慎齋按。已上二條。序胎前有霍亂證也。妊娠霍亂吐痢絞痛。最易傷胎。故胎前霍亂。宜辨飲食生冷。暑濕風寒四氣之感。隨其邪之所湊治之。而以保胎爲主也。

妊娠泄瀉見證用藥治法

大全曰。妊娠泄瀉。或青或白。水穀不化。腹痛腸鳴。謂之洞泄。水穀不化。喜飲嘔逆。謂之協熱下利。並以五苓散利小便。次以黃連阿膠丸。或三黃熟艾湯以安之。若瀉黃有沫。腸鳴腹痛。脈沉緊數。用戊己丸和之。噉腐不食。胃脈沉緊。感應丸下之。後調和脾胃。若風冷水穀不化如豆汁。用冒風湯寒冷。臍下陰冷洞泄。用理中湯。

治中湯。伏暑。煩渴瀉水。用四苓散。傷濕。泄瀉。小便自利。用不換金正氣散。胃苓湯。此四證之大略也。

慎齋按。泄瀉之證多因。有內外之合邪。有虛實之不同。况胎前泄瀉。尤宜審因詳證。豈四證足以盡之乎。抑四證可執定數方以施治乎。

妊娠泄瀉分因用藥之法

薛立齋曰。泄瀉若米食所傷。六君子加穀芽。麵食所傷。六君子加麥芽。肉食所傷。六君子加山楂。若兼寒熱作嘔。乃肝木侮脾土。六君子加柴胡生薑。兼嘔吐腹痛。手足逆冷。乃寒水侮土。六君子加薑桂。不應。錢氏益黃散。若元氣下陷。發熱作渴。肢體倦怠。補中湯。若泄瀉色黃。乃脾土真色。六君子加木香肉果。若作嘔不食。腹痛惡寒。乃脾土虛寒。六君子加木香薑桂。若瀉在五更侵晨。飲食少思。乃脾腎虛弱。五更服四神丸。日間服白朮散。如不應。或愈而復作。或飲食少思。急用八味丸。補命門火。以生脾土爲善。

慎齋按。已上二條。序胎前有泄瀉證也。妊娠泄瀉。必原其由。大抵不外脾腎二臟虛者居多。夫血統於脾。血擁胎元。則脾陰虛而食不運化。水穀難消而作瀉。

胎繫於腎。腎氣弱。命門火衰。胎竊其氣以擁護。而腎間之陽不能上蒸脾土。則爲瀉。此妊娠泄瀉之由也。雖其間不無風寒暑濕之外感。飲食生冷之內傷。而屬於脾腎有虧者。其本也。大全漫序四證。爲妊娠泄瀉大略。已屬草率無理。立齋又以大概泄瀉證候。分配某證用某藥爲治。此膠柱鼓瑟。印定後人眼目。予不能無議者也。

妊娠傷食屬於飲食不節

大全曰。經云。飲食自倍。腸胃乃傷。又云。陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。若妊娠飲食不節。生冷毒物。恣性食啖。致傷脾胃。故妊娠傷食。最難用藥。惟木香丸白朮散二方最穩。

妊娠傷食分證用藥之法

薛立齋曰。東垣云。脾胃之氣壯。則過時而不饑。多食而不傷。蓋胃主司納。脾主消化。五臟之本也。食倍而傷者。脾氣虛而不化也。若投以峻劑。則脾胃復傷。而胎亦損。當審所因調治。若飲食停滯。或腹痛。平胃散。嘔吐惡心。加枳殼砂仁。吞酸噉腐。加黃連吳茱。腹滿泄瀉。六君子湯。停肉食。加山查麵食。加麥芽卜子。糯米。加白酒。

麴米食。加穀芽。魚腥傷。倍陳皮。傷辛熱之物。加黃連。傷生冷之物。加砂仁木香。大凡脾胃虛弱。飲食難化。以白朮陳皮爲末。神麴丸最穩。枳殼丸可暫用。枳實峻厲。能耗真氣。治者慎之。

慎齋按。已上二條。序胎前有傷食證也。妊娠傷食。多由脾胃虛弱。不能運化。沉胎以脾胃爲主。脾胃強。則胎系如懸鐘而不墜。若傷食不化。則脾困而胎不能固。故凡消食導滯。先以補脾健胃爲主。則飲食自化。一切峻厲剋伐之藥。未可浪投。以傷胎氣。觀立齋一條。得其本矣。

妊娠吐血屬臟腑有傷氣逆於上

大全曰。妊娠吐血者。皆由臟腑有傷。凡憂思驚怒。皆傷臟腑。氣逆於上。血隨而溢。心悶滿煩。久而不已。多致墮胎。

妊娠吐血分證用藥之法

薛立齋曰。妊娠吐血。若肝經怒火。先用小柴胡山梔生地。次用四物加味逍遙散。若肝經風熱者。防風子芩丸。心經有熱者。朱砂安神丸。心氣不足者。補心湯。思慮傷心者。妙香散。胃經有火者。犀角地黃湯。膏粱積熱者。加味清胃散。肺經有火者。

黃芩清肺飲。氣不攝血。用補中湯。腎經虛火者。加味六味丸。

慎齋按。已上二條。序胎前有吐血證也。吐血證。或七情內傷。或六淫外感。皆足致失血之患。而妊娠吐血。一主火熱者。正以氣血壅養胎元。或有所感。則氣逆而火上乘。此立齋分證。獨主火論也。但火有虛實之分。實火當清熱以養血。虛火當滋陰以補水。則胎安而可固。若執以尋常治血之法。用行血消血之劑。胎必墮而禍不旋踵矣。

妊娠喘息屬肺隘氣爭

產寶百問曰。胎前喘息。皆由榮衛之氣流行失度。氣經於臟。臟不能受。諸氣上併於肺。肺隘而氣爭。故令喘。其始得之。或因恐墜。則精却。却則上焦閉而氣不行。則留於肝。肝乘於肺。此喘出於肝也。或因驚恐。驚則心無所依。神無所歸。氣亂於中。心乘於肺。此喘出於心也。或因墮水跌仆。腎氣暴動。傷而不通。氣留於腎。腎氣上乘於肺。此喘出於腎也。或因飽食過傷。動作用力。穀氣不行。脾氣逆肺。此喘出於脾也。諸臟相乘爲喘。名各不同。

妊娠胎逆作喘屬於火

朱丹溪曰。妊婦因火動胎。逆上作喘。急者用條芩香附爲末。才調服。

妊娠作喘屬毒藥傷胎

呂滄洲曰。有婦胎死於腹。病喘不得臥。醫以風邪傷肺治之。診其脈。氣口盛人迎一倍。左關弦動而疾。兩尺俱短而離經。因曰。病蓋得之毒藥動血。以致胎死不下。奔迫而上。衝非風寒作喘也。大劑芎歸湯。加催生藥服之。夜半果下一死胎而喘止。其夫曰。病妾誠有懷。以室人見嫉。故藥去之。衆所不知也。

慎齋按。已上三條。序胎前有喘證也。內經論喘。屬於肺經爲病。若妊娠氣喘。有乍感風寒而不得臥者。客邪勝也。發散自愈。參蘇飲主之。三拗湯在所斟酌。若脾虛。四肢無力。肺虛不任風寒。腎虛腰痠。短氣不能步。猝然氣喘不息。此脾肺素虧。母虛子亦虛。腎氣不歸元而上乘於肺也。生脈散補中湯去升柴。加沉香補骨主之。產寶一條。是泛論喘證。有五臟相乘。非論胎前病也。丹溪火動作喘。此胎前最多。至於毒藥傷胎病喘。時俗往往有之。病機之不可不察者也。

婦人無故悲傷屬於臟燥

張仲景曰。婦人臟燥。悲傷欲哭。象如神靈所作。數欠伸。甘草小麥大棗湯主之。